

レジメンスケジュール

診療科	乳腺外科
適応	乳癌
レジメン	乳AC療法

申請・改訂日	2018年5月
備考	

クール関連
下記の通り、総4クール

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day2	day3	day4	day21
①		アプレピタント		内服		点滴も可	125mg	朝80mg	朝80mg										
①		デキサメタゾン注	9.9mg	メイン	15分		○												
		パロノセトロン	0.75mg																
		生理食塩液	50mL																
②	○	ドキシソルピシン	60mg/m ²	メイン	15分	総投与量500mg/m ² を超えない	○												
			生理食塩液																
③	○	シクロフォスファミド	600mg/m ²	メイン	30分		○												
			生理食塩液																
④		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○												
⑤		デキサメタゾン	8mg	内服				○	○	○									
																			終了

投与開始基準

好中球数1500以上、血小板10万以上、ヘモグロビン8以上

減量・中止基準

ドキソルビシン	総投与量が500mg/m ² を超えると心毒性のリスク増大 T-Bil: 1.2~3かつAST160~180: 50%減量 T-Bil: 3.1~5かつAST180超: 75%減量
シクロフォルフアミド	GFRが10mL/min未満: 25%減量 T-Bil: 3.1~5またはAST3×ULN以上: 25%減量 T-Bil: 5以上: 中止