

レジメンスケジュール

診療科	乳腺外科
適応	乳癌
レジメン	乳PTX+Tmab(4週毎)療法

申請・改訂日	2016年8月
備考	

クール関連	
下記の通り	

使用した臨床データ	
がん化学療法レジメンハンドブック	

1クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day28
①		デキサメタゾン注	9.9mg	メイン	15分		○		○		○								
		ファモチジン注	20mg																
		クロルフェニラミン注	5mg																
		生理食塩液	50mL																
②		グラニセトロン注	3mg	メイン	30分		○		○		○								
②		生理食塩液	50mL																
③	○	パクリタキセル	80mg/m ²	メイン	60分	PVCルート、要フィルター	○		○		○								
			生理食塩液																
④	○	トラスツズマブ	4mg/kg	メイン	90分		○		2mg/kg 30分可		2mg/kg 30分可								
			生理食塩液																
⑤		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○								

終了

2クール目以降																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day28
①		デキサメタゾン注	9.9mg	メイン	15分		○		○		○								
		ファモチジン注	20mg																
		クロルフェニラミン注	5mg																
		生理食塩液	50mL																
②		グラニセトロン注	3mg	メイン	30分		○		○		○								
②		生理食塩液	50mL																
③	○	パクリタキセル	80mg/m ²	メイン	60分	PVCルート、要フィルター	○		○		○								
			生理食塩液																
④	○	トラスツズマブ	2mg/kg	メイン	90分 30分も可		○		○		○								
			生理食塩液																
⑤		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○								

終了

投与開始基準

各コース開始時:白血球数3000未満または好中球数1500未満の場合。回復するまで延期

減量・中止基準

	AST/ALT	T-Bil	パクリタキセル
肝機能障害	10×ULN未満	1.26～2×ULN	左記両方満たす場合25%減量
	10×ULN未満	2.01～5×ULN	左記両方満たす場合50%減量
	10×ULN以上	5×ULNを超える	左記どちらかを満たす場合中止
血球	前顆粒球数1000以上、血小板数10万以上、G4以上の血小板減少症(2.5万未満)を認めた場合は、1段階減量を行う。		
トラスツズマブ			
設定されていない。定期的な心機能モニタリングを行うこと。			