

レジメンスケジュール

診療科	消化器外科
適応	大腸癌
レジメン	大腸5FU+LV療法

申請・改訂日	2018年11月
備考	

クール関連
結腸直腸癌術後補助療法3クール

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	...	day22	...	day29	...	day36	...	day56
①		デキサメタゾン注	6.6mg	CVポート	30分		○		○		○		○		○		○		
①		生理食塩液	50mL				○		○		○		○		○		○		○
②		レボホリナート	250mg/m2	CVポート	120分		○		○		○		○		○		○		
		5%ブドウ糖液	250mL				○		○		○		○		○		○		○
③	○	5-FU	500mg/m2	CVポート	全開	レボホリナート開始1時間後に5FU開始	○		○		○		○		○		○		
		生理食塩液	50mL				○		○		○		○		○		○		○
④		生理食塩液	50mL	CVポート	全開	フラッシュ	○		○		○		○		○		○		

終了

投与開始基準

5FU(一般的な基準記載)

投与可能条件	好中球1500/mm ³ 以上、血小板75000/mm ³ 以上であれば、2コース目以降の投与可能
--------	---

減量・中止基準

5FU(一般的な基準記載)

副作用	程度	処置
好中球減少	G3以上	休薬
血小板減少	G3以上	休薬
消化器系の副作用	予防的治療の施行にもかかわらずG3以上発現した場合	休薬
肝機能障害	T-Bilが5mg/dL以上	投与中止