

減量・中止基準 (CHOP療法より)

シクロフォスファミド		
副作用	程度	対処法
腎機能障害	Ccr10未満の場合	25%減量
肝機能障害	T-Bil 3.1~5mg/dL または AST 3×ULN超	25%減量
	T-Bil 5mg/dL超	中止
※特徴的禁忌	ペントスタチンを投与中の患者	投与をしてはいけない
ドキシソルビシン		
副作用	程度	対処法
心筋障害	発現時(総投与量が500mg/m2を超えると起こりやすくなる)	中止
肝機能障害	T-Bil 1.5(or1.2)~3mg/dL または AST 60~180IU/L	50%減量
	T-Bil 3.1~5mg/dL または AST 180IU/L超	75%減量
	T-Bil 5mg/dL超	中止
※特徴的禁忌	心機能異常またはその既往歴のある患者	投与をしてはいけない
ビンクリスチン		
副作用	程度	対処法
肝機能障害	T-Bil 1.5~3mg/dL	50%減量
	T-Bil 3超	中止
消化器障害	重度便秘、腸管麻痺、消化管穿孔	中止
※特徴的禁忌	脱髄性Charcot-Marie-Tooth病の患者	投与をしてはいけない
CHOP 3薬剤		
副作用	程度	対処法
好中球減少	1500/mm ³ 未満	中止
血小板減少	150000/mm ³ 未満	中止