

## レジメンスケジュール

診療科	呼吸器外科
適応	非小細胞肺癌
レジメン	肺CPT-11(3投1休)療法

申請・改訂日	2012年7月
備考	

クール関連

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																					
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	...	...	...	...	...	...	...	day28		
①		デキサメタゾン注	9.9mg	メイン	15分		○		○		○										
①		グラニセトロン注	3mg				○		○		○										
①		生理食塩液	50mL				○		○		○										
②	○	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	メイン	90分	遺伝子多型に注意	○		○		○										
		5%ブドウ糖液	250mL				○		○		○										
③		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○										

終了

## 投与開始基準

イリノテカン

PS0-2、白血球数4000/mm<sup>3</sup>以上、血小板数100000/mm<sup>3</sup>以上、ヘモグロビン値9g/dL、AST/ALT 2×ULN以下、T-Bil 1.5mg/dL以下

## 減量・中止基準

イリノテカン

副作用	程度	対処法
白血球減少	2000～3000/mm <sup>3</sup> の場合	3000/mm <sup>3</sup> 以上に回復後100%Doseで投与
	2000/mm <sup>3</sup> 未満の場合	回復後80%Doseに減量して投与