

## レジメンスケジュール

診療科	泌尿器科
適応	尿路上皮癌、膀胱癌
レジメン	尿路上皮M-VAC療法

申請・改訂日	2008年4月
備考	

クール関連
-------

使用した臨床データ
添付文書参照

全クール																				
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day2	...	day15	...	day22	...	...	...	...	...	...	day28	
①		5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL	メイン:メ 側管:側	120分		○300分	メ①		○		○								
②	○	メトレキサート 生理食塩液	30mg/m2 100mL		30分		○			○		○								
③		5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL		120分				メ②											
④	○	ビンプラスチン 生理食塩液	3mg/m2 100mL		30分				側①		○		○							
⑤	○	ドキシルピシン 生理食塩液	30mg/m2 100mL		30分				側②											
⑥		ファモチジン注 5%ブドウ糖液	20mg 500mL		120分				メ③											
⑦		マンニトール	300mL		60分				メ④											
⑧		デキサメタゾン注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6mg 3mg 50mL		30分		シスプラチン投 与30分前に		側③ 側③ 側③											
⑨	○	シスプラチン 生理食塩液	70mg/m2 500mL		180分		total500mL		メ⑤	シスプラチン投与後数日間は飲水励行。補液追加も検討を。										
⑩		4号液	500mL		120分				メ⑥											
⑪		4号液	500mL		120分				メ⑦											

終了

各薬剤の添付文書を参照のこと。GC療法推奨。