

## レジメンスケジュール

診療科	消化器外科
適応	転移再発胃癌
レジメン	胃CPT-11(A)療法

申請・改訂日	2012年7月
備考	3rd line以降

クール関連
-------

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																					
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	...	day22	...	...	...	...	...	day42		
①		デキサメタゾン注	9.9mg	メイン	30分		○		○		○		○						終了		
①		グラニセトロン注	3mg				○		○		○		○								
①		生理食塩液	100mL				○		○		○		○								
②	○	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	メイン	90分	遺伝子多型に注意	○		○		○		○								
		5%ブドウ糖液	250mL				○		○		○		○								
③		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○		○								

## 減量・中止基準

イリノテカン(卵巣がんCPT-11単独療法でのがん化学療法レジメンハンドブック参照)

副作用	程度	対処
骨髄抑制	白血球数3000/mm <sup>3</sup> 未満または血小板数10万/mm <sup>3</sup> 未満	回復まで延期または中止
	上記であっても急激な減少傾向があるなど骨髄抑制が疑われる場合	回復まで延期または中止
下痢	G2以上	回復まで中止