

レジメンスケジュール

診療科	泌尿器科
適応	進行・再発の尿路上皮癌(膀胱癌)
レジメン	GCarbo(3週間)療法

申請・改訂日	2020年6月
備考	

クール関連

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック等

投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day2	...	day8	...	day15	day21
①		グラニセトロン注	3mg	メイン	15分			○											終了
		デキサメタゾン注	6.6mg				○	○		○		○							
		生理食塩液	50mL				○	○		○		○							
②	○	ゲムシタピン	1000mg/m ²	メイン	30分														
		生理食塩液	100mL				○			○		○							
③	○	カルボプラチン	AUC5	メイン	60分			○											
		5%ブドウ糖液	250mL																
④		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○	○		○		○							

投与開始基準

項目	程度
白血球数	3000/mm以上
好中球数	1500/mm以上
血小板数	100000/mm ³ 以上
ヘモグロビン値	10g/dL以上
PS	0~2
AST/ALT	正常値上限の3倍未満
T-Bil	正常値上限の1.5倍未満
Ccr値	30mL/min以上

減量・中止基準

副作用	程度	対処法
白血球減少	2000/mm ³ 未満	休薬し、減量はしなくてもよい
好中球減少	1000/mm ³ 未満	休薬し、減量はしなくてもよい
血小板減少	70000/mm ³ 未満	休薬し、減量はしなくてもよい
非血液毒性	G4または再発性のG3	休薬し、減量はしなくてもよい