

医療法人社団こうかん会
日本鋼管病院

常用医薬品集

2024年 6月 改訂版

利用の手引

1. 本書は2024年6月1日現在の当院採用医薬品を収載したものである。
2. 本書は「薬効分類別目次」、「五十音順索引」、「本文」よりなる。
3. 本文は薬効別に分類し、配列順序は、日本標準商品分類を基準とした。
4. 本文の記載内容は添付文書に準じている。必要に応じて最新の添付文書を確認のこと。
5. 「本文」の記載内容は下記のとおり。

(院内)：院内専用薬

(院外)：院外専用薬

(患者限定)：処方される患者を限定した薬品

(今回限定)：今回に限って処方される薬品

(水江)：水江診療所で処方される薬品

(クリニックのみ)：クリニック限定で処方される薬品

※上記複数組み合わせでの採用区分も有り

* 1 ㊦：生物由来製品, ㊧(特生)：特定生物由来製品, ㊨：毒薬, ㊩：劇薬, ㊪：麻薬,
㊫：覚醒剤原料, ㊬：習慣性医薬品, ㊭：後発医薬品

* 2 後発品の場合、対応先発品名(同一規格品)を記載

* 3 (内)：内服, (外)：外用, (注)：注射

※ 溶解・希釈に使用する注射用水・生理食塩水等は日本薬局方のもとし、本文中の局方記載は省略した。

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量・備考
一般名 ㊭商品名 * 1 規制区分 商品名英名 (会社名) 規格単位 【薬価】 【先発品】 配合成分 * 2 先発医薬品名	【効】 効能・効果：承認を受けた効能又は効果 【用】 (* 3 投与経路) 用法・用量：承認を受けた用法及び用量

薬効分類別目次

1. 神経系及び感覚器官用医薬品	1	1242. アトロピン系製剤	42
11. 中枢神経系用薬	1	1244. マグネシウム塩製剤	43
111. 全身麻酔剤	1	1249. その他の鎮けい剤	43
1115. 溶性バルビツール酸系及び溶性チオ バルビツール酸系製剤	1	125. 発汗剤, 止汗剤	43
1119. その他の全身麻酔剤	2	1259. その他の発汗剤, 止汗剤	43
112. 催眠鎮静剤, 抗不安剤	4	13. 感覚器官用薬	44
1124. ベンゾジアゼピン系製剤	4	131. 眼科用剤	44
1125. バルビツール酸系及びチオバルビツ ール酸系製剤	7	1311. 散瞳剤	44
1129. その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤	7	1312. 縮瞳剤	44
113. 抗てんかん剤	9	1313. 眼科用局所麻酔剤	44
1132. ヒダントイン系製剤	9	1315. 眼科用コルチゾン製剤	44
1139. その他の抗てんかん剤	9	1317. 眼科用抗生物質製剤	45
114. 解熱鎮痛消炎剤	15	1319. その他の眼科用剤	45
1141. アニリン系製剤	15	132. 耳鼻科用剤	52
1143. サリチル酸系製剤	16	1324. 耳鼻科用血管収縮剤	52
1145. インドメタシン製剤	16	1325. 耳鼻科用抗生物質製剤	52
1147. フェニル酢酸系製剤	17	1329. その他の耳鼻科用剤	53
1149. その他の解熱鎮痛消炎剤	18	133. 鎮量剤	54
116. 抗パーキンソン剤	21	1339. その他の鎮量剤	54
1161. アマンタジン製剤	21	2. 個々の器官系用医薬品	56
1162. ビペリデン製剤	21	21. 循環器官用薬	56
1164. レボドパ製剤	21	211. 強心剤	56
1169. その他の抗パーキンソン剤	21	2113. ジギタリス製剤	56
117. 精神神経用剤	25	2115. カフェイン系製剤	56
1171. クロルプロマジン製剤	25	2119. その他の強心剤	56
1172. フェノチアジン系製剤	25	212. 不整脈用剤	58
1174. イミプラミン系製剤	26	2121. プロカインアミド系製剤	58
1179. その他の精神神経用剤	26	2123. β -遮断剤	58
118. 総合感冒剤	31	2129. その他の不整脈用剤	60
119. その他の中枢神経系用薬	31	213. 利尿剤	63
12. 末梢神経系用薬	36	2132. チアジド系製剤	63
121. 局所麻酔剤	36	2133. 抗アルドステロン製剤	63
1211. アミノ安息香酸アルカミンエステル 製剤	36	2134. 炭酸脱水酵素阻害剤	63
1214. キシリジン系製剤	36	2139. その他の利尿剤	64
1219. その他の局所麻酔剤	39	214. 血圧降下剤	65
122. 骨格筋弛緩剤	39	2144. アンジオテンシン変換酵素阻害剤	65
1224. コリン系製剤	39	2145. メチルドパ製剤	66
1229. その他の骨格筋弛緩剤	40	2149. その他の血圧降下剤	66
123. 自律神経剤	41	216. 血管収縮剤	72
1231. 四級アンモニウム塩製剤	41	217. 血管拡張剤	74
1232. アセチルコリン系製剤	41	2171. 冠血管拡張剤	74
1233. ネオスチグミン系製剤	42	2179. その他の血管拡張剤	77
1239. その他の自律神経剤	42	218. 高脂血症用剤	77
124. 鎮けい剤	42	2183. クロフィブラート系製剤	77
		2189. その他の高脂血症用剤	78
		219. その他の循環器官用薬	81
		22. 呼吸器官用薬	87

221. 呼吸促進剤	87	2419. その他の脳下垂体ホルモン剤	122
2213. ジモルホラミン系製剤	87	243. 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	122
2219. その他の呼吸促進剤	87	2431. 甲状腺ホルモン製剤	122
222. 鎮咳剤	88	2432. 抗甲状腺ホルモン製剤	123
2221. エフェドリン及びマオウ製剤	88	2439. その他の甲状腺, 副甲状腺ホルモ 剤	123
2223. デキストロメトルファン製剤	88	244. たん白同化ステロイド剤	124
2229. その他の鎮咳剤	88	2449. その他のたん白同化ステロイド剤	124
223. 去たん剤	88	245. 副腎ホルモン剤	124
2233. システイン系製剤	88	2451. エピネフリン製剤	124
2234. ブロムヘキシン製剤	89	2452. コルチゾン系製剤	126
2239. その他の去たん剤	90	2454. フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	130
224. 鎮咳去たん剤	90	2456. プレドニゾン系製剤	144
2242. コデイン系製剤 (家庭麻薬)	90	2459. その他の副腎ホルモン剤	154
2249. その他の鎮咳去たん剤	91	246. 男性ホルモン剤	155
225. 気管支拡張剤	91	2461. テストステロン製剤	155
2251. キサンチン系製剤	91	247. 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	155
2254. サルブタモール製剤	91	2473. エストラジオール系製剤	155
2259. その他の気管支拡張剤	92	2475. エストリオール系製剤	155
226. 含嗽剤	95	2478. 合成黄体ホルモン製剤	156
229. その他の呼吸器官用薬	96	2479. その他の卵胞ホルモン及び黄体ホル モン剤	156
23. 消化器官用薬	104	248. 混合ホルモン剤	156
231. 止しゃ剤, 整腸剤	104	2481. 男性ホルモン, 卵胞ホルモン混合製 剤	156
2312. タンニン酸系製剤	104	2482. 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製 剤	157
2316. 活性生菌製剤	104	249. その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を 含む.)	158
2318. ジメチコン製剤	104	2491. 循環ホルモン剤	158
2319. その他の止しゃ剤, 整腸剤	104	2492. すい臓ホルモン剤	158
232. 消化性潰瘍用剤	105	2499. 他に分類されないホルモン剤 (抗ホル モン剤を含む.)	160
2325. H ₂ 遮断剤	105	25. 泌尿生殖器官及び肛門用薬	165
2329. その他の消化性潰瘍用剤	107	251. 泌尿器官用剤	165
233. 健胃消化剤	110	2519. その他の泌尿器官用剤	165
2331. 消化酵素系製剤	110	252. 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む.)	165
2335. 酸類製剤	111	2521. 生殖器官用抗生物質製剤	165
2339. その他の健胃消化剤	111	2529. その他の生殖器官用剤 (性病予防剤 を含む.)	165
234. 制酸剤	112	254. 避妊剤	166
2343. アルミニウム化合物製剤	112	2549. その他の避妊剤	166
2344. 無機塩製剤	112	255. 痔疾用剤	166
235. 下剤, 浣腸剤	112	2559. その他の痔疾用剤	166
2354. 植物性製剤	112	259. その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	167
2357. グリセリン製剤	113	26. 外皮用薬	170
2359. その他の下剤, 浣腸剤	113	261. 外皮用殺菌消毒剤	170
236. 利胆剤	115	2612. ヨウ素化合物	170
2362. 胆汁酸製剤	115	2614. 過酸化物質製剤	170
239. その他の消化器官用薬	115	2615. アルコール製剤	170
2391. 鎮吐剤	115		
2399. 他に分類されない消化器官用薬	116		
24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)	122		
241. 脳下垂体ホルモン剤	122		
2411. ACTH製剤	122		
2413. 性腺刺激ホルモン製剤	122		
2414. 脳下垂体後葉ホルモン製剤	122		

2616.	石けん類製剤	171	317.	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く.）	192
2619.	その他の外皮用殺菌消毒剤	171	3179.	その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く.）	192
263.	化膿性疾患用剤	172	319.	その他のビタミン剤	194
2633.	外用サルファ製剤	172	32. 滋養強壯薬		195
2634.	外用抗生物質製剤	172	321.	カルシウム剤	195
2639.	その他の化膿性疾患用剤	174	3211.	乳酸カルシウム製剤	195
264.	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	174	3213.	グルコン酸カルシウム製剤	195
2642.	外用抗ヒスタミン製剤	174	3214.	有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く.）	195
2646.	副腎皮質ホルモン製剤	174	3219.	その他のカルシウム剤	195
2647.	抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	176	322.	無機質製剤	196
2649.	その他の鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	177	3221.	ヨウ素化合物製剤	196
265.	寄生性皮膚疾患用剤	181	3222.	鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む.）	196
2652.	外用サリチル酸系製剤	181	3229.	その他の無機質製剤	196
2655.	イミダゾール系製剤	181	323.	糖類剤	198
2659.	その他の寄生性皮膚疾患用剤	181	3231.	ブドウ糖製剤	198
266.	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む.）	182	325.	たん白アミノ酸製剤	198
2661.	有機酸製剤	182	3253.	混合アミノ酸製剤	198
2669.	その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む.）	182	3259.	その他のたん白アミノ酸製剤	200
267.	毛髪用剤（発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤）	182	326.	臓器製剤	201
2679.	その他の毛髪用剤（発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤）	182	3262.	肝臓製剤	201
269.	その他の外皮用薬	182	329.	その他の滋養強壯薬	202
2691.	外用ビタミン製剤	182	3299.	他に分類されない滋養強壯薬	202
2699.	他に分類されない外皮用薬	183	33. 血液・体液用薬		203
27. 歯科口腔用薬		185	331.	血液代用剤	203
271.	歯科用局所麻酔剤	185	3311.	生理食塩液類	203
279.	その他の歯科口腔用薬	185	3319.	その他の血液代用剤	204
29. その他の個々の器官系用医薬品		186	332.	止血剤	206
3. 代謝性医薬品		187	3321.	カルババクロム系製剤	206
31. ビタミン剤		187	3322.	ゼラチン製剤	207
311.	ビタミンA及びD剤	187	3323.	臓器性止血製剤	207
3111.	合成ビタミンA製剤	187	3327.	抗プラスミン剤	207
3112.	合成ビタミンD製剤	187	3329.	その他の止血剤	208
312.	ビタミンB ₁ 剤	188	333.	血液凝固阻止剤	209
3121.	ビタミンB ₁ 剤	188	3332.	ジクマロール系製剤	209
3122.	ビタミンB ₁ 誘導体製剤	189	3334.	ヘパリン製剤	209
313.	ビタミンB剤（ビタミンB ₁ 剤を除く.）	189	3339.	その他の血液凝固阻止剤	210
3131.	ビタミンB ₂ 剤	189	339.	その他の血液・体液用薬	212
3132.	ニコチン酸系製剤	189	3399.	他に分類されない血液・体液用薬	212
3133.	パントテン酸系製剤	189	34. 人工透析用薬		218
3134.	ビタミンB ₆ 剤	190	341.	人工腎臓透析用剤	218
3135.	葉酸製剤	190	342.	腹膜透析用剤	219
3136.	ビタミンB ₁₂ 剤	190	39. その他の代謝性医薬品		220
314.	ビタミンC剤	191	391.	肝臓疾患用剤	220
316.	ビタミンK剤	191	3919.	その他の肝臓疾患用剤	220
			392.	解毒剤	220
			3922.	グルタチオン製剤	220

3925. チオ硫酸ナトリウム製剤	221	611. 主としてグラム陽性菌に作用するもの	305
3929. その他の解毒剤	221	6111. ペニシリン系抗生物質製剤	305
394. 痛風治療剤	223	6112. リンコマイシン系抗生物質製剤	305
3941. コルヒチン製剤	223	6113. バンコマイシン製剤	305
3942. プロベネシド製剤	223	6119. その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	306
3943. アロプリノール製剤	223	612. 主としてグラム陰性菌に作用するもの	307
3949. その他の痛風治療剤	223	6123. アミノ糖系抗生物質製剤	307
395. 酵素製剤	224	613. 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	308
3954. ウロキナーゼ製剤	224	6131. ペニシリン系抗生物質製剤	308
3959. その他の酵素製剤	224	6132. セフェム系抗生物質製剤	309
396. 糖尿病用剤	224	6134. アミノ糖系抗生物質製剤	313
3961. スルフォニル尿素系製剤	224	6135. ホスホマイシン製剤	313
3962. ビグアナイド系製剤	225	6139. その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	313
3969. その他の糖尿病用剤	225	614. 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	316
399. 他に分類されない代謝性医薬品	228	6141. エリスロマイシン製剤	316
3992. アデノシン製剤	228	6149. その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	316
3999. 他に分類されないその他の代謝性医薬品	229	615. 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	317
4. 組織細胞機能用医薬品	243	6152. テトラサイクリン系抗生物質製剤	317
42. 腫瘍用薬	243	616. 主として抗酸菌に作用するもの	318
421. アルキル化剤	243	6161. ストレプトマイシン系抗生物質製剤	318
4211. クロロエチルアミン系製剤	243	6164. リファンピシン製剤	318
4219. その他のアルキル化剤	245	6169. その他の主として抗酸菌に作用するもの	319
422. 代謝拮抗剤	247	617. 主としてカビに作用するもの	319
4222. メトトレキサート製剤	247	6173. アムホテリシンB製剤	319
4223. フルオロウラシル系製剤	248	6179. その他の主としてカビに作用するもの	319
4224. シトシン系製剤	249	619. その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	320
4229. その他の代謝拮抗剤	250	6199. 他に分類されない抗生物質製剤	320
423. 抗腫瘍性抗生物質製剤	252	62. 化学療法剤	321
4231. マイトマイシンC製剤	252	621. サルファ剤	321
4234. ブレオマイシン系製剤	252	6219. その他のサルファ剤	321
4235. アントラサイクリン系抗生物質製剤	252	622. 抗結核剤	321
424. 抗腫瘍性植物成分製剤	256	6222. イソニアジド系製剤	321
429. その他の腫瘍用薬	259	6223. ピラジナミド製剤	321
4291. その他の抗悪性腫瘍用剤	259	6225. エタンブトール製剤	321
4299. 他に分類されない腫瘍用薬	280	624. 合成抗菌剤	322
44. アレルギー用薬	282	6241. ピリドンカルボン酸系製剤	322
441. 抗ヒスタミン剤	282	6249. その他の合成抗菌剤	323
4411. ジフェンヒドラミン系製剤	282	625. 抗ウイルス剤	324
4413. フェノチアジン系製剤	282		
4419. その他の抗ヒスタミン剤	282		
442. 刺激療法剤	283		
449. その他のアレルギー用薬	283		
5. 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	289		
52. 漢方製剤	289		
59. その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	304		
6. 病原生物に対する医薬品	305		
61. 抗生物質製剤	305		

629. その他の化学療法剤	329	79. その他の治療を主目的としない医薬品	355
63. 生物学的製剤	331	799. 他に分類されない治療を主目的としな い医薬品	355
631. ワクチン類	331	8. 麻薬	357
6311. 細菌ワクチン類	331	81. アルカロイド系麻薬（天然麻薬）	357
6313. ウイルスワクチン類	332	811. あへんアルカロイド系麻薬	357
632. 毒素及びトキシイド類	335	8114. モルヒネ系製剤	357
6322. トキシイド類	335	8115. コデイン系製剤	358
634. 血液製剤類	336	8119. その他のあへんアルカロイド系麻薬	358
6343. 血漿分画製剤	336	82. 非アルカロイド系麻薬	360
6349. その他の血液製剤類	338	821. 合成麻薬	360
636. 混合生物学的製剤	340	8211. フェニルペリジン系製剤	360
6361. ワクチン・トキシイド混合製剤	340	8219. その他の合成麻薬	360
6369. その他の混合生物学的製剤	341		
639. その他の生物学的製剤	341		
6391. 結核菌含有及び抗アレルギー的物質 製剤	341		
6393. 精製ツベルクリン	342		
6399. 他に分類されない生物学的製剤	342		
64. 寄生動物用薬	344		
641. 抗原虫剤	344		
6419. その他の抗原虫剤	344		
642. 駆虫剤	345		
6429. その他の駆虫剤	345		
7. 治療を主目的としない医薬品	346		
71. 調剤用薬	346		
711. 賦形剤	346		
7111. 乳糖類	346		
7112. デンプン類	346		
712. 軟膏基剤	346		
7121. 油脂性基剤	346		
7122. 乳剤性基剤	346		
713. 溶解剤	347		
7131. 精製水類	347		
714. 矯味, 矯臭, 着色剤	347		
7142. シロップ製剤	347		
719. その他の調剤用薬	347		
72. 診断用薬（体外診断用医薬品を除く.）	348		
721. X線造影剤	348		
7211. ヨウ素化合物製剤	348		
7212. バリウム塩製剤	348		
7213. 造影補助剤	349		
7214. 配合製剤	349		
7219. その他のX線造影剤	349		
722. 機能検査用試薬	351		
7223. 内分泌機能検査用試薬	351		
7224. 肝機能検査用試薬	352		
7225. 腎機能検査用試薬	352		
7229. その他の機能検査用試薬	352		
729. その他の診断用薬（体外診断用医薬品 を除く.）	353		

五十音順索引

太字：商品名 細字：一般名・成分名

【ア】

アーチスト錠2.5mg (院外)	67
〔先〕アーチスト錠2.5mg	
〔後〕カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	67
アーチスト錠10mg (院外)	68
〔先〕アーチスト錠10mg	
〔後〕カルベジロール錠10mg「サワイ」	68
アーテン錠 (2mg) (院外)	22
アービタックス注射液100mg	269
アーリーダ錠60mg	260
アイセントレス錠400mg (院内)	327
アイトロール錠20mg (院外)	74
〔先〕アイトロール錠20mg	
〔後〕一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	74
アイピーディカプセル100	285
アイピーディドライシロップ5% (院外)	285
アイファガン点眼液0.1%	48
〔先〕アイファガン点眼液0.1%	
〔後〕ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わか もと」	48
アイミクス配合錠HD	71
〔先〕アイミクス配合錠HD	
〔後〕イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	71
アイラミド配合懸濁性点眼液 (院外)	50
〔後〕亜鉛華 (10%) 単軟膏「ヨシダ」	177
亜鉛華単軟膏	177
亜鉛華軟膏	177
アカルボース	225
〔後〕アカルボース錠50mg「NIG」 (院内)	225
アキシチニブ	259
アキネトン錠1mg	21
アクアテムクリーム1%	174
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	343
〔先〕アクトス錠15	
〔後〕ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	226
アクトネル錠17.5mg	241
アクトネル錠75mg	241
アクトヒブ	331
アクラシノン注射用20mg	252
アクラルピシン塩酸塩	252
アグリリンカプセル0.5mg (院外)	280
アクロマイシン軟膏3%	172
アクロマイシン末	173

アコチアミド塩酸塩水和物	116
アコファイド錠100mg	116
アサコール錠400mg	120
アザンチジン	259
アザチオプリン	229
アザルフィジンEN錠500mg	321
アシクロビル	45,324
アシクロビル錠200mg「サワイ」	324
〔後〕アシクロビルDS80%「NK」	324
アシクロビル点滴静注液250mg「トロー」	324
アジスロマイシン水和物	45,316
アシタザノラスト水和物	45
アシノン錠150mg	105
アジマイシン点眼液1% (院外)	45
アシミニブ塩酸塩	259
アジャストAコーワ錠40mg	112
アジルサルタン	66
〔後〕アジルサルタン錠40mg「トロー」	
〔先〕アジルバ錠40mg	66
〔先〕アジルバ錠40mg	
〔後〕アジルサルタン錠40mg「トロー」	66
アジレクト錠1mg	23
アスコルビン酸	191
アストミン錠10mg	88
〔後〕アズノールうがい液4%	95
アズノール軟膏0.033%	178
アスバラカリウム錠300mg	196
アスバラカリウム注10mEq	196
アスバラギナーゼ, L-	262
アスバラギン酸カリウム, L-	196
アスバラギン酸カルシウム水和物, L-	195
アスパラ-CA錠200	195
アスピリン	16,212
アスピリン「ヨシダ」	16
アスペノンカプセル10 (院外)	60
〔先〕アスペノンカプセル10	
〔後〕アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	60
アスベリン散10%	91
アスベリンシロップ0.5% (院外)	91
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	95
アセタゾラミド	63
アセタゾラミドナトリウム	63
アセチルコリン塩化物	41
アセトアミノフェン	15,16
アセリオ静注液1000mgバッグ	15
アゼルニジピン	66

⑥アゼルニジピン錠16mg「NP」	
〔先カルブロック錠16mg〕……………	66
アゾセミド……………	64
⑥アゾセミド錠30mg「JG」	
〔先ダイアート錠30mg〕……………	64
⑥アゾセミド錠60mg「JG」	
〔先ダイアート錠60mg〕……………	64
アダパレン……………	183
アダプチノール錠5mg（院外）……………	49
アダラートCR錠20mg（院外）……………	77
〔先アダラートCR錠20mg〕	
⑥ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」……………	77
アタラックス錠10mg……………	29
アタラックス-P注射液（25mg/ml）……………	29
アダリムマブ（遺伝子組換え）……………	229
アテキュラ吸入用カプセル高用量……………	99
アテキュラ吸入用カプセル中用量……………	99
アテゾリズマブ（遺伝子組換え）……………	260
アデノシン……………	355
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物……………	228
⑥アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	355
アテノロール……………	58
⑥アテノロール錠25mg「タイヨー」【経過措置】	
（院内）	
〔先テノーミン錠25〕……………	58
⑥アテノロール錠50mg「タイヨー」【経過措置】	
〔先テノーミン錠50〕……………	58
アデホス-Lコーワ注40mg……………	228
アデホスコワ顆粒10%……………	228
アデムパス錠0.5mg……………	85
アデムパス錠1.0mg……………	85
アデラビン9号注1mL【経過措置】……………	201
アテレック錠10（院外）……………	68
〔先アテレック錠10〕	
⑥シルニジピン錠10mg「サワイ」……………	68
アトーゼット配合錠LD（院外）……………	81
アドエア100ディスクス60吸入用（院外）……………	99
アドエア125エアゾール120吸入用（院外）……………	100
アドエア250エアゾール120吸入用（院外）……………	99
アドセトリス点滴静注用50mg……………	274
アドソルビン原末……………	112
アドナ錠10mg……………	206
アドナ錠30mg……………	206
〔先アドナ注（静脈用）50mg〕	
⑥カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注	
液50mg「日医工」……………	207
〔先アドナ注（静脈用）100mg〕	
⑥カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注	
液100mg「日医工」……………	207
アトバコン……………	329
アドフィードパップ40mg……………	179
アドリアシン注用10……………	255
アトルバスタチンカルシウム水和物……………	78
⑥アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」	
〔先リビトール錠10mg〕……………	78
アドレナリン……………	124
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」……………	124
⑥アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」……………	42
アトロピン点眼液1%, 日点……………	44
アトロピン硫酸塩水和物……………	42,44
アトロベントエロゾル20 μ g（院外）……………	92
アトワゴリバース静注シリンジ6mL……………	42
アナグリプチン……………	225
アナグレリド塩酸塩水和物……………	280
アナストロゾール……………	260
アナフラニール錠10mg……………	26
アナペイン注2mg/mL……………	38
アナペイン注7.5mg/mL……………	38
アナペイン注10mg/mL……………	38
アナモレリン塩酸塩……………	229
アニユイティ100 μ gエリプタ30吸入用……………	98
〔先アネキセート注射液0.5mg〕	
⑥フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」……………	87
アネメトロ点滴静注液500mg……………	344
アネレム静注用50mg……………	4
アノーロエリプタ30吸入用……………	94
アバスチン点滴静注用100mg/4mL……………	274
アバスチン点滴静注用400mg/16mL……………	274
アバタセプト（遺伝子組換え）……………	229,230
アバプロ錠100mg（院外）……………	66
〔先アバプロ錠100mg〕	
⑥イルベサルタン錠100mg「サワイ」……………	66
アパルタミド……………	260
アピキサバン……………	210
アピラテロン酢酸エステル……………	260
アフアチニブマレイン酸塩……………	260
アフイニトール錠5mg……………	262
〔先アフタゾロン口腔用軟膏0.1%〕	
⑥デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」……………	118
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g……………	118
アブラキサ点静注用100mg……………	257
アフリベルセプトベータ（遺伝子組換え）……………	260
アプリンジン塩酸塩……………	60
⑥アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	
〔先アスペノンカプセル10〕……………	60
アプレピタント……………	115
⑥アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	
〔先イメンドカプセル80mg〕……………	115
⑥アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	
〔先イメンドカプセル125mg〕……………	115

⑥アプレピタントカプセルセット「サワイ」		[⑦アムロジンOD錠2.5mg]	
〔⑧イメンドカプセルセット〕……………	115	⑥アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 ……	74
アプレミラスト……………	230	[⑧アムロジンOD錠5mg]	
アベマシクリブ……………	261	⑥アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 ……	74
アベルマブ（遺伝子組換え）……………	261	アメジニウムメチル硫酸塩……………	81
アボネックス筋注30 μ gペン……………	342	⑥アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	
アポハイドローション20%……………	43	〔⑨リズミック錠10mg〕……………	81
アマージ錠2.5mg……………	73	アメナメビル……………	324
アマリール1mg錠（院外）……………	225	アメナリーフ錠200mg……………	324
〔⑩アマリール1mg錠〕		アモキサピン……………	26
⑥グリメピリド錠1mg「サワイ」……………	225	アモキササンカプセル25mg……………	26
アマンタジン塩酸塩……………	21	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」……………	308
⑥アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		アモキシシリン水和物……………	308
〔⑪シンメトレル細粒10%〕……………	21	アモバン錠7.5（院外）……………	8
⑥アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」		〔⑫アモバン錠7.5〕	
〔⑬シンメトレル錠50mg〕……………	21	⑥ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」（院内） ……	8
アミオダロン塩酸塩……………	60	アラセナーA点滴静注用300mg……………	326
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」……………	60	アラセナーA軟膏3%……………	326
アミカシン硫酸塩……………	307,319	アラバ錠10mg……………	241
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」……………	307	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用（院外） ……	53
アミサリン錠250mg……………	58	〔⑭アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用〕	
アミゼットB輸液……………	199	⑥フルチカゾンフランカルボン酸エステル点	
アミティーザカプセル24 μ g……………	114	鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用（院内） ……	53
アミド，ニコチン酸……………	189	アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用（院外） ……	53
アミド散10%「ゾンネ」，ニコチン酸……………	189	アリケイス吸入液590mg……………	319
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン……………	348,349	〔⑮アリセプトD錠3mg〕	
アミトリプチリン塩酸塩……………	26	⑥ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 ……	33
アミノ安息香酸エチル……………	185	〔⑯アリセプトD錠5mg〕	
アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン		⑥ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 ……	33
液……………	200	アリセプトD錠10mg（院外）……………	33
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン……………	200	アリドネパッチ27.5mg……………	34
アミノ酸製剤，肝硬変用……………	198,199	アリドネパッチ55mg……………	34
アミノ酸製剤，肝不全用……………	199	アリナミンF糖衣錠，25mg……………	189
アミノ酸製剤，腎不全用……………	199	アリナミン注射液10mg……………	189
アミノ酸製剤，総合……………	199	アリピプラゾール……………	26
アミノフィリン水和物……………	56	アリミデックス錠1mg……………	260
アミノレバンEN配合散……………	200	アリムタ注射用100mg……………	250
⑥アムバロ配合錠「JG」		アリムタ注射用500mg……………	250
〔⑰エックスフォージ配合錠〕……………	71	アルガトロバン水和物……………	82
アムビゾーム点滴静注用50mg……………	319	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩……………	171
アムホテリシンB……………	319	アルギン酸ナトリウム……………	107
アムルピシン塩酸塩……………	253	アルケラン錠2mg……………	246
⑥アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」		アルサルミン内用液10%（院外）……………	108
〔⑱アムロジンOD錠2.5mg，ノルバスクOD錠		〔⑲アルサルミン内用液10%〕	
2.5mg〕……………	74	⑥スクラルファート内用液10%「NIG」 ……	108
⑥アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」		アルジオキサ……………	107
〔⑳アムロジンOD錠5mg，ノルバスクOD錠		⑥アルジオキサ錠100mg「あすか」……………	107
5mg〕……………	74	アルスロマチック関節手術用灌流液……………	217
アムロジピンベシル酸塩……………	74	アルダクトンA細粒10%……………	63
アムロジンOD錠2.5mg（院外）……………	74	アルダクトンA錠25mg……………	63

アルタットカプセル75mg	106	[⊕アレロックOD錠5]	
[⊕アルチバ静注用2mg]		⊕オロパジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	
⊕レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	362	(院外)	284
アルツディスボ関節注25mg	235	アレロック顆粒0.5% (院外)	284
アルドメット錠250	66	⊕アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	
アルファカルシドール	187	[⊕ボナロン点滴静注バッグ900μg]	230
⊕アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」		アレンドロン酸ナトリウム水和物	230
[⊕ワンアルファ錠0.5μg]	187	アローゼン顆粒	114
アルファロール内用液0.5μg/mL	187	アロカリス点滴静注235mg	116
アルブミン, タンニン酸	104	[⊕アロキシ静注0.75mg]	
アルブミン「NikP」【経過措置】, タンニン酸	104	⊕パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	
アルプラゾラム	4		116
⊕アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」		アロチノロール塩酸塩	58
[⊕コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠]	4	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	58
アルプロスタジル	82	アロプリノール	223
アルプロスタジルアルファデクス	82,183	⊕アロプリノール錠100mg「サワイ」	
⊕アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」		[⊕ザイロリック錠100]	223
[⊕プロスタンディン注射用20μg]	82	アロマシン錠25mg	262
アルベカシン硫酸塩	306	[⊕アロマシン錠25mg]	
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	306	⊕エキセメスタン錠25mg「VTRS」	262
アルミニウム, 天然ケイ酸	112	アンカロン注150	60
アルロイドG内用液5%	107	アンジュ28錠 (院外)	166
アルンブリグ錠30mg	273	アンチレクス静注10mg	352
アレクチニブ塩酸塩	261	アンデキサネットアルファ(遺伝子組換え)	212
[⊕アレグラOD錠60mg]		アンピシリンナトリウム	309
⊕フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」	286	アンヒバ坐剤小児用100mg	15
アレグラ錠30mg (院外)	286	アンヒバ坐剤小児用200mg	15
[⊕アレグラ錠30mg]		アンプラーグ錠100mg (院外)	213
⊕フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」(院外)	286	[⊕アンプラーグ錠100mg]	
アレグラ錠60mg (院外)	286	⊕サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」	213
[⊕アレグラ錠60mg]		アンブロキシソール塩酸塩	90
⊕フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SAN-IK」(水江)	286	⊕アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	
アレジオンLX点眼液0.1%	45	[⊕ムコソルバン錠15mg]	90
アレジオン錠20 (院外)	283	⊕アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	
[⊕アレジオン錠20]		[⊕ムコソルバンL錠45mg]	90
⊕エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	283	アンベック坐剤10mg	357
アレジオンドライシロップ1%【経過措置】(院外)	284	アンベック坐剤20mg	357
アレセンサカプセル150mg	261	アンベック注50mg	357
アレックスビー筋注用	333		
アレビアチン散10%	9		
アレビアチン注250mg	9		
アレレルゲンエキス	353		
アレレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	353		
アレロックOD錠5 (院外)	284		

【イ】

EOB・プリモビスト注シリンジ	353
イーケプラ錠500mg (院外)	14
[⊕イーケプラ錠500mg]	
⊕レベチラセタム錠500mg「明治」(院内)	14
イーケプラドライシロップ50% (院外)	14
[⊕イーケプラドライシロップ50%]	
⊕レベチラセタムDS50%「サワイ」(院内)	15
イーシー・ドパール配合錠	24

イーフェンバツカル錠50 μ g	360	⑥イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」	64
イオウ・カンフルーション「東豊」	182	イソニアジド	321
イオジキサノール	349	イソバイドシロップ70%分包30mL	64
イオトロラン	349	イソビスト注300	349
イオパミドール	350	イソプレナリン塩酸塩, l-	56
イオパミドール300注20mL「F」	350	イソプレナリン塩酸塩, dl-	57
イオパミロン注300シリンジ	350	イダマイシン静注用5mg	253
イオパミロン注370シリンジ	350	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	212
イオプロミド	350	イダルビシン塩酸塩	253
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	350	15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフ テリア毒素結合体), 沈降	331
イオヘキソール	350,351	一硝酸イソソルビド	74
イオヘキソール300注20mL「F」	350	⑥一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	
イオヘキソール300注100mL「F」	350	〔①アイトロール錠20mg〕	74
イオメプロール	351	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	342
イオメロン350注50mL	351	イトプリド塩酸塩	116
イオメロン350注100mL	351	イドメシニコワゲル1%	177
イオメロン350注シリンジ100mL	351	イドメシニコワパップ70mg	177
イオメロン350注シリンジ135mL	351	イトラコナゾール	329
イキサザミブクエン酸エステル	261	イトリゾールカプセル50	329
イキセキズマブ(遺伝子組換え)	230	イナビル吸入懸濁用160mgセット	327
イグザレルトOD錠10mg	212	イナビル吸入粉末剤20mg	327
イグザレルトOD錠15mg	212	イノバン注0.6%シリンジ	57
イクスタンジ錠80mg	263	イノバン注100mg	57
イクセロンパッチ9mg	35	イノラス配合経腸用液	200
イクセロンパッチ18mg	35	イノレット30R注【経過措置】(院外)	159
イグラチモド	231	イバブラジン塩酸塩	82
イコサペント酸エチル	212	イバンドロン酸ナトリウム水和物	231
イサツキシマブ(遺伝子組換え)	261	イピリムマブ(遺伝子組換え)	262
イジュド点滴静注25mg	271	イフェクサーSRカプセル37.5mg(院外)	30
イジュド点滴静注300mg	271	イフェクサーSRカプセル75mg(院外)	30
イスコチン錠100mg	321	イフェンプロジル酒石酸塩	83
イスコチン注100mg	321	⑥イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」	
イストダックス点滴静注用10mg	279	〔①セロクラール錠10mg〕	83
イストラデフィリン	21	イブジラスト	283
イセパマイシン硫酸塩	307	イブプロフェン	18
〔①イソジン液10%〕		イブラグリフロジンL-プロリン	225
⑥ポビドンヨード外用液10%「イワキ」	170	イプラトロピウム臭化物水和物	92
〔①イソジゲル10%〕		イブランス錠25mg	273
⑥ポビヨドンゲル10%	170	イブランス錠125mg	273
〔①イソジンスクラブ液7.5%〕		イブルチニブ	262
⑥ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケン エー」	170	イベニティ皮下注105mgシリンジ	242
イソゾール注射用0.5g	1	イベルメクチン	345
イソソルビド	64	イマチニブメシル酸塩	262
イソソルビド, 一硝酸	74	イミキモド	329
イソソルビド, 硝酸	74,75	イミグラン点鼻液20	73
⑥イソソルビド錠20mg「サワイ」, 一硝酸		イミダフェナシン	167
〔①アイトロール錠20mg〕	74	⑥イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」	
⑥イソソルビドテープ40mg「EMEC」, 硝酸		〔①ウリトスOD錠0.1mg, ステープラOD錠 0.1mg〕	167
〔①フランドルテープ40mg〕	75		

イミダプリル塩酸塩	65
⑧イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	
〔先タナトリル錠5〕	65
イミフィンジ点滴静注120mg	270
イミフィンジ点滴静注500mg	270
イミプラミン塩酸塩	26
イムセラカプセル0.5mg	239
イムネース注35	343
イムノブラダー膀胱注用80mg	341
イムブルピカカプセル140mg	262
イムラン錠50mg	229
イメグリミン塩酸塩	225
〔先イメンドカプセル80mg〕	
⑧アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	115
〔先イメンドカプセル125mg〕	
⑧アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	115
〔先イメンドカプセルセット〕	
⑧アプレピタントカプセルセット「サワイ」	115
イリノテカン塩酸塩水和物	256
⑧イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	
〔先カンプト点滴静注100mg, トポテシン点滴静注100mg〕	256
イリボーOD錠2.5μg	121
イリボーOD錠5μg	121
⑧イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	
〔先アイミクス配合錠HD〕	71
イルベサルタン	66
⑧イルベサルタン錠100mg「サワイ」	
〔先アバプロ錠100mg, イルベタン錠100mg〕	66
〔先イルベタン錠100mg〕	
⑧イルベサルタン錠100mg「サワイ」	66
〔先イレッサ錠250〕	
⑧ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(院内)	267
インクリシランナトリウム	78
⑧インクレミンシロップ5%	196
インジゴカルミン	352
インジゴカルミン注20mg「AFP」	352
インスリン(遺伝子組換え), ヒト	159
インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	158
⑧インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	158
インスリングルラルギン(遺伝子組換え)	158
⑧インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リリー」	158
インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	158
インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	158,159
⑧インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	158

インターフェロンベーター1a(遺伝子組換え)	342
インターフェロンベーター1b(遺伝子組換え)	342
インターール吸入液1%	92
インダカテロールマレイン酸塩	92
インダパミド	67
インテバン坐剤25(院外)	16
インテバン坐剤50	16
インデラル錠10mg	59
インドシアニングリーン	352,353
インドメタシン	16,177
インドメタシンフェルネシル	16
イントラリポス輸液10%	202
イントラリポス輸液20%	202
インフリーSカプセル200mg(院外)	16
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	117
インフルエンザHAワクチン	332
インフルエンザHAワクチン「KMB」	332
インライタ錠1mg	259
インライタ錠5mg	259

【ウ】

ヴィーンD輸液	204
ウインタミン細粒(10%)	25
ヴォトリエント錠200mg	272
ウサギ免疫グロブリン, 抗ヒト胸腺細胞	342
ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	231
ウパダシチニブ水和物	231
ウフェナマート	177
ウプトラビ錠0.2mg	83
ウブレチド錠5mg	41
ウメクリジニウム臭化物	92
ウラジログシエキス	167
ウラピジル	67
ウラリット配合錠	224
ウリアデック錠40mg	223
〔先ウリトスOD錠0.1mg〕	
⑧イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」	167
ウリナスタチン	231
ウルソ錠50mg	115
ウルソ錠100mg(院外)	115
〔先ウルソ錠100mg〕	
⑧ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	115
ウルソデオキシコール酸	115
⑧ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	115
〔先ウルソ錠100mg〕	115
ウルティブ吸入用カプセル	94

ウロカルン錠225mg	167	⑥エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」	
ウロキナーゼ	224	〔先ルネスタ錠1mg〕	7
ウログラフィン注60%	349	エスタゾラム	4
ウロナーゼ静注用6万単位	224	⑥エスタゾラム錠2mg「アメル」	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	165	〔先ユーロジン2mg錠〕	4
ウロミテキサン注100mg	222	エストラーナテープ0.72mg	155
温経湯	301	エストラサイトカプセル156.7mg (院外)	245
温経湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-106] (院外),		エストラジオール	155
ツムラ	301	エストラジオール吉草酸エステル	155
温清飲	297	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水	
温清飲エキス顆粒 (医療用) [TJ-57] (院外),		和物	245
ツムラ	297	エストリオール	155,165
		エストロゲン, 結合型	156
		エスポー皮下用24000シリンジ	232
		〔先エスラックス静注50mg/5.0mL〕	
		⑥ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マ	
		ルイシ」	41
		⑥エスワнтаイホウ配合OD錠T20	
		〔先ティーエスワン配合OD錠T20〕	251
		⑥エスワнтаイホウ配合OD錠T25	
		〔先ティーエスワン配合OD錠T25〕	251
		エゼチミブ	78
		⑥エゼチミブ錠10mg「DSEP」	
		〔先ゼチーア錠10mg〕	78
		⑥エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	
		〔先ネキシウムカプセル20mg〕	107
		エソメプラゾールマグネシウム水和物	107
		エタネルセプト (遺伝子組換え)	231
		エタノール	170
		エタノール, 無水	277
		エタノール注「フソー」, 無水	277
		〔先エタノールB液「ケンエー」, 消毒用〕	
		⑥消毒用エタライト液	170
		〔先エタノールB液「ケンエー」, 消毒用〕	
		⑥消毒用エタライトB液	170
		エタノール「マルイシ」(今回限定), 消毒用	170
		⑥エタライト液, 消毒用	
		〔先消毒用エタノールB液「ケンエー」〕	170
		⑥エタライトB液, 消毒用	
		〔先消毒用エタノールB液「ケンエー」〕	170
		エダラボン	31,32
		⑥エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	
		〔先ラジカット点滴静注バッグ30mg〕	31
		エタンブトール塩酸塩	321
		エチゾラム	27
		⑥エチゾラム錠0.5mg「SW」	
		〔先デバス錠0.5mg〕	27
		エックスフォージ配合錠 (院外)	71
		〔先エックスフォージ配合錠〕	
		⑥アムバロ配合錠「JG」	71
A型ボツリヌス毒素	40		
エースコール錠1mg (院外)	66		
〔先エースコール錠1mg〕			
⑥テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」	66		
エイゾプト懸濁性点眼液1%	49		
HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」, 乾			
燥	336		
HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」, 乾			
燥	336		
エイベリス点眼液0.002%	46		
エイムゲン	333		
エカード配合錠HD	71		
エカベトナトリウム水和物	107		
エキザルベ	179		
液状フェノール「タイセイ」(院内)	171		
エキセメスタン	262		
⑥エキセメスタン錠25mg「VTRS」			
〔先アロマシン錠25mg〕	262		
エクア錠50mg	227		
エクザール注射用10mg	259		
エクサシン注射液200	307		
エクストラニール腹膜透析液	219		
エクセグラン錠100mg	10		
エクフィナ錠50mg	22		
エクメット配合錠HD	227		
エクラープラスター20 μ g/cm ²	175		
エクロックゲル5%	43		
エサキセレン	67		
エサンブトール錠250mg	321		
エジャイモ点滴静注1.1g (患者限定)	343		
S・M配合散	111		
⑥エシタロプラムOD錠10mg「サワイ」	27		
エシタロプラムシュウ酸塩	27		
エスゾピクロン	7		

【エ】

(先)エディロールカプセル0.5μg	
(後)エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	187
(先)エディロールカプセル0.75μg	
(後)エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	187
エテルカルセチド塩酸塩	232
エドキサバントシル酸塩水和物	211
エトキシスクレロール1%注射液	208
エトドラク	18
エトポシド	256
(後)エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	
[(先)ラストレット注100mg/5mL, ペプシド注100mg]	256
エドルミズ錠50mg	229
エドロホニウム塩化物	352
エナジア吸入用カプセル高用量	100
エナジア吸入用カプセル中用量	100
エナラプリルマレイン酸塩	65
(後)エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「NikP」	
[(先)レニベース錠10]	65
エナルモンデポー筋注250mg	155
エネフリード輸液	200
(後)エネマスター注射散	348
エバシエルド筋注セット	327
エバスチン	283
(後)エバスチンOD錠10mg「YD」	
[(先)エバステルOD錠10mg]	283
エバステルOD錠5mg (院外)	283
エバステルOD錠10mg (院外)	283
[(先)エバステルOD錠10mg]	
(後)エバスチンOD錠10mg「YD」	283
エパデールS900	212
エバミール錠1.0	7
エビスタ錠60mg	241
エピナスチン塩酸塩	45,283,284
(後)エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	
[(先)アレジオン錠20]	283
エビプロスタット配合錠DB	169
エピペン注射液0.15mg	124
エピペン注射液0.3mg (院外)	124
エビリファイ錠3mg	26
エピルピシン塩酸塩	253
(後)エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	253
(後)エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	253
(後)エピルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	253
エフィエントOD錠20mg	215
エフィエント錠3.75mg	215
エフィナコナゾール	329
エフェドリン塩酸塩	88
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	88
[(先)エフオーワイ500, 注射用]	
(後)ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	233
エプクルーサ配合錠	327
エプトール250mg錠	321
エブラジノン塩酸塩	91
エブランチルカプセル15mg	67
エプレレノン	67
(後)エプレレノン錠50mg「杏林」	
[(先)セララ錠50mg]	67
エペリゾン塩酸塩	43
(後)エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」【経過措置】	
[(先)ミオナル錠50mg]	43
エベロリムス	262
エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	232
エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)	232
エボカルセト	232
エボロクマブ(遺伝子組換え)	78
エミレース錠3mg (院外)	29
(後)MS温シップ「タカミツ」	180
MSコンチン錠10mg	358
MSコンチン錠30mg	358
(後)MS冷シップ「タイハウ」	180
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	32
エムプリシティ点滴静注用300mg	263
エムプリシティ点滴静注用400mg	263
エメダスチンフマル酸塩	284
エラスポール100, 注射用	234
エリキューズ錠5mg	210
エリスロシン錠100mg	316
エリスロシンドライシロップW20%	316
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	316
エリスロマイシンステアリン酸塩	316
L-アスパラギナーゼ	262
L-アスパラギン酸カリウム	196
L-アスパラギン酸カルシウム水和物	195
l-イソプレナリン塩酸塩	56
(後)エルエイジー10液	171
エルカトニン	233
[(先)エルカルチンFF錠250mg]	
(後)レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」	242
L-カルボシステイン	88,89
エルシトニン注20Sディスポ	233
エルシトニン注40単位	233
エルデカルシトール	187
(後)エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	
[(先)エディロールカプセル0.5μg]	187

⑥オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (院内)		オムニパーク300注シリンジ150mL	351
〔Ⓐサンドスタチン皮下注用100 μ g〕	160	オメガー3脂肪酸エチル	79
オザグレルナトリウム	233	⑥オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニ プロ」	
⑥オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	233	〔Ⓐロトリガ粒状カプセル2g〕	79
オシメルチニブメシル酸塩	263	オメプラゾール	108
オゼックス細粒小児用15% (院外)	322	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	108
オゼノキサシン	174	オラドールトローチ0.5mg	118
⑥オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」		オラパリブ	264
〔Ⓐタミフルカプセル75〕	325	オラビ錠口腔用50mg	330
⑥オセルタミビルDS3%「サワイ」		オラベネム小児用細粒10% (院外)	313
〔Ⓐタミフルドライシロップ3%〕	325	オランザピン	27
オセルタミビルリン酸塩	325	オリブ油	346
オゼンピック皮下注2mg	161	オリブ油「日医工」	346
オダイン錠125mg	273	オルケディア錠1mg	232
おたふくかぜワクチン, 乾燥弱毒生	332	オルダミン注射用1g	208
おたふくかぜワクチン「タケダ」, 乾燥弱毒生	332	⑥オルテクサー口腔用軟膏0.1% (院外)	118
オテズラ錠10mg (院外)	230	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	97
オテズラ錠20mg (院外)	230	オルミエント錠2mg	239
オテズラ錠30mg (院外)	230	⑥オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	
オノアクト点滴静注用50mg	59	〔ⒶオルメテックOD錠5mg〕	67
オノンドライシロップ10% (院外)	286	オルメサルタンメドキシミル	67
〔Ⓐオノンドライシロップ10%〕		〔ⒶオルメテックOD錠5mg〕	
⑥プランルカストDS10%「トーワ」(院内)	286	⑥オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	67
オパルモン錠5 μ g (院外)	215	オルメテックOD錠20mg (院外)	67
〔Ⓐオパルモン錠5 μ g〕		オレンシア点滴静注用250mg	229
⑥リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医 工」	215	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター 1mL	230
オピカボン	22	オロパタジン塩酸塩	46,284
オピソート注射用0.1g	41	⑥オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」(院 外)	
オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	122	〔ⒶアレロックOD錠5〕	284
オビヌツズマブ (遺伝子組換え)	264	オンコビン注射用1mg	258
オフアツムマブ (遺伝子組換え)	32	オンジェンティス錠25mg	22
オフエブカプセル100mg	239	オンダンセトロン塩酸塩水和物	115
オフエブカプセル150mg	239	⑥オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	
オフサグリーン静注用25mg	353		115
オブジーボ点滴静注120mg	272	オンデキサ静注用200mg	212
オブジーボ点滴静注240mg	272	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	92
オブスミット錠10mg	85	オンボー点滴静注300mg	119
オブソ内服液5mg	357	オンボー皮下注100mgオートインジェクター(院 外)	120
オブソ内服液10mg	357		
オフロキサシン	46		
オペガン0.6眼粘弾剤1% (院内)	47		
オマリグリブチン	226		
オマリズマブ (遺伝子組換え)	96		
オミデネバグイソプロピル	46		
オムニパーク240注10mL	350		
オムニパーク240注シリンジ100mL	350		
オムニパーク300注シリンジ100mL	351		

【力】

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	334
カーボスター透析剤・L (患者限定)	218
〔Ⓐカイトリル注3mg〕	
⑥グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	116
カイプロリス点滴静注用10mg (院内)	264

カイプロリス点滴静注用40mg (院内)	264	㊦ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	
ガザイバ点滴静注1000mg	264	〔㊦注射用エフオーワイ500〕	233
ガスコン錠40mg	104	カペシタビン	248
〔㊦ガスコンドロップ内用液2%〕		㊦カペシタビン錠300mg「サワイ」	
㊦ジメチコン内用液2%「ホリイ」	104	〔㊦ゼローダ錠300〕	248
ガスターD錠10mg (院外)	106	カベルゴリン	22
〔㊦ガスターD錠10mg〕		加味帰脾湯	303
㊦ファモチジンD錠10mg「サワイ」	106	加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)〔TJ-137〕,	
ガスターD錠20mg (院外)	106	ツムラ	303
〔㊦ガスターD錠20mg〕		加味逍遙散	292
㊦ファモチジンD錠20mg「サワイ」	106	加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)〔TJ-24〕,	
ガストローム顆粒66.7% (院外)	107	ツムラ	292
ガストログラフィン経口・注腸用	348	カモスタットメシル酸塩	233
ガスマチン散1%	120	㊦カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	
〔㊦ガスマチン錠5mg〕		〔㊦フオイバン錠100mg〕	233
㊦モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」	121	ガラクトシダーゼ (ベニシリウム), β -	111
カソデックスOD錠80mg (院外)	273	㊦ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	
〔㊦カソデックス錠80mg〕		〔㊦レミニールOD錠4mg〕	32
㊦ビカルタミド錠80mg「NP」	273	㊦ガラタミンOD錠8mg「DSEP」	
ガチフロキサシン水和物	46	〔㊦レミニールOD錠8mg〕	32
ガチフロ点眼液0.3%	46	㊦ガラタミンOD錠12mg「DSEP」	
カチリ「ホエイ」【経過措置】	178	〔㊦レミニールOD錠12mg〕	32
葛根湯	289	ガラタミン臭化水素酸塩	32
葛根湯エキス顆粒 (医療用)〔TJ-1〕, ツムラ	289	カリウム, L-アスパラギン酸	196
カデックス軟膏0.9%	184	カリウム, 塩化	196,197,204
カデュエット配合錠4番	86	カリウム, カンレノ酸	63
ガドキセト酸ナトリウム	353	カリウム, グルコン酸	197
カドサイラ点滴静注用100mg	270	㊦カリウム静注用200mg「サワイ」, カンレノ酸	
カドサイラ点滴静注用160mg	270	63
ガドテリドール	353	㊦カリウム徐放錠600mg「St」, 塩化	197
ガドテル酸メグルミン	354	カリウム「フソー」, 塩化	196
㊦ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL		カリジノゲナーゼ	158
「GE」		㊦カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	
〔㊦マグネスコープ静注38%シリンジ20mL〕	354	〔㊦カルナクリン錠50〕	158
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	354	カリメート経口液20%	85
ガドブトロール	354	ガルカネズマブ (遺伝子組換え)	32
カナグリフロジン水和物	226	カルシウム, 沈降炭酸	84
カナグル錠100mg	226	カルシウム「ケンエー」, 乳酸	195
ガナトン錠50mg (院外)	116	㊦カルシウム錠500mg「三和」, 沈降炭酸	
カナマイシンカプセル250mg「明治」(患者限定)	307	〔㊦カルタン錠500〕	84
.....	307	カルシウム水和物, L-アスパラギン酸	195
カナマイシン硫酸塩	307	カルシウム水和物, グルコン酸	195
カナリア配合錠	227	カルシウム水和物, 乳酸	195
カバサル錠0.25mg	22	カルシトリオール	188
カバサル錠1.0mg (院外)	22	㊦カルシトリオールカプセル0.25 μ g「YD」	
カバジタキセルアセトン	257	〔㊦ロカルトロールカプセル0.25〕	188
ガベキサートメシル酸塩	233	カルシポトリオール	182
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	233	〔㊦カルスロット錠10〕	
.....	233	㊦マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	70

カルスロット錠20 (院外)	70	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	265
カルセド注射液20mg	253	〔㊦カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」〕	
カルセド注射液50mg	253	㊧カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	
カルタン錠500 (院外)	84	266
〔㊦カルタン錠500〕		カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	266
㊧沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	84	〔㊦カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」〕	
カルチコール注射液8.5%5mL	195	㊧カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	
カルチコール末【経過措置】(水江)	195	266
カルテオロール塩酸塩	46	㊧カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	
カルデナリン錠2mg (院外)	68	〔㊦パラプラチン注射液150mg, カルボプラチン	
〔㊦カルデナリン錠2mg〕		点滴静注液150mg「NK」, カルボプラチン	
㊧ドキサゾシン錠2mg「テバ」	68	注射液150mg「日医工」, カルボプラチン点滴	
〔㊦カルナクリン錠50〕		静注液150mg「SW」	266
㊧カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	158	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	267
㊧カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液		カレトラ配合錠	328
50mg「日医工」		カログラ錠120mg	117
〔㊦アドナ注(静脈用) 50mg〕	207	カロテグラストメチル	117
㊧カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液		コロナール細粒50%	15
100mg「日医工」		コロナール坐剤400	16
〔㊦アドナ注(静脈用) 100mg〕	207	㊧コロナール錠200	16
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		肝炎ワクチン(酵母由来), 組換え沈降B型	334
.....	206,207	肝硬変用アミノ酸製剤	198,199
カルバマゼピン	9	ガンシクロビル	325
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(院内)	9	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	
カルフィルズミブ	264	336
カルブロック錠16mg (院外)	66	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	
〔㊦カルブロック錠16mg〕		336
㊧アゼルニジピン錠16mg「NP」	66	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハ	
カルプロニウム塩化物	182	ムスター卵巣細胞由来)	332
カルベジロール	67,68	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	336
㊧カルベジロール錠2.5mg「サワイ」		乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	336
〔㊦アーチスト錠2.5mg〕	67	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	336
㊧カルベジロール錠10mg「サワイ」		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	332
〔㊦アーチスト錠10mg〕	68	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	332
カルペリチド(遺伝子組換え)	77	乾燥弱毒生水痘ワクチン	332
カルボカインアンプル注1%	36	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	332
カルボシステイン, L-	88,89	乾燥弱毒生風しんワクチン	332
㊧カルボシステイン錠250mg「サワイ」		乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	332
〔㊦ムコダイン錠250mg〕	88	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	341
㊧カルボシステイン錠500mg「サワイ」		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケ	
〔㊦ムコダイン錠500mg〕	88	ダ」	341
㊧カルボシステインシロップ5%「タカタ」		乾燥弱毒生麻しんワクチン	333
〔㊦ムコダインシロップ5%〕	89	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	333
㊧カルボシステインDS50%「タカタ」		乾燥スルホ化人免疫グロブリン	336
〔㊦ムコダインDS50%〕	89	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	333
カルボプラチン	265,266,267	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	333
〔㊦カルボプラチン注射液150mg「日医工」〕		乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	336
㊧カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」		乾燥BCG膀胱内用(日本株)	341
.....	266	乾燥BCGワクチン	331
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	265	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	331

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）…………… 331
 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン…………… 337
 含糖酸化鉄…………… 196
 肝不全用アミノ酸製剤…………… 199
 肝不全用成分栄養剤…………… 200
 【㊦カンプト点滴静注100mg】
 ㊦イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」…………… 256
 ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」…………… 337
 カンレノ酸カリウム…………… 63
 ㊦カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」… 63

【キ】

キイトルーダ点滴静注100mg…………… 275
 希塩酸…………… 111
 希塩酸「コザカイ・M」…………… 111
 キサラタン点眼液0.005%…………… 49
 キシロカイン2%, 静注用…………… 38
 キシロカイン液「4%」…………… 38
 キシロカインゼリー2%…………… 37
 キシロカインゼリー2%（院外）…………… 37
 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含有…………… 39
 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1：80,000）含有…………… 39
 キシロカイン注ポリアンプ0.5%…………… 37
 キシロカイン注ポリアンプ1%…………… 37
 キシロカイン注ポリアンプ2%…………… 37
 キシロカイン点眼液4%…………… 38
 キシロカインビスカス2%…………… 37
 キシロカインビスカス2%（院外）…………… 37
 ㊦キシロカインポンプスプレー8%…………… 36
 キドミン輸液…………… 199
 【㊦キプレス細粒4mg】
 ㊦モンテルカスト細粒4mg「明治」（院外）… 287
 【㊦キプレス錠10mg】
 ㊦モンテルカスト錠10mg「KM」…………… 287
 【㊦キプレスチュアブル錠5mg】
 ㊦モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」…………… 287
 9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来），組換え沈降…………… 333
 球形吸着炭…………… 221
 キュバール100エアゾール…………… 94
 キュビシン静注用350mg…………… 306
 【㊦強力ネオミノファーゲンシー静注20mL】
 ㊦ネオファーゲン静注20mL…………… 220

【㊦強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL】
 ㊦ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL…………… 220
 【㊦強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL】
 ㊦ネオファーゲン静注20mL…………… 220
 強力ポステリザン（軟膏）…………… 166
 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏（院外）…………… 180
 キロサイド注20mg…………… 249
 キンダベート軟膏0.05%…………… 175
 キンダリー透析剤AF4号（院内）…………… 218

【ク】

グーフィス錠5mg…………… 113
 クアトロバック皮下注シリンジ…………… 340
 ㊦クエチアピン錠25mg「明治」
 【㊦セロクエル25mg錠】…………… 28
 ㊦クエチアピン錠100mg「明治」（院外）
 【㊦セロクエル100mg錠】…………… 28
 クエチアピン fumarate 塩…………… 28
 クエン酸第一鉄ナトリウム…………… 196
 クエン酸第二鉄水和物…………… 83
 クエン酸マグネシウム…………… 349
 グセルクマブ（遺伝子組換え）…………… 234
 組換えRSウイルスワクチン…………… 333
 組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来），乾燥…………… 332
 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン…………… 333
 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）…………… 333
 組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）…………… 334
 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）…………… 334
 グラアルファ配合点眼液…………… 50
 グラケーカプセル15mg…………… 191
 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒〔KB-83〕（院外）…………… 298
 クラドリピン…………… 267
 グラナテック点眼液0.4%…………… 49
 グラニセトロン塩酸塩…………… 116
 【㊦グラニセトロン静注液3mg「F」】
 ㊦グラニセトロン静注液3mg「サワイ」…………… 116
 ㊦グラニセトロン静注液3mg「サワイ」
 【㊦カイトリル注3mg，グラニセトロン静注液3mg「F」，グラニセトロン静注液3mg「トーワ」，グラニセトロン静注液3mg「日医工」，グラニセトロン静注液3mg「明治」〕…………… 116

〔先〕グラニセトロン静注液3mg「トーウ」	
〔後〕グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	116
〔先〕グラニセトロン静注液3mg「日医工」	
〔後〕グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	116
〔先〕グラニセトロン静注液3mg「明治」	
〔後〕グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	116
〔後〕グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	116
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外）	314
〔先〕クラビット錠500mg	
〔後〕レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	323
クラビット点眼液1.5%	50
〔先〕クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	
〔後〕レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	323
グラマリール細粒10%（院外）	33
〔先〕グラマリール細粒10%	
〔後〕チアプリド細粒10%「サワイ」	33
グラマリール錠25mg（院外）	33
〔先〕グラマリール錠25mg	
〔後〕チアプリド錠25mg「サワイ」	33
クラリスロマイシン	317
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	317
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	317
クラリチンレディタブ錠10mg	288
クリアクター静注用80万	224
クリアナール錠200mg	89
クリアミン配合錠S0.5（院外）	20
グリクラジド	224
グリセリン	113
グリセリン浣腸「オヲタ」60	113
グリセリン浣腸「オヲタ」120	113
グリセリン「マルイシ」	113
グリセリン「ヨシダ」	113
グリセレブ配合点滴静注	86
クリゾチニブ	267
グリベック錠100mg	262
グリミクロン錠40mg（院外）	224
グリメピリド	225
〔後〕グリメピリド錠1mg「サワイ」	
〔先〕アマリール1mg錠	225
クリンダマイシン塩酸塩	305
クリンダマイシンリン酸エステル	305
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	305
グルアセト35注	205
グルカゴン	159,353
グルカゴンGノボ注射用1mg	353
グルコン酸カリウム	197
グルコン酸カルシウム水和物	195
グルコンサンK細粒4mEq/g	197
グルタチオン	220
グルファスト錠10mg	227
グレースビット錠50mg（院外）	322
〔先〕グレースビット錠50mg	
〔後〕シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	322
クレストールOD錠2.5mg（院外）	80
〔先〕クレストールOD錠2.5mg	
〔後〕ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	80
クレストールOD錠5mg（院外）	80
〔先〕クレストールOD錠5mg	
〔後〕ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	80
クレナフィン爪外用液10%	329
クレメジン速崩錠500mg	221
クレンブテロール塩酸塩	92
〔後〕クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	
〔先〕スピロベント錠10μg	92
クロキサゾラム	4
クロタミトン	177
クロチアゼパム	28
クロトリマゾール	181
クロナゼパム	9
クロバザム	9
〔後〕クロピドグレル錠25mg「SANIK」	
〔先〕プラビックス錠25mg	213
〔後〕クロピドグレル錠75mg「SANIK」	
〔先〕プラビックス錠75mg	213
クロピドグレル硫酸塩	213
グロブリン，抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫	342
グロブリン，人免疫	337
グロブリン筋注用200単位「ニチャク」，乾燥HB	336
グロブリン筋注用1000単位「ニチャク」，乾燥HB	336
グロブリン筋注用1000倍「JB」，抗D人免疫	336
クロベタゾールプロピオン酸エステル	174,175
クロベタゾン酪酸エステル	175
グロベニン-I静注用5000mg，献血	337
クロマイ腔錠100mg	165
クロミッド錠50mg（院外）	160
クロミフェンクエン酸塩	160
クロミプラミン塩酸塩	26
クロモグリク酸ナトリウム	92
クロラムフェニコール	165,172
クロルフェニラミンマレイン酸塩	282
クロルフェニラミンマレイン酸塩，d-	283
クロルプロマジン塩酸塩	25
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	25
クロルヘキシジングルコン酸塩	171
クロルマジノン酢酸エステル	156

⑥クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」
 [(先)プロスタール錠25]…………… 156
 クロロマイセチン局所用液5% …………… 172

【ケ】

ゲーファピキサントクエン酸塩…………… 97
 ゲーベンクリーム1% …………… 172
 ケーワン錠5mg …………… 191
 ケアラム錠25mg (院外) …………… 231
 けい芥連翹湯…………… 295
 荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-50],
 ツムラ…………… 295
 [(先)ケイキサレート散]
 ⑥ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原
 末 (院内) …………… 85
 ケイキサレートドライシロップ76%…………… 85
 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン…………… 335
 経口弱毒生ロタウイルスワクチン…………… 335
 ケイ酸アルミニウム, 天然…………… 112
 ⑥KCL注20mEqキット「テルモ」…………… 204
 桂枝茯苓丸…………… 292
 桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用) [TJ-25],
 ツムラ…………… 292
 経腸成分栄養剤 (消化態) …………… 200
 経腸成分栄養剤 (半消化態) …………… 200,201
 ケイツーN静注10mg …………… 192
 ケイツーシロップ0.2% (院外) …………… 191
 ケシンプタ皮下注20mgペン…………… 32
 ケタスカプセル10mg…………… 283
 ケタミン塩酸塩…………… 2
 ケタラール静注用200mg …………… 2
 血液凝固第XIII因子, 人…………… 337
 結合型エストロゲン…………… 156
 ケトコナゾール…………… 181
 ケトチフェンフマル酸塩…………… 53,284
 ケトプロフェン…………… 177,178
 ⑥ケトプロフェンテープ40mg「日医工」
 [(先)モーラステープL40mg] …………… 178
 ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg
 /1mL…………… 137
 ゲフィチニブ…………… 267
 ⑥ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(院内)
 [(先)イレッサ錠250] …………… 267
 ケフラールカプセル250mg (水江)…………… 309
 ゲムシタピン塩酸塩…………… 249
 ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」…………… 249
 ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」…………… 249
 ゲメプロスト…………… 160
 ケラチナミンコーワクリーム20%…………… 182

ケレンディア錠10mg…………… 84
 献血グロベニン-I静注用5000mg …………… 337
 献血ベニロン-I静注用5000mg …………… 336
 ゲンタシン軟膏0.1% …………… 172
 ゲンタマイシン硫酸塩…………… 172,313
 ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」… 313

【コ】

コートリル錠10mg…………… 126
 コートロシン注射用0.25mg …………… 122
 ゴービック水性懸濁注シリンジ…………… 341
 コールタイジン点鼻液…………… 54
 コアベータ静注用12.5mg …………… 60
 抗HBs人免疫グロブリン, 乾燥…………… 336
 高カロリー輸液用総合ビタミン…………… 192
 高カロリー輸液用微量元素製剤…………… 197
 抗D (Rho) 人免疫グロブリン, 乾燥…………… 336
 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」… 336
 抗破傷風人免疫グロブリン, 乾燥…………… 336
 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン…………… 342
 牛車腎気丸…………… 301
 牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) [TJ-107],
 ツムラ…………… 301
 呉茱萸湯…………… 293
 呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-31] (院
 外), ツムラ …………… 293
 コスパノンカプセル40mg…………… 43
 ゴセレリン酢酸塩…………… 160
 コセンティクス皮下注75mgシリンジ…………… 235
 コセンティクス皮下注150mgペン…………… 235
 コソプト配合点眼液…………… 50
 コソプトミニ配合点眼液 (院外) …………… 50
 コデインリン酸塩散1%「タケダ」【経過措置】 90
 コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」…………… 358
 コデインリン酸塩水和物…………… 90,358
 ゴナックス皮下注用80mg…………… 162
 ゴナックス皮下注用120mg …………… 162
 コニール錠4 …………… 77
 コハク酸ソリフェナシン…………… 167
 コムクロシャンプー0.05% …………… 174
 コムタン錠100mg (院外)…………… 21
 [(先)コムタン錠100mg]
 ⑥エンタカポン錠100mg「JG」…………… 21
 コムレクス耳科用液1.5% …………… 54
 コメリアンコーワ錠50…………… 75
 コララン錠2.5mg …………… 82
 コリオゴナドトロピンアルファ (遺伝子組換え)
 …………… 122
 …………… 122
 グリムマブ (遺伝子組換え) …………… 234

コルヒチン…………… 223
 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」…………… 223
 五苓散…………… 291
 五苓散エキス顆粒(医療用)[TJ-17](院外),
 ツムラ…………… 291
 コレクチム軟膏0.25%(院外) …… 183
 コレクチム軟膏0.5% …… 183
 コレスチミド…………… 79
 コレチメント錠9mg(院外)…………… 119
 コレバイン錠500mg …… 79
 コレミナル錠4mg …… 6
 コロンフォート内用懸濁液25%…………… 348
 コンスタン0.4mg錠(院外)…………… 4
 [先コンスタン0.4mg錠]
 後アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」…………… 4
 コントミン筋注10mg…………… 25
 コントミン糖衣錠12.5mg …… 25
 コンドリアーゼ…………… 234

【サ】

サークリサ点滴静注100mg …… 261
 サークリサ点滴静注500mg …… 261
 ザーコリカプセル250mg …… 267
 ザーネ軟膏0.5% …… 178
 サーバリックス…………… 333
 サアミオン錠5mg(院外)…………… 84
 [先サアミオン錠5mg]
 後ニセルゴリン錠5mg「NP」…………… 84
 柴胡加竜骨牡蛎湯…………… 290
 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[TJ
 -12], ツムラ…………… 290
 柴胡桂枝乾姜湯…………… 290
 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[TJ
 -11](院外), ツムラ…………… 290
 柴胡桂枝湯…………… 290
 柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[TJ-10](院
 外), ツムラ…………… 290
 [先ザイザル錠5mg]
 後レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」… 287
 [先ザイザルシロップ0.05%]
 後レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニ
 プロ」…………… 288
 ザイティガ錠250mg …… 260
 サイトテック錠200(院外)…………… 109
 サイプレジン1%点眼液 …… 44
 柴朴湯…………… 300
 柴朴湯エキス顆粒(医療用)[TJ-96], ツム
 ラ…………… 300

[先ザイボックス錠600mg]
 後リネゾリド錠600mg「サワイ」(院内) …… 323
 [先ザイボックス注射液600mg]
 後リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」… 323
 サイモグロブリン点滴静注用25mg…………… 342
 サイラムザ点滴静注液100mg …… 277
 サイラムザ点滴静注液500mg …… 277
 柴苓湯…………… 302
 柴苓湯エキス顆粒(医療用)[TJ-114], ツム
 ラ…………… 302
 [先ザイロリック錠100]
 後アロプリノール錠100mg「サワイ」…………… 223
 [先サインバルタカプセル20mg]
 後デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」… 28
 酢酸亜鉛水和物…………… 221
 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物… 83
 [先ザクラス配合錠HD]
 後ジルムロ配合錠HD「ニプロ」…………… 71
 ザジテンカプセル1mg(院外)…………… 284
 ザジテンシロップ0.02% …… 284
 ザジテン点鼻液0.05% …… 53
 ザジテンドライシロップ0.1%(院外) …… 284
 サトラリズマブ(遺伝子組換え)…………… 342
 ザナミビル水和物…………… 325
 ザバクサ配合点滴静注用…………… 315
 サフィナミドメシル酸塩…………… 22
 サブラッド血液ろ過用補充液BSG…………… 218
 サムスカOD錠7.5mg …… 64
 サムスカOD錠15mg …… 64
 サムタス点滴静注用8mg …… 65
 サムチレール内用懸濁液15%…………… 329
 ザラカム配合点眼液…………… 51
 サラジェン錠5mg(院外)…………… 119
 サラズスルファペリジン…………… 321
 サラゾピリン錠500mg …… 321
 サリグレンカプセル30mg(院外) …… 118
 サリチル酸…………… 182
 後サリチル酸ワセリン軟膏東豊(院外), 10% 181
 サリベートエアゾール…………… 121
 サルタノールインヘラー100μg …… 91
 ザルトラップ点滴静注100mg …… 260
 ザルトラップ点滴静注200mg …… 260
 サルブタモール硫酸塩…………… 91
 サルボグレラート塩酸塩…………… 213
 後サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」
 [先アンブラーグ錠100mg]…………… 213
 酸化鉄, 含糖…………… 196
 酸化マグネシウム…………… 112
 サンコバ点眼液0.02% …… 46
 三酸化ヒ素…………… 267

酸棗仁湯…………… 300
 酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-103〕（院
 外），ツムラ…………… 300
 〔㊦サンドスタチン皮下注用100μg〕
 ㊦オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン
 ド」（院内）…………… 160
 サンピロ点眼液1%…………… 44
 サンピロ点眼液3%…………… 44
 サンリズムカプセル50mg（院外）…………… 62
 〔㊦サンリズムカプセル50mg〕
 ㊦ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」
 ……………… 62
 サンリズム注射液50…………… 62

【シ】

ジーラスタ皮下注3.6mg…………… 215
 ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド…………… 215
 ジアグノグリーン注射用25mg…………… 352
 ジアゼパム…………… 4,5
 ジアゼパム注射液10mg「NIG」…………… 4
 シアノコバラミン…………… 46
 ジアフエニルスルホン…………… 183
 ジェービックV…………… 335
 ジェイゾロフト錠25mg…………… 27
 ジェノゲスト…………… 160
 ジェブタナ点滴静注60mg…………… 257
 ジオクチルソジウムスルホサクシネート…………… 53
 ㊦ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科
 用液5%「CEO」…………… 53
 ジオトリフ錠40mg…………… 260
 ジオン注無痛化剤付…………… 166
 ジカディア錠150mg…………… 269
 ジクアスLX点眼液3%…………… 46
 ジクアス点眼液3%…………… 46
 ジクアホソルナトリウム…………… 46
 ジクトルテープ75mg…………… 17
 シグマート錠5mg（院外）…………… 75
 〔㊦シグマート錠5mg〕
 ㊦ニコランジル錠5mg「サワイ」…………… 75
 シグマート注2mg…………… 76
 シグマート注12mg…………… 76
 シクレソニド…………… 97
 シクロスポリン…………… 47,234
 ジクロフェナクナトリウム…………… 17,178
 ㊦ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 178
 ㊦ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
 〔㊦ボルタレンサポ25mg〕…………… 17
 ㊦ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
 〔㊦ボルタレンサポ50mg〕…………… 17

㊦ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
 〔㊦ボルタレン錠25mg〕…………… 17
 シクロベントラート塩酸塩…………… 44
 シクロホスファミド水和物…………… 243,244
 ジゴキシシ…………… 56
 ジゴシン錠0.125mg…………… 56
 ジゴシン注0.25mg…………… 56
 ㊦シザナリン配合点滴静注液
 〔㊦エレメンミック注〕…………… 197
 ジスチグミン臭化物…………… 41
 シスプラチン…………… 268
 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」…………… 268
 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」…………… 268
 ジスロマック細粒小児用10%（院外）…………… 316
 ジスロマック錠250mg…………… 316
 ジスロマック点滴静注用500mg…………… 316
 ジセレカ錠200mg…………… 239
 ジソピラミド…………… 61
 ジソピラミドリン酸塩…………… 61
 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU…………… 285
 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU…………… 285
 シタグリプチンリン酸塩水和物…………… 226
 ㊦シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
 〔㊦グレースビット錠50mg〕…………… 322
 シタフロキサシン水和物…………… 322
 シタラビン…………… 249
 ㊦シタラビン点滴静注液400mg「NIG」…………… 249
 ジドロゲステロン…………… 156
 シナール配合顆粒…………… 193
 シナジス筋注液50mg…………… 326
 シナジス筋注液100mg…………… 326
 ジノプロスト…………… 161
 ㊦ジノプロスト注射液1000μg「F」
 〔㊦プロスタルモン・F注射液1000〕…………… 161
 ジピリダモール…………… 74
 ジファミラスト…………… 183
 ジフェニドール塩酸塩…………… 54
 ジフェンヒドラミン…………… 174
 ジフェンヒドラミン塩酸塩…………… 282
 ジフテリア破傷風混合トキソイド，沈降…………… 340
 ジフテリア破傷風混合ワクチン，沈降精製百日
 せき…………… 340
 ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン，
 沈降精製百日せき…………… 340
 ジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb
 型混合ワクチン（生），沈降精製百日せき …… 341
 ジフルカンカプセル100mg…………… 329
 ジプレキサザイデイス錠5mg…………… 27
 ジプレキサ細粒1%（院外）…………… 27

〔㊦シプロキサシ注400mg〕	
㊦シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニ プロ」……………	322
シプロフロキサシン……………	322
㊦シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニ ロ」	
〔㊦シプロキサシ注400mg〕……………	322
シプロヘプタジン塩酸塩水和物……………	282
シベノール錠100mg……………	61
シベノール静注70mg……………	61
シベレスタットナトリウム水和物……………	234
シベンゾリンコハク酸塩……………	61
シムジア皮下注200mgオートクリックス……………	235
シムビコートタービュヘイラー60吸入……………	101
〔㊦シムビコートタービュヘイラー60吸入〕	
㊦ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」……………	102
ジメチコン……………	104
㊦ジメチコン内用液2%「ホリイ」	
〔㊦ガスコンドロップ内用液2%〕……………	104
シメチジン……………	105
㊦シメチジン錠200mg「サワイ」	
〔㊦タガメット錠200mg〕……………	105
ジメチル, フマル酸……………	34
ジメチルイソプロピルアズレン……………	178
ジモルファンリン酸塩……………	88
ジモルホラミン……………	87
ジャカビ錠5mg……………	278
弱毒生おたふくかぜワクチン, 乾燥……………	332
弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」, 乾燥 ……………	332
弱毒生水痘ワクチン, 乾燥……………	332
弱毒生水痘ワクチン「ビケン」, 乾燥……………	332
弱毒生風しんワクチン, 乾燥……………	332
弱毒生風しんワクチン「タケダ」, 乾燥……………	332
弱毒生麻しん風しん混合ワクチン, 乾燥……………	341
弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」, 乾燥……………	341
弱毒生麻しんワクチン, 乾燥……………	333
弱毒生麻しんワクチン「タケダ」, 乾燥……………	333
芍薬甘草湯……………	297
芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-68〕, ツムラ……………	297
ジャディアン錠10mg……………	226
ジャドニュー顆粒分包90mg(院外)……………	221
ジャドニュー顆粒分包360mg(院外)……………	221
ジャヌビア錠50mg……………	226
シュアポスト錠0.5mg……………	227
十全大補湯……………	295
十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-48〕, ツムラ……………	295
十味敗毒湯……………	289
十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-6〕(院 外), ツムラ……………	289
ジュリナ錠0.5mg(院外)……………	155
潤腸湯……………	296
潤腸湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-51〕, ツム ラ……………	296
小建中湯……………	300
小建中湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-99〕(院 外), ツムラ……………	300
小柴胡湯……………	289
小柴胡湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-9〕, ツム ラ……………	289
小柴胡湯加桔梗石膏……………	302
小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)〔TJ -109〕, ツムラ……………	302
硝酸イソソルビド……………	74,75
㊦硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	
〔㊦フランドルテープ40mg〕……………	75
小青竜湯……………	291
小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-19〕(院 外), ツムラ……………	291
静注用キシロカイン2%……………	38
〔㊦消毒用エタノールB液「ケンエー」〕	
㊦消毒用エタライト液……………	170
〔㊦消毒用エタノールB液「ケンエー」〕	
㊦消毒用エタライトB液……………	170
消毒用エタノール「マルイシ」(今回限定)……………	170
㊦消毒用エタライト液	
〔㊦消毒用エタノールB液「ケンエー」〕……………	170
㊦消毒用エタライトB液	
〔㊦消毒用エタノールB液「ケンエー」〕……………	170
小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(院外) ……………	53
小児用ムコソルバンシロップ0.3%……………	90
蒸留水, 大塚……………	347
食塩注10%, 大塚……………	203
ジラゼブ塩酸塩水和物……………	75
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ……………	333
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物……………	83
ジルチアゼム塩酸塩……………	75
㊦ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日 医工」	
〔㊦ヘルベッサ-Rカプセル100mg〕……………	75
㊦ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	
〔㊦ヘルベッサ-注射用50〕……………	75
シルデナフィルクエン酸塩……………	83,168
シルニジピン……………	68
㊦シルニジピン錠10mg「サワイ」	
〔㊦アテレック錠10〕……………	68

【セ】

生食注, 大塚	203	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	310
生食注2ポート50mL, 大塚	204	セフジトレン ピボキシル	311
生食注2ポート100mL, 大塚	204	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	311
生食注シリンジ「オーツカ」5mL	204	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	311
生食注シリンジ「オーツカ」20mL	204	セフジニル	311
精製ツベルクリン	342	⑥セフジニル細粒小児用10%「SW」(院外)	
精製ツベルクリン (PPD) 1人用, 一般診断用	342	〔①セフゾン細粒小児用10%〕	311
精製ヒアルロン酸ナトリウム	47,235	セフジニル錠100mg「サワイ」	311
精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン, 沈降	340	〔①セフゾン細粒小児用10%〕	
精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混 合ワクチン, 沈降	340	⑥セフジニル細粒小児用10%「SW」(院外)	311
精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオへ モフィルスb型混合ワクチン (生), 沈降	341	セフタジジム静注用1g「VTRS」(院内)	312
清肺湯	299	セフタジジム水和物	312
清肺湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-90] (院外), ツムラ	299	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医 工」	312
〔①セイブルOD錠75mg〕		セフトリアキソンナトリウム水和物	312
⑥ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	227	ゼフナート外用液2%	181
セイブル錠50mg	227	セフポドキシムプロキセチル	312
成分栄養剤, 肝不全用	200	【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg (院 外)	313
生理食塩液	203,204	⑥セフポドキシムプロキセチルDS小児用5% 「サワイ」(院外)	
生理食塩液バッグ「フソー」	203	〔①バナンドライシロップ5%〕	312
生理食塩液PL「フソー」	203	セフメタゾールナトリウム	313
生理食塩液「ヒカリ」	203	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	313
セクキヌマブ (遺伝子組換え)	235	セフメノキシム塩酸塩	45,52
〔①ゼチーア錠10mg〕		ゼベリン点眼液0.1% (院外)	45
⑥エゼチミブ錠10mg「DSEP」	78	セボフルラン	2
セツキシマブ (遺伝子組換え)	269	セボフルラン吸入麻醉液「ニッコー」	2
セディール錠10mg (院外)	8	セマグルチド (遺伝子組換え)	161,162
セパゾン錠2	4	セムブリックス錠20mg	259
セパミット-Rカプセル10	76	セムブリックス錠40mg	259
⑥セパミット細粒1%	77	ゼラチン	207
ゼビアックスローション2%	174	〔①セララ錠50mg〕	
セビメリン塩酸塩水和物	118	⑥エプレノン錠50mg「杏林」	67
セファクロル	309	セリチニブ	269
セファクロルカプセル250mg「トーワ」	309	セルシン散1% (院外)	5
セファゾリンナトリウム水和物	310	セルシン錠, 2mg	5
セファゾリンNa注射用1g「NP」	310	セルシン注射液10mg	5
セファドール錠25mg	54	セルタッチパップ70 (氷江)	179
セファランチン	186	セルトラリン, 塩酸	27
セファランチン錠1mg	186	セルトリズマブペゴル (遺伝子組換え)	235
ゼフィックス錠100	327	ゼルフォーム	207
⑥セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	310	〔①セルベックスカプセル50mg〕	
セフェピム塩酸塩水和物	310	⑥テプレノンカプセル50mg「サワイ」	108
セフォチアム塩酸塩	310	セレキシパグ	83
		セレコキシブ	18
		⑥セレコキシブ錠100mg「トーワ」	
		〔①セレコックス錠100mg〕	18

[⊕ダイアート錠30mg]

⊕アゾセミド錠30mg「JG」…………… 64

ダイアート錠60mg（院外）…………… 64

[⊕ダイアート錠60mg]

⊕アゾセミド錠60mg「JG」…………… 64

ダイアアップ坐剤4…………… 5

ダイアアップ坐剤6…………… 5

ダイアアップ坐剤10…………… 5

ダイアモックス錠250mg…………… 63

ダイアモックス注射用500mg…………… 63

第一鉄ナトリウム，クエン酸…………… 196

大黃牡丹皮湯…………… 293

大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-33〕
（院外），ツムラ…………… 293

タイケルブ錠250mg（院外）…………… 277

大建中湯…………… 300

大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕，ツ
ムラ…………… 300

ダイズ油…………… 202

第二鉄，溶性ピロリン酸…………… 196

第二鉄水和物，クエン酸…………… 83

ダイメジン・マルチ注…………… 192

ダウノマイシン静注用20mg…………… 254

ダウノルピシン塩酸塩…………… 254

[⊕タガメット錠200mg]

⊕シメチジン錠200mg「サワイ」…………… 105

ダカルバジン…………… 245

ダカルバジン注用100…………… 245

タグリッソ錠40mg…………… 263

タグリッソ錠80mg…………… 263

タクロリムス水和物…………… 183,236

タケキャブ錠10mg…………… 108

タケキャブ錠20mg…………… 108

タケプロンOD錠15（院外）…………… 110

[⊕タケプロンOD錠15]

⊕ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」… 110

タケプロン静注用30mg…………… 109

タコシル組織接着用シート…………… 338

[⊕タゴシッド200mg，注射用]

⊕テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」
…………… 306

ダサチニブ…………… 269

タシグナカプセル150mg…………… 272

⊕タゾピベ配合静注用4.5「明治」
〔⊕ゾシン静注用4.5〕…………… 315

タダラフィル…………… 168

⊕タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」…………… 168

タチオン錠50mg…………… 220

タナトリル錠5（院外）…………… 65

[⊕タナトリル錠5]

⊕イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」…………… 65

ダバグリフロジンプロピレングリコール…………… 226

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸
塩…………… 211

ダフクリア錠200mg…………… 306

ダプトマイシン…………… 306

タフルプロスト…………… 48

タプロス点眼液0.0015%…………… 48

タプロスミニ点眼液0.0015%…………… 48

ダプロデュスタット…………… 236

[⊕タミフルカプセル75]

⊕オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」… 325

[⊕タミフルドライシロップ3%]

⊕オセルタミビルDS3%「サワイ」…………… 325

タムスロシン塩酸塩…………… 168

⊕タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」（院
内）

〔⊕ハルナールD錠0.2mg〕…………… 168

タモキシフェンクエン酸塩…………… 269

ダラキューロ配合皮下注…………… 279

ダラシンカプセル150mg…………… 305

タリージェ錠15mg…………… 34

タリオン錠10mg…………… 287

タリビッド眼軟膏0.3%…………… 46

タルク…………… 281

タルセバ錠150mg…………… 262

タルチレリン水和物…………… 33

ダルテパリンナトリウム…………… 209

ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ
「ニプロ」…………… 209

ダルベポエチナルファ（遺伝子組換え）… 237,238

⊕ダルベポエチナルファ注10μgシリンジ
「KKF」

〔⊕ネस्प注射液10μgプラシリンジ〕…………… 237

⊕ダルベポエチナルファ注20μgシリンジ
「KKF」

〔⊕ネस्प注射液20μgプラシリンジ〕…………… 237

⊕ダルベポエチナルファ注30μgシリンジ
「KKF」

〔⊕ネस्प注射液30μgプラシリンジ〕…………… 237

⊕ダルベポエチナルファ注40μgシリンジ
「KKF」

〔⊕ネस्प注射液40μgプラシリンジ〕…………… 237

⊕ダルベポエチナルファ注60μgシリンジ
「KKF」

〔⊕ネस्प注射液60μgプラシリンジ〕…………… 237

⊕ダルベポエチナルファ注120μgシリンジ
「KKF」

〔⊕ネस्प注射液120μgプラシリンジ〕…………… 237

沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来), 組換え 334

【ツ】

ツートラム錠50mg (院外) 18
 ツイミーグ錠500mg 225
 ツベルクリン (PPD) 1人用, 一般診断用精製 342
 ツベルクリン, 精製 342
 ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-106] (院外) 301
 ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) [TJ-57] (院外) 297
 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-98] (院外) 300
 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-15] 291
 ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-1] 289
 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-137] 303
 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) [TJ-24] 292
 ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-50] 295
 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用) [TJ-25] 292
 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) [TJ-107] 301
 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-31] (院外) 293
 ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) [TJ-17] (院外) 291
 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-12] 290
 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-11] (院外) 290
 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-10] (院外) 290
 ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-96] 300
 ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-114] 302
 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-103] (院外) 300
 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-68] 297
 ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-48] 295
 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-6] (院外) 289

ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-51] 296
 ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-99] (院外) 300
 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-9] 289
 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用) [TJ-109] 302
 ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-19] (院外) 291
 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-104] (院外) 301
 ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-90] (院外) 299
 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-53] (院外) 296
 ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-33] (院外) 293
 ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-100] 300
 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-91] (院外) 299
 ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用) [TJ-47] (院外) 295
 ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-40] (院外) 294
 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-61] (院外) 297
 ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用) [TJ-86] (院外) 298
 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-38] (院外) 294
 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) [TJ-23] 292
 ツムラ二朮湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-88] (院外) 299
 ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-32] (院外) 293
 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-108] 301
 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-29] 292
 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) [TJ-7] (院外) 289
 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-16] (院外) 291
 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-14] 290
 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-37] (院外) 293

⑧デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	
〔先〕プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」	8
テクフィデラカプセル120mg	34
テクフィデラカプセル240mg	34
テグレート錠200mg	9
デザレックス錠5mg	285
〔先〕デジレル錠25	
⑧トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	28
テストステロンエナンチオン酸エステル	155
デスフルラン	3
デスマプレシン酢酸塩水和物	122
デスロラタジン	285
テゼスパイア皮下注210mgペン（院外）	97
テゼベルマブ（遺伝子組換え）	97
テセロイキン（遺伝子組換え）	343
テセントリク点滴静注1200mg	260
テタノブリン筋注用250単位	336
デトキソール静注液2g	221
テトラコサクチド酢酸塩	122
テトラサイクリン塩酸塩	172,173
テトラミド錠10mg	30
テナパノル塩酸塩	84
テネリアOD錠20mg	226
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	226
テノーミン錠25（院外）	58
〔先〕テノーミン錠25	
⑧アテノロール錠25mg「タイヨー」【経過措置】（院内）	58
テノーミン錠50（院外）	58
〔先〕テノーミン錠50	
⑧アテノロール錠50mg「タイヨー」【経過措置】	58
デノシン点滴静注用500mg	325
デノスマブ（遺伝子組換え）	238
テノゼット錠300mg	325
デノタスチュアブル配合錠	195
テノヒビルアラフェナミドフマル酸塩	325
テノヒビルジソプロキシシルフマル酸塩	325
デパケンR錠100mg（院外）	10
〔先〕デパケンR錠100mg	
⑧バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	10
デパケン錠200mg（院外）	10
デパケンシロップ5%（院外）	10
〔先〕デパケンシロップ5%	
⑧バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	10
デパス錠0.5mg（院外）	27
〔先〕デパス錠0.5mg	
⑧エチゾラム錠0.5mg「SW」	27
テビベネムピボキシル	313
デフェラシロクス	221
テプレノン	108
⑧テプレノンカプセル50mg「サワイ」	
〔先〕セルベックスカプセル50mg	108
デプロドンプロピオン酸エステル	175
デベルザ錠20mg	226
テムシロリムス	270
テモカプリル塩酸塩	66
⑧テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」	
〔先〕エースコール錠1mg	66
デュークラバシチニブ	238
デュオトラバ配合点眼液（院外）	51
デュタステリド	162
⑧デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	162
デュピクセント皮下注300mgペン	285
デュピルマブ（遺伝子組換え）	285
デュファストン錠5mg（院外）	156
デュラグルチド（遺伝子組換え）	162
デュルバルマブ（遺伝子組換え）	270
デュロキセチン塩酸塩	28
⑧デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」	
〔先〕サインバルタカプセル20mg	28
テラプチク静注45mg	87
⑧テラムロ配合錠AP「DSEP」	
〔先〕ミカムロ配合錠AP	72
テラルビシン注射用10mg	256
テラルビシン注射用20mg	256
テリバラチド（遺伝子組換え）	123
テリバラチド酢酸塩	123,351
テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	351
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	123
テリルジー100エリプタ30吸入用	101
テリルジー200エリプタ30吸入用	101
デルイソマルトース第二鉄	196
デルゴシチニブ	183
⑧テルチア配合錠BP「トーワ」	
〔先〕ミコンビ配合錠BP	72
テルネリン錠1mg（院外）	43
〔先〕テルネリン錠1mg	
⑧チザニジン錠1mg「日医工」	43
テルビナフィン塩酸塩	181
テルフィス点滴静注	199
テルミサルタン	68
⑧テルミサルタン錠40mg「ニプロ」	
〔先〕ミカルディス錠40mg	68
デルモベートクリーム0.05%（院外）	174
デルモベートスカルプローション0.05%	175

デルモベート軟膏0.05% 174
 テレミンソフト坐薬2mg 114
 テレミンソフト坐薬10mg (院外) 114
 点眼・点鼻用リンデロンA液 51
 天然ケイ酸アルミニウム 112
 デンプン部分加水分解物 354

【ト】

トーリセル点滴静注液25mg 270
 ⑥トアラセット配合錠「DSEP」
 〔⊕トラムセット配合錠〕 20
 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元
 素 201
 糖液5%, 大塚 198
 糖液5%2ポート50mL, 大塚 198
 糖液5%2ポート100mL, 大塚 198
 糖液10%, 大塚 198
 糖液20%, 大塚 198
 糖液50%, 大塚 198
 桃核承気湯 297
 桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-61] (院
 外), ツムラ 297
 当帰飲子 298
 当帰飲子エキス顆粒 (医療用) [TJ-86] (院
 外), ツムラ 298
 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 294
 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)
 [TJ-38] (院外), ツムラ 294
 当帰芍薬散 292
 当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) [TJ-23],
 ツムラ 292
 ⑥ドキサゾシン錠2mg「テバ」
 〔⊕カルデナリン錠2mg〕 68
 ドキサゾシンメシル酸塩 68
 ドキサプラム塩酸塩水和物 87
 ドキシサイクリン塩酸塩水和物 317
 ドキソルピシン塩酸塩 255
 ドグマチール錠50mg (院外) 108
 〔⊕ドグマチール錠50mg〕
 ⑥スルピリド錠50mg「アメル」 108
 トコフェロールニコチン酸エステル 84
 トシリズマブ (遺伝子組換え) 343
 トスフロキサシントシル酸塩水和物 322
 ドセタキセル水和物 257
 ⑥ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
 〔⊕ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL〕 257
 ⑥ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
 〔⊕ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL〕 257
 ドチヌラド 223

ドネペジル塩酸塩 33,34
 ⑥ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」
 〔⊕アリセプトD錠3mg〕 33
 ⑥ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
 〔⊕アリセプトD錠5mg〕 33
 ドパストン静注50mg 21
 ドパミン塩酸塩 57
 ⑥ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット
 「VTRS」 57
 トビエース錠4mg 168
 トピロキソスタット 223
 トプシムクリーム0.05% 176
 トプシムローション0.05% 176
 ドプスOD錠100mg 23
 ドブタミン塩酸塩 57
 ⑥ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」 57
 ⑥ドブタミン点滴静注液100mg「F」
 〔⊕ドブトレックス注射液100mg〕 57
 〔⊕ドブトレックス注射液100mg〕
 ⑥ドブタミン点滴静注液100mg「F」 57
 トフラニール錠10mg (院外) 26
 トフラニール錠25mg (院外) 26
 ドプラム注射液400mg 87
 トホグリフロジン水和物 226
 〔⊕トポテシン点滴静注100mg〕
 ⑥イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サ
 ワイ」 256
 ドボネックス軟膏50μg/g 182
 ドボベットゲル 184
 ドボベット軟膏 184
 ドボベットフォーム 184
 ドミフェン臭化物 118
 トラスツズマブ (遺伝子組換え) 270
 トラスツズマブエムタンシン (遺伝子組換え)
 270
 トラスツズマブデルクステカン (遺伝子組換
 え) 271
 トラセミド 64
 ⑥トラセミドOD錠4mg「TE」
 〔⊕ルブラック錠4mg〕 64
 トラゼンタ錠5mg 227
 トラゾドン塩酸塩 28
 ⑥トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
 〔⊕レスリン錠25, デジレル錠25〕 28
 トラディアンス配合錠AP 228
 トラニラスト 285
 トラネキサム酸 207
 ⑥トラネキサム酸注1g「NP」
 〔⊕トランサミン注10%〕 207
 トラフェルミン (遺伝子組換え) 183

トラベルミン注	55
トラベルミン配合錠	54
トラマールOD錠25mg	18
トラマゾリン塩酸塩	52
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	52
トラマドール塩酸塩	18
〔㊦トラムセット配合錠〕	
〔㊧〕トアラセット配合錠「DSEP」	20
トランサミン錠250mg	207
〔㊦トランサミン注10%〕	
〔㊧〕トラネキサム酸注1g「NP」	207
トリアゾラム	5
〔㊧〕トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	
〔㊦〕ハルシオン0.25mg錠	5
トリアムシノロンアセトニド	48,118,137
トリクロホスナトリウム	8
トリクロリールシロップ10%	8
トリクロルメチアジド	63
トリセノックス点滴静注12mg	267
トリビック	340
トリプタノール錠10	26
トリプタノール錠25	26
トリヘキシフェニジル塩酸塩	22
トリメブチンマレイン酸塩	118
〔㊧〕トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	
	118
トリラホン錠2mg	25
トルソプト点眼液1%	48
ドルゾラムド塩酸塩	48
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	230
〔㊦〕ドルナー錠20μg〕	
〔㊧〕ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	215
トルバプタン	64
トルバプタンリン酸エステルナトリウム	65
ドルミカム注射液10mg	6
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	162
トレランG液75g	354
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL（院内）	245
トリアキシン点滴静注用25mg	246
トレシーバ注フレックスタッチ	158
トレチノイン	271
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	234
トレメリムマブ（遺伝子組換え）	271
トレリーフOD錠25mg	22
〔㊦〕トレリーフOD錠25mg〕	
〔㊧〕ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	22
ドロキシドパ	23
トロピカミド	44
ドロペリドール	3
ドロレプタン注射液25mg	3

トロンピン	207
トロンピン液モチダソフトボトル5千	207
トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）	211
ドンペリドン	118
〔㊧〕ドンペリドン錠10mg「日医工」	
〔㊦〕ナウゼリン錠10〕	118

【ナ】

ナイキサン錠100mg	18
ナウゼリン坐剤10	118
ナウゼリン坐剤60	118
ナウゼリン錠10（院外）	118
〔㊦〕ナウゼリン錠10〕	
〔㊧〕ドンペリドン錠10mg「日医工」	118
ナジフロキサシン	174
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	54
〔㊦〕ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用〕	
〔㊧〕モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用	54
ナテグリニド	226
ナトリウム，塩化	203,347
ナトリウム，クエン酸第一鉄	196
ナトリウム，炭酸水素	112,221
ナトリウム「オーツカ」，塩化	347
ナトリウム「ケンエー」，炭酸水素	112
〔㊧〕ナトリウム錠500mg「VTRS」，炭酸水素	112
Na補正液0.5mmol/mL，リン酸	206
ナトリックス錠1	67
〔㊦〕ナパゲルンローション3%〕	
〔㊧〕フェルビナクローション3%「三笠」	178
ナファゾリン硝酸塩	52
ナファモスタット注射用10mg「SW」	238
ナファモスタット注射用50mg「SW」	239
ナファモスタットメシル酸塩	238,239
ナフトピジル	168
ナプロキセン	18
ナラトリプタン塩酸塩	73
ナルサス錠2mg	359
ナルデメジントシル酸塩	113
ナルフラフィオン塩酸塩	34
ナルラピド錠1mg	359
ナロキソン塩酸塩	87
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	87

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩	69
〔㊧〕ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	
〔㊦〕ペルジピン注射液2mg〕	69

ネオメドロールEE軟膏	51
〔先〕ネキシウムカプセル20mg	
〔後〕エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	
.....	107
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	107
ネクスバール錠200mg	269
〔後〕ネグミンシュガー軟膏	
〔先〕ユーパスタコーク軟膏, ソアナース軟膏	
.....	184
ネシツムマブ（遺伝子組換え）	272
〔先〕ネस्प注射液10μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注10μgシリンジ	
「KKF」	237
〔先〕ネस्प注射液20μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注20μgシリンジ	
「KKF」	237
〔先〕ネस्प注射液30μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注30μgシリンジ	
「KKF」	237
〔先〕ネस्प注射液40μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注40μgシリンジ	
「KKF」	237
〔先〕ネस्प注射液60μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注60μgシリンジ	
「KKF」	237
ネस्प注射液120μgプラシリンジ	238
〔先〕ネस्प注射液120μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注120μgシリンジ	
「KKF」	237
〔先〕ネस्प注射液180μgプラシリンジ	
〔後〕ダルベポエチナルファ注180μgシリンジ	
「KKF」	237
ネモナプリド	29
〔後〕ネリザ坐剤	167

【ノ】

ノイアート静注用1500単位	336
ノイキノン錠10mg	58
ノイトロジン注100μg	216
ノイロトロピン錠4単位	20
ノイロトロピン注射液3.6単位	20
ノイロビタン配合錠	193
濃縮人アンチトロンビンIII, 乾燥	336
ノウリアスト錠20mg	21
ノギテカン塩酸塩	257
ノバスタンHI注10mg/2mL	82
ノバミン筋注5mg	25
ノバミン錠5mg	25
ノバントロン注10mg	276

ノベルジン錠50mg	221
ノボリンR注100単位/mL	159
ノボリンR注フレックスペン	159
ノリトレン錠10mg（院外）	29
ノリトレン錠25mg（院外）	29
ノルアドリナリン注1mg	125
ノルアドレナリン	125
ノルスパンテープ5mg	19
ノルスパンテープ10mg	19
ノルトリプチリン塩酸塩	29
〔先〕ノルバスクOD錠2.5mg	
〔後〕アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」	74
ノルバスクOD錠5mg（院外）	74
〔先〕ノルバスクOD錠5mg	
〔後〕アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	74
ノルバデックス錠20mg	269
ノルレボ錠1.5mg（院外）	166

【ハ】

パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	232
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	232
パージェタ点滴静注420mg/14mL	275
ハーセプチン注射用60	270
ハーセプチン注射用150	270
ハーボニー配合錠	328
パーロデル錠2.5mg（院外）	23
バイアグラ錠25mg（院外）	168
バイアグラ錠50mg（院外）	168
〔後〕バイアスピリン錠100mg	212
ハイアミン液10%	171
肺炎球菌ワクチン	331
ハイカムチン注射用1.1mg	257
ハイシー顆粒25%	191
ハイドレアカプセル500mg	250
ハイドロコートン注射液100mg, 水溶性	129
ハイペン錠200mg	18
〔後〕ハイボエタノール液2%「ヨシダ」	172
ハイボン錠20mg	189
パキシル錠10mg（院外）	29
〔先〕パキシル錠10mg	
〔後〕パロキセチン錠10mg「DSEP」	29
白色ワセリン	346
白色ワセリン	346
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	159
バクタ配合錠（院外）	330
バクトラミン注	344
バクトラミン配合錠	330
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	307
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	331

麦門冬湯	292	バリテスターA240散	348
麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[TJ-29], ツ ムラ	292	バリビズマブ(遺伝子組換え)	326
パクリタキセル	257,258	バリブライトLV	348
パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	258	バリブライトP	348
パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	258	バルガンシクロビル塩酸塩	326
破傷風混合トキソイド, 沈降ジフテリア	340	②バルギン発泡顆粒	349
破傷風混合ワクチン, 沈降精製百日せきジフテ リア	340	パルクス注10μg	82
破傷風トキソイド, 沈降	335	バルサルタン	69
破傷風トキソイド「生研」, 沈降	335	②バルサルタン錠80mg「ケミファ」 〔①ディオバン錠80mg〕	69
破傷風不活化ポリオ混合ワクチン, 沈降精製百 日せきジフテリア	340	ハルシオン0.25mg錠(院外)	5
破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワク チン(生), 沈降精製百日せきジフテリア	341	〔①ハルシオン0.25mg錠〕 ②トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	5
パゾパニブ塩酸塩	272	バルトレックス錠500	325
バソプレシン	122	ハルナールD錠0.1mg(水江)	168
パタノール点眼液0.1%	46	〔①ハルナールD錠0.2mg〕 ②タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 (院内)	168
八味地黄丸	289	バルプロ酸ナトリウム	10
八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[TJ-7](院 外), ツムラ	289	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	10
バップフォー錠10	169	②バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トー ワ」 〔①デバケンR錠100mg〕	10
パドセブ点滴静注用30mg	263	〔①バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医 工」〕 ②バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	10
パナルジン錠100mg(院外)	213	〔①デバケンシロップ5%, バルプロ酸ナトリ ウムシロップ5%「日医工」〕	10
〔①パナルジン錠100mg〕 ②チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	213	バルボシクリブ	273
〔①バナンドライシロップ5%〕 ②セフポドキシムプロキセチルDS小児用5% 「サワイ」(院外)	312	パルミコート200μgタービューヘイラー56吸入 (院外)	97
パニツムマブ(遺伝子組換え)	273	パルミコート吸入液0.25mg(院外)	97
パピローマウイルス様粒子ワクチン, 組換え沈 降2価ヒト	333	パルモディアXR錠0.2mg	78
パピロックミニ点眼液0.1%(院外)	47	ハルロピテープ8mg	24
②バファリン配合錠A81	217	ハルロピテープ32mg	24
ハプトグロビン, 人	337	バレイショデンペン	346
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	337	バレイショデンペン「ケンエー」	346
バベンチオ点滴静注200mg	261	バレニクリン酒石酸塩	355
パム静注500mg	222	バロキサビルマルボキシル	326
バラクルード錠0.5mg	324	パロキセチン塩酸塩水和物	29
〔①バラクルード錠0.5mg〕 ②エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	324	②パロキセチン錠10mg「DSEP」 〔①パキシル錠10mg〕	29
バラシクロビル塩酸塩	325	パロノセトロン塩酸塩	116
〔①パラプラチン注射液150mg〕 ②カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	266	②パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 〔①アロキシ静注0.75mg〕	116
バラマイシン軟膏	174	ハロペリドール	29
バリウム, 硫酸	348	パンクレアチン	110
パリエット錠10mg(院外)	109	パンクレアチン「ヨシダ」	110
バリキサ錠450mg(院外, 患者限定)	326	パンクレリパーゼ	111
バリシチニブ	239		

半夏厚朴湯	291
半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕（院外），ツムラ	291
半夏瀉心湯	290
半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕，ツムラ	290
半夏白朮天麻湯	293
半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕（院外），ツムラ	293
バンコマイシン塩酸塩	305,306
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	305
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	306
パンテチン	189
パンテノール	190
パントール注射液500mg	190
パントシン散20%	189
パンビタン末，調剤用	192
ハンブ注射用1000	77

【ヒ】

PA・ヨード点眼・洗眼液（院内）	49
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	45
PFDF内服液500mg，腩外分泌機能検査用	353
PL配合顆粒	31
B型肝炎ワクチン（酵母由来），組換え沈降	334
BCG膀胱内用（日本株），乾燥	341
BCGワクチン（経皮用・1人用），乾燥	331
BCGワクチン，乾燥	331
ビートル顆粒分包250mg	83
ビーフリード輸液	200
ビームゲン注0.25mL	334
ビームゲン注0.5mL	334
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL（院内）	47
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL（院内）	47
ビ・シフロール錠0.125mg	23
ヒアルロン酸ナトリウム，精製	47,235
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	47
ヒアレイン点眼液0.1%	47
ヒアレインミニ点眼液0.1%（院外）	47
ヒアレインミニ点眼液0.3%	47
ピオグリタゾン塩酸塩	226
⑥ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	
〔①アクトス錠15〕	226
ピオチン	194
ピオチン散0.2%「ホエイ」（院外）	194
⑥ピオフェルミン錠剤	104
ピカネイト輸液	205

ビカルタミド	273
⑥ビカルタミド錠80mg「NP」	
〔①カソデックス錠80mg，ビカルタミド錠80mg「ケミファ」〕	273
〔①ビカルタミド錠80mg「ケミファ」	
⑥ビカルタミド錠80mg「NP」〕	273
ビクシリン注射用1g	309
ビクシリン注射用2g	309
ビクトーザ皮下注18mg	163
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	114
ピコスルファートナトリウム水和物	113,114
⑥ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	
〔①ラキソベロン内用液0.75%〕	113
ビスコジル	114
ビジパーク270注20mL	349
ピシバニール注射用5KE	281
⑥ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	
〔①強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL〕	220
⑥ビスコート0.5眼粘弾剤	51
ヒスロンH錠200mg（院外）	156
ヒ素，三酸化	267
ビソノテープ4mg	70
ビソプロロール	70
ビソプロロールフマル酸塩	59
⑥ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	
〔①メインテート錠0.625mg〕	59
⑥ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」	
〔①メインテート錠2.5mg〕	59
ビソルボン吸入液0.2%（院外）	89
〔①ビソルボン吸入液0.2%〕	
⑥ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	89
〔①ビソルボン注4mg〕	
⑥ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	90
ビダーザ注射用100mg	259
ビタシミン注射液500mg	191
ビタノイリンカプセル25	193
ピタバスタチンカルシウム	79
⑥ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」	
〔①リバロ錠1mg〕	79
⑥ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」	
〔①リバロ錠2mg〕	79
ビタミン，高カロリー輸液用総合	192
ビタミンA	187
ビタミンA油	178
ビタミン剤，総合	192

〔先〕ファンガード点滴用50mg]		フェノバルビタール……………	7
〔後〕ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」……………	320	フェノフィブラート……………	77
ファンギゾンシロップ100mg/mL……………	319	フェブキソスタット……………	223
フィコンバ錠2mg……………	11	〔後〕フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	
フィジオ140輸液……………	205	〔先〕フェブプリク錠10mg……………	223
フィダキソマイシン……………	306	〔後〕フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	
フィトナジオン……………	191	〔先〕フェブプリク錠20mg……………	223
フィナステリド……………	162	〔先〕フェブプリク錠10mg	
フィナステリド錠1mg「VTRS」……………	162	〔後〕フェブキソスタット錠10mg「DSEP」……………	223
フィネレノン……………	84	〔先〕フェブプリク錠20mg	
ブイフェンド200mg静注用……………	320	〔後〕フェブキソスタット錠20mg「DSEP」……………	223
ブイフェンド錠50mg……………	319	フェマーラ錠2.5mg……………	278
ブイフェンド錠200mg……………	319	フェルカルボトラン……………	354
フィブラストスプレー500……………	183	フェルビナク……………	178,179
フィブロガミンP静注用……………	337	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」……………	178
フィルグラスチム（遺伝子組換え）……………	214	〔後〕フェルビナクローション3%「三笠」	
〔後〕フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」…	214	〔先〕ナバゲルンローション3%……………	178
〔後〕フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」…	214	フェロベリン配合錠……………	105
フィルゴチニブマレイン酸塩……………	239	フェロミア錠50mg……………	196
フィルデシン1mg，注射用……………	258	フェンタニルクエン酸塩……………	360,361
フィンゴリモド塩酸塩……………	239	〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	
風しんワクチン，乾燥弱毒生……………	332	〔先〕フェントステープ1mg……………	361
風しんワクチン「タケダ」，乾燥弱毒生……………	332	〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	
フェキソフェナジン塩酸塩……………	286	〔先〕フェントステープ2mg……………	361
〔後〕フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」（院外）		〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	
〔先〕アレグラ錠30mg……………	286	〔先〕フェントステープ4mg……………	361
〔後〕フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」		〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」（院内）	
〔先〕アレグラOD錠60mg……………	286	〔先〕フェントステープ8mg……………	361
〔後〕フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（水江）		〔先〕フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」]	
〔先〕アレグラ錠60mg……………	286	〔後〕フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」……………	360
フェジン静注40mg……………	196	〔後〕フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	
フェスゴ配合皮下注IN……………	280	〔先〕フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」]…	360
フェスゴ配合皮下注MA……………	280	フェントステープ0.5mg……………	361
フェソテロジン fumarate 酸塩……………	168	フェントステープ1mg……………	361
フェソロデックス筋注250mg……………	274	〔先〕フェントステープ1mg]	
フェナゾールクリーム5%……………	177	〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg	
フェニトイン……………	9	「第一三共」……………	361
フェニレフリン塩酸塩……………	44,73	フェントステープ2mg……………	361
フェノール……………	171	〔先〕フェントステープ2mg]	
フェノール・亜鉛華リニメント……………	178	〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg	
フェノールスルホンフタレイン……………	352	「第一三共」……………	361
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」		フェントステープ4mg……………	361
……………	352	〔先〕フェントステープ4mg]	
フェノール「タイセイ」（院内），液状……………	171	〔後〕フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg	
フェノバル散10%……………	7	「第一三共」……………	361
フェノバル注射液100mg……………	7		

〔Ⓐフェントステープ8mg〕		ⒺプラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	
Ⓕフェentanilクエン酸塩1日用テープ8mg		〔Ⓐメバロチン錠10〕……………	80
「第一三共」(院内)……………	361	プラビックス錠25mg(院外)……………	213
フォイバン錠100mg(院外)……………	233	〔Ⓐプラビックス錠25mg〕	
〔Ⓐフォイバン錠100mg〕		Ⓕクロピドグレル錠25mg「SANIK」……………	213
Ⓕカモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」		プラビックス錠75mg(院外)……………	213
……………	233	〔Ⓐプラビックス錠75mg〕	
フォシーガ錠5mg(院外)……………	226	Ⓕクロピドグレル錠75mg「SANIK」……………	213
フォシーガ錠10mg……………	226	プラミベキソール塩酸塩水和物……………	23
フォゼベル錠5mg……………	84	プラリア皮下注60mgシリンジ……………	238
フォリアミン錠……………	190	プラリドキシムヨウ化物……………	222
フォリアミン注射液……………	190	フランドルテープ40mg(院外)……………	75
フォルテオ皮下注キット600μg……………	123	〔Ⓐフランドルテープ40mg〕	
フォロデシン塩酸塩……………	273	Ⓕ硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」…	75
複方ヨード・グリセリン……………	119	Ⓔプランルカスト錠112.5mg「CEO」……………	286
複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」……………	119	Ⓔプランルカスト錠225mg「CEO」……………	286
ブコラム口腔用液2.5mg……………	11	プランルカスト水和物……………	286
ブコラム口腔用液5mg……………	11	ⒺプランルカストDS10%「トーワ」(院内)	
ブシラミン……………	283	〔Ⓐオノンドライシロップ10%〕……………	286
ブスコパン錠10mg……………	42	ブリグチニブ……………	273
ブスコパン注20mg……………	42	プリズバインド静注液2.5g……………	212
ブチルスコポラミン臭化物……………	42	ブリディオン静注200mg……………	221
ブデソニド……………	97,119	フリバスOD錠25mg……………	168
ブテナフィン塩酸塩……………	181	プリピナ液0.05%……………	52
Ⓔブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」		プリモジアン・デポー筋注……………	156
〔Ⓐシムビコートタービュヘイラー60吸入〕…	102	ブリモニジン酒石酸塩……………	48
ブドウ糖……………	198	Ⓔブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかも	
ブドウ糖注50%PL「フソー」……………	198	と〕	
ブドステイン……………	89	〔Ⓐアイファガン点眼液0.1%〕……………	48
ブピバカイン塩酸塩水和物……………	36	プリモボラン錠5mg……………	124
ブプレノルフィン……………	19	プリンゾラミド……………	49
ブプレノルフィン塩酸塩……………	19	プリンペラン錠5(院外)……………	120
Ⓔブプレノルフィン注0.2mg「日新」		〔Ⓐプリンペラン錠5〕	
〔Ⓐレペタン注0.2mg〕……………	19	Ⓕメトクロプラミド錠5mg「NIG」……………	120
フマル酸ジメチル……………	34	プリンペランシロップ0.1%……………	117
プラケニル錠200mg(患者限定)……………	239	プリンペラン注射液10mg……………	117
プラザキサカプセル75mg……………	211	フルイトラン錠2mg……………	63
プラザキサカプセル110mg……………	211	フルオシノニド……………	176
フラジール腔錠250mg……………	165	Ⓔフルオレサイト静注500mg……………	354
フラジール内服錠250mg……………	344	フルオレセイナトリウム……………	354
フラジオマイシン硫酸塩……………	173	フルオロウラシル……………	248
プラジカンテル……………	345	フルオロメトロン……………	44
プラスグレル塩酸塩……………	215	フルコナゾール……………	329
プラノバル配合錠(院外)……………	157	フルスルチアミン……………	189
プラノプロフェン……………	48	ブルゼニド錠12mg(院外)……………	113
Ⓔプラノプロフェン点眼液0.1%「参天」		〔Ⓐブルゼニド錠12mg〕	
〔Ⓐニフラン点眼液0.1%〕……………	48	Ⓕセンノシド錠12mg「サワイ」……………	113
プラバスタチンナトリウム……………	80	フルタイド50μgエアゾール120吸入用(院外)…	98
ⒺプラバスタチンNa錠5mg「サワイ」		フルタイド50ディスクス……………	98
〔Ⓐメバロチン錠5〕……………	80	フルタイド100ディスクス……………	98

フルタゾラム	6	プロカイン塩酸塩	36
フルタミド	273	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」	36
フルチカゾンフランカルボン酸エステル	53,98	プロカテロール塩酸塩水和物	93,94
⑥フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用（院内）		プロカルバジン塩酸塩	274
〔Ⓐアラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用〕	53	プロカルバジンカプセル50mg「TYP」, 塩酸	274
フルチカゾンプロピオン酸エステル	53,98	プロギノン・デポー筋注10mg	155
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	102	プロクトセディル軟膏	167
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	102	プログラフィカプセル1mg	236
フルドロコルチゾン酢酸エステル	129	プロクロルペラジンマレイン酸塩	25
フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用（院外）, 小児用	53	プロクロルペラジンメシル酸塩	25
ブルフェン錠100	18	プロサイリン錠20（院外）	215
フルベストラント	274	〔Ⓐプロサイリン錠20〕	
フルボキサミンマレイン酸塩	30	⑥ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	215
フルマゼニル	87	プロジフ静注液200	329
⑥フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」	87	⑥フロジン外用液5%	182
⑥フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」		プロスタール錠25（院外）	156
〔Ⓐアネキセート注射液0.5mg〕	87	〔Ⓐプロスタール錠25〕	
フルメトロン点眼液0.1%	44	⑥クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」	156
フルルビプロフェン	179	〔Ⓐプロスタルモン・F注射液1000〕	
フルルビプロフェンアキセチル	19	⑥ジノプロスト注射液1000μg「F」	161
ブレオ注射用15mg	252	〔Ⓐプロスタンディン注射液20μg〕	
ブレオマイシン塩酸塩	252	⑥アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	82
フレカイニド酢酸塩	62	プロスタンディン軟膏0.003%	183
プレガバリン	34	プロスルチアミン	189
⑥プレガバリンOD錠25mg「DSEP」		フロセミド	65
〔ⒶリリカOD錠25mg〕	34	⑥フロセミド錠40mg「NP」	
⑥プレガバリンOD錠75mg「DSEP」		〔Ⓐラシックス錠40mg〕	65
〔ⒶリリカOD錠75mg〕	34	⑥フロセミド注20mg「トーワ」	
ブレクスピプラゾール	30	〔Ⓐラシックス注20mg〕	65
プレグランディン膣坐剤1mg（院内）	160	プロタノールS錠15mg	57
プレスミンS注射液1000μg	190	プロタノールL注0.2mg	56
〔Ⓐプレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」〕		プロタミン硫酸塩	208
⑥デクスメドトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	8	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	208
プレタールOD錠100mg	213	プロダルマブ（遺伝子組換え）	240
ブレディニン錠50	240	プロチゾラム	6
プレドニゾロン	144,146,148,150	⑥プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	176	〔ⒶレンドルミンD錠0.25mg〕	6
プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	152	プロチレリン酒石酸塩水和物	351
プレドニゾロン散「タケダ」1%	144	⑥プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」	
プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	146	〔Ⓐヒルトニン2mg注射液〕	351
プレドニゾロン錠5mg（旭化成）（院外）	150	プロテアミン12注射液	199
プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	148	プロテカジン錠10（院外）	106
プレドニン20mg, 水溶性	152	〔Ⓐプロテカジン錠10〕	
プレマリン錠0.625mg（院外）	156	⑥ラフチジン錠10mg「日医工」	106
ブレンツキシマブベドチン（遺伝子組換え）	274	プロトピック軟膏0.03%小児用	183
プロカインアミド塩酸塩	58	プロトピック軟膏0.1%	183
		プロナーゼ	355
		プロナーゼMS	355

ブロナック点眼液0.1%	49	ベザトールSR錠200mg (院外)	78
ブロナンセリン.....	30	[先ベザトールSR錠200mg]	
プロバジル錠50mg (院外)	123	後ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 ..	78
プロハンス静注シリンジ17mL.....	353	ベサノイドカプセル10mg.....	271
プロピペリン塩酸塩.....	169	ベザフィブラート.....	78
プロピルチオウラシル.....	123	後ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	
プロプラノロール塩酸塩.....	59	[先ベザトールSR錠200mg]	78
フロプロピオン.....	43	[先ベシケア錠5mg]	
プロベネシド.....	223	後ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	
プロベラ錠2.5mg (院外)	156	167
プロポフォール.....	3	ベストロン耳鼻科用1% (院外)	52
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」.....	3	ベストロン点眼用0.5%	45
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」.....	3	ベスレミ皮下注250μgシリンジ	279
ブロマゼパム.....	6	ベスレミ皮下注500μgシリンジ	279
プロマックD錠75 (院外)	109	ベセルナクリーム5%	329
[先プロマックD錠75]		ベタニス錠25mg.....	169
後ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」.....	109	ベタヒスチンメシル酸塩.....	54
ブロムフェナクナトリウム水和物.....	49	後ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	
ブロムヘキシン塩酸塩.....	89,90	[先メリスロン錠6mg]	54
後ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ		ベタフェロン皮下注用960万国際単位	342
ヨー」		ベタメタゾン.....	139,140
[先ビソルボン吸入液0.2%]	89	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ	
後ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」.....	89	ル.....	176
後ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ	
[先ビソルボン注4mg]	90	ル軟膏0.05%「MYK」	176
ブロムペリドール.....	30	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム... ..	45,141
後ブロムペリドール錠1mg「サワイ」(院外) ..	30	ペチジン塩酸塩.....	360
プロメタジン塩酸塩.....	282	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」	360
プロメタジンメチレンジサリチル酸塩.....	282	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	119
ブロモクリプチンメシル酸塩.....	23	ベナンボックス注用300mg	344
フロリードゲル経口用2%	330	ベニジピン塩酸塩.....	77
フロリネフ錠0.1mg	129	ペニシリンGカリウム100万単位, 注射用	305

【へ】

ベージニオ錠50mg.....	261	ベネシッド錠250mg	223
ベージニオ錠100mg	261	ベネトクラクス.....	274
ベージニオ錠150mg	261	ベノキシール点眼液0.4%	44
β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	111	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	274,275
ベオーバ錠50mg.....	168	後ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	275
ペガシス皮下注90μg.....	343	後ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	275
ヘキザック水W, 0.05%	171	ヘパフィールド透析用250単位/mLシリンジ20mL...	209
ヘキザック水W, 0.5%	171	ヘパリンカルシウム.....	209
ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組		後ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシ	
換え)	343	リンジ「モチダ」	209
ベクティビックス点滴静注100mg	273	ヘパリンナトリウム.....	209,210
ベクティビックス点滴静注400mg	273	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」.....	210
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	215	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 ..	210
ベクルリー点滴静注用100mg	327	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オー	
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル.....	94	ツカ」10mL.....	210

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ	
「オーツカ」10mL	210
ヘパリン類似物質	211
⑧ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	
〔⑩ヒルドイドソフト軟膏0.3%〕	211
〔⑩ベブシド注100mg〕	
⑩エトピンド点滴静注液100mg「サンド」	256
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	334
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	334
ベプリコール錠50mg	62
ベプリジル塩酸塩水和物	62
ベポタスチンベシル酸塩	287
ペマフィブラート	78
ペムプロリズマブ（遺伝子組換え）	275
ペムリディ錠25mg	325
ペメトレキセドナトリウム水和物	250
ヘモナーゼ配合錠（院外）	167
ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体），乾燥	331
ベラパミル塩酸塩	62,77
ベラプロストナトリウム	215
⑧ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	
〔⑩ドルナー錠20μg，プロサイリン錠20〕	215
ベラミビル水和物	326
ペランパネル水和物	11
ペリアクチン散1%（院外）	282
ペリアクチン錠4mg（院外）	282
ペリアクチンシロップ0.04%	282
ペリキューボ錠5mg	84
ペリチーム配合顆粒	111
ペリプラストPコンビセット組織接着用	338
ベルイシグアト	84
ベルケイド注射用3mg	276
ベルサンチン錠25mg	74
〔⑩ベルジピン注射液2mg〕	
⑩ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	69
ベルソムラ錠15mg	33
ベルソムラ錠20mg	33
ベルツズマブ（遺伝子組換え）	275
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	234
ペルフェナジン	25
ペルフルブタン	354
ヘルベッサRカプセル100mg（院外）	75
〔⑩ヘルベッサRカプセル100mg〕	
⑩ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	
「日医工」	75
ヘルベッサ錠30	75

〔⑩ヘルベッサ注射用50〕	
⑩ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	75
ベレキシブル錠80mg（院外）	270
ヘレニエン	49
ベンザリン錠5	5
ベンジルペニシリンカリウム	305
ベンズブロマロン	224
ベンゼトニウム塩化物	171,185
ペンタサ顆粒94%	120
ペンタサ坐剤1g	120
ペンタサ錠500mg	120
ペンタサ注腸1g	120
ペンタゾシン	19
ペンタゾシン，塩酸	18
ペンタミジンイセチオン酸塩	344
ベンダムスチン塩酸塩	245,246
ベンチロミド	353
ベンラファキシン塩酸塩	30
ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	98
〔⑩ペンレステープ18mg〕	
⑩リドカインテープ18mg「YP」	37

【ホ】

ボースデル内用液10	353
ポートルーザ点滴静注液800mg	272
ホーリン錠1mg	155
ホーリンV腔用錠1mg	165
防已黄耆湯	291
防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-20〕（院外），ツムラ	291
防風通聖散	297
防風通聖散エキス顆粒（医療用）〔TJ-62〕（院外），ツムラ	297
ホクナリンテープ0.5mg（院外）	93
〔⑩ホクナリンテープ0.5mg〕	
⑩ツロブテロールテープ0.5mg「NP」	93
ホクナリンテープ1mg（院外）	93
〔⑩ホクナリンテープ1mg〕	
⑩ツロブテロールテープ1mg「NP」	93
ホクナリンテープ2mg（院外）	93
〔⑩ホクナリンテープ2mg〕	
⑩ツロブテロールテープ2mg「NP」	93
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用（院外）	93
ボシュリフ錠100mg	276
ボスチニブ水和物	276
ポステリザン（軟膏），強力	166
ホストイン静注750mg	9

ホスネットピタント塩化物塩酸塩	116	ポララミン錠2mg	283
ホスフェニトインナトリウム水和物	9	ポララミン注5mg	282
ホスフルコナゾール	329	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン, 乾燥	337
ホスホマイシンカルシウム水和物	313	ポリカルボフィルカルシウム	119
ホスホマイシンナトリウム	52,313	ポリコナゾール	319,320
ホスミンS耳科用3%	52	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	85
ホスミンS静注用2g	313	〔後〕ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	85
ホスミン錠500	313	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	85
ホスミンシンドライシロップ400	313	〔後〕ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 (院内) 〔先〕ケイキサレート散	85
ボスミン外用液0.1%	124	ホリゾン錠5mg	5
ボスミン注1mg	124	ポリドカスクレオール1%注2mL	208
ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物	330	ポリドカスクレオール3%注2mL	208
ホスリボン配合顆粒	197	ポリドカノール	208
ホスレノールOD錠500mg	83	ホリナートカルシウム	222
〔後〕ボチシート20%	177	ポリビニルアルコールヨウ素	49
補中益気湯	294	ポリフル錠500mg	119
補中益気湯エキスパラ（医療用）〔TJ-41〕, ツムラ	294	ポリミキシンB硫酸塩	173
ボツリヌス毒素, A型	40	ポリミキシンB硫酸塩散50万単位「ファイザー」	173
ボトックス注用50単位	40	ポルタレンSRカプセル37.5mg (院外)	17
ボナロン経口ゼリー35mg	230	ポルタレンサボ25mg (院外)	17
ボナロン錠5mg (院外)	230	〔先〕ポルタレンサボ25mg 〔後〕ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	17
ボナロン点滴静注バッグ900μg	230	ポルタレンサボ50mg (院外)	17
〔先〕ボナロン点滴静注バッグ900μg 〔後〕アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg 「HK」	230	〔先〕ポルタレンサボ50mg 〔後〕ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	17
ボノサップパック400 (院外)	320	ポルタレン錠25mg (院外)	17
ボノテオ錠50mg (院外)	240	〔先〕ポルタレン錠25mg 〔後〕ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	17
ボノプラザンフマル酸塩	108	ボルテゾミブ	276
ポビドンヨード	95,170	ボルヒール組織接着用	339
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	95	ボルベン輸液6%	204
〔後〕ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 〔先〕イソジン液10%	170	ボンタールシロップ3.25%	16
〔後〕ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 〔先〕イソジンスクラブ液7.5%	170	ボンビバ静注1mgシリンジ	231
〔後〕ポピドンゲル10% 〔先〕イソジンゲル10%	170		
ポマリストカプセル1mg	276		
ポマリストカプセル2mg	276		
ポマリストカプセル3mg	276		
ポマリストカプセル4mg	276		
ポマリドミド	276		
ポライビー点滴静注用30mg	280		
ポライビー点滴静注用140mg	280		
ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え)	280		
ポラプレジック	109		
〔後〕ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 〔先〕プロマックD錠75	109		
ポララミン散1% (院外)	283		

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重	36
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	36
マーズレンS配合顆粒	110
マイスタ錠10mg (院外)	9
マイスリー錠5mg (院外)	8
〔先〕マイスリー錠5mg 〔後〕ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	8

マイティア点眼液, 人工涙液	51
マイトマイシンC	252
マイトマイシン注用2mg	252
マヴィレット配合錠	328
麻黄湯	292
麻黄湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-27], ツムラ	292
麻黄附子細辛湯	303
麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-127] (院外), ツムラ	303
マキサカルシトール	182,188
⑥マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	
〔Ⓢオキサロール注2.5μg〕	188
⑥マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	
〔Ⓢオキサロール注5μg〕	188
マキュエイド眼注用40mg	48
マグコロール散68%分包50g	349
マグコロール内用液13.6%分包250mL	349
マクスルトRPD錠10mg	73
〔ⓈマクスルトRPD錠10mg〕	
⑥リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	73
マグネシウム, クエン酸	349
マグネシウム, 酸化	112
マグネシウム水和物, 硫酸	43
Mg補正液1mEq/mL (院内), 硫酸	43
〔Ⓢマグネスコープ静注38%シリンジ20mL〕	
⑥ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	354
⑥マグミット細粒83%	112
⑥マグミット錠250mg	112
⑥マグミット錠330mg	112
⑥マグミット錠500mg	112
マシテンタン	85
麻しん風しん混合ワクチン, 乾燥弱毒生	341
麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」, 乾燥弱毒生	341
麻しんワクチン, 乾燥弱毒生	333
麻しんワクチン「タケダ」, 乾燥弱毒生	333
マスキンR・エタノール液 (0.5W/V%)	171
マニジピン塩酸塩	70
⑥マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	
〔Ⓢカルスロット錠10〕	70
マリゼブ錠12.5mg	226
マンガン四水和物, 塩化	353
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	162
マンジャロ皮下注5mgアテオス	162
マンニトール注射液「YD」, 20%	84
マンニトール, D-	84

【ミ】

ミアンセリン塩酸塩	30
ミオコールスプレー0.3mg	76
ミオナール錠50mg (院外)	43
〔Ⓢミオナール錠50mg〕	
⑥エペリゾン塩酸塩錠50mg「NP」【経過措置】	43
ミカファンギンナトリウム	320
⑥ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	
〔Ⓢファンガード点滴用50mg〕	320
ミカムロ配合錠AP	72
〔Ⓢミカムロ配合錠AP〕	
⑥テラムロ配合錠AP「DSEP」	72
ミカルディス錠40mg	68
〔Ⓢミカルディス錠40mg〕	
⑥テルミサルタン錠40mg「ニプロ」	68
ミグシス錠5mg	83
ミグリトール	227
⑥ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	
〔ⓈセイブルOD錠75mg〕	227
ミケランLA点眼液2%	46
ミケルナ配合点眼液 (院外)	52
ミコナゾール	330
ミコフェノール酸モフェチル	240
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	240
ミコブティンカプセル150mg	319
ミコンビ配合錠AP	72
〔Ⓢミコンビ配合錠BP〕	
⑥テルチア配合錠BP「トーワ」	72
ミソプロストール	109
ミゾリビン	240
ミダゾラム	6,11
ミチグリニドカルシウム水和物	227
ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU (院外)	288
ミチキュアダニ舌下錠10,000JAU (院外)	288
ミトキサントロン塩酸塩	276
ミドドリン塩酸塩	73
ミドリンM点眼液0.4%	44
ミドリンP点眼液	52
ミニリンメルトOD錠25μg (院外)	122
ミニリンメルトOD錠120μg (院外)	122
ミネプロOD錠2.5mg	67
ミノサイクリン塩酸塩	317,318
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	317
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	318
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	318

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	318	〔⊕ムコダインシロップ5%〕	
ミノドロン酸水和物	240	〔⊖カルボシステインシロップ5%「タカタ」〕	89
ミノマイシン錠50mg（水江）	318	ムコダインDS50%（院外）	89
ミヤBM細粒	104	〔⊕ムコダインDS50%〕	
ミヤBM錠	104	〔⊖カルボシステインDS50%「タカタ」〕	89
ミラクリッド注射液5万単位	231	無水エタノール	277
ミラベグロン	169	無水エタノール注「フソー」	277
ミラベックスLA錠0.375mg	23	ムピロシンカルシウム水和物	307
ミラベックスLA錠1.5mg	23	ムルプレタ錠3mg	215
ミリキズマブ（遺伝子組換え）	119,120	ムンデシンカプセル100mg（院外）	273

〔⊕〕ミリスロール注5mg/10mL

〔⊖〕ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	76
ミリプラチン水和物	277
ミリプラ動注用70mg	277
ミリプラ用懸濁用液4mL	356
ミルセラ注シリンジ25μg	232
ミルセラ注シリンジ100μg	232
ミルセラ注シリンジ150μg	232
ミルセラ注シリンジ250μg	232
ミルタザピン	31
〔⊖〕ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」	
〔⊕〕レメロン錠15mg, リフレックス錠15mg	31
ミルタックスパップ30mg（水江）	177
ミルラクト細粒50%（院外）	111
ミルリーラ注射液10mg	57
ミルリノン	57
ミレーナ52mg（院内）	165
ミログバリンベシル酸塩	34
ミンクリア内用散布液0.8%	355

〔ム〕

ムコサルドライシロップ1.5%	90
ムコスタ点眼液UD2%	49
〔⊕〕ムコソルバンL錠45mg	
〔⊖〕アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	90
ムコソルバン錠15mg（院外）	90
〔⊕〕ムコソルバン錠15mg	
〔⊖〕アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	90
ムコソルバンシロップ0.3%, 小児用	90
ムコダイン錠250mg（院外）	88
〔⊕〕ムコダイン錠250mg	
〔⊖〕カルボシステイン錠250mg「サワイ」	88
〔⊕〕ムコダイン錠500mg	
〔⊖〕カルボシステイン錠500mg「サワイ」	88
ムコダインシロップ5%（院外）	89

〔メ〕

メイラックス錠1mg	7
〔⊕〕メイラックス錠1mg	
〔⊖〕ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	7
メイロン静注8.4%	221
メインテート錠0.625mg（院外）	59
〔⊕〕メインテート錠0.625mg	
〔⊖〕ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「サワイ」	59
メインテート錠2.5mg（院外）	59
〔⊕〕メインテート錠2.5mg	
〔⊖〕ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「テバ」	59
メキシチールカプセル100mg	62
メキシチール点滴静注125mg	63
メキシレチン塩酸塩	62,63
メグルミン, ガドテル酸	354
〔⊖〕メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」, ガドテル酸	
〔⊕〕マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	354
メコバラミン	191
メサデルムクリーム0.1%	175
メサラジン	120
メジコン錠15mg	88
メスチノン錠60mg	42
メスナ	222
メソトレキセート5mg, 注射用	247
メソトレキセート錠2.5mg	247
メソトレキセート点滴静注液200mg	247
メダゼパム	6
メタボリンG注射液10mg	188
メタボリン注射液50mg	188
〔⊖〕メチコバル錠500μg	191
メチコバル注射液500μg	191
メチルドパ水和物	66
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	154
メテノロン酢酸エステル	124

メトアナ配合錠HD	228
メトクロプラミド	120
メトクロプラミド, 塩酸	117
⑧メトクロプラミド錠5mg「NIG」	
〔Ⓐプリンペラン錠5〕	120
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	240
メトトレキサート	240,247
メトプロロール酒石酸塩	70
⑧メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	
〔Ⓐセロケン錠20mg, ロプレソール錠20mg〕	70
メトホルミン塩酸塩	225
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	225
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	225
メトリジンD錠2mg	73
メドロキシprogステロン酢酸エステル	156
メトロニダゾール	165,183,344
メナテトレン	191,192
メネシット配合錠100(院外)	25
メノエイドコンビパッチ(院外)	157
メバロチン錠5(院外)	80
〔Ⓐメバロチン錠5〕	
⑨プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	80
メバロチン錠10(院外)	80
〔Ⓐメバロチン錠10〕	
⑨プラバスタチンNa錠10mg「トーウ」	80
メピバカイン塩酸塩	36
メフィーゴパック(院内)	164
メフェナム酸	16
メプチンエア−10μg吸入100回	94
メプチンキッドエア−5μg吸入100回(院外)	94
メプチン吸入液0.01%	93
メプチン吸入液ユニット0.3mL	93
メプチン錠50μg	93
メプチンスイングヘラー−10μg吸入100回	94
メポリズマブ(遺伝子組換え)	98
〔ⒶメマリーOD錠5mg〕	
⑨メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」	35
〔ⒶメマリーOD錠20mg〕	
⑨メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」	35
メマンチン塩酸塩	35
⑧メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」	
〔ⒶメマリーOD錠5mg〕	35
⑧メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」	
〔ⒶメマリーOD錠20mg〕	35
メリスロン錠6mg(院外)	54
〔Ⓐメリスロン錠6mg〕	
⑨ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	54
メルカゾール錠5mg	123
メルファラン	246

メロペネム水和物	314
メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	314
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	314
免疫グロブリン, 抗ヒト胸腺細胞ウサギ	342
免疫グロブリン, 人	337
メンクアッドフィ筋注	331
メンタックス外用液1%【経過措置】(水江)	181
メントール, 1-	355

【モ】

モーステープL40mg(院外)	178
〔ⒶモーステープL40mg〕	
⑨ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	178
モースパップXR120mg(院外)	178
モイゼルト軟膏1%	183
⑧モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」	
〔Ⓐガスモチン錠5mg〕	121
モサプリドクエン酸塩水和物	120,121
モニラック・シロップ65%(院外)	241
〔Ⓐモニラック・シロップ65%〕	
⑨ラクツロースシロップ65%「タカタ」	241
モノヴァー静注500mg	196
モノエタノールアミノオレイン酸塩	208
モビコール配合内用剤LD	114
モビブレップ配合内用剤	356
⑧モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用	
〔Ⓐナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用〕	54
モメタゾンフランカルボン酸エステル	54
モルヌピラビル	326
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	357
モルヒネ塩酸塩水和物	357
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	357
モルヒネ硫酸塩水和物	358
モンテプラゼ(遺伝子組換え)	224
⑧モンテルカスト細粒4mg「明治」(院外)	
〔Ⓐキプレス細粒4mg, シングレア細粒4mg〕	287
⑧モンテルカスト錠10mg「KM」	
〔Ⓐキプレス錠10mg, シングレア錠10mg〕	287
⑧モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	
〔Ⓐキプレスチュアブル錠5mg, シングレア チュアブル錠5mg〕	287
モンテルカストナトリウム	287

【ヤ】

ヤーズフレックス配合錠(院外)	157
ヤーボイ点滴静注液20mg	262
ヤーボイ点滴静注液50mg	262
薬用炭	104

薬用炭「日医工」…………… 104

【ユ】

ユーエフティE配合顆粒T100（院外）…………… 252
 ユーエフティE配合顆粒T150（院外）…………… 252
 ユーゼル錠25mg…………… 222
 ユーパスタコーワ軟膏（院外）…………… 184
 [①ユーパスタコーワ軟膏]
 ②ネグミンシュガー軟膏…………… 184
 ユービット錠100mg…………… 354
 ユーロジン2mg錠（院外）…………… 4
 [①ユーロジン2mg錠]
 ②エスタゾラム錠2mg「アメル」…………… 4
 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g…………… 281
 ユビデカレノン…………… 58
 ユベラNカプセル100mg…………… 84
 ユベラ軟膏…………… 180
 [①ユリーフOD錠4mg]
 ②シロドシンOD錠4mg「DSEP」（院内）…………… 168
 ユリス錠1mg…………… 223
 ユリノーム錠50mg…………… 224
 ユルトミスHI点滴静注300mg/3mL（患者限定、
 今回限定）…………… 343

【ヨ】

ヨード・グリセリン，複方…………… 119
 ヨード・グリセリン「コザカイ・M」，複方 …… 119
 ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル…………… 348,356
 ヨウ化カリウム…………… 196
 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」（院外）…………… 196
 葉酸…………… 190
 溶性ピロリン酸第二鉄…………… 196
 ヨウ素…………… 184
 ヨクイニン…………… 304
 ヨクイニンエキス錠「コタロー」（院外）…………… 304
 よく苡仁湯…………… 296
 よく苡仁湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-52〕（院
 外），ツムラ…………… 296
 抑肝散…………… 296
 抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕，ツム
 ラ…………… 296
 抑肝散加陳皮半夏…………… 298
 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）〔TJ
 -83〕，ツムラ…………… 298
 抑肝散加陳皮半夏エキス細粒〔KB-83〕（院
 外），クラシエ…………… 298
 4価髄膜炎菌ワクチン（破傷風トキソイド結合
 体）…………… 331

4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
 （酵母由来），組換え沈降…………… 334

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ…………… 159
 [①ラキソベロン内用液0.75%]
 ②ピコスルファートナトリウム内用液0.75%
 「イワキ」…………… 113
 酪酸菌…………… 104
 ラクツロース…………… 241
 ②ラクツロースシロップ65%「タカタ」
 [①モニラック・シロップ65%]…………… 241
 ラクテックG輸液…………… 205
 ラクテック注…………… 205
 ②ラゲノスNF経口ゼリー分包12g（院内）…………… 241
 ラゲブリオカプセル200mg…………… 326
 ラコールNF配合経腸用液…………… 201
 ラコールNF配合経腸用半固形剤…………… 201
 ラコサミド…………… 11,12
 ラサギリンメシル酸塩…………… 23
 ラジカット点滴静注バッグ30mg…………… 32
 [①ラジカット点滴静注バッグ30mg]
 ②エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」… 31
 ラジカット内用懸濁液2.1%…………… 32
 ラシックス錠20mg（院外）…………… 65
 ラシックス錠40mg（院外）…………… 65
 [①ラシックス錠40mg]
 ②フロセミド錠40mg「NP」…………… 65
 [①ラシックス注20mg]
 ②フロセミド注20mg「トーフ」…………… 65
 ラスクフロキサシン塩酸塩…………… 322
 [①ラステット注100mg/5mL]
 ②エトボシド点滴静注液100mg「サンド」… 256
 ラスビック錠75mg…………… 322
 ラスビック点滴静注キット150mg…………… 322
 ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）…………… 224
 ラスミジタンコハク酸塩…………… 35
 ラスリテック点滴静注用7.5mg…………… 224
 ラタノプロスト…………… 49
 ラツーダ錠20mg（院外）…………… 31
 ラックビー微粒N…………… 104
 ラニナミビルオクタン酸エステル水和物…………… 327
 ラニビズマブ（遺伝子組換え）…………… 49
 ②ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/
 mL「センジュ」…………… 49
 ラパチニブトシル酸塩水和物…………… 277
 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg…………… 326
 ラフチジン…………… 106

⑧ラフチジン錠10mg「日医工」
 [(⊕)プロテカジン錠10]…………… 106
 ラブリズマブ（遺伝子組換え）…………… 343
 ラベプラゾールナトリウム…………… 109
 ラボナール注射用0.5g…………… 2
 ラミクタール錠25mg…………… 13
 ラミクタール錠100mg（院外）…………… 13
 ラミシールクリーム1%…………… 181
 ラミブジン…………… 327
 ラムシルマブ（遺伝子組換え）…………… 277
 ラメルテオン…………… 35
 ⑨ラメルテオン錠8mg「杏林」
 [(⊕)ロゼレム錠8mg]…………… 35
 ラモセトロン塩酸塩…………… 121
 ラモトリギン…………… 13
 ラルテグラビルカリウム…………… 327
 ラロキシフェン塩酸塩…………… 241
 ランジオロール塩酸塩…………… 59,60
 ランソプラゾール…………… 109,110
 ⑩ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
 [(⊕)タケプロンOD錠15]…………… 110
 ランタスXR注シロスター…………… 158
 ランタン水和物、炭酸…………… 83
 ランマーク皮下注120mg…………… 238

【リ】

リーゼ錠5mg…………… 28
 リーバクト配合顆粒…………… 198
 リーバクト配合経口ゼリー…………… 199
 リーマス錠100…………… 28
 リアルダ錠1200mg…………… 120
 リウマトレックスカプセル2mg…………… 240
 リオシグアト…………… 85
 リオチロンナトリウム…………… 122
 リオナ錠250mg…………… 83
 リクシアナOD錠30mg…………… 211
 リクラスト点滴静注液5mg…………… 235
 リコモジュリン点滴静注用12800…………… 211
 リザトリプタン安息香酸塩…………… 73
 ⑪リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
 [(⊕)マクサルトルPD錠10mg]…………… 73
 リザベンカプセル100mg…………… 285
 リサンキズマブ（遺伝子組換え）…………… 241
 リスパダール錠1mg…………… 31
 リスパダール内用液1mg/mL…………… 31
 リスペリドン…………… 31
 リズミック錠10mg（院外）…………… 81

[(⊕)リズミック錠10mg]
 ⑫アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」…………… 81
 リスモダンR錠150mg…………… 61
 リスモダンカプセル100mg…………… 61
 リスモダンP静注50mg…………… 61
 リセドロン酸ナトリウム水和物…………… 241
 リゾビスト注…………… 354
 リチウム、炭酸…………… 28
 リツキサン点滴静注100mg…………… 277
 リツキサン点滴静注500mg…………… 277
 リツキシマブ（遺伝子組換え）…………… 277
 六君子湯…………… 295
 六君子湯エキス顆粒（医療用）[TJ-43]、ツムラ…………… 295
 立効散…………… 302
 立効散エキス顆粒（医療用）[TJ-110]、ツムラ…………… 302
 リドカイン…………… 36,37
 リドカイン塩酸塩…………… 37,38
 [(⊕)リドカインテープ18mg「NP」]
 ⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 ㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝
 ㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗
 ㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳
 ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷
 ㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜
 ㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳㉑
 ㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴
 ㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳㉑㉒㉓㉔㉕
 ㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵
 ㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳㉑㉒㉓
 ㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱
 ㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽
 ㊾㊿⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗
 ㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱
 ㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹
 ㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳
 ㉑㉒㉓㉔㉕
 ㉖㉗㉘㉙㉚
 ㉛㉜㉝㉞㉟
 ㊱㊲㊳㊴
 ㊵㊶㊷㊸
 ㊹㊺㊻㊼
 ㊽㊾㊿⑳
 ㉑㉒㉓
 ㉔㉕㉖
 ㉗㉘㉙
 ㉚㉛㉜
 ㉝㉞㉟
 ㊱㊲
 ㊳㊴
 ㊵㊶
 ㊷㊸
 ㊹㊺
 ㊻㊼
 ㊽㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜

リピトール錠10mg (院外) …………… 78	苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用) [TJ-39] (院
〔先〕リピトール錠10mg〕	外), ツムラ …………… 294
〔後〕アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」 …… 78	リラグルチド (遺伝子組換え) …………… 163
リファキシミン …………… 320	リラナフタート …………… 181
リファブチン …………… 319	〔先〕リリカOD錠25mg〕
リファンピシン …………… 318	〔後〕プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 …… 34
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」 …… 318	〔先〕リリカOD錠75mg〕
リフキシマ錠200mg …………… 320	〔後〕プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 …… 34
リフヌア錠45mg …………… 97	リルゾール …………… 35
〔先〕リフレックス錠15mg〕	〔後〕リルゾール錠50mg「ニプロ」
〔後〕ミルタザピンOD錠15mg「トローワ」 …… 31	〔先〕リルテック錠50〕 …………… 35
リベルサス錠3mg …………… 162	〔先〕リルテック錠50〕
リベルサス錠7mg …………… 162	〔後〕リルゾール錠50mg「ニプロ」 …… 35
リボスチン点眼液0.025% (院外) …………… 49	リレンザ …………… 325
リボトリール錠0.5mg …………… 9	リンヴォック錠15mg …………… 231
リポバス錠5 …………… 79	リン酸Na補正液0.5mmol/mL …………… 206
〔先〕リポバス錠5〕	リンゼス錠0.25mg …………… 121
〔後〕シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 …… 79	リンデロンA液, 点眼・点鼻用 …………… 51
リボフラビン酪酸エステル …………… 189	リンデロン坐剤1.0mg …………… 140
リマチル錠50mg …………… 283	リンデロン錠0.5mg …………… 139
リマプロストアルファデクス …………… 215	リンデロン注2mg (0.4%) …………… 141
〔後〕リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リンデロン注4mg (0.4%) …………… 141
〔先〕オパルモン錠5μg〕 …………… 215	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% …… 45
リムパーザ錠150mg (院外) …………… 264	リンデロン-VGクリーム0.12% …… 176
リユープリンSR注射用キット11.25mg …… 163	リンデロン-VG軟膏0.12% …… 176
リユープリン注射用3.75mg …………… 163	リンデロン-VGローション …… 177
〔先〕リユープリン注射用キット1.88mg〕	
〔後〕リユープロレリン酢酸塩注射用キット	
1.88mg「NP」 …………… 163	
〔先〕リユープリン注射用キット3.75mg〕	
〔後〕リユープロレリン酢酸塩注射用キット	
3.75mg「NP」 …………… 163	
リユープリンPRO注射用キット22.5mg …… 163	
リユープロレリン酢酸塩 …………… 163	
〔後〕リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg	
「NP」	
〔先〕リユープリン注射用キット1.88mg〕 …… 163	
〔後〕リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg	
「NP」	
〔先〕リユープリン注射用キット3.75mg〕 …… 163	
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」【経	
過措置】 …………… 318	
硫酸バリウム …………… 348	
硫酸マグネシウム水和物 …………… 43	
硫酸Mg補正液1mEq/mL (院内) …………… 43	
苓甘姜味辛夏仁湯 …………… 302	
苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 (医療用) [TJ	
-119] (院外), ツムラ …………… 302	
苓桂朮甘湯 …………… 294	
	【ル】
	ルキソリチニブリン酸塩 …………… 278
	ルコナック爪外用液5% …………… 330
	ルストロンボラグ …………… 215
	ルテスデポー注 (クリニックのみ) …… 157
	ルナベル配合錠LD (院外) …………… 157
	ルナベル配合錠ULD (院外) …………… 157
	〔先〕ルネスタ錠1mg〕
	〔後〕エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 …… 7
	ルパタジンフマル酸塩 …………… 287
	ルパフィン錠10mg …………… 287
	ルビプロストン …………… 114
	〔先〕ルプラック錠4mg〕
	〔後〕トラセミドOD錠4mg「TE」 …… 64
	ルボックス錠25 …………… 30
	ルマケラス錠120mg …………… 269
	ルミセフ皮下注210mgシリンジ …… 240
	ルムジェブ注ミリオペン …………… 159
	ルラシドン塩酸塩 …………… 31
	ルリコナゾール …………… 181,330
	ルリコンクリーム1% …………… 181

【レ】

レイボー錠100mg	35
レキサルティ錠1mg【経過措置】	30
レキソタン錠2	6
レキップCR錠2mg	24
レキップCR錠8mg(院外)	24
レギュニールHCa1.5腹膜透析液	219
レギュニールHCa2.5腹膜透析液	219
レクタブル2mg注腸フォーム14回	119
レクチゾール錠25mg	183
レクビオ皮下注300mgシリンジ	78
レゴラフェニブ水和物	278
レザルタス配合錠HD	72
レシカルボン坐剤, 新	114
レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(院外), 強カ	180
レスタミンコーワクリーム1%	174
レスタミンコーワ錠10mg	282
レスプレン錠20mg	91
レスミット錠5	6
[先]レスリン錠25	
[後]トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	28
レトロゾール	278
レナリドミド水和物	278
レニベース錠5(院外)	65
[先]レニベース錠10	
[後]エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「NikP」	65
レノグラスチム(遺伝子組換え)	216
レパーサ皮下注140mgペン	78
レパグリニド	227
レバチオ錠20mg	83
レバミピド	49,110
[後]レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(院外)	49
レバミピド錠100mg「オーツカ」	110
レブラミドカプセル2.5mg(院内)	278
レブラミドカプセル5mg(院内)	278
レフルノミド	241
レペタン坐剤0.2mg	19
[先]レペタン注0.2mg	
[後]ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	19
レベチラセタム	14,15
[後]レベチラセタム錠500mg「明治」(院内)	
[先]イーケプラ錠500mg	14
[後]レベチラセタムDS50%「サワイ」(院内)	
[先]イーケプラドライシロップ50%	15
レボカバステチン塩酸塩	49

[後]レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	
[先]エルカルチンFF錠250mg	242
レボカルニチン塩化物	242
レボセチリジン塩酸塩	287,288
[後]レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	
[先]ザイザル錠5mg	287
[後]レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	
[先]ザイザルシロップ0.05%	288
レボチロキシナトリウム水和物	123
レボドバ	21
レボノルゲストレル	165,166
[後]レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	
[先]クラビット錠500mg	323
レボフロキサシン水和物	50,54,323
[後]レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	
[先]クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	323
レボホリナートカルシウム	222
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	222
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	222
レボメプロマジンマレイン酸塩	26
レボレード錠12.5mg(院外)	233
レミカットカプセル2mg(院外)	284
レミケード点滴静注用100	117
レミッチOD錠2.5μg	34
[先]レミニールOD錠4mg	
[後]ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	32
[先]レミニールOD錠8mg	
[後]ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	32
[先]レミニールOD錠12mg	
[後]ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	32
レミフェンタニル塩酸塩	362
[後]レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	
[先]アルチバ静注用2mg	362
レミマゾラムベシル酸塩	4
レムデシビル注射液	327
[先]レメロン錠15mg	
[後]ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」	31
レルゴリクス	163
[先]レルパックス錠20mg	
[後]エレクトリプタン錠20mg「ファイザー」【経過措置】(院内)	72
レルベア100エリプタ30吸入用	103
レルベア200エリプタ30吸入用	103
レルミナ錠40mg(院外)	163
レンドルミンD錠0.25mg(院外)	6
[先]レンドルミンD錠0.25mg	
[後]プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	6

レンバチニブメシル酸塩	278
レンビマカプセル4mg	278
レンビマカプセル10mg	278
レンボレキサント	35

【ロ】

ローブレナ錠25mg	279
ローブレナ錠100mg	279
ロイコボリン注3mg	222
ロイスタチン注8mg	267
ロイナーゼ注用5000	262
ロカイン注1% (患者限定)	36
ロカルトロールカプセル0.25 (院外)	188
〔先〕ロカルトロールカプセル0.25	
〔後〕カルシトリオールカプセル0.25 μ g「YD」	188
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	106
ロキソニン錠60mg	19
〔先〕ロキソニン錠60mg	
〔後〕ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	19
ロキソニンテープ100mg (院外)	179
〔先〕ロキソニンテープ100mg	
〔後〕ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	179
ロキソニンパップ100mg (院外)	179
〔先〕ロキソニンパップ100mg	
〔後〕ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	179
〔先〕ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」	
〔後〕ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	19
〔後〕ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	
〔先〕ロキソニン錠60mg, ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」	19
ロキソプロフェンナトリウム水和物	19,179
〔後〕ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	
〔先〕ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」	179
〔先〕ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」	
〔後〕ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	179
〔後〕ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	
〔先〕ロキソニンパップ100mg, ロキソプロフェンNaパップ100mg「タカタ」	179

〔先〕ロキソプロフェンNaパップ100mg「タカタ」	
〔後〕ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	179
六味丸	298
六味丸エキス顆粒 (医療用)〔TJ-87〕 (院外), ツムラ	298
ロクロニウム臭化物	41
〔後〕ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	
〔先〕エスラックス静注50mg/5.0mL	41
ロケルマ懸濁用散分包5g	83
ロコアテープ	180
ロコイドクリーム0.1%	175
ロサルタンカリウム	70
〔後〕ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」	
〔先〕ニューロタン錠25mg	70
ロスゼット配合錠HD	81
〔後〕ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	
〔先〕クレストールOD錠2.5mg	80
〔後〕ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	
〔先〕クレストールOD錠5mg	80
ロスバスタチンカルシウム	80
〔後〕ロゼウス静注液10mg	258
〔後〕ロゼウス静注液40mg	258
ロゼックスゲル0.75%	183
〔先〕ロゼレム錠8mg	
〔後〕ラメルテオン錠8mg「杏林」	35
ロタテック内用液	335
ロタリックス内用液	335
ロチゴチン	23,24
〔先〕ロトリガ粒状カプセル2g	
〔後〕オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」	79
ロナセン錠4mg (院外)	30
ロナセンテープ20mg	30
ロナプリーブ注射液セット300	328
ロナプリーブ注射液セット1332	328
ロピオン静注50mg	19
ロピニロール塩酸塩	24
ロピバカイン塩酸塩水和物	38
ロフラゼブ酸エチル	7
〔後〕ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	
〔先〕メイラックス錠1mg	7
〔先〕ロプレソール錠20mg	
〔後〕メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	70
ロペグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	279
ロペミンカプセル1mg	105

[ロヘ〜ワン]

〔先〕ロベミンカプセル1mg〕

〔後〕ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」…	105
ロベミン細粒0.1% ……………	105
ロペラミド塩酸塩……………	105
〔後〕ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	
〔先〕ロベミンカプセル1mg〕 ……………	105
ロミデプシン……………	279
ロミプレート皮下注250 μ g調製用 ……………	242
ロミプロスチム（遺伝子組換え）……………	242
ロメフロキサシン塩酸塩……………	50
ロメフロンミニムス眼科耳科用液0.3%（院内）	
……………	50
ロメリジン，塩酸……………	83
ロモソズマブ（遺伝子組換え）……………	242
ロラゼパム……………	7
ロラタジン……………	288
ロルメタゼパム……………	7
ロルラチニブ……………	279
ロンサーフ配合錠T15 ……………	281
ロンサーフ配合錠T20 ……………	281

【ワ】

ワーファリン顆粒0.2% ……………	209
ワーファリン錠1mg ……………	209
ワーファリン錠5mg（院外）……………	209
ワイスタール配合静注用1g ……………	315
YDソリター-T1号輸液 ……………	206
YDソリター-T3号輸液 ……………	206
〔後〕ワイドシリン細粒20% ……………	308
ワイボックス錠0.5（院内）……………	7
ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液…	20
ワセリン，白色……………	346
ワセリン，白色……………	346
ワソラン錠40mg……………	77
ワソラン静注5mg ……………	62
ワルファリンカリウム……………	209
ワンアルファ錠0.5 μ g（院外）……………	187
〔先〕ワンアルファ錠0.5 μ g〕	
〔後〕アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」…	187
〔先〕ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL〕	
〔後〕ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	
……………	257
〔先〕ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL〕	
〔後〕ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	
……………	257

1. 神経系及び感覚器官用医薬品

11. 中枢神経系用薬

111. 全身麻酔剤

1115. 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
チアミラールナトリウム <u>イソゾール注射用 0.5g</u> (日医工) Isozol 0.5g/Vi 【薬価】 449.00 円 / 瓶	<p>【効】 全身麻酔，全身麻酔の導入，局所麻酔剤・吸入麻酔剤との併用，精神神経科における電撃療法の際の麻酔，局所麻酔剤中毒・破傷風・子痲等に伴う痙攣</p> <p>【用】 (注) 1. 静脈内投与 [溶液濃度] 2.5% 水溶液 (5% 溶液は静脈炎を起こすことがある。) [投与量・投与方法] 調整したチアミラール水溶液を静脈より注入。1) 全身麻酔の導入：最初に 2～4mL (2.5% 溶液で 50～100mg) を注入して患者の全身状態，抑制状態などを観察し，その感受性より追加量を決定。次に患者が応答なくなるまで追加注入し，応答がなくなった時の注入量を就眠量とする。さらに就眠量の半量ないし同量を追加注入したのち，他の麻酔法に移行。気管内に挿管する場合は筋弛緩剤を併用。2) 短時間麻酔 (a) 患者とコンタクトを保ちながら最初に 2～3mL (2.5% 溶液で 50～75mg) を 10～15 秒位の速度で注入後 30 秒間，麻酔の程度，患者の全身状態を観察する。さらに必要ならば 2～3mL を同速度で注入し，患者の応答のなくなった時の注入量を就眠量とする。手術に先立ち，さらに 2～3mL を同速度で分割注入すれば 10～15 分程度の麻酔が得られる。(b) 短時間で手術が終了しない場合は注射針を静脈中に刺したまま呼吸，脈拍，血圧，角膜反射，瞳孔対光反射などに注意しながら手術の要求する麻酔深度を保つように 1～4mL (2.5% 溶液で 25～100mg) を分割注入 (1 回の最大使用量は 1g まで)。3) 精神神経科における電撃療法の際の麻酔：通常 12mL (2.5% 溶液で 300mg) を 25 秒～35 秒で注入し，必要な麻酔深度に達したことを確かめたのち，直ちに電撃療法を行う。4) 併用使用：本剤は局所麻酔剤あるいは，吸入麻酔剤と併用することができる。通常 2～4mL (2.5% 溶液で 50～100mg) を間歇的に静脈内注入。点滴投与を行う場合は，静脈内点滴麻酔法に準ずる。5) 痙攣時における使用：患者の全身状態を観察しながら，通常 2～8mL (2.5% 溶液で 50～200mg) を痙攣が止まるまで徐々に注入。</p> <p>2. 直腸内注入 [溶液濃度] 10% 水溶液 [投与量] 20～40mg/kg (10% 溶液で 0.2～0.4mL/kg) を基準とする。[注入法] 溶液を注射器に入れ，注射器の先に導尿用カテーテルをつけ肛門より直腸に挿入し，注腸。注入後 15 分で麻酔にはいり，約 1 時間持続する。</p> <p>3. 筋肉内注射 [溶液濃度] 2.0～2.5% 水溶液，とくに 7 歳以下の小児に対しては 2% 溶液を使用する (2.5% 以上の濃度は組織の壊死をおこす危険がある)。[筋注部位] 大腿筋肉，上腕部筋肉など筋肉の多い部位を選んで注射する。[投与量] 20mg/kg (2% 溶液で 1mL/kg) を基準とする。[投与方法] 一度に全量を注入してはならず，全量を 2～3 等分して，5 分毎に必要なに応じて追加投与。注入後 5～15 分で麻酔にはいり，約 40～50 分程度持続する</p>

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>チオペンタールナトリウム <u>ラボナール注射用 0.5g</u> (株) Ravonal (田辺三菱) 0.5g/A 【薬価】919.00円/A</p>	<p>【効】 全身麻酔, 全身麻酔の導入, 局所麻酔剤・吸入麻酔剤との併用, 精神神経科における電撃療法の際の麻酔, 局所麻酔剤中毒・破傷風・子癇等に伴う痙攣, 精神神経科における診断 (麻酔インタビュー)</p> <p>【用】 (注) 1. 静脈内投与 [溶液濃度] 2.5% 水溶液 (5% 溶液は静脈炎を起こすことがある) [投与量・投与方法] 調製したチオペンタール水溶液を静脈より注入. 1) 全身麻酔の導入: 最初に 2~4mL (2.5% 溶液で 50~100mg) を注入して患者の全身状態, 抑制状態等を観察し, その感受性より追加量を決定. 次に患者が応答しなくなるまで追加注入し, 応答がなくなった時の注入量を就眠量とする. 更に就眠量の半量ないし同量を追加注入した後, 他の麻酔法に移行. 気管内に挿管する場合は筋弛緩剤を併用. 2) 短時間麻酔 (a) 患者とコンタクトを保ちながら最初に 2~3mL (2.5% 溶液で 50~75mg) を 10~15 秒位の速度で注入後 30 秒間麻酔の程度, 患者の全身状態を観察する. 更に必要ならば 2~3mL を同速度で注入し, 患者の応答がなくなった時の注入量を就眠量とする. 手術に先立ち, 更に 2~3mL を同速度で分割注入すれば, 10~15 分程度の麻酔が得られる. (b) 短時間で手術が終了しない場合は, 注射針を静脈中に刺したまま呼吸, 脈拍, 血圧, 角膜反射, 瞳孔対光反射等に注意しながら手術の要求する麻酔深度を保つように 1~4mL (2.5% 溶液で 25~100mg) を分割注入 (1 回の最大使用量は 1g まで). 3) 精神神経科における電撃療法の際の麻酔: 通常, 12mL (2.5% 溶液で 300mg) を 25~35 秒で注入し, 必要な麻酔深度に達したことを確かめた後, 直ちに電撃療法を行う. 4) 併用使用: 本剤は局所麻酔剤あるいは吸入麻酔剤と併用することができる. 通常, 2~4mL (2.5% 溶液で 50~100mg) を間歇的に静脈内注入. 点滴投与を行う場合は静脈内点滴麻酔法に準ずる. 5) 痙攣時における使用: 患者の全身状態を観察しながら, 通常, 2~8mL (2.5% 溶液で 50~200mg) を痙攣が止まるまで徐々に注入. 6) 精神神経科における診断 (麻酔インタビュー): 約 1mL/分 で 3~4mL 注入し入眠させる. その後 2~10 分で呼びかければ覚醒し, 質問に答えるようになればインタビューを実施する. その後は約 1mL/分 で追加注入.</p> <p>2. 直腸内注入 [溶液濃度] 10% 水溶液 [投与量] 20~40mg/kg (10% 溶液で 0.2~0.4mL/kg) を基準とする. [注入法] 溶液を注射器に入れ, 注射器の先に導尿用カテーテルをつけ肛門より直腸に挿入し, 注腸. 注入後 15 分で麻酔に入り, 約 1 時間持続する.</p> <p>3. 筋肉内注射 [溶液濃度] 2.0~2.5% 水溶液, 特に 7 歳以下の小児に対しては 2% 溶液を使用する (2.5% 以上の濃度は組織の壊死を起こす危険がある). [筋注部位] 大腿筋肉, 上腕部筋肉など筋肉の多い部位を選んで注射する. [投与量] 20mg/kg (2% 溶液で 1mL/kg) を基準とする. [投与方法] 一度に全量を注入してはならず, 全量を 2~3 等分して, 5 分ごとに必要に応じて追加投与. 注入後 5~15 分で麻酔に入り, 約 40~50 分程度持続する</p>

1119. その他の全身麻酔剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ケタミン塩酸塩 <u>ケタラール静注用 200mg</u> (株) Ketalar (第一三共) 200mg/20mL/V 【薬価】1,077.00円/瓶</p>	<p>【効】 手術, 検査及び処置時の全身麻酔及び吸入麻酔の導入</p> <p>【用】 (注) 初回 1~2mg/kg を緩徐 (1 分以上) に静注. 必要に応じて, 初回量と同量又は半量を追加</p>
<p>セボフルラン <u>セボフルラン吸入麻酔液「ニッコウ」</u> (株) Sevoflurane (丸石) 250mL/瓶 【薬価】27.20円/mL</p>	<p>【効】 全身麻酔</p> <p>【用】 (外) 導入: 本剤と酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガスとで導入. 睡眠量の静脈麻酔剤を投与し, 本剤と酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガスでも導入できる. 本剤による導入は, 0.5~5.0% で行うことができる. 維持: 患者の臨床徴候を観察しながら, 酸素・亜酸化窒素と併用し, 最小有効濃度で外科的麻酔状態を維持. 4.0% 以下の濃度で維持できる</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
デスフルラン <u>スープレン吸入麻酔液</u> Ⓢ Suprane(バクスター・ジャパン) 240mL/瓶 【薬価】 38.70 円/mL	【効】 全身麻酔の維持 【用】(外) 3.0%の濃度で開始し、適切な麻酔深度が得られるよう患者の全身状態を観察しながら、濃度を調節。亜酸化窒素の併用の有無にかかわらず、7.6%以下の濃度で外科的手術に適切な麻酔深度が得られる
ドロペリドール <u>ドロレプタン注射液 25mg</u> Ⓢ Droleptan (アルフレッサ) 25mg10mL/V 【薬価】 95.00 円/mL	【効】 ①フェンタニルとの併用による手術、検査及び処置時の全身麻酔並びに局所麻酔の補助。②ドロペリドールの単独投与による麻酔前投薬 【用】(注) ①導入麻酔剤として投与する場合には0.25～0.5mg/kg(本注射液として0.1～0.2mL/kg)をフェンタニル5～10μg/kg(フェンタニル注射液として0.1～0.2mL/kg)と共に緩徐に静注するか、又はブドウ糖液等に希釈して点滴静注。局所麻酔の補助として投与する場合には局所麻酔剤投与10～15分後に0.25mg/kg(本注射液として0.1mL/kg)をフェンタニル5μg/kg(フェンタニル注射液として0.1mL/kg)と共に緩徐に静注。②0.05～0.1mg/kg(本注射液として0.02～0.04mL/kg)を麻酔開始30～60分前に筋注
プロポフォール <u>1%ディプリバン注-キット</u> Ⓢ Diprivan (サンド) 500mg50mL/本 【薬価】 1,581.00 円/筒	【効】 ①全身麻酔の導入及び維持。②集中治療における人工呼吸中の鎮静 【用】(注) ①(1)ディプリフェューザー TCI 機能を用いない投与方法 1) 導入：0.5mg/kg/10秒(本剤として0.05mL/kg/10秒)で、患者の全身状態を観察しながら、就眠が得られるまで静注。ASAIII及びIVの患者には、より緩徐に投与。2.0～2.5mg/kg(本剤として0.20～0.25mL/kg)で就眠が得られる。 2) 維持：酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガスと併用し、静注。適切な麻酔深度が得られるよう患者の全身状態を観察しながら、投与速度を調節。4～10mg/kg/時(本剤として0.4～1.0mL/kg/時)で適切な麻酔深度が得られる。鎮痛剤(麻薬性鎮痛剤、局所麻酔剤等)を併用。局所麻酔剤併用時には通常より低用量で適切な麻酔深度が得られる。 (2)ディプリフェューザー TCI 機能を用いる投与方法 1) 導入：目標血中濃度3.0μg/mLで静注を開始し、投与開始3分後に就眠が得られない場合には1分毎に1.0～2.0μg/mLずつ目標血中濃度を上げる。目標血中濃度3.0～6.0μg/mL、投与開始後1～3分で就眠が得られる。高齢者、ASAIII及びIVの患者には、より低い目標血中濃度で投与を開始。 2) 維持：酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガスと併用し、本剤を静注。適切な麻酔深度が得られるよう患者の全身状態を観察しながら、目標血中濃度を調節。目標血中濃度2.0～5.0μg/mLで適切な麻酔深度が得られる。鎮痛剤(麻薬性鎮痛剤、局所麻酔剤等)を併用。 ②0.3mg/kg/時(本剤として0.03mL/kg/時)で、持続注入にて静注を開始し、適切な鎮静深度が得られるよう患者の全身状態を観察しながら、投与速度を調節。0.3～3.0mg/kg/時(本剤として0.03～0.30mL/kg/時)で適切な鎮静深度が得られる。必要に応じて鎮痛剤を併用
プロポフォール <u>プロポフォール静注1%20mL「マ ルイシ」</u> Ⓢ Propofol (丸石) 200mg20mL/A 【薬価】 752.00 円/A <u>プロポフォール静注1%50mL「マ ルイシ」</u> Ⓢ Propofol (丸石) 500mg50mL/V 【薬価】 1,021.00 円/瓶	【効】 ①全身麻酔の導入及び維持。②集中治療における人工呼吸中の鎮静 【用】(注) ①1) 導入：0.5mg/kg/10秒(本剤として0.05mL/kg/10秒)で、患者の全身状態を観察しながら、就眠が得られるまで静注。ASAIII及びIVの患者には、より緩徐に投与。2.0～2.5mg/kg(本剤として0.20～0.25mL/kg)で就眠が得られる。 2) 維持：酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガスと併用し、静注。適切な麻酔深度が得られるよう患者の全身状態を観察しながら、投与速度を調節。4～10mg/kg/時(本剤として0.4～1.0mL/kg/時)で適切な麻酔深度が得られる。鎮痛剤(麻薬性鎮痛剤、局所麻酔剤等)を併用。局所麻酔剤併用時には通常より低用量で適切な麻酔深度が得られる。 ②0.3mg/kg/時(本剤として0.03mL/kg/時)で、持続注入にて静注を開始し、適切な鎮静深度が得られるよう患者の全身状態を観察しながら、投与速度を調節。0.3～3.0mg/kg/時(本剤として0.03～0.30mL/kg/時)で適切な鎮静深度が得られる。必要に応じて鎮痛剤を併用

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レミゾラムベシル酸塩 <u>アネレム静注用 50mg</u> ㊞ Anerem (ムンディ) 50mg/Vi 【薬価】 2,218.00 円 / 瓶	【効】 全身麻酔の導入及び維持 【用】 (注) 導入：12mg/kg/時の速度で、患者の全身状態を観察しながら、意識消失が得られるまで静脈内へ持続注入。患者の年齢、状態に応じて投与速度を適宜減速 維持：1mg/kg/時の速度で静脈内への持続注入を開始し、適切な麻酔深度が維持できるよう患者の全身状態を観察しながら、投与速度を適宜調節するが、上限は2mg/kg/時とする。患者の年齢、状態に応じて投与開始速度を適宜減速。覚醒徴候が認められた場合は、最大0.2mg/kgを静注してもよい

112. 催眠鎮静剤, 抗不安剤

1124. ベンゾジアゼピン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アルプラゾラム <u>コンスタン 0.4mg錠 (院外)</u> ㊞ Constan (武田) 0.4mg/T 【薬価】 5.90 円 / T ㊞ <u>後アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」</u> ㊞ Alprazolam (沢井) 0.4mg/T 【薬価】 5.70 円 / T 【先発品】 コンスタン 0.4mg錠, ソラナックス 0.4mg錠	【効】 心身症(胃・十二指腸潰瘍, 過敏性腸症候群, 自律神経失調症)における身体症候ならびに不安・緊張・抑うつ・睡眠障害 【用】 (内) 1日1.2mgを3回に分割。増量する場合には最高用量を1日2.4mgとして漸次増量し, 3~4回に分割。高齢者:1回0.4mgの1日1~2回投与から開始し, 増量する場合でも1日1.2mgまで
エスタゾラム <u>ユーロジン 2mg錠 (院外)</u> ㊞ Eurodin (武田) 2mg/T 【薬価】 9.20 円 / T ㊞ <u>後エスタゾラム錠 2mg「アメル」</u> ㊞ Estazolam (共和) 2mg/T 【薬価】 7.30 円 / T 【先発品】 ユーロジン 2mg錠	【効】 ①不眠症, ②麻酔前投薬 【用】 (内) ①1回1~4mgを就寝前, ②手術前夜:1回1~2mgを就寝前, 麻酔前:1回2~4mg
クロキサゾラム <u>セバゾン錠 2</u> ㊞ Sepazon (第一三共) 2mg/T 【薬価】 5.80 円 / T	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ・強迫・恐怖・睡眠障害, ②心身症(消化器疾患, 循環器疾患, 更年期障害, 自律神経失調症)における身体症候ならびに不安・緊張・抑うつ, ③術前の不安除去 【用】 (内) ①②1日3~12mgを3回に分割, ③0.1~0.2mg/kgを手術前
ジアゼパム <u>ジアゼパム注射液 10mg「NIG」</u> ㊞ Diazepam (武田) 10mg/管 【薬価】 118.00 円 / A	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ, ②次記疾患及び状態における不安・興奮・抑うつの軽減:麻酔前, 麻酔導入時, 麻酔中, 術後, アルコール依存症の禁断(離脱)症状, 分娩時, ③次記状態における痙攣の抑制:てんかん様重積状態, 有機リン中毒, カルバマゼート中毒 【用】 (注) 初回10mgをできるだけ緩徐に静注又は筋注。以後必要に応じて3~4時間ごとに注射。静注には, なるべく太い静脈を選んで, できるだけ緩徐に(2分間以上の時間をかけて)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジアゼパム <u>セルシン散 1% (院外)</u> ㊞ Cercine (武田) 10mg/g 【薬価】 10.70 円 /g <u>2mgセルシン錠</u> ㊞ Cercine (武田) 2mg/T 【薬価】 6.00 円 /T <u>ホリゾン錠 5mg</u> ㊞ Horizon (丸石) 5mg/T 【薬価】 9.40 円 /T	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ。うつ病における不安・緊張。心身症（消化器疾患、循環器疾患、自律神経失調症、更年期障害、腰痛症、頸肩腕症候群）における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ。②次記疾患における筋緊張の軽減：脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛。③麻酔前投薬 【用】 (内) ① 1回2～5mgを1日2～4回。外来患者は1日量15mg以内。小児：3歳以下は1日量1～5mg、4～12歳は1日量2～10mg、それぞれ1～3回に分割。② 1回2～10mgを1日3～4回。③ 1回5～10mgを就寝前又は手術前
ジアゼパム <u>セルシン注射液 10mg</u> ㊞ Cercine (武田) 10mg/A 【薬価】 82.00 円 /A	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ。②次記疾患及び状態における不安・興奮・抑うつの軽減：麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後、アルコール依存症の禁断（離脱）症状、分娩時。③てんかん様重積状態における痙攣の抑制 【用】 (注) 初回10mgをできるだけ緩徐に静注又は筋注。以後必要に応じて3～4時間ごとに注射。静注には、なるべく太い静脈を選んで、できるだけ緩徐に（2分間以上の時間をかけて）
ジアゼパム <u>ダイアップ坐剤 4</u> ㊞ Diapp (高田) 4mg/個 【薬価】 54.10 円 / 個 <u>ダイアップ坐剤 6</u> ㊞ Diapp (高田) 6mg/個 【薬価】 62.10 円 / 個 <u>ダイアップ坐剤 10</u> ㊞ Diapp (高田) 10mg/個 【薬価】 70.30 円 / 個	【効】 小児に対して次の目的に用いる：熱性痙攣及びてんかんの痙攣発作の改善 【用】 (外) 小児：1回0.4～0.5mg/kgを1日1～2回、直腸内に挿入。1日1mg/kgまで
トリアゾラム <u>ハルシオン 0.25mg錠 (院外)</u> ㊞ Halcion (ファイザー) 0.25mg/T 【薬価】 8.80 円 /T <u>後トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」</u> ㊞ Triazolam (日医工) 0.25mg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 ハルシオン 0.25mg錠	【効】 ①不眠症。②麻酔前投薬 【用】 (内) ① 1回0.25mgを就寝前。高度な不眠症には0.5mg投与可。高齢者：1回0.125mg～0.25mgまで。②手術前夜：1回0.25mgを就寝前。必要に応じ0.5mgを投与可
ニトラゼパム <u>ベンザリン錠 5</u> ㊞ Benzalin (共和) 5mg/T 【薬価】 8.40 円 /T	【効】 ①不眠症。②麻酔前投薬。③異型小発作群：點頭てんかん、ミオクロヌス発作、失立発作等。④焦点性発作：焦点性痙攣発作、精神運動発作、自律神経発作等 【用】 (内) ① 1回5～10mgを就寝前。② 1回5～10mgを就寝前又は手術前。③④成人・小児とも1日5～15mgを適宜分割投与

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フルタゾラム <u>コレミナル錠 4mg</u> Coreminal (沢井) 4mg/T 【薬価】6.60 円 /T	【効】心身症（過敏性腸症候群，慢性胃炎，胃・十二指腸潰瘍）における身体症候ならびに不安・緊張・抑うつ 【用】(内) 1日12mgを3回に分割
プロチゾラム <u>レンドルミンD錠 0.25mg (院外)</u> ㊞ Lendormin D (日本ベーリンガー) 0.25mg/T 【薬価】12.50 円 /T ㊞ <u>後プロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」</u> ㊞ Brotizolam OD (沢井) 0.25mg/T 【薬価】10.10 円 /T 【先発品】レンドルミンD錠0.25mg	【効】①不眠症，②麻酔前投薬 【用】(内) ①1回0.25mgを就寝前，②手術前夜：1回0.25mgを就寝前，麻酔前：1回0.5mg
プロマゼパム <u>レキソタン錠 2</u> ㊞ Lexotan (サンド) 2mg/T 【薬価】5.90 円 /T	【効】①神経症における不安・緊張・抑うつ及び強迫・恐怖，うつ病における不安・緊張，②心身症（高血圧症，消化器疾患，自律神経失調症）における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ及び睡眠障害，③麻酔前投薬 【用】(内) ①1日量6～15mgを1日2～3回に分割，②1日量3～6mgを1日2～3回に分割，③5mgを就寝前又は手術前
ミダゾラム <u>ドルミカム注射液 10mg</u> ㊞ Dormicum (丸石) 10mg/A 【薬価】115.00 円 /A	【効】①麻酔前投薬，②全身麻酔の導入・維持，③集中治療における人工呼吸中の鎮静，④歯科・口腔外科領域における手術及び処置時の鎮静 【用】(注) ①0.08～0.10mg/kgを手術前30分～1時間に筋注，修正在胎45週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児：0.08～0.15mg/kgを手術前30分～1時間に筋注，②0.15～0.30mg/kgを静注し，必要に応じて初回量の半量ないし同量を追加投与，静注する場合には，なるべく太い静脈を選んで，できるだけ緩徐に（1分間以上の時間をかけて），③1）導入：初回投与は，0.03mg/kgを少なくとも1分以上かけて静注，より確実な鎮静導入が必要とされる場合の初回投与量は0.06mg/kgまで，必要に応じて，0.03mg/kgを少なくとも5分以上の間隔を空けて追加投与，初回投与及び追加投与の総量は0.30mg/kgまで，修正在胎45週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児：初回投与は0.05～0.20mg/kgを少なくとも2～3分以上かけて静注，必要に応じて，初回量と同量を少なくとも5分以上の間隔を空けて追加投与，2）維持：0.03～0.06mg/kg/時より持続静脈内投与を開始，鎮静状態をみながら適宜増減，（0.03～0.18mg/kg/時の範囲が推奨される），修正在胎45週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児：0.06～0.12mg/kg/時より持続静脈内投与を開始し，鎮静状態をみながら適宜増減（投与速度の増減は25%の範囲内とする），修正在胎45週未満（在胎週数＋出生後週数）の小児のうち，修正在胎32週未満では0.03mg/kg/時，修正在胎32週以上では0.06mg/kg/時より持続静脈内投与を開始し，鎮静状態をみながら適宜増減，④初回投与として1～2mgをできるだけ緩徐に（1～2mg/分）静注し，必要に応じて0.5～1mgを少なくとも2分以上の間隔を空けて，できるだけ緩徐に（1～2mg/分）追加，初回の目標鎮静レベルに至るまでの，初回投与及び追加投与の総量は5mgまで
メダゼパム <u>レスミット錠 5</u> ㊞ Resmit (共和) 5mg/T 【薬価】5.70 円 /T	【効】①神経症における不安・緊張・抑うつ，②心身症（消化器疾患，循環器疾患，内分泌系疾患，自律神経失調症）における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ 【用】(内) 1日10～30mg

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ロフラゼブ酸エチル <u>メイラックス錠 1mg</u> (商) Meilax (Meiji Seika) 1mg/T 【薬価】 10.40 円 /T (後) <u>ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サイワイ」</u> (商) Ethyl loflazepate (沢井) 1mg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 メイラックス錠 1mg	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ・睡眠障害, ②心身症(胃・十二指腸潰瘍, 慢性胃炎, 過敏性腸症候群, 自律神経失調症)における不安・緊張・抑うつ・睡眠障害 【用】 (内) 2mgを1日1～2回に分割
ロラゼパム <u>ワイパックス錠 0.5 (院内)</u> (商) Wypax (ファイザー) 0.5mg/T 【薬価】 5.90 円 /T	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ, ②心身症(自律神経失調症, 心臓神経症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ 【用】 (内) 1日1～3mgを2～3回に分割
ロルメタゼパム <u>エバミール錠 1.0</u> (商) Evamyl (バイエル) 1mg/T 【薬価】 12.60 円 /T	【効】 不眠症 【用】 (内) 1回1～2mgを就寝前, 高齢者: 1回2mgまで

1125. バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェノバルビタール <u>フェノバル散 10%</u> (商) (商) Phenobal (藤永) 100mg/g 【薬価】 7.50 円 /g	【効】 ①不眠症, ②不安緊張状態の鎮静, てんかんの痙攣発作: 強直間代発作(全般痙攣発作, 大発作), 焦点発作(ジャクソン型発作を含む), 自律神経発作, 精神運動発作 【用】 (内) ①1回30～200mgを就寝前, ②1日30～200mgを1～4回に分割
フェノバルビタール <u>フェノバル注射液 100mg</u> (商) (商) Phenobal (藤永) 100mg1mL/A 【薬価】 70.00 円 /A	【効】 ①不安緊張状態の鎮静(緊急に必要な場合), ②てんかんの痙攣発作: 強直間代発作(全般痙攣発作, 大発作), 焦点発作(ジャクソン型発作を含む), ③自律神経発作, 精神運動発作 【用】 (注) 1回50～200mgを1日1～2回, 皮下又は筋注

1129. その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エソゾピクロン (後) <u>エソゾピクロン錠 1mg 「ニプロ」</u> Eszopiclone (ニプロ) 1mg/T 【薬価】 8.90 円 /T 【先発品】 ルネスタ錠 1mg	【効】 不眠症 【用】 (内) 1回2mgを, 高齢者には1回1mgを就寝前, 1回3mgまで, 高齢者では1回2mgまで

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ゾピクロン アモバン錠 7.5 (院外) Ⓢ Amoban (日医工) 7.5mg/T 【薬価】12.30 円/T Ⓢゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院内) Ⓢ Zopiclone (沢井) 7.5mg/T 【薬価】6.50 円/T 【先発品】アモバン錠 7.5</p>	<p>【効】①不眠症. ②麻酔前投薬 【用】(内) ① 1回 7.5～10mgを就寝前. 10mgまで. ② 1回 7.5～10mgを就寝前又は手術前. 10mgまで</p>
<p>ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー錠 5mg (院外) Ⓢ Myslee (アステラス) 5mg/T 【薬価】20.60 円/T Ⓢゾルピデム酒石酸塩 OD 錠 5mg「サワイ」 Ⓢ Zolpidem tartrate OD (沢井) 5mg/T 【薬価】10.10 円/T 【先発品】マイスリー錠 5mg</p>	<p>【効】不眠症 (統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く) 【用】(内) 1回 5～10mgを就寝直前. 高齢者: 1回 5mgから投与を開始. 1日 10mgまで</p>
<p>タンドスピロンクエン酸塩 セディール錠 10mg (院外) Ⓢ Sediel (大日本住友) 10mg/T 【薬価】17.20 円/T</p>	<p>【効】①心身症 (自律神経失調症, 本態性高血圧症, 消化性潰瘍) における身体症状ならびに抑うつ, 不安, 焦躁, 睡眠障害. ②神経症における抑うつ, 恐怖 【用】(内) 1日 30mgを3回に分割. 1日 60mgまで</p>
<p>デクスメトミジン塩酸塩 Ⓢデクスメトミジン静注液 200 μg/50mL シリンジ「ニプロ」 Ⓢ Dexmedetomidine (ニプロ) 200 μg/50mL 【薬価】1,943.00 円/筒 【先発品】プレセデックス静注液 200 μg/50mL シリンジ「ファイザー」</p>	<p>【効】①集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静. ②局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静 【用】(注) ① 6 μg/kg/時で10分間持続静注し (初期負荷投与), 続いて患者の状態に合わせて, 至適鎮静レベルが得られる様, 維持量として 0.2～0.7 μg/kg/時の範囲で持続静注 (維持投与). 維持投与から開始することも可. 投与速度を適宜減速. ② 6 μg/kg/時で10分間持続静注し (初期負荷投与), 続いて患者の状態に合わせて, 至適鎮静レベルが得られる様, 維持量として 0.2～0.7 μg/kg/時の範囲で持続静注 (維持投与). 投与速度を適宜減速</p>
<p>トリクロホスナトリウム トリクロロールシロップ 10% Ⓢ Tricloryl (アルフレッサ) 100mg/mL 【薬価】10.20 円/mL</p>	<p>【効】①不眠症. ②脳波・心電図検査等における睡眠 【用】(内) 1回 1～2g (本剤として 10～20mL) を就寝前又は検査前. 20～80mg/kg (本剤として 0.2～0.8mL/kg) を標準とし, 総量 2g (本剤として 20mL) まで. 幼小児は年齢により適宜減量</p>

113. 抗てんかん剤

1132. ヒダントイン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェニトイン アレビアチン散 10% Ⓢ Aleviatin (住友ファーマ) 100mg/g 【薬価】12.10 円/g	【効】①てんかんの痙攣発作：強直間代発作（全般痙攣発作，大発作），焦点発作（ジャクソン型発作を含む），②自律神経発作，③精神運動発作 【用】（内）1日200～300mg，小児：次記用量を毎食後3回に分割，学童：100～300mg，幼児：50～200mg，乳児：20～100mg
フェニトイン アレビアチン注 250mg Ⓢ Aleviatin (大日本住友) 250mg5mL/A 【薬価】123.00 円/A	【効】①てんかん様痙攣発作が長時間引き続いて起こる場合（てんかん発作重積症），②経口投与が不可能で，かつ，痙攣発作の出現が濃厚に疑われる場合（特に意識障害，術中，術後），③急速にてんかん様痙攣発作の抑制が必要な場合 【用】（注）125～250mg（本剤2.5～5mL）を，1分間1mLを超えない速度で徐々に静注，以上の用量で発作が抑制できないときには，30分後更に100～150mg（2～3mL）を追加するか，他の対策を考慮，小児：成人量を基準として，体重により決定，痙攣が消失し，意識が回復すれば経口に切り替える
ホスフェニトインナトリウム水和物 ホストイン静注 750mg Ⓢ Fostoin (ノーベル) 750mg10mL/V（ホスフェニトインナトリウムとして） 【薬価】6,419.00 円/瓶	【効】①てんかん重積状態，②脳外科手術又は意識障害（頭部外傷等）時のてんかん発作の発現抑制，③フェニトインを経口投与しているてんかん患者における一時的な代替療法 【用】（注）成人又は2歳以上の小児には，次記の用法・用量にて投与，①初回投与：ホスフェニトインナトリウムとして22.5mg/kgを静注，3mg/kg/分又は150mg/分のいずれか低い方を超えないこと，維持投与：5～7.5mg/kg/日を1回又は分割にて静注，1mg/kg/分又は75mg/分のいずれか低い方を超えないこと，②初回投与：15～18mg/kgを静注，1mg/kg/分又は75mg/分のいずれか低い方を超えないこと，維持投与：5～7.5mg/kg/日を1回又は分割にて静注，1mg/kg/分又は75mg/分のいずれか低い方を超えないこと，③経口フェニトインの1日投与量の1.5倍量を，1日1回又は分割にて静注，1mg/kg/分又は75mg/分のいずれか低い方を超えないこと

1139. その他の抗てんかん剤


商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カルバマゼピン カルバマゼピン細粒 50%「フジナガ」(院内) Carbamazepine (藤永＝第一三共) 500mg/g 【薬価】22.20 円/g テグレトール錠 200mg Tegretol (サンファーマ) 200mg/T 【薬価】8.20 円/T	【効】①精神運動発作，てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害，てんかんの痙攣発作〔強直間代発作（全般痙攣発作，大発作）〕，②躁病，躁うつ病の躁状態，統合失調症の興奮状態，③三叉神経痛 【用】（内）①最初1日量200～400mgを1～2回に分割し，至適効果が得られるまで（1日600mg）徐々に増量，1日1200mgまで，小児：1日100～600mgを分割，②最初1日量200～400mgを1～2回に分割し，至適効果が得られるまで（1日600mg）徐々に増量，1日1200mgまで，③最初1日量200～400mgからはじめ，1日600mgまでを分割するが，1日800mgまで
クロナゼパム リボトリール錠 0.5mg Ⓢ Rivotril (中外) 0.5mg/T 【薬価】9.30 円/T	【効】①小型（運動）発作〔ミオクローニー発作，失立（無動）発作，點頭てんかん（幼児痙攣発作，BNS痙攣等）〕，②精神運動発作，③自律神経発作 【用】（内）成人・小児：初回量1日0.5～1mgを1～3回に分割，徐々に増量，維持量は1日2～6mgを1～3回に分割，乳・幼児：初回量1日0.025mg/kgを1～3回に分割，徐々に増量，維持量は1日0.1mg/kgを1～3回に分割
クロバザム マイスタン錠 10mg (院外) Ⓢ Mystan (大日本住友) 10mg/T 【薬価】27.80 円/T	【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかんの次記発作型における抗てんかん薬との併用，①部分発作：単純部分発作，複雑部分発作，二次性全般化強直間代発作，②全般発作：強直間代発作，強直発作，非定型欠神発作，ミオクローニー発作，脱力発作 【用】（内）1日10mgから始め，徐々に増量，維持量は1日10～30mgを1～3回に分割（1日量は40mgまで），小児：1日0.2mg/kgから始め，症状に応じて徐々に増量，維持量は1日0.2～0.8mg/kgを1～3回に分割（1日量は1.0mg/kgまで）

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ゾニサミド エクセگران錠 100mg Ⓜ Excegran (大日本住友) 100mg/T 【薬価】16.80 円/T</p>	<p>【効】部分てんかん及び全般てんかんの次記発作型。①部分発作:単純部分発作 [焦点発作 (ジャクソン型発作を含む), 自律神経発作, 精神運動発作], 複雑部分発作 [精神運動発作, 焦点発作], 二次性全般化強直間代痙攣 [強直間代発作 (大発作)]. ②全般発作:強直間代発作 [強直間代発作 (全般痙攣発作, 大発作)], 強直発作 [全般痙攣発作], 非定型欠伸発作 [異型小発作]. ③混合発作 【用】(内) 最初1日100～200mgを1～3回に分割, 以後1～2週ごとに増量して1日量200～400mgまで漸増し, 1～3回に分割, 最高1日量は600mgまで. 小児: 最初1日2～4mg/kgを1～3回に分割, 以後1～2週ごとに増量して1日量4～8mg/kgまで漸増し, 1～3回に分割, 最高1日量は12mg/kgまで</p>
<p>バルプロ酸ナトリウム セレニカ R 顆粒 40% Selenica R (興和) 400mg/g 【薬価】36.70 円/g</p>	<p>【効】①各種てんかん (小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作) 及びてんかんに伴う性格行動障害 (不機嫌・易怒性等) の治療. ②躁病及び躁うつ病の躁状態の治療. ③片頭痛発作の発症抑制 【用】(内) ①②400～1200mgを1日1回, ③400～800mgを1日1回, 1日量として1000mgまで</p>
<p>バルプロ酸ナトリウム デパケン錠 200mg (院外) Depakene (協和キリン) 200mg/T 【薬価】10.10 円/T</p>	<p>【効】①各種てんかん (小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作) 及びてんかんに伴う性格行動障害 (不機嫌・易怒性等) の治療. ②躁病及び躁うつ病の躁状態の治療. ③片頭痛発作の発症抑制 【用】(内) ①②1日量400～1200mgを1日2～3回に分割, ③1日量400～800mgを1日2～3回に分割, 1日量として1000mgまで</p>
<p>バルプロ酸ナトリウム バルプロ酸ナトリウム錠 200mg 「アメル」 Sodium valproate (共和) 200mg/T 【薬価】14.30 円/T</p>	<p>【効】①各種てんかん (小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作) 及びてんかんに伴う性格行動障害 (不機嫌・易怒性等) の治療. ②躁病及び躁うつ病の躁状態の治療. ③片頭痛発作の発症抑制 【用】(内) ①②1日量400～1200mgを1日2～3回に分割, ③1日量400～800mgを1日2～3回に分割, 1日量として1000mgまで</p>
<p>バルプロ酸ナトリウム デパケンシロップ 5% (院外) Depakene (協和キリン) 5%50mg/mL 【薬価】7.70 円/mL Ⓜバルプロ酸 Na シロップ 5% 「フシナガ」 Sodium valproate (第一三共) 5%50mg/mL 【薬価】6.80 円/mL 【先発品】デパケンシロップ 5%, バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」</p>	<p>【効】①各種てんかん (小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作) 及びてんかんに伴う性格行動障害 (不機嫌・易怒性等) の治療. ②躁病及び躁うつ病の躁状態の治療. ③片頭痛発作の発症抑制 【用】(内) ①②1日量400～1200mg (本剤として8～24mL) を1日2～3回に分割, ③1日量400～800mg (本剤として8～16mL) を1日2～3回に分割, 1日量として1000mg (本剤として20mL) まで</p>
<p>バルプロ酸ナトリウム デパケン R 錠 100mg (院外) Depakene R (協和キリン) 100mg/T 【薬価】9.50 円/T Ⓜバルプロ酸ナトリウム徐放錠 A100mg 「トーワ」 Sodium valproate (東和薬品) 100mg/T 【薬価】6.90 円/T 【先発品】デパケン R 錠 100mg</p>	<p>【効】①各種てんかん (小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作) 及びてんかんに伴う性格行動障害 (不機嫌・易怒性等) の治療. ②躁病及び躁うつ病の躁状態の治療. ③片頭痛発作の発症抑制 【用】(内) ①②1日量400～1200mgを1日1～2回に分割, ③1日量400～800mgを1日1～2回に分割, 1日量として1000mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベランパネル水和物 <u>フィコンバ錠 2mg</u> Fycompa (エーザイ) 2mg/T 【薬価】 195.70 円/T	【効】 ①てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）. ②他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【用】 (内) ① [単剤療法] 成人及び4歳以上の小児には1日1回2mgの就寝前経口投与より開始, その後2週間以上の間隔をあけて2mgずつ漸増. 維持用量は1日1回4～8mg. 症状により2週間以上の間隔をあけて2mg以下ずつ適宜増減するが, 1日最高8mgまで. [併用療法] 成人及び12歳以上の小児: 1日1回2mgの就寝前経口投与より開始, その後1週間以上の間隔をあけて2mgずつ漸増. 本剤の代謝を促進する抗てんかん薬を併用しない場合の維持用量は1日1回4～8mg, 併用する場合の維持用量は1日1回8～12mg. 症状により1週間以上の間隔をあけて2mg以下ずつ適宜増減するが, 1日最高12mgまで. 4歳以上12歳未満の小児: 1日1回2mgの就寝前経口投与より開始, その後2週間以上の間隔をあけて2mgずつ漸増. 本剤の代謝を促進する抗てんかん薬を併用しない場合の維持用量は1日1回4～8mg, 併用する場合の維持用量は1日1回8～12mg. 症状により2週間以上の間隔をあけて2mg以下ずつ適宜増減するが, 1日最高12mgまで. ② [併用療法] 成人及び12歳以上の小児に1日1回2mgの就寝前経口投与より開始, その後1週間以上の間隔をあけて2mgずつ漸増. 本剤の代謝を促進する抗てんかん薬を併用しない場合の維持用量は1日1回8mg, 併用する場合の維持用量は1日1回8～12mg. 症状により1週間以上の間隔をあけて2mg以下ずつ適宜増減するが, 1日最高12mgまで
ミダゾラム <u>ブコラム口腔用液 2.5mg</u> (武田) Buccolam 2.5mg0.5mL/筒 【薬価】 1,688.70 円/筒 <u>ブコラム口腔用液 5mg</u> (武田) Buccolam 5mg1mL/筒 【薬価】 2,966.70 円/筒	【効】 てんかん重積状態 【用】 (外) 修正在胎52週（在胎週数＋出生後週数）以上1歳未満: 1回2.5mg, 1歳以上5歳未満: 1回5mg, 5歳以上10歳未満: 1回7.5mg, 10歳以上18歳未満: 1回10mgを頬粘膜投与
ラコサミド <u>ビムパット錠 100mg</u> (第一三共) Vimpat 50mg/T 【薬価】 355.50 円/T	【効】 ①てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）. ②他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【用】 (内) 成人: 1日100mgより投与を開始し, その後1週間以上の間隔をあけて増量し, 維持用量を1日200mgとするが, 1日2回に分割. 1日400mgを超えない範囲で適宜増減, 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として100mg以下ずつ. 小児: 4歳以上の小児には1日2mg/kgより投与を開始, その後1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kgずつ増量し, 維持用量を体重30kg未満の小児には1日6mg/kg, 体重30kg以上50kg未満の小児には1日4mg/kgとする. 1日2回に分けて経口投与. 症状により体重30kg未満の小児には1日12mg/kg, 体重30kg以上50kg未満の小児には1日8mg/kgを超えない範囲で適宜増減, 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kg以下ずつ. 体重50kg以上の小児では, 成人と同じ用法・用量

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ラコサミド <u>ビムパット点滴静注 200mg</u>  Vimpat (第一三共) 200mg20mL/ 瓶 【薬価】 4,298.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 一時的に経口投与ができない患者における，次記の治療に対するラコサミド経口製剤の代替療法：①てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む），②他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法</p> <p>【用】（注）《ラコサミドの経口投与から本剤に切り替える場合》ラコサミド経口投与と同じ1日用量及び投与回数にて，1回量を30分から60分かけて点滴静注 《ラコサミドの経口投与に先立ち本剤を投与する場合》成人：1日100mgより投与を開始し，その後1週間以上の間隔をあけて増量し，維持用量を1日200mgとするが，いずれも1日2回に分け，1回量を30分から60分かけて点滴静注．小児：4歳以上の小児には1日2mg/kgより投与を開始し，その後1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kgずつ増量し，維持用量を体重30kg未満の小児には1日6mg/kg，体重30kg以上50kg未満の小児には1日4mg/kgとする．1日2回に分け，1回量を30分から60分かけて点滴静注．体重50kg以上の小児では，成人と同じ用法・用量いずれの場合においても，症状により適宜増減できるが，1日最高投与量及び増量方法は次記のとおりとすること 成人：1日最高投与量は400mgを超えないこととし，増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として100mg以下ずつ．小児：4歳以上の小児のうち体重30kg未満の小児では1日12mg/kg，体重30kg以上50kg未満の小児では1日8mg/kgを超えないこととし，増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kg以下ずつ．体重50kg以上の小児では，成人と同じ1日最高投与量及び増量方法</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ラモトリギン <u>ラミクタール錠 25mg</u> (Ⓜ) Lamictal (グラクソ・スミスクライン) 25mg/T 【薬価】 34.20 円/T <u>ラミクタール錠 100mg (院外)</u> (Ⓜ) Lamictal (グラクソ・スミスクライン) 100mg/T 【薬価】 89.20 円/T</p>	<p>【効】 ①てんかん患者の次記発作に対する単剤療法：部分発作（二次性全般化発作を含む）、強直間代発作、定型欠伸発作。②他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の次記発作に対する抗てんかん薬との併用療法：部分発作（二次性全般化発作を含む）、強直間代発作、Lennox-Gastaut 症候群における全般発作。③双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制</p> <p>【用】 (内) (成人 (錠 25・100mg))</p> <p>(1) てんかん患者に用いる場合</p> <p>(a) 単剤療法の場合（部分発作（二次性全般化発作を含む）及び強直間代発作に用いる場合）：最初の 2 週間は 1 日 25mg を 1 日 1 回経口投与し、次の 2 週間は 1 日 50mg を 1 日 1 回経口投与し、5 週目は 1 日 100mg を 1 日 1 回又は 2 回に分服。その後は、1～2 週間ごとに 1 日量として最大 100mg ずつ漸増。維持用量は 1 日 100～200mg とし、1 日 1 回又は 2 回に分服。症状に応じて適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として最大 100mg ずつ、1 日用量は最大 400mg までとし、いずれも 1 日 1 回又は 2 回に分服</p> <p>(b) バルプロ酸ナトリウムを併用する場合：最初の 2 週間は 1 回 25mg を隔日に経口投与し、次の 2 週間は 1 日 25mg を 1 日 1 回経口投与。その後は、1～2 週間ごとに 1 日量として 25～50mg ずつ漸増。維持用量は 1 日 100～200mg とし、1 日 2 回に分服</p> <p>(c) バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合※1</p> <p>(ア) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※2 を併用する場合：最初の 2 週間は 1 日 50mg を 1 日 1 回経口投与し、次の 2 週間は 1 日 100mg を 1 日 2 回に分服。その後は、1～2 週間ごとに 1 日量として最大 100mg ずつ漸増。維持用量は 1 日 200～400mg とし、1 日 2 回に分服</p> <p>(イ) (ア) 以外の薬剤※3 を併用する場合：単剤療法の場合に従う</p> <p>(2) 双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制に用いる場合</p> <p>(a) 単剤療法の場合：最初の 2 週間は 1 日 25mg を 1 日 1 回経口投与し、次の 2 週間は 1 日 50mg を 1 日 1 回又は 2 回に分服、5 週目は 1 日 100mg を 1 日 1 回又は 2 回に分服、6 週目以降は維持用量として 1 日 200mg を 1 日 1 回又は 2 回に分服。症状に応じて適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として最大 100mg ずつ、1 日用量は最大 400mg までとし、いずれも 1 日 1 回又は 2 回に分服</p> <p>(b) バルプロ酸ナトリウムを併用する場合：最初の 2 週間は 1 回 25mg を隔日に経口投与し、次の 2 週間は 1 日 25mg を 1 日 1 回経口投与し、5 週目は 1 日 50mg を 1 日 1 回又は 2 回に分服。6 週目以降は維持用量として 1 日 100mg を 1 日 1 回又は 2 回に分服。症状に応じて適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として最大 50mg ずつ、1 日用量は最大 200mg までとし、いずれも 1 日 1 回又は 2 回に分服</p> <p>(c) バルプロ酸ナトリウムを併用しない場合※1</p> <p>(ア) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※2 を併用する場合：最初の 2 週間は 1 日 50mg を 1 日 1 回経口投与し、次の 2 週間は 1 日 100mg を 1 日 2 回に分服、5 週目は 1 日 200mg を 1 日 2 回に分服、6 週目は 1 日 300mg を 1 日 2 回に分服し、7 週目以降は維持用量として 1 日 300～400mg を 1 日 2 回に分服。症状に応じて適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として最大 100mg ずつ、1 日用量は最大 400mg までとし、いずれも 1 日 2 回に分服</p> <p>(イ) (ア) 以外の薬剤※3 を併用する場合：単剤療法の場合に従う。※1：本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、バルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法・用量に従う。※2 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤：フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシム、ロピナビル・リトナビル配合剤（相互作用及び「薬物動態 8.」の項参照）。※3 本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラゾール、オランザピン、ゾニサミド、ガバペンチン、シメチジン、トピラマート、プレガバリン、リチウム、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド（「薬物動態 8.」の項参照）。</p> <p>[小児 (錠小児用 2・5mg, 錠 25・100mg)]</p> <p>てんかん患者に用いる場合</p> <p>(1) 単剤療法の場合（定型欠伸発作に用いる場合）：最初の 2 週間は 1 日 0.3mg/kg を 1 日 1 回又は 2 回に分割して投与し、次の 2 週間は 1 日 0.6mg/kg を 1 日 1 回又は 2 回に分割して投与。その後は、1～2 週間毎に 1 日量として最大 0.6mg/kg ずつ漸増する。維持用量は 1 日 1～10mg/kg とし、1 日 1 回又は 2 回に分割して投与。増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として最大 0.6mg/kg ずつ、1 日用量は最大</p>

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>200mgまで、いずれも1日1回又は2回に分割して投与。 (2) パルプロ酸ナトリウムを併用する場合：最初の2週間は1日0.15mg/kgを1日1回経口投与し、次の2週間は1日0.3mg/kgを1日1回経口投与。その後は、1～2週間ごとに1日量として最大0.3mg/kgずつ漸増。維持用量は、パルプロ酸ナトリウムに加えて本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※2を併用する場合は1日1～5mg/kgとし、本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※2を併用していない場合は1日1～3mg/kgとし、1日2回に分服。なお、1日用量は最大200mgまで (3) パルプロ酸ナトリウムを併用しない場合※1 (a) 本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※2を併用する場合：最初の2週間は1日0.6mg/kgを1日2回に分服し、次の2週間は1日1.2mg/kgを1日2回に分服。その後は、1～2週間ごとに1日量として最大1.2mg/kgずつ漸増。維持用量は1日5～15mg/kgとし、1日2回に分服。なお、1日用量は最大400mgまで (b) (a)以外の薬剤※3を併用する場合：パルプロ酸ナトリウムを併用する場合に従う。※1：本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、パルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法・用量に従う。※2本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤：フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤（相互作用及び「薬物動態8.」の項参照）。※3本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラゾール、オランザピン、ゾニサミド、ガバペンチン、シメチジン、トピラマト、プレガバリン、リチウム、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド（「薬物動態8.」の項参照）</p>
<p>レベチラセタム <u>イーケブラ錠 500mg (院外)</u> E Keppra (大塚) 500mg/T 【薬価】 124.30 円/T <u>②レベチラセタム錠 500mg「明治」(院内)</u> Levetiracetam (Meiji Seika) 500mg/T 【薬価】 46.00 円/T 【先発品】 イーケブラ錠 500mg</p>	<p>【効】 てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【用】(内) 1日1000mgを1日2回に分割。1日3000mgまで、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg以下ずつ。小児：4歳以上の小児：1日20mg/kgを1日2回に分割。1日60mg/kgまで。増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg以下ずつ行う。体重50kg以上の小児：成人と同じ用法・用量を用いる</p>
<p>レベチラセタム <u>イーケブラドライシロップ 50% (院外)</u> E Keppra (大塚) 50%1g 【薬価】 145.60 円/g</p>	<p>【効】 てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【用】(内) 〈部分発作（二次性全般化発作を含む）〉1日1000mg（ドライシロップとして2g）を1日2回に分けて用時溶解。症状により1日3000mg（ドライシロップとして6g）を超えない、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg（ドライシロップとして2g）以下ずつ行う。小児（生後6か月以上）：1日20mg/kg（ドライシロップとして40mg/kg）を1日2回に分けて用時溶解。症状により1日60mg/kg（ドライシロップとして120mg/kg）を超えない、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg（ドライシロップとして40mg/kg）以下ずつ行う。体重50kg以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。小児（生後1か月以上6か月未満）：1日14mg/kg（ドライシロップとして28mg/kg）を1日2回に分けて用時溶解。症状により1日42mg/kg（ドライシロップとして84mg/kg）を超えない、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として14mg/kg（ドライシロップとして28mg/kg）以下ずつ行う。〈強直間代発作〉1日1000mg（ドライシロップとして2g）を1日2回に分けて用時溶解。症状により1日3000mg（ドライシロップとして6g）を超えない範囲で適宜増減するが、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg（ドライシロップとして2g）以下ずつ行う。小児（4歳以上）：1日20mg/kg（ドライシロップとして40mg/kg）を1日2回に分けて用時溶解。なお、症状により1日60mg/kg（ドライシロップとして120mg/kg）を超えない、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg（ドライシロップとして40mg/kg）以下ずつ行う。体重50kg以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レベチラセタム <u>⑨レベチラセタム DS50%「サワイ」(院内)</u> Levetiracetam (沢井) 50% 500mg/g 【薬価】 69.20 円/g 【先発品】 イーケプラドライシロップ 50%	【効】 てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 【用】(内) 1日1000mgを1日2回に分けて用時溶解して、1日3000mgまで、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として1000mg以下ずつ、小児：4歳以上の小児には1日20mg/kgを1日2回に分けて用時溶解して、1日60mg/kgまで、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として20mg/kg以下ずつ行う、体重50kg以上の小児：成人と同じ用法・用量を用いる
<u>⑨ヒダントールF配合錠</u> Hydantol F (藤永) 1錠 【薬価】 5.90 円/T 12錠中： フェントイン 300mg フェノバルビタール 100mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 200mg	【効】 ①てんかんの痙攣発作：強直間代発作(全般痙攣発作、大発作)、焦点発作(ジャクソン型発作を含む)、②自律神経発作、精神運動発作 【用】(内) 1日6～12錠を分割

114. 解熱鎮痛消炎剤

1141. アニリン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アセトアミノフェン <u>⑨アセリオ静注液 1000mgバッグ</u> Acelio (テルモ) 1000mg/100mL/V 【薬価】 304.00 円/袋	【効】 経口製剤及び坐剤の投与が困難な場合における疼痛及び発熱 【用】(注) 次記のとおり本剤を15分かけて静脈内投与 <成人における疼痛> 1回300～1000mgを15分かけて静脈内投与し、投与間隔は4～6時間以上とする。1日総量として4000mgまで、体重50kg未満の成人：1回15mg/kgを上限として静脈内投与し、投与間隔は4～6時間以上とする。1日総量として60mg/kgまで、 <成人における発熱> 1回300～500mgを15分かけて静脈内投与し、投与間隔は4～6時間以上とする。1日2回までとし、1日最大1500mgまで。 <2歳以上の幼児及び小児における疼痛及び発熱> 1回10～15mg/kgを15分かけて静脈内投与し、投与間隔は4～6時間以上とする。1日総量として60mg/kgまで、成人の用量を超えない。 <乳児及び2歳未満の幼児における疼痛及び発熱> 1回7.5mg/kgを15分かけて静脈内投与し、投与間隔は4～6時間以上とする。1日総量として30mg/kgまで
アセトアミノフェン <u>⑨アンヒバ坐剤小児用 100mg</u> Anhiba (ヴィアトリス) 100mg/個 【薬価】 19.70 円/個 <u>⑨アンヒバ坐剤小児用 200mg</u> Anhiba (ヴィアトリス) 200mg/個 【薬価】 20.30 円/個	【効】 小児科領域における解熱・鎮痛 【用】(外) 乳児・幼児・小児：1回10～15mg/kgを直腸内に挿入、投与間隔4～6時間以上、1日総量として60mg/kgを限度、成人の用量を超えない
アセトアミノフェン <u>⑨カロナール細粒 50%</u> Calonal (あゆみ) 100g 【薬価】 13.60 円/g	【効】 ①各種疾患及び症状における鎮痛、②次記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)、③小児科領域における解熱・鎮痛 【用】(内) ①1回300～1000mg、投与間隔は4～6時間以上とし、1日総量4000mgまで、空腹時投与禁止希望、②1回300～500mgを頓用、1日2回まで、1日1500mgまで、空腹時投与禁止希望、③乳児、幼児及び小児：1回10～15mg/kg、投与間隔は4～6時間以上とし、1日総量60mg/kgまで、成人の用量を超えない、空腹時投与禁止希望

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アセトアミノフェン ㊞カロナール錠 200 Calonal (あゆみ) 200mg/T 【薬価】 6.70 円 / T	【効】 ①各種疾患及び症状における鎮痛. ②次記疾患の解熱・鎮痛:急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む). ③小児科領域における解熱・鎮痛 【用】(内) ① 1回 300～1000mg, 投与間隔は4～6時間以上とし, 1日総量4000mgまで, 空腹時投与禁止希望. ② 1回 300～500mgを頓用. 1日2回まで, 1日1500mgまで. 空腹時投与禁止希望. ③幼児及び小児:1回10～15mg/kg. 投与間隔は4～6時間以上とし, 1日総量60mg/kgまで. 成人の用量を超えない. 空腹時投与禁止希望
アセトアミノフェン ㊞カロナール坐剤 400 Calonal (あゆみ) 400mg/個 【薬価】 50.40 円 / 個	【効】 小児科領域における解熱・鎮痛 【用】(外) 乳児・幼児・小児:1回10～15mg/kgを直腸内に挿入. 投与間隔4～6時間以上, 1日総量として60mg/kgを限度. 成人の用量を超えない
メフェナム酸 ㊞ポンタールシロップ 3.25% Pontal (第一三共) 3.25%500mL/本 【薬価】 6.50 円 / mL	【効】 次記疾患の解熱・鎮痛:急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) 【用】(内) 小児:1回6.5mg/kg(本剤として0.2mL/kg)を頓用. 1日2回まで. 空腹時の投与禁止希望

1143. サリチル酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アスピリン ㊞アスピリン「ヨシダ」 Aspirin (吉田) 末 【薬価】 4.91 円 / g	【効】 ①関節リウマチ, リウマチ熱, 変形性関節症, 強直性脊椎炎, 関節周囲炎, 結合織炎, 術後疼痛, 歯痛, 症候性神経痛, 関節痛, 腰痛症, 筋肉痛, 捻挫痛, 打撲痛, 痛風による痛み, 頭痛, 月経痛. ②次の疾患の解熱・鎮痛:急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む). ③川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む) 【用】(内) ① 1回0.5～1.5g, 1日1.0～4.5g, 1日4.5gまで. ② 1回0.5～1.5gを頓用, 1日2回まで, 1日4.5gまで. 空腹時の投与は避けさせることが望ましい. ③急性期有熱期間:1日30～50mg/kgを3回に分割. 解熱後の回復期から慢性期:1日3～5mg/kgを1回

1145. インドメタシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インドメタシン ㊞インテバン坐剤 25 (院外) Inteban (帝國製薬) 25mg/個 【薬価】 19.70 円 / 個 ㊞インテバン坐剤 50 Inteban (帝國製薬) 50mg/個 【薬価】 19.70 円 / 個	【効】 ①次記の疾患の消炎, 鎮痛:関節リウマチ, 変形性関節症. ②手術後の炎症及び腫脹の緩解 【用】(外) 1回25～50mgを1日1～2回直腸内に. 低体温によるショックを起こすことがあるので, 高齢者に投与する場合には, 少量から投与を開始
インドメタシンフェルネシル ㊞インフリー S カプセル 200mg (院外) Infree S (エーザイ) 200mg/C 【薬価】 20.60 円 / cap	【効】 次の疾患並びに症状の消炎・鎮痛:関節リウマチ, 変形性関節症, 腰痛症, 肩関節周囲炎, 頸肩腕症候群 【用】(内) 1回200mgを朝夕1日2回食後

1147. フェニル酢酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジクロフェナクナトリウム <u>ジクトルテープ 75mg</u> Zicthoru (久光) 75mg/枚 【薬価】 154.50円/枚	【効】 ①各種がんにおける鎮痛。②腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎 【用】(外) ① 1日1回，2枚を胸部，腹部，上腕部，背部，腰部又は大腿部に貼付し，1日(約24時間)毎に貼り替える。症状や状態により1日3枚に増量可。② 1日1回，1枚又は2枚を胸部，腹部，上腕部，背部，腰部又は大腿部に貼付し，1日(約24時間)毎に貼り替える
ジクロフェナクナトリウム <u>ボルタレン錠 25mg (院外)</u> Ⓢ Voltaren (ノバルティス) 25mg/T 【薬価】 7.90円/T <u>後ジクロフェナク Na 錠 25mg 「YD」</u> Ⓢ Diclofenac sodium (陽進堂) 25mg/T 【薬価】 5.70円/T 【先発品】 ボルタレン錠 25mg	【効】 ①次記の疾患並びに症状の鎮痛・消炎：関節リウマチ，変形性関節症，変形性脊椎症，腰痛症，腱鞘炎，頸肩腕症候群，神経痛，後陣痛，骨盤内炎症，月経困難症，膀胱炎，前眼部炎症，歯痛。②手術並びに抜歯後の鎮痛・消炎。③次記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) 【用】(内) ①② 1日量75～100mgとし3回に分割。頓用する場合には25～50mg。空腹時の投与は避けさせることが望ましい。③ 1回量25～50mgを頓用。1日2回までとし，1日100mgまで。空腹時の投与は避けさせることが望ましい
ジクロフェナクナトリウム <u>ボルタレン SR カプセル 37.5mg (院外)</u> Ⓢ Voltaren SR (ノバルティス) 37.5mg/cap 【薬価】 8.80円/cap	【効】 次記の疾患ならびに症状の消炎・鎮痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群 【用】(内) 1回37.5mgを1日2回食後
ジクロフェナクナトリウム <u>ボルタレンサボ 25mg (院外)</u> Ⓢ Voltaren (ノバルティス) 25mg/個 【薬価】 25.50円/個 <u>ボルタレンサボ 50mg (院外)</u> Ⓢ Voltaren (ノバルティス) 50mg/個 【薬価】 29.00円/個 <u>後ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」</u> Ⓢ Diclofenac sodium (日本ジェネリック) 25mg/個 【薬価】 20.30円/個 【先発品】 ボルタレンサボ 25mg <u>後ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「JG」</u> Ⓢ Diclofenac sodium (日本ジェネリック) 50mg/個 【薬価】 20.30円/個 【先発品】 ボルタレンサボ 50mg	【効】 ①次記の疾患並びに症状の鎮痛・消炎：関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，後陣痛。②手術後の鎮痛・消炎。③他の解熱剤では効果が期待できないか，あるいは，他の解熱剤の投与が不可能な場合の急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)の緊急解熱 【用】(外) 1回25～50mgを1日1～2回，直腸内に挿入するが，年齢，症状に応じ低用量投与が望ましい。低体温によるショックを起こすことがあるので，高齢者に投与する場合には少量から開始。小児：1回0.5～1.0mg/kgを1日1～2回，直腸内に挿入。年齢，症状に応じ低用量投与が望ましい。低体温によるショックを起こすことがあるので，少量から開始。年齢別投与量の目安は1回量として次記のとおり。1歳以上3歳未満：6.25mg。3歳以上6歳未満：6.25mg～12.5mg。6歳以上9歳未満：12.5mg。9歳以上12歳未満：12.5mg～25mg

11. 中枢神経系用薬

1149. その他の解熱鎮痛消炎剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>イブプロフェン ブルフェン錠 100 Brufen (科研) 100mg/T 【薬価】5.90 円 /T</p>	<p>【効】①次記疾患並びに症状の消炎・鎮痛：関節リウマチ，関節痛及び関節炎，神経痛及び神経炎，背腰痛，頸腕症候群，子宮付属器炎，月経困難症，紅斑（結節性紅斑，多形滲出性紅斑，遠心性環状紅斑）。②手術後並びに外傷後の消炎・鎮痛。③次記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む） 【用】（内）①②1日量600mgを3回に分割。小児：5～7歳1日量200～300mg，8～10歳1日量300～400mg，11～15歳1日量400～600mgを3回に分割。空腹時投与禁止希望。③1回量200mgを頓用。1日2回までとし，1日600mgまで。空腹時投与禁止希望</p>
<p>エトドラク ハイペン錠 200mg Ⓢ Hypen (日本新薬) 200mg/T 【薬価】14.20 円 /T</p>	<p>【効】①次の疾患並びに症状の消炎・鎮痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸腕症候群，腱鞘炎。②手術後並びに外傷後の消炎・鎮痛 【用】（内）1日量400mgを朝・夕食後の2回に分割</p>
<p>塩酸ペンタゾシン ソセゴン錠 25mg ⓈⓈ Sosegon (丸石) 25mg/T 【薬価】28.40 円 /T</p>	<p>【効】各種癌における鎮痛 【用】（内）1回25～50mg。追加する場合には，3～5時間の間隔をおく</p>
<p>セレコキシブ 後セレコキシブ錠 100mg「トーフ」 Ⓢ Celecoxib (東和薬品) 100mg/T 【薬価】10.50 円 /T 【先発品】セレコックス錠 100mg</p>	<p>【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮痛：①関節リウマチ，②変形性関節症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群，腱・腱鞘炎，③手術後，外傷後並びに抜歯後 【用】（内）①1回100～200mgを1日2回，朝・夕食後。②1回100mgを1日2回，朝・夕食後。③初回のみ400mg，2回目以降は1回200mgとして1日2回。投与間隔は6時間以上あけること。頓用の場合は，初回のみ400mg，以降は200mgを6時間以上あける。1日2回まで</p>
<p>トラマドール塩酸塩 ゾートラム錠 50mg (院外) Ⓢ Twotram (日本臓器) 50mg/T 【薬価】51.70 円 /T</p>	<p>【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記における鎮痛：慢性疼痛，疼痛を伴う各種がん 【用】（内）1日100～300mgを2回に分割。1回200mg，1日400mgまで</p>
<p>トラマドール塩酸塩 トラマール OD 錠 25mg Ⓢ Tramal OD (日本新薬) 25mg/T 【薬価】19.20 円 /T</p>	<p>【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各種癌，慢性疼痛 【用】（内）1日100～300mgを4回に分割。1回100mg，1日400mgまで</p>
<p>ナプロキセン ナイキサン錠 100mg Naixan (田辺三菱) 100mg/T 【薬価】5.90 円 /T</p>	<p>【効】①次記疾患の消炎，鎮痛，解熱：関節リウマチ，変形性関節症，痛風発作，強直性脊椎炎，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群，腱炎・腱鞘炎，月経困難症，帯状疱疹。②外傷後並びに手術後の消炎，鎮痛。③歯科・口腔外科領域における抜歯後並びに小手術後の消炎，鎮痛 【用】（内）1日量300～600mgを2～3回に分割，なるべく空腹時をさけて。痛風発作には初回400～600mg。頓用する場合及び外傷後並びに術後初回には300mg</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ブプレノルフィン <u>ノルスパンテープ 5mg</u> (株)向 Norspan (ムンディ) 5mg/枚 【薬価】 1,579.10 円 / 枚 <u>ノルスパンテープ 10mg</u> (株)向 Norspan (ムンディ) 10mg/枚 【薬価】 2,431.40 円 / 枚	【効】 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記疾患に伴う慢性疼痛における鎮痛：変形性関節症，腰痛症 【用】(外) 前胸部，上背部，上腕外部又は側胸部に貼付し，7日毎に貼り替えて使用，初回貼付用量は5mg，20mgまで
ブプレノルフィン塩酸塩 <u>後ブプレノルフィン注 0.2mg 「日新」</u> (株)向 Buprenorphine (日新製薬) 0.2mg1mL/A 【薬価】 67.00 円 / A 【先発品】 レベタン注 0.2mg	【効】 ①次記疾患並びに状態における鎮痛：(1)術後，各種癌。(2)心筋梗塞症。 ②麻酔補助 【用】(注) ①(1)1回0.2mg～0.3mg(4μg/kg～6μg/kg)を筋注。初回量は0.2mgとすることが望ましい。約6～8時間ごとに反復注射。(2)1回0.2mgを徐々に静注。 ②0.2mg～0.4mg(4μg/kg～8μg/kg)を麻酔導入時に徐々に静注
ブプレノルフィン塩酸塩 <u>レベタン坐剤 0.2mg</u> (株)向 Lepetan (大塚) 0.2mg/個 【薬価】 124.80 円 / 個	【効】 次記疾患並びに状態における鎮痛：①術後，②各種癌 【用】(外) ①1回0.4mgを直腸内に。必要に応じて約8～12時間ごとに反復投与，術直後の激しい疼痛には注射剤を投与し，その後，必要に応じて坐剤を投与，②1回0.2mg又は0.4mgを直腸内に。その後，約8～12時間ごとに反復投与，低用量より開始することが望ましい
フルルビプロフェンアキセチル <u>ロピオン静注 50mg</u> (株)向 Ropion (科研) 50mg5mL/A 【薬価】 278.00 円 / A	【効】 次記疾患並びに状態における鎮痛：術後，各種癌 【用】(注) 1回50mgをできるだけゆっくり静注。必要に応じて反復投与，本剤の使用は経口投与が不可能な場合又は効果が不十分な場合とする
ペンタゾシン <u>ソセゴン注射液 15mg</u> (株)向 Sosegon (丸石) 15mg1mL/A 【薬価】 89.00 円 / A	【効】 ①次記疾患並びに状態における鎮痛：各種癌，術後，心筋梗塞，胃・十二指腸潰瘍，腎・尿路結石，閉塞性動脈炎，胃・尿管・膀胱検査器具使用時，②麻酔前投薬及び麻酔補助 【用】(注) ①1回15mgを筋注又は皮下注，その後，必要に応じて，3～4時間毎に反復注射。②30～60mgを筋注，皮下注，静注
ロキソプロフェンナトリウム水和物 <u>ロキソニン錠 60mg</u> Loxonin (第一三共) 60mg/T 【薬価】 10.10 円 / T <u>後ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「日医工」</u> Loxoprofen sodium (日医工) 60mg/T 【薬価】 9.80 円 / T 【先発品】 ロキソニン錠 60mg，ロキソプロフェン Na 錠 60mg 「ツルハラ」	【効】 ①次記疾患並びに症状の消炎・鎮痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群，歯痛。②手術後，外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎。 ③次記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) 【用】(内) ①②1回60mg，1日3回。頓用の場合は，1回60～120mg，③1回60mgを頓用，1日2回までとし，1日180mgまで。それぞれ空腹時の投与禁止希望

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 ノイロトロピン錠 4 単位 Neurotropin (日本臓器) 4 単位 /T 【薬価】 28.50 円 /T 1 錠中： ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 4.0 ノイロトロピン単位含有</p>	<p>【効】 帯状疱疹後神経痛，腰痛症，頸肩腕症候群，肩関節周囲炎，変形性関節症 【用】 (内) 1 日 4 錠を朝夕 2 回に分割</p>
<p>ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 ノイロトロピン注射液 3.6 単位 Ⓔ Neurotropin (日本臓器) 3mL/A 【薬価】 159.00 円 /A 1 管 (3mL) 中： ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 3.6 ノイロトロピン単位</p>	<p>【効】 ①腰痛症，頸肩腕症候群，症候性神経痛，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，蕁麻疹）に伴うそう痒，アレルギー性鼻炎。②スモン（SMON）後遺症状の冷感・異常知覚・痛み 【用】 (注) ① 1 日 1 回ノイロトロピン単位として，3.6 単位（1 管）を静注，筋注，皮下注。② 1 日 1 回ノイロトロピン単位として，7.2 単位（2 管）を静注</p>
<p>クリアミン配合錠 S0.5 (院外) Ⓒ Cleamine S (日医工) 錠 【薬価】 9.50 円 /T 1 錠中： エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg 無水カフェイン 25mg インプロピルアンチピリン 150mg</p>	<p>【効】 血管性頭痛，片頭痛（家族性片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性・網膜片頭痛を除く），緊張性頭痛 【用】 (内) 1 回 2 錠 1 日 2 ～ 3 回。頭痛発作の前兆がある場合は 2 ～ 4 錠を頓用。1 週間に 20 錠まで</p>
<p>後トアラセット配合錠「DSEP」 Ⓒ Toaraset「DSEP」 (第一三共エスファ) T 【薬価】 7.90 円 /T 【先発品】 ترامセット配合錠 1 錠中： トラマドール塩酸塩 37.5mg アセトアミノフェン 325mg</p>	<p>【効】 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記疾患における鎮痛：①非がん性慢性疼痛。②抜歯後の疼痛 【用】 (内) ① 1 回 1 錠，1 日 4 回。投与間隔は 4 時間以上空ける。1 回 2 錠，1 日 8 錠まで。空腹時の投与禁止希望。② 1 回 2 錠。追加投与の場合は，投与間隔を 4 時間以上空ける。1 回 2 錠，1 日 8 錠まで。空腹時の投与禁止希望</p>
<p>ネオビタカイン注シリンジ 5mL Ⓒ Neo vitacain (田辺三菱) 5mL/筒 【薬価】 343.00 円 /筒 1 シリンジ 5mL 中： ジブカイン塩酸塩 5mg サリチル酸ナトリウム 15mg 臭化カルシウム 10mg</p>	<p>【効】 症候性神経痛，筋肉痛，腰痛症，肩関節周囲炎 【用】 (注) 血管内を避けて局所に注射。顔面頸骨各部：0.5 ～ 1.0mL，肩甲部：1.0 ～ 2.0mL，胸・腰各部：1.0 ～ 2.5mL，その他局所：0.5 ～ 1.0mL</p>

116. 抗パーキンソン剤

1161. アマンタジン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アマンタジン塩酸塩 後アマンタジン塩酸塩細粒 10% 「サワイ」 Amantadine hydrochloride (沢井) 100mg/g 【薬価】 6.50 円 /g 【先発品】 シンメトレル細粒 10% 後アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サ ワイ」 Amantadine hydrochloride (沢井) 50mg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 シンメトレル錠 50mg	【効】 ①パーキンソン症候群、②脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善、③A型インフルエンザウイルス感染症 【用】 (内) ①初期量 1日 100mgを1～2回に分割し、1週間後に維持量として1日 200mgを2回に分割、1日 300mg3回分割まで、②1日 100～150mgを2～3回に分割、③1日 100mgを1～2回に分割、高齢者及び腎障害のある患者では1日 100mgまで

1162. ビペリデン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビペリデン塩酸塩 アキネトン錠 1mg Akineton (大日本住友) 1mg/T 【薬価】 5.70 円 /T	【効】 ①特発性パーキンソニズム、②その他のパーキンソニズム（脳炎後、動脈硬化性、中毒性）、③向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア（遅発性を除く）・アカシジア 【用】 (内) 1回 1mg 1日 2回から開始、その後漸増し1日 3～6mgを分割

1164. レボドパ製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボドパ ドバトン静注 50mg Dopaston (大原) 50mg 20mL/A 【薬価】 339.00 円 /A	【効】 パーキンソン病、パーキンソン症候群 【用】 (注) 1日量 25～50mgを1～2回に分割し、そのままゆっくり静注又は生理食塩液もしくはブドウ糖注射液などに希釈して点滴静注

1169. その他の抗パーキンソン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イストラデフィリン ノウリアスト錠 20mg Nourias (協和キリン) 20mg/T 【薬価】 796.90 円 /T	【効】 レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるウェアリングオフ現象の改善 【用】 (内) レボドパ含有製剤と併用、20mgを1日1回、40mgを1日1回まで
エンタカポン コムタン錠 100mg (院外) Comtan (ノバルティス) 100mg/T 【薬価】 90.60 円 /T 後エンタカポン錠 100mg「JG」 Entacapone (日本ジェネリック) 100mg/T 【薬価】 26.40 円 /T 【先発品】 コムタン錠 100mg	【効】 レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off現象）の改善 【用】 (内) 単独では使用せず、必ずレボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩と併用、1回 100mg、症状により1回 200mg可、1日 8回まで

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>オビカボン オンジェンティス錠 25mg Ⓜ Ongentys (小野) 25mg 【薬価】946.60円/T</p>	<p>【効】レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善 【用】(内) レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩と併用. 25mgを1日1回, レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩の投与前後及び食事の前後1時間以上あけて</p>
<p>カベルゴリン カバサール錠 0.25mg Ⓜ Cabaser (ファイザー) 0.25mg/T 【薬価】41.20円/T</p>	<p>【効】①パーキンソン病. ②乳汁漏出症, 高プロラクチン血性排卵障害, 高プロラクチン血性下垂体腺腫 (外科的処置を必要としない場合に限る). ③産褥性乳汁分泌抑制. ④生殖補助医療に伴う卵巣過剰刺激症候群の発症抑制 【用】(内) ①1日量0.25mgから始め, 2週目には1日量を0.5mgとし, 以後経過を観察しながら, 1週間毎に1日量として0.5mgずつ増量し, 維持量定める. 1日3mgまで, いずれの投与量の場合も1日1回朝食後. ②1週1回 (同一曜日) 就寝前とし, 1回量0.25mgから始め, 以後臨床症状を観察しながら, 少なくとも2週間以上の間隔で1回量を0.25mgずつ増量し, 維持量 (標準1回量0.25~0.75mg) を定める. 1回量の上限は1.0mg. ③1.0mgを胎児娩出後に1回のみ食後. ④1日1回0.5mgを最終的な卵胞成熟の誘発日又は採卵日から7~8日間, 就寝前に投与</p>
<p>カベルゴリン カバサール錠 1.0mg (院外) Ⓜ Cabaser (ファイザー) 1mg/T 【薬価】129.00円/T</p>	<p>【効】①パーキンソン病. ②乳汁漏出症, 高プロラクチン血性排卵障害, 高プロラクチン血性下垂体腺腫 (外科的処置を必要としない場合に限る). ③産褥性乳汁分泌抑制 【用】(内) ①1日量0.25mgから始め, 2週目には1日量を0.5mgとし, 以後経過を観察しながら, 1週間毎に1日量として0.5mgずつ増量し, 維持量定める. 1日3mgまで, いずれの投与量の場合も1日1回朝食後. ②1週1回 (同一曜日) 就寝前とし, 1回量0.25mgから始め, 以後臨床症状を観察しながら, 少なくとも2週間以上の間隔で1回量を0.25mgずつ増量し, 維持量 (標準1回量0.25~0.75mg) を定める. 1回量の上限は1.0mg. ③1.0mgを胎児娩出後に1回のみ食後</p>
<p>サフィナミドメシル酸塩 エクフィナ錠 50mg Ⓜ Equfina (エーザイ) 50mg/T 【薬価】867.90円/T</p>	<p>【効】レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病における wearing off 現象の改善 【用】(内) レボドパ含有製剤と併用. 50mgを1日1回. 症状に応じて100mgを1日1回投与可</p>
<p>ゾニサミド トレリーフ OD 錠 25mg Ⓜ Trierief OD (大日本住友) 25mg/T 【薬価】684.10円/T 後ゾニサミド OD 錠 25mg TRE 「SMPP」 Ⓜ Zonisamide (住友ファーマ) 25mg/T 【薬価】321.30円/T 【先発品】トレリーフ OD 錠 25mg</p>	<p>【効】①パーキンソン病 (レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合). ②レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム (レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合) 【用】(内) レボドパ含有製剤と併用. ①1日1回25mg. パーキンソン病における症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善には, 1日1回50mg. ②1日1回25mg</p>
<p>トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン錠 (2mg) (院外) Artane (ファイザー) 2mg/T 【薬価】8.80円/T</p>	<p>【効】①向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア (遅発性を除く)・アカシジア. ②特発性パーキンソニズム及びその他のパーキンソニズム (脳炎後, 動脈硬化性) 【用】(内) ①1日量2~10mgを3~4回に分割. ②第1日目1mg, 第2日目2mg, 以後1日につき2mgずつ増量し, 1日量6~10mgを維持量として3~4回に分割</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ドロキシドパ ドプス OD 錠 100mg Dops OD (大日本住友) 100mg/T 【薬価】 36.00 円 / T	【効】 ①パーキンソン病 (Yahr 重症度ステージ III) におけるすくみ足, 立ちくらみの改善. ②次記疾患における起立性低血圧, 失神, 立ちくらみの改善: シャイドレーガー症候群, 家族性アミロイドポリニューロパチー. ③起立性低血圧を伴う血液透析患者における次記症状の改善: めまい・ふらつき・立ちくらみ, 倦怠感, 脱力感 【用】 (内) ① 1 日量 100mg, 1 日 1 回より始め, 隔日に 100mg ずつ増量, 最適量を定め維持量とする (標準維持量は 1 日 600mg, 1 日 3 回分割). 1 日 900mg まで. ② 1 日量 200 ~ 300mg を 2 ~ 3 回に分割より始め, 数日から 1 週間毎に 1 日量 100mg ずつ増量, 最適量を定め維持量とする (標準維持量は 1 日 300 ~ 600mg, 1 日 3 回分割). 1 日 900mg まで. ③ 1 回量 200 ~ 400mg を透析開始 30 分から 1 時間前. 1 回量は 400mg まで
プラミベキソール塩酸塩水和物 ビ・シフロール錠 0.125mg BI sifrol (日本ベーリンガー) 0.125mg/T 【薬価】 20.50 円 / T	【効】 ①パーキンソン病. ②中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群 (下肢静止不能症候群) 【用】 (内) ① 1 日量 0.25mg からはじめ, 2 週目に 1 日量を 0.5mg とし, 以後経過を観察しながら, 1 週間毎に 1 日量として 0.5mg ずつ増量し, 維持量 (標準 1 日量 1.5 ~ 4.5mg) を定める. 1 日量が 1.5mg 未満の場合は 2 回に分割して朝夕食後に, 1.5mg 以上の場合は 3 回に分割して毎食後. 1 日量は 4.5mg まで. ② 0.25mg を 1 日 1 回就寝 2 ~ 3 時間前に. 1 日 0.125mg より開始し, 1 日 0.75mg まで. 増量は 1 週間以上の間隔をあけて
プラミベキソール塩酸塩水和物 ミラペックス LA 錠 0.375mg Mirapex-LA (日本ベーリンガー) 0.375mg/T 【薬価】 57.00 円 / T ミラペックス LA 錠 1.5mg Mirapex-LA (日本ベーリンガー) 1.5mg/T 【薬価】 198.40 円 / T	【効】 パーキンソン病 【用】 (内) 1 日量 0.375mg 1 日 1 回食後からはじめ, 2 週目に 1 日量を 0.75mg とし, 以後経過を観察しながら, 1 週間毎に 1 日量として 0.75mg ずつ増量し, 維持量 (標準 1 日量 1.5 ~ 4.5mg 1 日 1 回食後) を定める. 1 日量は 4.5mg まで
プロモクリプチンメシル酸塩 パーロデル錠 2.5mg (院外) Parlodel (田辺三菱) 2.5mg/T 【薬価】 34.20 円 / T	【効】 ①産褥性乳汁分泌抑制, 乳汁漏出症, 高プロラクチン血性排卵障害, 高プロラクチン血性下垂体腺腫 (外科的処置を必要としない場合に限る). ②末端肥大症, 下垂体性巨人症. ③パーキンソン症候群 【用】 (内) ① 1 日 1 回 2.5mg を夕食直後に, 効果をみながら 1 日 5.0 ~ 7.5mg まで漸増し, 2 ~ 3 回に分けて食直後. ② 1 日 2.5 ~ 7.5mg を 2 ~ 3 回に分けて食直後. ③ 1 日 1 回 1.25 又は 2.5mg を朝食直後から始め, 1 又は 2 週毎に 1 日量として 2.5mg ずつ増量し, 維持量 (標準 1 日 15.0 ~ 22.5mg) を定める. 1 日量は 5.0mg の場合は朝食及び夕食直後に, 7.5mg 以上の場合は毎食直後に分割
ラサギリルンメシル酸塩 アジレクト錠 1mg Azilect (武田) 1mg/T 【薬価】 945.00 円 / T	【効】 パーキンソン病 【用】 (内) 1mg を 1 日 1 回
ロチゴチン ニュープロパッチ 4.5mg Neupro (大塚) 4.5mg / 枚 【薬価】 324.40 円 / 枚	【効】 ①パーキンソン病. ②中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群 (下肢静止不能症候群) 【用】 (外) ① 1 日 1 回 4.5mg / 日からはじめ, 以後経過を観察しながら 1 週間毎に 1 日量として 4.5mg ずつ増量し維持量 (標準 1 日量 9mg ~ 36mg) を定める. 1 日量は 36mg まで. 肩, 上腕部, 腹部, 側腹部, 臀部, 大腿部のいずれかの正常な皮膚に貼付し, 24 時間毎に貼り替える. ② 1 日 1 回 2.25mg / 日からはじめ, 以後経過を観察しながら 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として 2.25mg ずつ増量し維持量 (標準 1 日量 4.5mg ~ 6.75mg) を定める. 1 日量は 6.75mg まで. 肩, 上腕部, 腹部, 側腹部, 臀部, 大腿部のいずれかの正常な皮膚に貼付し, 24 時間毎に貼り替える

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ロチゴチン ニュープロパッチ 13.5mg Ⓢ Neupro (大塚) 13.5mg/枚 【薬価】633.50円/枚</p>	<p>【効】パーキンソン病 【用】(外) 1日1回4.5mg/日からはじめ、以後経過を観察しながら1週間毎に1日量として4.5mgずつ増量し維持量(標準1日量9mg～36mg)を定める。1日量は36mgまで。肩、上腕部、腹部、側腹部、臀部、大腿部のいずれかの正常な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える</p>
<p>ロピニロール塩酸塩 ハルロピテープ 8mg Ⓢ Haruropi (協和キリン) 8mg/枚 【薬価】312.90円/枚 ハルロピテープ 32mg Ⓢ Haruropi (協和キリン) 32mg/枚 【薬価】753.10円/枚</p>	<p>【効】パーキンソン病 【用】(外) 1日1回8mgから始め、以後経過を観察しながら、必要に応じて1週間以上の間隔で、1日量として8mgずつ増量。いずれの投与量の場合も1日1回、胸部、腹部、側腹部、大腿部又は上腕部のいずれかの皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。1日量64mgまで</p>
<p>ロピニロール塩酸塩 レキップ CR錠 2mg Ⓢ ReQuip CR (グラクソ・スミスクライン) 2mg/T 【薬価】114.80円/T レキップ CR錠 8mg (院外) Ⓢ ReQuip CR (グラクソ・スミスクライン) 8mg/T 【薬価】381.20円/T</p>	<p>【効】パーキンソン病 【用】(内) 1日1回2mgから始め、2週目に4mg/日とする。以後経過観察しながら、必要に応じ、2mg/日ずつ1週間以上の間隔で増量。いずれの投与量の場合も1日1回。1日量16mgまで</p>
<p>イーシー・ドパール配合錠 EC doparl (協和キリン) 1錠 【薬価】17.30円/T 1錠中： レボドパ 100mg ベンセラジド塩酸塩 28.5mg (ベンセラジドとして25mg)</p>	<p>【効】パーキンソン病、パーキンソン症候群 【用】(内) ①レボドパ未投与例の場合：初回1日量1～3錠を1～3回に分割し食後に投与、2～3日毎に1日量1～2錠ずつ増量し、維持量として1日3～6錠。②レボドパ投与例の場合：初回1日量は投与中のレボドパ量の約1/5に相当するレボドパ量(本剤1錠中レボドパ100mg含有)に切り換え、1～3回に分割し食後に投与、漸増もしくは漸減し、維持量として1日量3～6錠</p>
<p>スタレボ配合錠 L50 Stalevo (ノバルティス) 1錠 【薬価】90.60円/T 1錠中： レボドパ 50mg カルビドパ水和物 5.4mg (カルビドパとして5mg) エンタカポン 100mg スタレボ配合錠 L100 Stalevo (ノバルティス) 1錠 【薬価】90.60円/T 1錠中： レボドパ 100mg カルビドパ水和物 10.8mg (カルビドパとして10mg) エンタカポン 100mg</p>	<p>【効】パーキンソン病〔レボドパ・カルビドパ投与において症状の日内変動(wearing-off現象)が認められる場合〕 【用】(内) レボドパ・カルビドパ・エンタカポンとして1回50mg/5mg/100mg～200mg/20mg/200mgの間で1回1又は2錠。1日総レボドパ量として1,500mg、総カルビドパ量として150mg、総エンタカポン量として1,600mgまで。投与回数は1日8回まで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メネシット配合錠 100 (院外) Menesit (オルガノン) 1錠 【薬価】 12.60 円 / T 1錠中： レボドパ 100mg カルビドパ水和物（無水物として） 10mg	【効】 パーキンソン病，パーキンソン症候群 【用】 (内) ①レボドパ末服用患者：レボドパ量として1回100～125mg，1日100～300mgよりはじめ，毎日又は隔日にレボドパ量として100～125mg宛増量し，最適量を定め維持量（標準維持量：レボドパ量として1回200～250mg，1日3回）とする．レボドパ量として1日1500mgまで．②レボドパ既服用患者：レボドパ単味製剤の服用後，少なくとも8時間の間隔をおいてから，レボドパ1日維持量の約1/5量に相当するレボドパ量を目安として初回量をきめ，1日3回に分割，以後，適宜増減して最適量を定め維持量（標準維持量：レボドパ量として1回200～250mg，1日3回）とする．レボドパ量として1日1500mgまで

117. 精神神経用剤

1171. クロルプロマジン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロルプロマジン塩酸塩 コントミン糖衣錠 12.5mg Contomin (田辺三菱) 12.5mg/T 【薬価】 9.40 円 / T	【効】 統合失調症，躁病，神経症における不安・緊張・抑うつ，悪心・嘔吐，吃逆，破傷風に伴う痙攣，麻酔前投薬，人工冬眠，催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強 【用】 (内) 1日30～100mgを分割．精神科領域において用いる場合には，1日50～450mgを分割
クロルプロマジン塩酸塩 コントミン筋注 10mg Ⓢ Contomin (田辺三菱) 10mg2mL/A 【薬価】 94.00 円 / A	【効】 統合失調症，躁病，神経症における不安・緊張・抑うつ，悪心・嘔吐，吃逆，破傷風に伴う痙攣，麻酔前投薬，人工冬眠，催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強 【用】 (注) 1回10～50mgを緩徐に筋注
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 ウインタミン細粒 (10%) Ⓢ Wintermin (共和) 100mg/g 【薬価】 9.80 円 / g	【効】 統合失調症，躁病，神経症における不安・緊張・抑うつ，悪心・嘔吐，吃逆，破傷風に伴う痙攣，麻酔前投薬，人工冬眠，催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強 【用】 (内) 1日30～100mgを分割．精神科領域において用いる場合には，1日50～450mgを分割．(参考) 小児：発達段階や症状の程度により，個人差が特に著しいが，多くの場合1回0.5～1mg/kgを，1日3～4回をめどとし，症状の程度により加減．生後6か月未満の乳児への使用は避けることが望ましい

1172. フェノチアジン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロクロルペラジンマレイン酸塩 ノバミン錠 5mg Novamin (共和) 5mg/T 【薬価】 9.80 円 / T	【効】 統合失調症，術前・術後等の悪心・嘔吐 【用】 (内) 1日5～20mgを分割．精神科領域において用いる場合には，1日15～45mgを分割．(参考) 幼児・小児：1回2.5mgを1日1～3回．体重15kg以下では1日量が7.5mgを超えないよう注意．生後6か月未満の乳児への使用は避ける
プロクロルペラジンメシル酸塩 ノバミン筋注 5mg Novamin (共和) 5mg1mL/A 【薬価】 59.00 円 / A	【効】 術前・術後等の悪心・嘔吐 【用】 (注) 1日1回5mgを筋注．(参考) 小児：0.1mg/kgを筋注．生後6か月未満の乳児への使用は避けることが望ましい
ペルフェナジン トリラホン錠 2mg Trilafon (共和) 2mg/T 【薬価】 9.80 円 / T	【効】 統合失調症，術前・術後の悪心・嘔吐，メニエル症候群（めまい，耳鳴） 【用】 (内) 1日6～24mgを分割．精神科領域：1日6～48mgを分割

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン錠 (5mg) Hirnamin (共和) 5mg/T 【薬価】 5.70 円 /T ヒルナミン錠 (25mg) Hirnamin (共和) 25mg/T 【薬価】 5.70 円 /T	【効】 統合失調症, 躁病, うつ病における不安・緊張 【用】 (内) 1日 25 ~ 200mgを分割

1174. イミプラミン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イミプラミン塩酸塩 トフラニール錠 10mg (院外) Tofranil (アルフレッサ) 10mg/T 【薬価】 9.80 円 /T	【効】 ①精神科領域におけるうつ病・うつ状態. ②遺尿症 (昼, 夜) 【用】 (内) ① 1日 30 ~ 70mgを初期用量とし, 1日 200mgまで漸増し分割. まれに 300mgまで増量することもある. ②学童は 1日量 30 ~ 50mgを 1 ~ 2回
イミプラミン塩酸塩 トフラニール錠 25mg (院外) Tofranil (アルフレッサ) 25mg/T 【薬価】 10.10 円 /T	【効】 ①精神科領域におけるうつ病・うつ状態. ②遺尿症 (昼, 夜) 【用】 (内) ① 1日 25 ~ 75mgを初期用量とし, 1日 200mgまで漸増し分割. まれに 300mgまで増量することもある. ②幼児は 1日量 25mgを 1回, 学童は 1日量 25 ~ 50mgを 1 ~ 2回
クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール錠 10mg Anafranil (アルフレッサ) 10mg/T 【薬価】 9.60 円 /T	【効】 ①精神科領域におけるうつ病・うつ状態. ②遺尿症. ③ナルコレプシーに伴う情動脱力発作 【用】 (内) ① 1日 50 ~ 100mgを 1 ~ 3回に分割. 1日 225mgまで. ② 6歳未満の幼児: 1日 10 ~ 25mg. 6歳以上の小児: 1日 20 ~ 50mg, 1 ~ 2回に分割. ③ 1日 10 ~ 75mgを 1 ~ 3回に分割

1179. その他の精神神経用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール錠 10 Tryptanol (日医工) 10mg/T 【薬価】 9.80 円 /T トリプタノール錠 25 Tryptanol (日医工) 25mg/T 【薬価】 9.80 円 /T	【効】 ①精神科領域におけるうつ病・うつ状態. ②夜尿症. ③末梢性神経障害性疼痛 【用】 (内) ① 1日 30 ~ 75mgを初期用量とし, 1日 150mgまで漸増し, 分割. まれに 300mgまで増量することもある. ② 1日 10 ~ 30mgを就寝前. ③ 1日 10mgを初期用量とし, 1日 150mgを超えない
アモキサピン アモキシサンカプセル 25mg Ⓢ Amoxan (ファイザー) 25mg/cap 【薬価】 8.60 円 /cap	【効】 うつ病・うつ状態 【用】 (内) 1日 25 ~ 75mgを 1 ~ 数回に分割. 1日量 150mg, 症状が特に重篤な場合には 1日 300mgまで
アリピプラゾール エビリファイ錠 3mg Ⓢ Abilify (大塚) 3mg/T 【薬価】 38.40 円 /T	【効】 ①統合失調症. ②双極性障害における躁症状の改善. ③うつ病・うつ状態 (既存治療で十分な効果が認められない場合に限る). ④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 【用】 (内) ① 1日 6 ~ 12mgを開始用量, 1日 6 ~ 24mgを維持用量とし, 1回又は 2回に分割. 1日 30mgまで. ② 12 ~ 24mgを 1日 1回. 開始用量は 24mgとし, 1日 30mgまで. ③ 3mgを 1日 1回. 増量幅は 1日量として 3mgとし, 1日量は 15mgまで. ④ 1日 1mgを開始用量, 1日 1 ~ 15mgを維持用量とし, 1日 1回. 増量幅は 1日量として最大 3mgとし, 1日量は 15mgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エスシタロプラムシュウ酸塩 <u>⑨</u> 後エスシタロプラム OD 錠 10mg 「サワイ」 ㊟ Escitalopram (沢井) 10mg/T 【薬価】 60.00 円/T	【効】 うつ病・うつ状態, 社会不安障害 【用】 (内) 10mgを1日1回夕食後. 増量は1週間以上の間隔をあけて行い, 1日最高用量は20mgまで
エチゾラム <u>⑨</u> デパス錠 0.5mg (院外) ㊟ Depas (田辺三菱) 0.5mg/T 【薬価】 9.20 円/T <u>⑨</u> 後エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 ㊟ Etizolam (沢井) 0.5mg/T 【薬価】 6.40 円/T 【先発品】 デパス錠 0.5mg	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ・神経衰弱症状・睡眠障害. ②うつ病における不安・緊張・睡眠障害. ③心身症(高血圧症, 胃・十二指腸潰瘍)における身体症候ならびに不安・緊張・抑うつ・睡眠障害. ④統合失調症における睡眠障害. ⑤次記疾患における不安・緊張・抑うつ及び筋緊張: 頸椎症, 腰痛症, 筋収縮性頭痛 【用】 (内) ①② 1日 3mgを3回に分割. ③⑤ 1日 1.5mgを3回に分割. 睡眠障害に用いる場合(①②③④): 1日1~3mgを就寝前に1回. 全ての場合で高齢者は1日1.5mgまで
塩酸セルトラリン <u>⑨</u> ジェイソロフト錠 25mg ㊟ Jzoloft (ヴィアトリス) 25mg/T 【薬価】 50.90 円/T	【効】 うつ病・うつ状態, パニック障害, 外傷後ストレス障害 【用】 (内) 1日 25mgを初期用量とし, 1日 100mgまで漸増し, 1日1回. 1日 100mgまで
オランザピン <u>⑨</u> ジプレキサ細粒 1% (院外) ㊟ Zyprexa (日本イーライリリー) 10mg/g 【薬価】 189.50 円/g <u>⑨</u> ジプレキサザイデリス錠 5mg ㊟ Zyprexa (日本イーライリリー) 5mg/T 【薬価】 103.10 円/T	【効】 ①統合失調症. ②双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善. ③抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心, 嘔吐) 【用】 (内) ① 5~10mgを1日1回より開始. 維持量として1日1回10mg. 1日量は20mgまで. ②双極性障害における躁症状の改善: 10mgを1日1回より開始. 1日量は20mgまで. 双極性障害におけるうつ症状の改善: 5mgを1日1回より開始. その後1日1回10mgに増量. いずれも就寝前に投与. 1日量は20mgまで. ③他の制吐剤との併用において, 5mgを1日1回. 1日量は10mgを超えない

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>クエチアピンフマル酸塩 セロクエル 25mg錠 (院外) Ⓜ Seroquel (アステラス) 25mg/T 【薬価】18.70 円/T セロクエル 100mg錠 (院外) Ⓜ Seroquel (アステラス) 100mg/T 【薬価】43.30 円/T 後クエチアピン錠 25mg 「明治」 Ⓜ Quetiapine (Meiji Seika) 25mg/T 【薬価】10.10 円/T 【先発品】セロクエル 25mg錠 後クエチアピン錠 100mg 「明治」 (院外) Ⓜ Quetiapine (Meiji Seika) 100mg/T 【薬価】24.50 円/T 【先発品】セロクエル 100mg錠</p>	<p>【効】統合失調症 【用】(内) 1回 25mg, 1日2又は3回より開始し, 徐々に増量, 1日量は150～600mgとし, 2又は3回に分割, 1日量として750mgまで</p>
<p>クロチアゼパム リーゼ錠 5mg Ⓜ Rize (田辺三菱) 5mg/T 【薬価】6.40 円/T</p>	<p>【効】①心身症(消化器疾患, 循環器疾患)における身体症候ならびに不安・緊張・心気・抑うつ・睡眠障害, ②自律神経失調症におけるめまい・肩こり・食欲不振, ③麻酔前投薬 【用】(内) ①② 1日15～30mgを3回に分割, ③就寝前又は手術前に10～15mg</p>
<p>炭酸リチウム リーマス錠 100 Ⓜ Limas (大正製薬) 200mg/T 【薬価】8.80 円/T</p>	<p>【効】躁病及び躁うつ病の躁状態 【用】(内) 1日400～600mgより開始し, 1日2～3回に分割, 以後3日ないし1週間毎に, 1日1200mgまでの治療量に漸増, 改善がみられたならば症状を観察しながら, 維持量1日200～800mgの1～3回分割に漸減</p>
<p>デュロキセチン塩酸塩 後デュロキセチンカプセル 20mg 「ニプロ」 Ⓜ Duloxetine (ニプロ) 20mg/cap 【薬価】28.70 円/cap 【先発品】サインバルタカプセル 20mg</p>	<p>【効】①うつ病・うつ状態, ②糖尿病性神経障害に伴う疼痛, ③線維筋痛症に伴う疼痛, ④慢性腰痛症に伴う疼痛, ⑤変形性関節症に伴う疼痛 【用】(内) ①② 1日1回40mgを朝食後, 1日20mgより開始し, 1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量, 1日60mgまで増量可, ③④⑤ 1日1回60mgを朝食後, 1日20mgより開始し, 1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量</p>
<p>トラゾドン塩酸塩 後トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 Ⓜ Trazodone hydrochloride (共和) 25mg/T 【薬価】5.90 円/T 【先発品】レスリン錠 25, デジレル錠 25</p>	<p>【効】うつ病・うつ状態 【用】(内) 1日75～100mgを初期用量とし, 1日200mgまで増量し, 1～数回に分割</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ネモナブリド <u>エミレース錠 3mg (院外)</u> ㊞ Emilace (アステラス) 3mg/T 【薬価】 14.00 円/T	【効】 統合失調症 【用】 (内) 1日 9～36mgを食後に分割, 1日 60mgまで
ノルトリプチリン塩酸塩 <u>ノリトレン錠 10mg (院外)</u> ㊞ Noritren (大日本住友) 10mg/T 【薬価】 5.70 円/T <u>ノリトレン錠 25mg (院外)</u> ㊞ Noritren (大日本住友) 25mg/T 【薬価】 10.10 円/T	【効】 精神科領域におけるうつ病及びうつ状態(内因性うつ病, 反応性うつ病, 退行期うつ病, 神経症性うつ状態, 脳器質性精神障害のうつ状態) 【用】 (内) 初め1回量として10～25mg相当量を1日3回投与するか, その1日量を2回に分割. 必要ある場合は漸次増量. 最大量は1日150mg相当量以内であり, これを2～3回に分割
パロキセチン塩酸塩水和物 <u>パキシル錠 10mg (院外)</u> ㊞ Paxil(グラクソ・スミスクライン) 10mg/T 【薬価】 40.90 円/T <u>パロキセチン錠 10mg 「DSEP」</u> ㊞ Paroxetine (第一三共エスファ) 10mg/T 【薬価】 16.20 円/T 【先発品】 パキシル錠 10mg	【効】 ①うつ病・うつ状態. ②パニック障害. ③強迫性障害. ④社会不安障害. ⑤外傷後ストレス障害 【用】 (内) ①1日1回夕食後, 20～40mg. 1回10～20mgより開始し, 1週ごとに10mg/日ずつ増量. 1日40mgまで. ②1日1回夕食後, 30mg. 1回10mgより開始し, 1週ごとに10mg/日ずつ増量. 1日30mgまで. ③1日1回夕食後, 40mg. 1回20mgより開始し, 1週ごとに10mg/日ずつ増量. 1日50mgまで. ④1日1回夕食後, 20mg. 1回10mgより開始し, 1週ごとに10mg/日ずつ増量. 1日40mgまで. ⑤1日1回夕食後, 20mg. 1回10～20mgより開始し, 1週ごとに10mg/日ずつ増量. 1日40mgまで
ハロペリドール <u>セレネース錠 0.75mg</u> ㊞ Serenace (大日本住友) 0.75mg/T 【薬価】 7.90 円/T	【効】 統合失調症, 躁病 【用】 (内) 1日0.75～2.25mgから始め, 徐々に増量. 維持量として1日3～6mg
ハロペリドール <u>セレネース注 5mg</u> ㊞ Serenace (大日本住友) 5mg1mL/A 【薬価】 91.00 円/A	【効】 統合失調症, 躁病 【用】 (注) 急激な精神運動興奮等で緊急を要する場合に用いる. 1回5mgを1日1～2回筋注又は静注
ヒドロキシジン塩酸塩 <u>アタラックス錠 10mg</u> Atarax (ファイザー) 10mg/T 【薬価】 5.90 円/T	【効】 ①蕁麻疹, 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症). ②神経症における不安・緊張・抑うつ 【用】 (内) ①1日30～60mgを2～3回に分割. ②1日75～150mgを3～4回に分割
ヒドロキシジン塩酸塩 <u>アタラックス-P注射液 (25mg/ml)</u> Atarax-P (ファイザー) 25mg1mL/A 【薬価】 57.00 円/A	【効】 ①神経症における不安・緊張・抑うつ. ②麻酔前投薬. ③術前・術後の悪心・嘔吐の防止 【用】 (注) 静注: 1回25～50mgを必要に応じて4～6時間毎に静注又は点滴静注. 1回の静注量は100mgを超えてはならず, 25mg/分以上の速度で注入しない. 筋注: 1回50～100mgを必要に応じて4～6時間毎に筋注

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>フルボキサミンマレイン酸塩 ルボックス錠 25 Luvox (アッヴィ) 25mg/T 【薬価】16.70 円/T</p>	<p>【効】 うつ病・うつ状態, 強迫性障害, 社会不安障害 【用】 (内) 成人: うつ病・うつ状態, 強迫性障害, 社会不安障害で1日50mgを初期用量とし, 1日150mgまで増量し, 1日2回に分割. 小児: 強迫性障害で8歳以上の小児に, 1日1回25mg就寝前経口投与から開始. 1週間以上の間隔をあけて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与. 1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが, 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として25mgずつ</p>
<p>プレクスピプラゾール レキサルティ錠 1mg【経過措置】 Ⓢ Rexulti (大塚) 1mg/T 【薬価】241.80 円/T</p>	<p>【効】 ①統合失調症. ②うつ病・うつ状態 (既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) 【用】 (内) ①1日1回1mgから開始し, 4日以上の間隔をあけて増量し, 1日1回2mg. ②1日1回1mg. 忍容性に問題がなく, 十分な効果が認められない場合に限り, 1日量2mgに増量可</p>
<p>プロナンセリン ロナセン錠 4mg (院外) Ⓢ Lonasen (大日本住友) 4mg/T 【薬価】87.70 円/T</p>	<p>【効】 統合失調症 【用】 (内) 成人: 1回4mg, 1日2回食後より開始し, 徐々に増量. 維持量として1日8~16mgを2回に分けて食後. 1日24mgまで. 小児: 1回2mg, 1日2回食後より開始し, 徐々に増量. 維持量として1日8~16mgを2回に分けて食後. 1日16mgまで</p>
<p>プロナンセリン ロナセンテープ 20mg Ⓢ Lonasen (住友ファーマ) 20mg/枚 【薬価】239.40 円/枚</p>	<p>【効】 統合失調症 【用】 (外) 40mgを1日1回貼付, 最大80mgを1日1回貼付可. 1日量は80mgまで. 胸部, 腹部, 背部のいずれかに貼付し, 24時間ごとに貼り替える</p>
<p>ブロムペリドール 後ブロムペリドール錠 1mg「サワイ」(院外) Ⓢ Bromperidol (沢井) 1mg/T 【薬価】5.70 円/T</p>	<p>【効】 統合失調症 【用】 (内) 1日3~18mg. 1日36mgまで</p>
<p>ベンラファキシン塩酸塩 イフェクサー SR カプセル 37.5mg (院外) Ⓢ Effexor SR (ヴィアトリス) 37.5mg/T 【薬価】108.40 円/cap イフェクサー SR カプセル 75mg (院外) Ⓢ Effexor SR (ヴィアトリス) 75mg/C 【薬価】179.10 円/cap</p>	<p>【効】 うつ病・うつ状態 【用】 (内) 1日37.5mgを初期用量とし, 1週後より1日75mgを1日1回食後. 年齢, 症状に応じ1日225mgを超えない範囲で適宜増減, 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75mgずつ</p>
<p>ミアンセリン塩酸塩 テトラミド錠 10mg Tetramide (MSD) 10mg/T 【薬価】10.10 円/T</p>	<p>【効】 うつ病・うつ状態 【用】 (内) 1日30mgを初期用量とし, 1日60mgまで増量し, 分割. 前記用量は1日1回夕食後あるいは就寝前に投与できる</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ミルタザピン <u>②</u> ミルタザピンOD錠15mg「トロー」 ㊞ Mirtazapine” TOWA” (東和薬品) 15mg/T 【薬価】 17.90 円/T 【先発品】 レメロン錠15mg, リフレックス錠15mg	【効】 うつ病・うつ状態 【用】 (内) 1日15mgを初期用量とし, 15～30mgを1日1回就寝前. 1日45mgまで. 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として15mgずつ
リスペリドン <u>②</u> リスパダール錠1mg ㊞ Risperdal (ヤンセン) 1mg/T 【薬価】 14.20 円/T <u>②</u> リスパダール内用液1mg/mL ㊞ Risperdal (ヤンセン) 1mg1mL/包 【薬価】 37.50 円/mL	【効】 ①統合失調症. ②小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 【用】 (内) ①1回1mg1日2回より始め, 徐々に増量. 維持量は1日2～6mgを原則として1日2回に分割. 1日量は12mgまで, ②体重15kg以上20kg未満の患者: 1日1回0.25mgより開始し, 4日目より1日0.5mgを1日2回に分けて経口投与. 増量する場合は1週間以上の間隔をあけて1日量として0.25mgずつ増量. 1日量は1mgを超えない. 体重20kg以上の患者: 1日1回0.5mgより開始し, 4日目より1日1mgを1日2回に分けて経口投与. 増量する場合は1週間以上の間隔をあけて1日量として0.5mgずつ増量. 1日量は, 体重20kg以上45kg未満の場合は2.5mg, 45kg以上の場合は3mgを超えない
ルラシドン塩酸塩 <u>②</u> ラツダ錠20mg (院外) ㊞ Latuda (住友ファーマ) 20mg/T 【薬価】 163.00 円/T	【効】 ①統合失調症. ②双極性障害におけるうつ症状の改善 【用】 (内) ①40mgを1日1回食後. 1日量は80mgまで. ②20～60mgを1日1回食後. 開始用量は20mg, 増量幅は1日量として20mgとし, 1日量は60mgまで

118. 総合感冒剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<u>②</u> PL配合顆粒 ㊞ PL (塩野義) 1g/包 【薬価】 6.50 円/g 1g中: サリチルアミド 270mg アセトアミノフェン 150mg 無水カフェイン 60mg プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 13.5mg	【効】 感冒若しくは上気道炎に伴う次記症状の改善及び緩和: 鼻汁, 鼻閉, 咽・喉頭痛, 頭痛, 関節痛, 筋肉痛, 発熱 【用】 (内) 1回1gを1日4回

119. その他の中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エダラボン <u>②</u> エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 Edaravone (ニプロ) 30mg100mL/袋 【薬価】 1,174.00 円/キット 【先発品】 ラジカット点滴静注バッグ30mg	【効】 脳梗塞急性期に伴う神経症候, 日常生活動作障害, 機能障害の改善 【用】 (注) 1回30mgを, 30分かけて1日朝夕2回の点滴静注. 発症後24時間以内に投与を開始し, 投与期間は14日以内

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>エダラボン <u>ラジカット点滴静注バッグ 30mg</u> Radicut (田辺三菱) 30mg/ バッグ 【薬価】 2,019.00 円 / キット</p>	<p>【効】 ①脳梗塞急性期に伴う神経症候, 日常生活動作障害, 機能障害の改善. ②筋萎縮性側索硬化症 (ALS) における機能障害の進行抑制 【用】 (注) ① 1 回 30mg を, 30 分かけて 1 日朝夕 2 回の点滴静注. 発症後 24 時間以内に投与を開始し, 期間は 14 日以内. ② 1 回 60mg を, 60 分かけて 1 日 1 回点滴静注. 投与期と休業期を組み合わせた 28 日間を 1 クールとし, これを繰り返す. 第 1 クールは 14 日間連日投与する投与期の後 14 日間休業し, 第 2 クール以降は 14 日間のうち 10 日間投与する投与期の後 14 日間休業する</p>
<p>エダラボン <u>ラジカット内用懸濁液 2.1%</u> Radicut (田辺三菱) 35mL/ 瓶 【薬価】 2,744.00 円 / mL <u>ラジカット内用懸濁液 2.1%</u> Radicut (田辺三菱) 50mL/ 瓶 【薬価】 2,744.00 円 / mL</p>	<p>【効】 筋萎縮性側索硬化症 (ALS) における機能障害の進行抑制 【用】 (内) 1 回 105mg (本剤として 5mL) を空腹時に 1 日 1 回. 本剤投与期と休業期を組み合わせた 28 日間を 1 クールとし, これを繰り返す. 第 1 クールは 14 日間連日投与する投与期の後 14 日間休業し, 第 2 クール以降は 14 日間のうち 10 日間投与する投与期の後 14 日間休業</p>
<p>オフアットマブ (遺伝子組換え) <u>ケシンブタ皮下注 20mgペン</u> Ⓢ Kesimpta (ノバルティス) 20mg0.4mL/ キット 【薬価】 230,860.00 円 / キット</p>	<p>【効】 次記患者における再発予防及び身体的障害の進行抑制: 再発寛解型多発性硬化症, 疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症 【用】 (注) 1 回 20mg を初回, 1 週後, 2 週後, 4 週後に皮下注, 以降は 4 週間隔で皮下注</p>
<p>ガランタミン臭化水素酸塩 <u>後ガランタミン OD 錠 4mg</u> 「DSEP」 Ⓢ Galantamine (第一三共エスファ) 4mg/T 【薬価】 20.60 円 / T 【先発品】 レミニール OD 錠 4mg <u>後ガランタミン OD 錠 8mg</u> 「DSEP」 Ⓢ Galantamine (第一三共エスファ) 8mg/T 【薬価】 26.60 円 / T 【先発品】 レミニール OD 錠 8mg <u>後ガランタミン OD 錠 12mg</u> 「DSEP」 Ⓢ Galantamine (第一三共エスファ) 12mg/T 【薬価】 30.90 円 / T 【先発品】 レミニール OD 錠 12mg</p>	<p>【効】 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制 【用】 (内) 1 日 8mg (1 回 4mg を 1 日 2 回) から開始し, 4 週間後に 1 日 16mg (1 回 8mg を 1 日 2 回) に増量. 1 日 24mg (1 回 12mg を 1 日 2 回) まで増量できるが, 増量する場合は変更前の用量で 4 週間以上投与した後に増量</p>
<p>ガルカネズマブ (遺伝子組換え) <u>エムガルティ皮下注 120mgオートインジェクター</u> Ⓢ Emgality (第一三共) 120mg/ 筒 【薬価】 42,638.00 円 / キット</p>	<p>【効】 片頭痛発作の発症抑制 【用】 (注) 初回に 240mg を皮下注, 以降は 1 か月間隔で 120mg を皮下注</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スボレキサント <u>ベルソムラ錠 15mg</u> Belsomra (MSD) 15mg/T 【薬価】 90.80 円 /T <u>ベルソムラ錠 20mg</u> Belsomra (MSD) 20mg/T 【薬価】 109.90 円 /T	【効】 不眠症 【用】 (内) 1日1回20mg, 高齢者:1日1回15mg. 就寝直前
タルチレリン水和物 <u>セレジスト OD 錠 5mg</u> Ceredist OD (田辺三菱) 5mg/T 【薬価】 715.30 円 /T	【効】 脊髄小脳変性症における運動失調の改善 【用】 (内) 1回5mgを1日2回朝夕食後
チアプリド塩酸塩 <u>グラマリール細粒 10% (院外)</u> Gramalil (アステラス) 100mg/g 【薬価】 21.30 円 /g <u>グラマリール錠 25mg (院外)</u> Gramalil (アステラス) 25mg/T 【薬価】 13.60 円 /T <u>②チアプリド細粒 10% 「サワイ」</u> Tiapride (沢井) 100mg/g 【薬価】 11.20 円 /g 【先発品】 グラマリール細粒 10% <u>②チアプリド錠 25mg 「サワイ」</u> Tiapride (沢井) 25mg/T 【薬価】 7.90 円 /T 【先発品】 グラマリール錠 25mg	【効】 ①脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為, 精神興奮, 徘徊, せん妄の改善. ②特発性ジスキネジア及びパーキンソニズムに伴うジスキネジア 【用】 (内) 1日75mg~150mgを3回に分割. パーキンソニズムに伴うジスキネジアの患者では, 1日1回, 25mgから開始することが望ましい
ドネペジル塩酸塩 <u>アリセプト D 錠 10mg (院外)</u> Ⓒ Aricept D (エーザイ) 10mg/T 【薬価】 148.50 円 /T <u>②ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg「ケミファ」</u> Ⓒ Donepezil hydrochloride OD (日本ケミファ) 3mg/T 【薬価】 32.30 円 /T 【先発品】 アリセプト D 錠 3mg <u>②ドネペジル塩酸塩 OD 錠 5mg「ケミファ」</u> Ⓒ Donepezil hydrochloride OD (日本ケミファ) 5mg/T 【薬価】 48.30 円 /T 【先発品】 アリセプト D 錠 5mg	【効】 ①アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制. ②レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制 【用】 (内) ①1日1回3mgから開始し, 1~2週間後に5mgに増量. 高度のアルツハイマー型認知症患者には, 5mgで4週間以上経過後, 10mgに増量. 症状により適宜減量. ②1日1回3mgから開始し, 1~2週間後に5mgに増量. 5mgで4週間以上経過後, 10mgに増量. 症状により5mgまで減量できる. 投与開始12週間後までを目安に, 認知機能検査, 患者及び家族・介護者から自覚症状の聴取等による有効性評価を行い, 認知機能, 精神症状・行動障害, 日常生活動作等を総合的に評価してベネフィットがリスクを上回ると判断できない場合は, 投与を中止. 投与開始12週間後までの有効性評価の結果に基づき投与継続を判断した場合であっても, 定期的に有効性評価を行い, 投与継続の可否を判断

11. 中枢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ドネペジル塩酸塩 アリドネパッチ 27.5mg Ⓜ Allydone (興和) 27.5mg/枚 【薬価】286.40円/枚 アリドネパッチ 55mg Ⓜ Allydone (興和) 55mg/枚 【薬価】437.60円/枚</p>	<p>【効】アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制 【用】(外) 軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者には、1日1回27.5mgを貼付。高度のアルツハイマー型認知症患者には、27.5mgで4週間以上経過後、55mgに増量。症状により1日1回27.5mgに減量できる。背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える</p>
<p>ナルフラフィン塩酸塩 レミッチ OD錠 2.5μg Ⓜ Remitch OD (鳥居) 2.5μg 【薬価】599.30円/T</p>	<p>【効】次の患者におけるそう痒症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）：透析患者、慢性肝疾患患者 【用】(内) 1日1回2.5μgを夕食後又は就寝前、1日1回5μgまで</p>
<p>フマル酸ジメチル テクフィデラカプセル 120mg Tecfidera (バイオジェン) 120mg/C 【薬価】2,061.70円/cap テクフィデラカプセル 240mg Tecfidera (バイオジェン) 240mg/C 【薬価】4,132.00円/cap</p>	<p>【効】多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制 【用】(内) 1回120mgを1日2回から開始、1週間後に1回240mg1日2回に増量。いずれも朝・夕食後</p>
<p>プレガバリン プレガバリン OD錠 25mg 「DSEP」 Pregabalin OD (第一三共エスファ) 25mg/T 【薬価】8.00円/T 【先発品】リリカ OD錠 25mg プレガバリン OD錠 75mg 「DSEP」 Pregabalin OD (第一三共エスファ) 75mg/T 【薬価】20.90円/T 【先発品】リリカ OD錠 75mg</p>	<p>【効】①神経障害性疼痛。②線維筋痛症に伴う疼痛 【用】(内) ①初期用量として1日150mgを1日2回に分割し、その後1週間以上かけて1日用量として300mgまで漸増。1日最高用量は600mgを超えない、いずれも1日2回に分割。②初期用量として1日150mgを1日2回に分割し、その後1週間以上かけて1日用量として300mgまで漸増した後、300～450mgで維持。1日最高用量は450mgを超えない、いずれも1日2回に分割</p>
<p>ミロガバリンベシル酸塩 タリージェ錠 15mg Tarlige (第一三共) 5mg/T 【薬価】154.80円/T</p>	<p>【効】神経障害性疼痛 【用】(内) 初期用量1回5mgを1日2回、その後1回用量として5mgずつ1週間以上の間隔をあけて漸増し、1回15mgを1日2回</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>メマンチン塩酸塩 <u>②</u> メマンチン塩酸塩 OD錠 5mg「サンド」 ㊞ Memantine hydrochlorid (サンド) 5mg/T 【薬価】 15.40 円/T 【先発品】 メマリー OD錠 5mg <u>②</u> メマンチン塩酸塩 OD錠 20mg「サンド」 ㊞ Memantine hydrochlorid (サンド) 20mg/T 【薬価】 52.30 円/T 【先発品】 メマリー OD錠 20mg</p>	<p>【効】 中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制 【用】 (内) 1日1回5mgから開始し、1週間に5mgずつ増量し、維持量として1日1回20mg</p>
<p>ラスミジタンコハク酸塩 レイボー錠 100mg ㊞ Reyvow (日本イーライリリー) 100mg/T 【薬価】 570.90 円/T</p>	<p>【効】 片頭痛 【用】 (内) 1回100mgを片頭痛発作時、患者の状態に応じて1回50mg又は200mgを投与することができる。頭痛の消失後に再発した場合は、24時間あたりの総投与量が200mgを超えない範囲で再投与できる</p>
<p>ラメルテオン <u>②</u> ラメルテオン錠 8mg「杏林」 Ramelteon (杏林) 8mg/T 【薬価】 24.40 円/T 【先発品】 ロゼレム錠 8mg</p>	<p>【効】 不眠症における入眠困難の改善 【用】 (内) 1回8mgを就寝前</p>
<p>リバスチグミン イクセロンパッチ 9mg ㊞ Exelon (ノバルティス) 9mg/枚 【薬価】 194.80 円/枚 イクセロンパッチ 18mg ㊞ Exelon (ノバルティス) 18mg/枚 【薬価】 216.60 円/枚</p>	<p>【効】 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制 【用】 (外) 1日1回4.5mgから開始し、4週毎に4.5mgずつ増量し、維持量として1日1回18mgを貼付。患者の状態に応じて、1日1回9mgを開始用量とし、4週後に18mgに増量も可能。背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える</p>
<p>リルゾール <u>②</u> リルゾール錠 50mg「ニプロ」 Riluzole (ニプロ ES) 50mg/T 【薬価】 420.10 円/T 【先発品】 リルテック錠 50</p>	<p>【効】 ①筋萎縮性側索硬化症 (ALS) の治療。②筋萎縮性側索硬化症 (ALS) の病勢進展の抑制 【用】 (内) 1回50mg、1日2回朝食前、1日量100mg</p>
<p>レンボレキサント デヒビゴ錠 5mg Dayvigo (エーザイ) 5mg 【薬価】 82.70 円/T</p>	<p>【効】 不眠症 【用】 (内) 1日1回5mgを就寝直前。1日1回10mgまで</p>

12. 末梢神経系用薬

12. 末梢神経系用薬

121. 局所麻酔剤

1211. アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロカイン塩酸塩 プロカイン塩酸塩注射液 0.5%〔日医工〕 ㊞ Procaine hydrochloride (日医工) 0.5%5mL1 管 【薬価】 94.00 円 / A	【効】 浸潤麻酔 【用】 (注) 1 回 1000mg の範囲内で使用 (基準最高用量: 1 回 1000mg). 必要に応じてアドレナリン (濃度 1: 10 万 ~ 20 万) を添加
プロカイン塩酸塩 ロカイン注 1% (患者限定) ㊞ Rocain (扶桑) 1% 2mL/A 【薬価】 94.00 円 / A	【効】 伝達麻酔 【用】 (注) 10 ~ 400mg を使用, 必要に応じてアドレナリン (濃度 1: 10 万 ~ 20 万) を添加

1214. キシリジン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プピバカイン塩酸塩水和物 マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重 ㊞ Marcain (サンド) 20mg4mL/A 【薬価】 330.00 円 / A マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重 ㊞ Marcain (サンド) 20mg4mL/A 【薬価】 329.00 円 / A	【効】 脊椎麻酔 (腰椎麻酔) 【用】 (注) 1 回 10 ~ 20mg を脊髄クモ膜下腔に注入, 1 回 20mg まで
メピバカイン塩酸塩 カルボカインアンプル注 1% ㊞ Carbocain (サンド) 1% : 50mg5mL/A 【薬価】 103.00 円 / A カルボカインアンプル注 1% ㊞ Carbocain (サンド) 100mg10mL/A 【薬価】 97.00 円 / A	【効】 ①硬膜外麻酔, ②伝達麻酔, ③浸潤麻酔 【用】 (注) 基準最高用量は, それぞれ 1 回 500mg. 麻酔方法別の用量: ① 100 ~ 300mg, ② 50 ~ 200mg, 指趾神経遮断には 40 ~ 80mg, ③ 20 ~ 400mg
リドカイン ㊞キシロカインポンプスプレー 8% ㊞ Xylocaine (サンド) 80g/ 本 【薬価】 27.70 円 / g	【効】 表面麻酔 【用】 (外) 8 ~ 40mg (1 ~ 5 回の噴霧) を使用

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リドカイン <u>②</u> リドカインテープ 18mg 「YP」 ㊞ Lidocaine (祐徳) (18mg) 30.5mm×50.0mm/枚 【薬価】 31.60 円/枚 【先発品】 ペンレステープ 18mg, リドカインテープ 18mg 「NP」, リドカインテープ 18mg 「ニプロ」	【効】 ①静脈留置針穿刺時の疼痛緩和. ②伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和. ③皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 【用】(外) ① 1回1枚, 静脈留置針穿刺予定部位に約30分間貼付. 本剤除去後直ちに注射針を穿刺する. ②小児には1回2枚までを伝染性軟属腫摘除予定部位に約1時間貼付. ③成人には本剤1回6枚まで, 小児には次記枚数までを, レーザー照射予定部位に約1時間貼付. 3歳以下:2枚, 4歳~5歳:3枚, 6歳~7歳:4枚, 8歳~9歳:5枚, 10歳以上:6枚
リドカイン塩酸塩 <u>キシロカインビスカス 2%</u> ㊞ Xylocaine (アスペン) 100mL/本 【薬価】 5.30 円/mL <u>キシロカインビスカス 2% (院外)</u> ㊞ Xylocaine (サンド) 2%100mL/本 【薬価】 5.30 円/mL	【効】 表面麻酔 【用】(内) 1回100~300mg (5~15mL:添付の匙でほぼ1~3杯又は注射筒に吸引して使用)を1日1~3回
リドカイン塩酸塩 <u>キシロカイン注ポリアンプ 0.5%</u> ㊞ Xylocaine (サンド) 50mg10mL/A 【薬価】 86.00 円/A	【効】 ①硬膜外麻酔. ②伝達麻酔. ③浸潤麻酔. ④上肢手術における静脈内区域麻酔 【用】(注) 1回200mgを基準最高用量とする. ①25~150mg. 交感神経遮断:25~100mg. ②15~200mg. 指趾神経遮断:15~50mg. 肋間神経遮断:25mgまで. ③10~200mg. ④200mgまで
リドカイン塩酸塩 <u>キシロカイン注ポリアンプ 1%</u> ㊞ Xylocaine (サンド) 100mg10mL/A 【薬価】 79.00 円/A	【効】 ①硬膜外麻酔. ②伝達麻酔. ③浸潤麻酔. ④表面麻酔 【用】(注) 1回200mgを基準最高用量とする. ①100~200mg. ②30~200mg. 指趾神経遮断:30~100mg. 肋間神経遮断:50mgまで. ③20~200mg. ④適量を塗布又は噴霧
リドカイン塩酸塩 <u>キシロカイン注ポリアンプ 2%</u> ㊞ Xylocaine (サンド) 200mg10mL/A 【薬価】 110.00 円/A	【効】 ①硬膜外麻酔. ②伝達麻酔. ③浸潤麻酔. ④表面麻酔 【用】(注) 1回200mgを基準最高用量とする. ①200mg. ②40~200mg. 指趾神経遮断:60~120mg. ③40~200mg. ④適量を塗布又は噴霧
リドカイン塩酸塩 <u>キシロカインゼリー 2%</u> Xylocaine (アスペン) 30mL/本 【薬価】 6.30 円/mL <u>キシロカインゼリー 2% (院外)</u> Xylocaine (サンド) 2%30mL/本 【薬価】 6.30 円/mL	【効】 表面麻酔 【用】(外) 尿道麻酔には男子は200~300mg (10~15mL), 女子は60~100mg (3~5mL). 気管内挿管には適量

12. 末梢神経系用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>リドカイン塩酸塩 キシロカイン液「4%」 Xylocaine (サンド) 4%100mL/本 【薬価】17.00円/mL</p>	<p>【効】表面麻酔 【用】(外) 80～200mg (2～5mL) を使用。 〈使用方法〉 耳鼻咽喉科領域：鼻腔内，咽喉に刺激性薬物を塗布する前処置，耳管カテーテル挿入，下甲介切除，鼻中隔矯正，扁桃切除，咽喉頭鏡検査等の場合，本剤の適量（一時に5mL〈リドカイン塩酸塩として200mg〉以内）を塗布又は噴霧。 泌尿器科領域：膀胱鏡検査，尿管カテーテル挿入，逆行性腎盂撮影法，凝血除去，結石処置，経尿道式尿道乳頭腫切除等の場合，本剤を倍量に希釈し，その約10mL（リドカイン塩酸塩として200mg）を尿道内に注入し，男子では陰茎を箝搾子ではさみ，女子には綿栓を施して5～10分間，液を尿道内に貯留させる。 気管支鏡検査：全身麻酔時の挿管には本剤を倍量に希釈し，その適量（10mL〈リドカイン塩酸塩として200mg〉以内）を噴霧</p>
<p>リドカイン塩酸塩 キシロカイン点眼液4% Xylocaine (サンド) 4%20mL/本 【薬価】17.00円/mL</p>	<p>【効】眼科領域における表面麻酔 【用】(外) 1～5滴を点眼</p>
<p>リドカイン塩酸塩 静注用キシロカイン2% Ⓢ Xylocaine (サンド) 100mg5mL/A 【薬価】119.00円/A</p>	<p>【効】①期外収縮（心室性，上室性），発作性頻拍（心室性，上室性）. ②急性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈の予防 【用】(注) 1回50～100mg (1～2mg/kg) を，1～2分間で，緩徐に静注. 効果が認められない場合には，5分後に同量を. 効果の持続を期待する時には10～20分間隔で同量を追加してもさつつかえないが，1時間内の基準最高量は300mg. 静注の効果は，10～20分で消失</p>
<p>リドカイン塩酸塩 Ⓢリドカイン点滴静注液1%「タカタ」 Ⓢ Lidocaine (高田) 200mg20mL/袋 【薬価】689.00円/袋</p>	<p>【効】①期外収縮（心室性），発作性頻拍（心室性），急性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈の予防. ②期外収縮（上室性），発作性頻拍（上室性） 【用】(注) 点滴静脈内投与方法：静脈内1回投与が有効で，効果の持続を期待する場合に，心電図の連続監視下に点滴静注を行う. 1～2mg/分の速度で静注. 必要な場合には投与速度を増してもよいが，4mg/分以上の速度では重篤な副作用が現れるので，4mg/分までにとどめる. 必要に応じて24時間あるいはそれ以上連続投与しても差し支えないが，過量投与を避けるため，心電図の連続監視と頻回の血圧測定が必要である</p>
<p>ロピバカイン塩酸塩水和物 アナペイン注2mg/mL Ⓢ Anapeine (サンド) 20mg10mL/A 【薬価】287.00円/A</p>	<p>【効】術後鎮痛 【用】(注) 手術終了時にロピバカイン塩酸塩として12mg/時を硬膜外腔に持続投与. 8～20mg/時の範囲で適宜増減</p>
<p>ロピバカイン塩酸塩水和物 アナペイン注7.5mg/mL Ⓢ Anapeine (サンド) 75mg10mL/A 【薬価】520.00円/A アナペイン注7.5mg/mL Ⓢ Anapeine (サンド) 150mg20mL/A 【薬価】946.00円/A</p>	<p>【効】麻酔（①硬膜外麻酔. ②伝達麻酔） 【用】(注) ①1回150mgまでを硬膜外腔に. ②1回300mgまでを目標の神経あるいは神経叢近傍に</p>
<p>ロピバカイン塩酸塩水和物 アナペイン注10mg/mL Ⓢ Anapeine (サンド) 100mg10mL/A 【薬価】509.00円/A</p>	<p>【効】麻酔（硬膜外麻酔） 【用】(注) 1回200mgまでを硬膜外腔に</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
キシロカイン注射液「1%」エピ レナミン (1:100,000) 含有 (製) Xylocaine (サンド) 200mg20mL/V 【薬価】 11.90 円/mL 1mL 中： リドカイン塩酸塩 10mg アドレナリン 0.01mg	【効】 ①硬膜外麻酔. ②伝達麻酔. ③浸潤麻酔. ④表面麻酔 【用】 (注) 1回 50mL (リドカイン塩酸塩として 500mg) を基準最高用量とする. () 内はリドカイン塩酸塩として, (◇) 内はアドレナリンとしての用量である. ① 10～30mL (100～300mg) <0.1～0.3mg>. ② 3～20mL (30～200mg) <0.03～0.2mg>. 肋間神経遮断には 5mL まで (50mg まで) <0.05mg>. ③ 2～40mL (20～400mg) <0.02～0.4mg>. ④ 適量を塗布又は噴霧
キシロカイン注射液「2%」エピ レナミン (1:80,000) 含有 (製) Xylocaine (サンド) 400mg20mL/V 【薬価】 15.30 円/mL 1mL 中： リドカイン塩酸塩 20mg アドレナリン 0.0125mg	【効】 ①硬膜外麻酔. ②伝達麻酔. ③浸潤麻酔. ④表面麻酔 【用】 (注) 1回 25mL (リドカイン塩酸塩として 500mg) を基準最高用量とする. () 内はリドカイン塩酸塩として, (◇) 内はアドレナリンとしての用量である. ① 10～20mL (200～400mg) <0.125～0.25mg>. ② 2～20mL (40～400mg) <0.025～0.25mg>. ③ 2～25mL (40～500mg) <0.025～0.3125mg>. 眼科領域麻酔には 0.5～2mL (10～40mg) <0.00625～0.025mg>. ④ 適量を塗布又は噴霧

1219. その他の局所麻酔剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オキセサゼイン ストロカイン錠 5mg Strocain (エーザイ) 5mg/T 【薬価】 5.80 円/T	【効】 次記疾患に伴う疼痛・酸症状・暖気・悪心・嘔吐・胃部不快感・便意逼迫：食道炎，胃炎，胃・十二指腸潰瘍，過敏性大腸症（イリタブルコロン） 【用】 (内) 1日 15～40mg (3～8錠) を3～4回に分割

122. 骨格筋弛緩剤

1224. コリン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スキサメトニウム塩化物水和物 スキサメトニウム注 100「マルイ シ」 (製) Suxamethonium (丸石) 100mg5mL/A 【薬価】 504.00 円/A	【効】 ①麻酔時の筋弛緩. ②気管内挿管時・骨折脱臼の整復時・喉頭痙攣の筋弛緩. ③精神神経科における電撃療法の際の筋弛緩. ④腹部腫瘤診断時 【用】 (注) 間欠的投与法：1回 10～60mg を静注. 筋弛緩が得られないときは，適宜増量. 持続点滴用法：持続性効果を求める場合は，0.1～0.2% となるように生理食塩液又は 5% ブドウ糖液に溶かし，持続注入. 2.5mg/分ぐらいの速さで注入. 乳幼児・小児：静注の場合 1mg/kg を，静注が不可能な場合は 2～3mg/kg を筋注


1229. その他の骨格筋弛緩剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>A型ボツリヌス毒素 ボトックス注用50単位  生 Botox (グラクソ・スミスクライン) 50単位/V 【薬価】 33,368.00円/瓶</p>	<p>【効】 ①眼瞼痙攣。②片側顔面痙攣。③痙攣性斜頸。④上肢痙縮。⑤下肢痙縮。⑥2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足。⑦重度の原発性腋窩多汗症。⑧斜視。⑨痙攣性発声障害。⑩既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁。⑪既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない神経因性膀胱による尿失禁</p> <p>【用】(注) ①眼瞼痙攣：初回1.25～2.5単位/部位を、1眼当たり眼輪筋6部位に筋注。眼輪筋切除術施行後の患者に投与する場合には、筋電計を用いて注意深く目標とする部位を同定すること。効果は通常3～4か月間持続するが、症状再発の場合には再投与する。ただし、投与間隔は8週以上。再投与は初回投与量の2倍までの用量を用いることができるが、本剤の薬理作用である筋麻痺作用が予想以上に強く発現した結果と見られる閉眼不全、眼瞼下垂等の副作用が現れた場合には、再投与時の用量を適宜減量すること。1か月間に累積で45単位まで。②片側顔面痙攣：次記の用量を痙攣筋(眼輪筋、皺眉筋、前頭筋、口輪筋、大頬骨筋、小頬骨筋、笑筋、広頸筋、オトガイ筋等)に筋注。痙攣筋が複数ある場合は、分割して投与。初回投与の場合には合計で10単位を投与。初回投与後4週間観察し、効果が不十分な場合には、さらに追加で合計20単位を上限として投与可。症状再発の場合には、合計で30単位を上限として再投与可。ただし、投与間隔は8週以上。③痙攣性斜頸：次記の用量を緊張筋(胸鎖乳突筋、僧帽筋、板状筋、斜角筋、僧帽筋前縁、肩甲挙筋、傍脊柱筋、広頸筋等)に筋注。緊張筋が複数ある場合は、分割して投与。初回投与の場合には合計で30～60単位を投与。初回投与後4週間観察し、効果が不十分な場合には、さらに追加で合計180単位を上限として投与可。症状再発の場合には、合計で240単位を上限として再投与可。ただし、投与間隔は8週以上。④上肢痙縮：複数の緊張筋(上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋、橈側手根屈筋、尺側手根屈筋、深指屈筋、浅指屈筋、長母指屈筋、母指内転筋等)に合計400単位を分割して筋注。1回あたり400単位まで。投与量は必要最小限となるよう適宜減量。再投与は前回の効果が減弱した場合に可。投与間隔は12週以上。⑤下肢痙縮：複数の緊張筋(腓腹筋(内側頭、外側頭)、ヒラメ筋、後脛骨筋等)に合計300単位を分割して筋注。1回あたり300単位まで。投与量は必要最小限となるよう適宜減量。再投与は前回の効果が減弱した場合に可。投与間隔は12週以上。⑥2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足：2歳以上の小児には4単位/kgを、罹患している腓腹筋の内側頭・外側頭の各々2ヵ所に筋注。両下肢に投与する場合は、4単位/kgを両肢に分割して投与。初回投与以後、効果不十分な場合にはヒラメ筋、後脛骨筋等へ投与可。1回の総投与量は200単位までとし、再投与は前回の効果が消失した場合に可能であるが、投与間隔は12週以上。⑦重度の原発性腋窩多汗症：片腋窩あたり50単位を、複数の部位(10～15ヵ所)に1～2cm間隔で皮下内投与。再投与は前回の効果が減弱した場合に可能であるが、投与間隔は16週以上。⑧成人及び12歳以上の小児に外眼筋に筋注。初回投与：1)上下斜視の場合：上直筋又は下直筋に1.25～2.5単位。2)20プリズムジオプトリー未満の水平斜視の場合：内直筋又は外直筋に1.25～2.5単位。3)20～50プリズムジオプトリーの水平斜視の場合：内直筋又は外直筋に2.5～5.0単位。4)1か月以上持続する外転神経麻痺の場合：内直筋に1.25～2.5単位。初回投与後4週間観察し、効果不十分な場合には、追加で初回投与量の2倍までの用量を上限として投与できる。前回の効果が減弱した場合には、過去に投与された1回投与量の2倍までの用量を上限として再投与できる。但し、投与間隔は12週以上。1回の投与における1つの筋あたりの投与量は10単位まで。⑨次記の用量を内喉頭筋に筋肉内注射。内転型痙攣性発声障害：初回投与は片側の甲状披裂筋に2.5単位を投与。再投与は前回の効果が減弱した場合、片側又は両側の甲状披裂筋に再投与できる。ただし、投与間隔は12週以上。片側あたり2.5単位を超えない。外転型痙攣性発声障害：初回投与は片側の後輪状披裂筋に5.0単位を投与。再投与は前回の効果が減弱した場合、片側の後輪状披裂筋に再投与できる。ただし、投与間隔は12週以上。5.0単位を超えない。⑩100単位を排尿筋に分割して注射。再投与は前回の効果が減弱した場合に可能であるが、投与間隔は12週以上。⑪200単位を排尿筋に分割して注射。再投与は前回の効果が減弱した場合に可能であるが、投与間隔は12週以上。</p>


商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ダントロレンナトリウム水和物 <u>ダントリウムカプセル 25mg</u> Dantrium (オーファンパシフィック) 25mg/cap 【薬価】 18.90 円 /cap	【効】 ①次記疾患に伴う痙性麻痺：脳血管障害後遺症、脳性麻痺、外傷後遺症（頭部外傷、脊髄損傷）、頸部脊椎症、後縦靭帯骨化症、脊髄小脳変性症、痙性脊髄麻痺、脊髄炎、脊髄症、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、スモン（SMON）、潜水病、 ②全身こむら返り病。③悪性症候群 【用】 (内) ①② 1日1回 25mgより始め、1週毎に25mgずつ増量し（1日2～3回に分割）維持量を決定。1日最高投与量は150mgとし3回に分割。③ダントロレンナトリウム水和物注射剤の静注後、継続投与が必要で経口投与が可能な場合、1回25mg又は50mgを1日3回
ダントロレンナトリウム水和物 <u>ダントリウム静注用 20mg</u> Dantrium (オーファンパシフィック) 20mg/V 【薬価】 9,039.00 円 / 瓶	【効】 ①麻酔時における悪性高熱症。②悪性症候群 【用】 (注) ①初回量1mg/kgを静注、改善が認められない場合、1mg/kgずつ静脈内に追加。投与総量は7mg/kgまで。②初回量40mgを静注、改善が認められない場合、20mgずつ追加。1日総投与量は200mgまで、7日以内
ロクロニウム臭化物 <u>ロクロニウム臭化物静注液</u> <u>50mg/5.0mL「マルイシ」</u>  Rocuronium (丸石) 50mg/5mL/ 瓶 【薬価】 415.00 円 / 瓶 【先発品】 エスラックス静注 50mg /5.0mL	【効】 麻酔時の筋弛緩、気管挿管時の筋弛緩 【用】 (注) 挿管用量として0.6mg/kgを静脈内投与し、術中必要に応じて0.1～0.2mg/kgを追加。持続注入は、7μg/kg/分を開始。上限は0.9mg/kgまで

123. 自律神経剤

1231. 四級アンモニウム塩製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジスチグミン臭化物 <u>ウブレチド錠 5mg</u>  Ubretid (鳥居) 5mg/T 【薬価】 13.90 円 /T	【効】 ①手術後及び神経因性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿困難。②重症筋無力症 【用】 (内) ① 1日 5mg。② 1日 5～20mgを1～4回に分割
チキジウム臭化物 <u>チアトンカプセル 10mg</u> Thiaton (マイラン EPD) 10mg/cap 【薬価】 9.50 円 /cap	【効】 次の疾患における痙攣並びに運動機能亢進：胃炎、胃・十二指腸潰瘍、腸炎、過敏性大腸症候群、胆嚢・胆道疾患、尿路結石症 【用】 (内) 1回5～10mgを1日3回

1232. アセチルコリン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アセチルコリン塩化物 <u>オピソート注射用 0.1g</u>  Ovisot (第一三共) 100mg/A (溶解液付) 【薬価】 371.00 円 /A	【効】 ①麻酔後の腸管麻痺。②消化管機能低下のみられる急性胃拡張。③円形脱毛症。④冠動脈造影検査時の冠攣縮薬物誘発試験における冠攣縮の誘発 【用】 (注) ①② 1回0.1gを1～2mLの注射用水に使用のたびごとに溶解し、1日1～2回皮下注又は筋注。③ 1回0.1gを5mLの注射用水に使用のたびごとに溶解し、局所皮内の数か所に毎週1回ずつ注射。④生理食塩液で溶解及び希釈し、1回5mLを冠動脈内に注入。左冠動脈への注入から開始し、通常、20μg、50μg、100μgを冠攣縮が誘発されるまで5分間隔で段階的に各20秒間かけて注入。右冠動脈には通常、20μg、50μgを冠攣縮が誘発されるまで5分間隔で段階的に各20秒間かけて注入

12. 末梢神経系用薬

1233. ネオスチグミン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アトワゴリバース静注シリンジ 6mL</p> <p>Ⓢ Atvagoreverse (テルモ) 6mL/筒</p> <p>【薬価】495.00円/筒 1シリンジ中： ネオスチグミンメチル硫酸塩 2.0mg アトロピン硫酸塩水和物 1.0mg</p>	<p>【効】非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗</p> <p>【用】(注)1回1.5～6mL(ネオスチグミンメチル硫酸塩として0.5～2.0mg,アトロピン硫酸塩水和物として0.25～1.0mg)を緩徐に静注</p>

1239. その他の自律神経剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ピリドスチグミン臭化物</p> <p>メスチノン錠 60mg</p> <p>Ⓢ Mestinon (共和) 60mg/T</p> <p>【薬価】16.90円/T</p>	<p>【効】重症筋無力症</p> <p>【用】(内)1日180mgを3回に分割</p>

124. 鎮けい剤

1242. アトロピン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アトロピン硫酸塩水和物</p> <p>Ⓢアトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」</p> <p>Ⓢ Atropine (テルモ) 0.05% シリンジ</p> <p>【薬価】300.00円/筒</p>	<p>【効】胃・十二指腸潰瘍における分泌並びに運動亢進, 胃腸の痙攣性疼痛, 痙攣性便秘, 胆管・尿管の痙痛, 有機燐系殺虫剤・副交感神経興奮剤の中毒, 迷走神経性徐脈及び迷走神経性房室伝導障害, 麻酔前投薬, その他の徐脈及び房室伝導障害, ECTの前投与</p> <p>【用】(注)0.5mgを皮下注又は筋注. 場合により静注もできる. [有機燐系殺虫剤中毒の場合]軽症:0.5～1mgを皮下注又は経口. 中等症:1～2mgを皮下注・筋注又は静注. 必要があれば, その後20～30分毎に繰り返し注射. 重症:初回, 2～4mgを静注, アトロピン飽和の徴候が認められるまで繰り返し注射を行う. [ECTの前投与]1回0.5mgを皮下注, 筋注又は静注</p>
<p>ブチルスコポラミン臭化物</p> <p>ブスコパン錠 10mg</p> <p>Buscopan (日本ベーリンガー) 10mg/T</p> <p>【薬価】5.90円/T</p>	<p>【効】次記疾患における痙攣並びに運動機能亢進:胃・十二指腸潰瘍, 食道痙攣, 幽門痙攣, 胃炎, 腸炎, 腸痙痛, 痙攣性便秘, 機能性下痢, 胆嚢・胆管炎, 胆石症, 胆道ジスキネジー, 胆嚢切除後の後遺症, 尿路結石症, 膀胱炎, 月経困難症</p> <p>【用】(内)1回10～20mgを1日3～5回</p>
<p>ブチルスコポラミン臭化物</p> <p>ブスコパン注 20mg</p> <p>Ⓢ Buscopan (サノフィ) 20mg1mL/A</p> <p>【薬価】59.00円/A</p>	<p>【効】①次記疾患における痙攣並びに運動機能亢進:胃・十二指腸潰瘍, 食道痙攣, 幽門痙攣, 胃炎, 腸炎, 腸痙痛, 痙攣性便秘, 機能性下痢, 胆嚢・胆管炎, 胆石症, 胆道ジスキネジー, 胃・胆嚢切除後の後遺症, 尿路結石症, 膀胱炎, 器具挿入による尿道・膀胱痙攣, 月経困難症, 分娩時の子宮下部痙攣. ②消化管のX線及び内視鏡検査の前処置</p> <p>【用】(注)1回10～20mgを静注又は皮下注, 筋注</p>

1244. マグネシウム塩製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
硫酸マグネシウム水和物 <u>硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL (院内)</u> Magnesium sulfate (大塚) 20mL/管 【薬価】 129.00 円 /A 20mL 中： Mg ²⁺ 20mEq SO ₄ ²⁻ 20mEq	【効】 電解質補液の電解質補正 【用】 (注) 体内の水分，電解質の不足に応じて電解質補液に添加

1249. その他の鎮けい剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エペリゾン塩酸塩 <u>後エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「NP」</u> 【経過措置】 Eperisone hydrochloride (ニプロ) 50mg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 ミオナール錠 50mg <u>ミオナール錠 50mg (院外)</u> Myonal (エーザイ) 50mg/T 【薬価】 9.50 円 /T	【効】 ①次記疾患による筋緊張状態の改善：頸肩腕症候群，肩関節周囲炎，腰痛症，②次記疾患による痙性麻痺：脳血管障害，痙性脊髄麻痺，頸部脊椎症，術後後遺症（脳・脊髄腫瘍を含む），外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外傷），筋萎縮性側索硬化症，脳性小児麻痺，脊髄小脳変性症，脊髄血管障害，スモン（SMON），その他の脳脊髄疾患 【用】 (内) 1 日量として 150mg を 3 回に分割し食後
チザニジン塩酸塩 <u>テルネリン錠 1mg (院外)</u> Ternelin (田辺三菱) 1mg/T 【薬価】 9.00 円 /T <u>後チザニジン錠 1mg 「日医工」</u> Tizanidine (日医工) 1mg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 テルネリン錠 1mg	【効】 ①次記疾患による筋緊張状態の改善：頸肩腕症候群，腰痛症。②次記疾患による痙性麻痺：脳血管障害，痙性脊髄麻痺，頸部脊椎症，脳性（小児）麻痺，外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外傷），脊髄小脳変性症，多発性硬化症，筋萎縮性側索硬化症 【用】 (内) ① 3mg を 1 日 3 回に分割し食後。② 1 日 3mg より始め，1 日 6～9mg まで漸増し，1 日 3 回に分割し食後
フロプロピオン <u>コ-spanonカプセル 40mg</u> Cospanon (エーザイ) 40mg/cap 【薬価】 9.20 円 /cap	【効】 次記の疾患に伴う鎮痙効果。①肝胆道疾患：胆道ジスキネジー，胆石症，胆嚢炎，胆管炎，胆嚢別出後遺症。②膀胱疾患：膀胱炎。③尿路結石 【用】 (内) 1 回 40～80mg を 1 日 3 回

125. 発汗剤，止汗剤

1259. その他の発汗剤，止汗剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オキシブチニン塩酸塩 <u>アポハイドローション 20%</u> Apohide (久光) 4.5mL (4.32g) / 本 【薬価】 543.70 円 /g	【効】 原発性手掌多汗症 【用】 (外) 1 日 1 回，就寝前に適量を両手掌全体に塗布
ソフピロニウム臭化物 <u>エクロックゲル 5%</u> Ecclock (科研) 5%20g / 本 【薬価】 241.30 円 /g	【効】 原発性腋窩多汗症 【用】 (外) 1 日 1 回，適量を腋窩に塗布

13. 感覚器官用薬

13. 感覚器官用薬

131. 眼科用剤

1311. 散瞳剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アトロピン硫酸塩水和物 日点アトロピン点眼液 1% Ⓢ Nitten atropine (日本点眼薬) 1%5mL/本 【薬価】296.60円/瓶	【効】診断又は治療を目的とする散瞳と調節麻痺 【用】(外) 1日1～3回, 1回1～2滴宛点眼
シクロペントラート塩酸塩 サイプレジン1%点眼液 Cyplegin (参天) 1%10mL/本 【薬価】71.00円/mL	【効】診断又は治療を目的とする散瞳と調節麻痺 【用】(外) 1日1回1滴宛点眼, 又は1滴点眼後5～10分して更に1滴を点眼
トロピカミド ミドリンM点眼液 0.4% Mydrin M (参天) 0.4%5mL/本 【薬価】17.90円/mL	【効】診断又は治療を目的とする散瞳と調節麻痺 【用】(外) 診断又は治療を目的とする散瞳には1日1回, 1回1～2滴宛, 調節麻痺には3～5分おきに2～3回, 1回1滴宛点眼
フェニレフリン塩酸塩 ネオシネジンコーワ5%点眼液 Neosynesis (興和) 5%10mL/本 【薬価】39.50円/mL	【効】診断又は治療を目的とする散瞳 【用】(外) 1回, 1～2滴宛点眼

1312. 縮瞳剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ピロカルピン塩酸塩 サンピロ点眼液 1% Ⓢ Sanpilo (参天) 1%5mL/本 【薬価】107.80円/瓶 サンピロ点眼液 3% Ⓢ Sanpilo (参天) 3%5mL/本 【薬価】134.30円/瓶	【効】緑内障, 診断又は治療を目的とする縮瞳 【用】(外) 0.5～4%液を1日3～5回, 1回1～2滴宛点眼

1313. 眼科用局所麻酔剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オキシブプロカイン塩酸塩 ベノキシール点眼液 0.4% Benoxil (参天) 0.4%10mL/本 【薬価】25.10円/mL	【効】眼科領域における表面麻酔 【用】(外) 1～4滴を点眼

1315. 眼科用コルチゾン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フルオロメトロン フルメトロン点眼液 0.1% Flumetholon (参天) 0.1%5mL/本 【薬価】30.90円/mL	【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患(眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 上強膜炎, 虹彩炎, 虹彩毛様体炎, プドウ膜炎, 術後炎症等) 【用】(外) 用時よく振り混ぜたのち, 1回1～2滴, 1日2～4回点眼

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム <u>リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%</u> Rinderon (塩野義) 0.1%5mL/本 【薬価】 52.60 円/mL	【効】 ①眼科：外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎，前眼部ブドウ膜炎，術後炎症），②耳鼻科：外耳・中耳（耳管を含む）又は上気道の炎症性・アレルギー性疾患（外耳炎，中耳炎，アレルギー性鼻炎等），術後処置 【用】 (外) ① 1日3～4回，1回1～2滴ずつ点眼。② 1日1～数回，適量を点耳，点鼻，耳浴，ネブライザー又はタンポンにて使用するか，又は患部に注入

1317. 眼科用抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アジスロマイシン水和物 <u>アジマイシン点眼液 1% (院外)</u> Azimycin (武田) 2.5mL/瓶 【薬価】 289.20 円/mL	【効】 ①結膜炎，②眼瞼炎，麦粒腫，涙嚢炎。〈適応菌種〉アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，コリネバクテリウム属，インフルエンザ菌，アクネ菌 【用】 (外) ①成人及び7歳以上の小児には，1回1滴，1日2回2日間，その後，1日1回5日間点眼。② 1回1滴，1日2回2日間，その後，1日1回12日間点眼
セフメノキシム塩酸塩 <u>ベストロン点眼用 0.5%</u> Bestron (千寿) 0.5%5mL/本（溶解後の液として） 【薬価】 54.80 円/mL	【効】 眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む），眼科周術期の無菌化療法。〈適応菌種〉セフメノキシムに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ・ラクナータ（モラー・アクセンフェルト菌），セラチア・マルセスセンス，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロピデンシア属，インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌），緑膿菌，アクネ菌 【用】 (外) 添付の溶解液で5mg/mLの濃度に溶解し，1回1～2滴を1日4回点眼

1319. その他の眼科用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アシクロビル <u>ゾビラックス眼軟膏 3%</u> Zovirax (日東メディック) 3%5g/本 【薬価】 551.50 円/g	【効】 単純ヘルペスウイルスに起因する角膜炎 【用】 (外) 適量を1日5回塗布，症状により適宜回数を減じる
アシタザノラスト水和物 <u>ゼペリン点眼液 0.1% (院外)</u> Zepelin (興和) 0.1%5mL/本 【薬価】 522.40 円/瓶	【効】 アレルギー性結膜炎 【用】 (外) 1回1～2滴，1日4回（朝，昼，夕方及び就寝前）点眼
エピナスチン塩酸塩 <u>アレジオンLX点眼液 0.1%</u> Alesion (参天) 0.1%5mL 【薬価】 505.70 円/mL	【効】 アレルギー性結膜炎 【用】 (外) 1回1滴，1日2回（朝，夕）点眼
オキシグルタチオン <u>ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%</u> Bss plus (日本アルコン) 0.46% 20mL 【薬価】 2,917.40 円/瓶	【効】 眼科手術（①白内障，②硝子体，③緑内障）時の眼灌流及び洗浄 【用】 (外) 用時希釈液で希釈し，次の量を使用。① 60～240mL，② 90～400mL，③ 30～260mL

13. 感覚器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>オフロキサシン タリビッド眼軟膏 0.3% Tarivid (参天) 0.3%3.5g/本 【薬価】113.50円/g</p>	<p>【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む），眼科周術期の無菌化療法。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，マイクロコッカス属，モラクセラ属，コリネバクテリウム属，クレブシエラ属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンスシア属，インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌），シュードモナス属，緑膿菌，パークホルデリア・セパシア，ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア，アシネトバクター属，アクネ菌，トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマチス）</p> <p>【用】（外）適量を1日3回塗布</p>
<p>オミデナバグイソプロピル エイベリス点眼液 0.002% Eybelis (参天) 2.5mL/本 【薬価】831.10円/mL</p>	<p>【効】緑内障，高眼圧症 【用】（外）1回1滴，1日1回点眼</p>
<p>オロパタジン塩酸塩 パタノール点眼液 0.1% Patanol (協和キリン) 0.1%5mL/本 【薬価】96.40円/mL</p>	<p>【効】アレルギー性結膜炎 【用】（外）1回1～2滴，1日4回（朝，昼，夕方及び就寝前）点眼</p>
<p>ガチフロキサシン水和物 ガチフロ点眼液 0.3% Gatiflo (千寿) 0.3%5mL/本 【薬価】74.40円/mL</p>	<p>【効】①眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む）。②眼科周術期の無菌化療法。〈適応菌種〉ガチフロキサシンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，コリネバクテリウム属，シトロバクター属，クレブシエラ属，セラチア属，モルガネラ・モルガニー，インフルエンザ菌，シュードモナス属，緑膿菌，スフィンゴモナス・パウチモビリス，ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア，アシネトバクター属，アクネ菌</p> <p>【用】（外）①1回1滴，1日3回点眼。②手術前：1回1滴，1日5回。手術後：1回1滴，1日3回点眼</p>
<p>カルテオロール塩酸塩 ミケランLA点眼液 2% Mikelan LA (大塚) 2%2.5mL/本 【薬価】308.80円/mL</p>	<p>【効】緑内障，高眼圧症 【用】（外）1%製剤を1回1滴，1日1回点眼。十分な効果が得られない場合は，2%製剤を用いて1回1滴，1日1回点眼</p>
<p>シアノコバラミン サンコバ点眼液 0.02% Sancoba (参天) 0.02%5mL/本 【薬価】88.80円/瓶</p>	<p>【効】調節性眼精疲労における微動調節の改善 【用】（外）1回1～2滴を1日3～5回点眼</p>
<p>ジクアホソルナトリウム ジクアス点眼液 3% Diquas (参天) 3%5mL/本 【薬価】358.30円/瓶</p>	<p>【効】ドライアイ 【用】（外）1回1滴，1日6回点眼</p>
<p>ジクアホソルナトリウム ジクアスLX点眼液 3% Diquas (参天) 3%5mL/瓶 【薬価】770.50円/瓶</p>	<p>【効】ドライアイ 【用】（外）1回1滴，1日3回点眼</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
シクロスポリン <u>パピロックミニ点眼液 0.1% (院外)</u> (株) Papilock mini (参天) 0.1%0.4mL/本 【薬価】 148.80 円 / 個	【効】 春季カタル (抗アレルギー剤が効果不十分な場合) 【用】 (外) 1回1滴, 1日3回点眼
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>オペガン 0.6 眼粘弾剤 1% (院内)</u> Opegan (参天) 1% 0.6mL/筒 【薬価】 4,439.70 円 / 筒	【効】 ①白内障手術, ②眼内レンズ挿入術, ③全層角膜移植術における手術補助 【用】 (外) ①②を連続して施行する場合には, 0.4～1.0mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, 白内障手術又は眼内レンズ挿入術のみを施行する場合には, 次のとおりとする. ①0.1～0.6mLを前房内へ注入, ②挿入前に, 0.1～0.5mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, ③移植眼の角膜片を除去後に, 0.1～0.5mLを前房内へ注入し, 移植片角膜を本剤上に浮遊させて縫合を行う. 提供眼の移植片角膜のコーティングに約0.1mL使用
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」</u> Sodium hyaluronate (日本アルコン) 1% 0.85mL/筒 【薬価】 3,592.80 円 / 筒	【効】 ①白内障手術, ②眼内レンズ挿入術, ③全層角膜移植術における手術補助 【用】 (外) ①②を連続して施行: 0.2～0.75mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, ①のみ: 0.1～0.4mLを前房内へ注入, ②のみ: 挿入前に0.1～0.5mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, ③移植眼の角膜片を除去後に0.1～0.6mLを前房内へ注入, 移植片角膜を浮遊させて縫合, 提供眼の移植片角膜のコーティングに約0.1mL使用
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>ヒアレイン点眼液 0.1%</u> Hyalein (参天) 0.1%5mL/本 【薬価】 245.40 円 / 瓶 <u>ヒアレインミニ点眼液 0.1% (院外)</u> Hyalein mini (参天) 0.4mL/本 【薬価】 23.40 円 / 個 <u>ヒアレインミニ点眼液 0.3%</u> Hyalein mini (参天) 0.3%0.4mL/本 【薬価】 27.20 円 / 個	【効】 次記疾患に伴う角結膜上皮障害:①シェーグレン症候群, スティーブンス・ジョンソン症候群, 眼球乾燥症候群 (ドライアイ) 等の内因性疾患, ②術後, 薬剤性, 外傷, コンタクトレンズ装用等による外因性疾患 【用】 (外) 1回1滴, 1日5～6回点眼. 通常は0.1%製剤を投与し, 重症疾患等で効果不十分な場合には, 0.3%製剤を投与
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.6mL (院内)</u> Healon (エイエムオー) 1% 0.6mL/筒 【薬価】 2,794.30 円 / 筒	【効】 ①白内障手術, ②眼内レンズ挿入術, ③全層角膜移植術における手術補助 【用】 (外) ①②を連続して施行する場合には, 0.2～0.75mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, 白内障手術又は眼内レンズ挿入術のみを施行する場合には, 次のとおりとする. ①0.1～0.4mLを前房内へ注入, ②挿入前に, 0.1～0.5mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, ③移植眼の角膜片を除去後に, 0.1～0.6mLを前房内へ注入し, 移植片角膜を本剤上に浮遊させて縫合を行う. 提供眼の移植片角膜のコーティングに約0.1mL使用
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL (院内)</u> Healon V (エイエムオー) 2.3% 0.6mL/筒 【薬価】 6,739.90 円 / 筒	【効】 ①白内障手術, ②眼内レンズ挿入術における手術補助 【用】 (外) ①②を連続して施行:0.3～0.6mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用, ①のみ: 0.1～0.3mLを前房内へ注入, ②のみ: 挿入前に0.1～0.4mLを前房内へ注入, 眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用

13. 感覚器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>タフルプロスト タブロス点眼液 0.0015%  Tapros (参天) 0.0015%2.5mL/本 【薬価】 599.00 円 / mL タブロスミニ点眼液 0.0015%  Tapros mini (参天) 個 【薬価】 60.20 円 / 個</p>	<p>【効】 緑内障, 高眼圧症 【用】(外) 1回1滴, 1日1回点眼</p>
<p>チモロールマレイン酸塩 チモプトル XE 点眼液 0.5% Timoptol XE (参天) 0.5%2.5mL/本 【薬価】 408.30 円 / mL</p>	<p>【効】 緑内障, 高眼圧症 【用】(外) 0.25% 製剤を1回1滴, 1日1回点眼. 十分な効果が得られない場合は0.5% 製剤を用いて1回1滴, 1日1回点眼</p>
<p>トリアムシノロンアセトニド マキュエイド眼注用 40mg Maquaid (わかもと) 40mg/瓶 【薬価】 8,056.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 [硝子体内投与] ①硝子体手術時の硝子体可視化. ②糖尿病黄斑浮腫. [テノン嚢下投与] ③次記の疾患に伴う黄斑浮腫の軽減: 糖尿病黄斑浮腫, 網膜静脈閉塞症, 非感染性ぶどう膜炎 【用】(注) ① 40mg (1バイアル) に4mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入して濃度が10mg/mLになるように用時懸濁し, 0.5~4mg (懸濁液として0.05~0.4mL) を硝子体内に注入. 懸濁液の濃度は, 40mg/mLまで. ② 40mg (1バイアル) に1mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入して濃度が40mg/mLになるように用時懸濁し, 4mg (懸濁液として0.1mL) を硝子体内に投与. ③ 40mg (1バイアル) に1mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入して濃度が40mg/mLになるように用時懸濁し, 20mg (懸濁液として0.5mL) をテノン嚢下に投与</p>
<p>ドルゾラミド塩酸塩 トルソプト点眼液 1% Trusopt (参天) 1%5mL/本 【薬価】 169.80 円 / mL</p>	<p>【効】 次の疾患で, 他の緑内障治療薬で効果不十分な場合の併用療法: 緑内障, 高眼圧症 【用】(外) 0.5% 製剤を1回1滴, 1日3回点眼. 十分な効果が得られない場合は, 1% 製剤を用いて1回1滴, 1日3回点眼</p>
<p>ピレノキシシン  ピレノキシシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 Pirenoxine (参天) 0.005%5mL/瓶 【薬価】 64.90 円 / 瓶</p>	<p>【効】 初期老人性白内障 【用】(外) 用時よく振り混ぜたのち, 1回1~2滴を1日3~5回点眼</p>
<p>プラノプロフェン  プラノプロフェン点眼液 0.1% 「参天」 Pranopofen (参天) 0.1%5mL/瓶 【薬価】 17.90 円 / mL 【先発品】 ニフラン点眼液 0.1%</p>	<p>【効】 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 上強膜炎, 前眼部ブドウ膜炎, 術後炎症) 【用】(外) 1回1~2滴を1日4回点眼</p>
<p>ブリモニジン酒石酸塩 アイファガン点眼液 0.1% Aiphagan (千寿) 0.1%5mL/本 【薬価】 296.10 円 / mL  ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「わかもと」 Brimonidine tartrate (わかもと) 0.1%1mL 【薬価】 107.70 円 / mL 【先発品】 アイファガン点眼液 0.1%</p>	<p>【効】 次の疾患で, 他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合: 緑内障, 高眼圧症 【用】(外) 1回1滴, 1日2回点眼</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ブリンゾラミド <u>エイゾプト懸濁性点眼液 1%</u> Azopt (日本アルコン) 1%5mL/本 【薬価】 201.50 円 /mL	【効】 次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合：緑内障、高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日2回点眼，十分な効果が得られない場合には1回1滴，1日3回点眼できる
プロムフェナクナトリウム水和物 <u>ブロナック点眼液 0.1%</u> Bronuck (千寿) 0.1%5mL/本 【薬価】 69.70 円 /mL	【効】 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法〔眼瞼炎，結膜炎，強膜炎（上強膜炎を含む），術後炎症〕 【用】(外) 1回1～2滴，1日2回点眼
ヘレニエン <u>アダプチノール錠 5mg (院外)</u> Adaptinol (バイエル) 5mg/T 【薬価】 29.90 円 /T	【効】 網膜色素変性症における一時的な視野・暗順応の改善 【用】(内) 1回5mgを1日2～4回
ポリビニルアルコールヨウ素 <u>PA・ヨード点眼・洗眼液 (院内)</u> PA iodo (日本点眼薬) 0.2%20mL/瓶 【薬価】 22.50 円 /mL 1mL中： ヨウ素 2mg ポリビニルアルコール 80mg	【効】 角膜ヘルペス，洗眼殺菌 【用】(外) (有効ヨウ素濃度 0.2% の原液) 生理食塩液で4～8倍に希釈して用いる
ラタノプロスト <u>キサラタン点眼液 0.005%</u> Xalatan (ヴィアトリス) 0.005%2.5mL/本 【薬価】 354.40 円 /mL	【効】 緑内障，高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日1回点眼
ラニビズマブ (遺伝子組換え) <u>④ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」</u> ④ Ranibizumab BS (武田) 0.5mg0.05mL/筒 【薬価】 74,282.00 円 /筒	【効】 ①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性，②網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫，③病的近視における脈絡膜新生血管，④糖尿病黄斑浮腫 【用】(注) ① 0.5mg (0.05mL) を1か月毎に連続3か月間（導入期）硝子体内投与，その後の維持期においては，症状により投与間隔を適宜調節するが，1か月以上の間隔をあける．②③④ 1回あたり 0.5mg (0.05mL) を硝子体内投与．投与間隔は，1か月以上あける
リバスジル塩酸塩水和物 <u>グラナテック点眼液 0.4%</u> Glanatec (興和) 0.4%5mL/本 【薬価】 449.40 円 /mL	【効】 次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合：緑内障，高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日2回点眼
レバミピド <u>ムコスタ点眼液 UD2%</u> Mucosta (大塚) 2%0.35mL/本 【薬価】 17.30 円 /本 <u>④レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外)</u> Rebamipide (参天) 2%5mL/瓶 【薬価】 451.20 円 /瓶	【効】 ドライアイ 【用】(外) 1回1滴，1日4回点眼
レボカバスチン塩酸塩 <u>リボスチン点眼液 0.025% (院外)</u> Livostin (参天) 0.025%5mL/本 【薬価】 81.30 円 /mL	【効】 アレルギー性結膜炎 【用】(外) 1回1～2滴を1日4回（朝，昼，夕方及び就寝前）点眼

13. 感覚器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>レボフロキサシン水和物 クラビット点眼液 1.5% Cravit (参天) 1.5%5mL/本 【薬価】54.70円/mL</p>	<p>【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，マイクロコッカス属，モラクセラ属，コリネバクテリウム属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌），シュードモナス属，緑膿菌，ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア，アシネトバクター属，アクネ菌 【用】(外) 1回1滴，1日3回点眼</p>
<p>ロメフロキサシン塩酸塩 ロメフロンミニムス眼科耳科用液 0.3%（院内） Lomeflon minims (武田) 0.3%5mL/本 【薬価】35.60円/個</p>	<p>【効】①眼科：眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応菌種〉ロメフロキサシンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，マイクロコッカス属，モラクセラ属，コリネバクテリウム属，バシラス属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌），シュードモナス属，緑膿菌，バークホルデリア・セバシア，ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア，アシネトバクター属，フラボバクテリウム属，アクネ菌．②耳科：外耳炎，中耳炎．〈適応菌種〉ロメフロキサシンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プロテウス属，プロビデンシア属，シュードモナス属，緑膿菌，アシネトバクター属，アルカリゲネス属 【用】(外) ①1回1滴，1日3回点眼．②1回6～10滴点耳し，約10分間の耳浴を1日2回行う</p>
<p>アイラミド配合懸濁性点眼液（院外） Ailamide (千寿) 5mL/A 【薬価】441.70円/mL 1mL中： ブリモニジン酒石酸塩 1mg プリンゾラミド 10mg グラアルファ配合点眼液 Gla-alpha (興和) 5mL/瓶 【薬価】505.40円/mL 1mL中： リパスジル塩酸塩水和物 4.896mg （リパスジルとして4.0mg） ブリモニジン酒石酸塩 1.0mg コソプト配合点眼液 Cosopt (参天) 5mL/本 【薬価】367.70円/mL 1mL中： ドルゾラミド 10mg チモロール 5mg コソプトミニ配合点眼液（院外） Cosopt mini (参天) 0.4mL/本 【薬価】43.90円/個 1mL中： ドルゾラミド 10mg チモロール 5mg</p>	<p>【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障，高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日2回点眼</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ザラカム配合点眼液 Xalacom (ヴィアトリス) 2.5mL/本 【薬価】661.30円/mL 1mL中： ラタノプロスト 50μg チモロールマレイン酸塩 6.83mg (チモロールとして5mg)</p>	<p>【効】緑内障，高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日1回点眼</p>
<p>人工涙液マイティア点眼液 Artificial tear mytear (千寿) 5mL/本 【薬価】87.10円/瓶 1mL中： 塩化ナトリウム 5.5mg 塩化カリウム 1.6mg 乾燥炭酸ナトリウム 0.6mg リン酸水素ナトリウム水和物 1.8mg ホウ酸 12mg</p>	<p>【効】次記における涙液の補充：涙液減少症，乾性角結膜炎，コンタクトレンズ装着時 【用】(外) 1回1～2滴を1日5～6回点眼</p>
<p>デュオトラバ配合点眼液(院外) Duotrav (日本アルコン) 2.5mL/本 【薬価】677.10円/mL 1mL中： トラボプロスト 40μg チモロールマレイン酸塩 6.8mg (チモロールとして5mg)</p>	<p>【効】緑内障，高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日1回点眼</p>
<p>点眼・点鼻用リンデロンA液 Rinderon A (塩野義) 5mL/本 【薬価】78.20円/mL 1mL中： ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 1mg フラジオマイシン硫酸塩 3.5mg</p>	<p>【効】①点眼：外眼部・前眼部細菌感染を伴う炎症性疾患。②点鼻等：アレルギー性鼻炎，進行性壊疽性鼻炎，鼻及び咽喉頭部における術後処置。〈適応菌種〉フラジオマイシン感性菌 【用】(外) ①1回1～2滴を1日1～数回点眼。②適量を1日1～数回点鼻，ネブライザー又はタンポンにて使用</p>
<p>ネオメドロールEE軟膏 Neo medrol EE (ファイザー) 3g/本 【薬価】45.50円/g 1g中： フラジオマイシン硫酸塩 3.5mg メチルプレドニゾロン 1mg</p>	<p>【効】①外眼部・前眼部の細菌感染を伴う炎症性疾患。②外耳湿疹・皮膚炎，耳鼻咽喉科領域における術後処置。〈適応菌種〉フラジオマイシン感性菌 【用】(外) ①眼科用：適量を1日1～数回患部に点眼・塗布。②耳鼻科用：適量を1日1～数回患部に塗布</p>
<p>⑧ビスコート0.5眼粘弾剤 Viscoat (日本アルコン) 0.5mL/本 【薬価】3,716.60円/筒 1mL中： 精製ヒアルロン酸ナトリウム 30mg コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 40mg</p>	<p>【効】次の一連の眼科手術における手術補助：超音波乳化吸引法による白内障摘出術及び眼内レンズ挿入術 【用】(外) 超音波乳化吸引法による白内障摘出時には0.1～0.4mL，眼内レンズ挿入時には0.1～0.3mLを前房内へ注入。必要に応じて眼内レンズのコーティングに0.1mL使用</p>

13. 感覚器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ミケルナ配合点眼液 (院外) Mikeluna (大塚) 2.5mL/本 【薬価】568.80円/mL 1mL中： カルテオロール塩酸塩 20mg ラタノプロスト 50μg</p>	<p>【効】緑内障，高眼圧症 【用】(外) 1回1滴，1日1回点眼</p>
<p>ミドリソ P点眼液 Mydrin P (参天) 10mL/本 【薬価】27.60円/mL 1mL中： トロピカミド 5mg フェニレフリン塩酸塩 5mg</p>	<p>【効】診断及び治療を目的とする散瞳と調節麻痺 【用】(外) 散瞳には，1回1～2滴を点眼するか，又は1回1滴を3～5分おきに2回点眼．調節麻痺には，1回1滴を3～5分おきに2～3回点眼</p>

132. 耳鼻科用剤

1324. 耳鼻科用血管収縮剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>トラマゾリン塩酸塩 トラマゾリン点鼻液 0.118% 【AFP】 Ⓜ Tramazoline (アルフレッサ) 0.118%500mL/瓶 【薬価】5.50円/mL</p>	<p>【効】諸種疾患による鼻充血・うっ血 【用】(外) 1回2～3滴を1日数回点鼻するか，又は1日数回噴霧</p>
<p>ナファゾリン硝酸塩 プリビナ液 0.05% Privina (ノバルティス) 0.05%500mL/瓶 【薬価】4.00円/mL</p>	<p>【効】上気道諸疾患の充血・うっ血，上気道粘膜表面麻酔時における局所麻酔剤の効力持続時間の延長 【用】(外) 鼻腔内には，1回2～4滴を1日数回，咽頭・喉頭には1回1～2mLを1日数回塗布又は噴霧．局所麻酔剤への添加には，局所麻酔剤1mLあたり0.05%液2～4滴の割合で添加</p>

1325. 耳鼻科用抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>セフメノキシム塩酸塩 ベストロン耳鼻科用 1% (院外) Bestron (武田) 1%5mL/本 (溶解後) 【薬価】92.70円/mL</p>	<p>【効】外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎 (但し，ネブライザーを用いた噴霧吸入においては中鼻道閉塞が高度の症例を除く)．〈適応菌種〉セフメノキシムに感性的ブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，緑膿菌，ペプトストレプトコッカス属 【用】(外) 添付の溶解液で1mL当たり10mgの濃度に溶解し，次のとおり用いる．外耳炎及び中耳炎に対しては，1回6～10滴点耳し，約10分間の耳浴を1日2回行う．副鼻腔炎に対しては，1回2～4mLを隔日に1週間に3回ネブライザーを用いて噴霧吸入するか，1回1mLを1週間に1回上顎洞内に注入</p>
<p>ホスホマイシンナトリウム ホスミン S 耳科用 3% Fosmicin S (Meiji Seika) 3%10mL/本 (溶解後) 【薬価】81.40円/mL</p>	<p>【効】外耳炎，中耳炎．〈適応菌種〉ホスホマイシンに感性的ブドウ球菌属，プロテウス属，緑膿菌 【用】(外) 添付の溶解液で溶解し，1mL当たり30mgの溶液とし，10滴 (約0.5mL)を1日2回点耳する．難治性あるいは遷延性の重症例では，1日4回まで点耳回数を増加する (点耳後約10分間の耳浴を行う)</p>

1329. その他の耳鼻科用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ケトチフェンフマル酸塩 <u>ザジテン点鼻液 0.05%</u> Zaditen (サンファーマ) 0.05%8mL/本 【薬価】 439.70 円 / 瓶	【効】 アレルギー性鼻炎 【用】(外) 1日4回(朝, 昼, 夕方及び就寝前), 1回各鼻腔に1噴霧(0.05mg)ずつ, 専用の鼻用定量噴霧器を用いて噴霧吸入
ジオクチルソジウムスルホサクシネート <u>⑧ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」</u> Dioctyl sodium sulfosuccinate (セオリア) 5%10mL/本 【薬価】 41.00 円 / mL	【効】 耳垢の除去 【用】(外) 通常綿棒等で外耳へ塗布して使用. 除去困難な場合は数滴点耳後5分~20分後に微温湯(37℃)にて洗浄を行う. 高度の耳垢栓塞の場合は1日3回, 1~2日連続点耳後, 微温湯(37℃)洗浄を行う
フルチカゾンフランカルボン酸エステル <u>アラミスト点鼻液 27.5μg56 噴霧用(院外)</u> Allermist (グラクソ・スミスクライン) 27.5μg56 噴霧用 6g/本 【薬価】 1,086.80 円 / キット <u>アラミスト点鼻液 27.5μg120 噴霧用(院外)</u> Allermist (グラクソ・スミスクライン) 5mg10g/キット 【薬価】 2,209.50 円 / キット	【効】 アレルギー性鼻炎 【用】(外) 1回各鼻腔に2噴霧(1噴霧あたり27.5μg)を1日1回. 小児:1回各鼻腔に1噴霧(1噴霧あたり27.5μgを含有)を1日1回
フルチカゾンフランカルボン酸エステル <u>⑧フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」56 噴霧用(院内)</u> Fluticasone furoate (武田) 27.5μg56 噴霧用 6g/本 【薬価】 591.60 円 / キット 【先発品】 アラミスト点鼻液 27.5μg56 噴霧用	【効】 アレルギー性鼻炎 【用】(外) 1回各鼻腔に2噴霧(1噴霧あたり27.5μg)を1日1回. 小児:1回各鼻腔に1噴霧(1噴霧あたり27.5μg)を1日1回
フルチカゾンプロピオン酸エステル <u>小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外)</u> Flunase (グラクソ・スミスクライン) 2.04mg4mL/本 【薬価】 361.60 円 / 瓶	【効】 アレルギー性鼻炎, 血管運動性鼻炎 【用】(外) 小児:1回各鼻腔に1噴霧(25μg)を1日2回. 1日8噴霧まで

13. 感覚器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>モメタゾンフランカルボン酸エステル ナゾネックス点鼻液 50μg56 噴霧用 Nasonex (MSD) 50μg56 噴霧 10g/本 【薬価】 856.40 円 / 瓶 ⑧モメタゾン点鼻液 50μg「タカタ」 56 噴霧用 Mometasone (高田) 10g/本 【薬価】 459.10 円 / 瓶 【先発品】 ナゾネックス点鼻液 50μg56 噴霧用</p>	<p>【効】 アレルギー性鼻炎 【用】 (外) 各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回 (1日200μg). 小児:〔12歳未満〕各鼻腔に1噴霧ずつ1日1回 (1日100μg). 〔12歳以上〕各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回 (1日200μg)</p>
<p>レボフロキサシン水和物 コムレクス眼科用液 1.5% Comlex (武田) 5mL/瓶 【薬価】 1,568.10 円 / 瓶</p>	<p>【効】 外耳炎, 中耳炎, (適応菌種) 本剤に感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス, 肺炎桿菌, エンテロバクター属, セラチア属, インフルエンザ菌, 緑膿菌, アシネトバクター属 【用】 (外) 1回6~10滴を1日2回点耳. 点耳後は約10分間の耳浴を行う</p>
<p>コールタイジン点鼻液 Cor tyzine (陽進堂) 15mL/本 【薬価】 7.90 円 / mL 1mL中: 塩酸テトラヒドロゾリン 1.0mg プレドニゾン 0.2mg</p>	<p>【効】 諸種疾患による鼻充血・うっ血 【用】 (外) 6歳以上の小児及び成人に用いる. 成人3~5時間毎に2~3回鼻腔内に噴霧するか, 2~4滴を鼻腔内に点鼻</p>

133. 鎮量剤

1339. その他の鎮量剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ジフェニドール塩酸塩 セファドール錠 25mg Cephadol (日本新薬) 25mg/T 【薬価】 7.40 円 / T</p>	<p>【効】 内耳障害に基づくめまい 【用】 (内) 1回25~50mg, 1日3回</p>
<p>ベタヒスチンメシル酸塩 メリスロン錠 6mg (院外) Merislon (エーザイ) 6mg/T 【薬価】 8.70 円 / T ⑧ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工P」 Betahistine mesilate (日医工) 6mg/T 【薬価】 6.10 円 / T 【先発品】 メリスロン錠 6mg</p>	<p>【効】 次記の疾患に伴うめまい, めまい感:メニエール病, メニエール症候群, めまい症 【用】 (内) 1回1~2錠 (ベタヒスチンメシル酸塩として1回6~12mg) を1日3回食後</p>
<p>トラベルミン配合錠 Travelmin (エーザイ) 1錠 【薬価】 5.90 円 / T 1錠中: ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 40mg ジプロフィリン 26mg</p>	<p>【効】 次記の疾患又は状態に伴う悪心・嘔吐・めまい:動揺病, メニエール症候群 【用】 (内) 1回1錠, 1日3~4回</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>トラベルミン注 Travelmin (エーザイ) 1mL/A 【薬価】 61.00 円 /A 1 管 (1mL) 中： ジフェンヒドラミン塩酸塩 30mg ジプロフィリン 26mg</p>	<p>【効】 次記の疾患又は状態に伴う悪心・嘔吐・めまい：動揺病，メニエール症候群 【用】 (注) 1 回 1mL (1 管) を皮下注又は筋注</p>

21. 循環器官用薬

2. 個々の器官系用医薬品

21. 循環器官用薬

211. 強心剤

2113. ジギタリス製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジゴキシン ジゴキシン錠 0.125mg ㉞ Digosin (中外) 0.125mg/T 【薬価】9.80円/T	【効】 ①次の疾患に基づくうっ血性心不全(肺水腫, 心臓喘息等を含む):先天性心疾患, 弁膜疾患, 高血圧症, 虚血性心疾患(心筋梗塞, 狭心症等), 肺性心(肺血栓・塞栓症, 肺気腫, 肺線維症等によるもの), その他の心疾患(心膜炎, 心筋疾患等), 腎疾患, 甲状腺機能亢進症ならびに低下症等. ②心房細動・粗動による頻脈. ③発作性上室性頻拍. ④次の際における心不全及び各種頻脈の予防と治療:手術, 急性熱性疾患, 出産, ショック, 急性中毒 【用】(内) 急速飽和療法(飽和量:1.0~4.0mg):初回0.5~1.0mg, 以後0.5mgを6~8時間ごとに, 十分効果のあらわれるまで続ける. 比較的急速飽和療法を行うことができる. 緩徐飽和療法を行うことができる. [維持療法]:1日0.25~0.5mg, [小児]急速飽和療法:2歳以下;1日0.06~0.08mg/kgを3~4回に分割. 2歳以上;1日0.04~0.06mg/kgを3~4回に分割. 維持療法:飽和量の1/5~1/3量
ジゴキシン ジゴキシン注 0.25mg ㉞ Digosin (中外) 0.25mg1ml/A 【薬価】136.00円/A	【効】 ①次の疾患に基づくうっ血性心不全(肺水腫, 心臓喘息等を含む):先天性心疾患, 弁膜疾患, 高血圧症, 虚血性心疾患(心筋梗塞, 狭心症等), 肺性心(肺血栓・塞栓症, 肺気腫, 肺線維症等によるもの), その他の心疾患(心膜炎, 心筋疾患等), 腎疾患, 甲状腺機能亢進症ならびに低下症等. ②心房細動・粗動による頻脈. ③発作性上室性頻拍. ④次の際における心不全及び各種頻脈の予防と治療:手術, 急性熱性疾患, 出産, ショック, 急性中毒 【用】(注) 急速飽和療法(飽和量:1.0~2.0mg):1回0.25~0.5mgを2~4時間ごとに静注し, 十分効果のあらわれるまで続ける. 比較的急速飽和療法を行うことができる. 緩徐飽和療法を行うことができる. 維持療法:1日0.25mgを静注. 小児に対して:急速飽和療法:新生児, 未熟児:1日0.03~0.05mg/kgを3~4回に分割, 静注又は筋注. 2歳以下:1日0.04~0.06mg/kgを3~4回に分割, 静注又は筋注. 2歳以上:1日0.02~0.04mg/kgを3~4回に分割, 静注又は筋注. 維持療法:飽和量の1/10~1/5量を静注又は筋注

2115. カフェイン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミノフィリン水和物 ネオフィリン錠 100mg Neophyllin (エーザイ) 100mg/T 【薬価】5.90円/T	【効】 気管支喘息, 喘息性(様)気管支炎, 閉塞性肺疾患(肺気腫, 慢性気管支炎など)における呼吸困難, 肺性心, うっ血性心不全, 心臓喘息(発作予防) 【用】(内) 1日300~400mgを3~4回に分割, 小児:1回2~4mg/kgを1日3~4回
アミノフィリン水和物 ネオフィリン注 250mg Neophyllin (エーザイ) 250mg10ml/A 【薬価】94.00円/A	【効】 気管支喘息, 喘息性(様)気管支炎, 肺性心, うっ血性心不全, 肺水腫, 心臓喘息, チェーン・ストークス呼吸, 閉塞性肺疾患(肺気腫, 慢性気管支炎等)における呼吸困難, 狭心症(発作予防), 脳卒中発作急性期 【用】(注) 1回250mgを1日1~2回生理食塩液又は糖液に希釈して5~10分を要して緩徐に静注. 必要に応じて点滴静注. 小児:1回3~4mg/kgを静注. 投与間隔は8時間以上とし, 最高用量は1日12mg/kgを限度. 必要に応じて点滴静注

2119. その他の強心剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
1-イソプレナリン塩酸塩 プロタノールL注 0.2mg ㉞ Propranolol (興和) 0.2mg1ml/A 【薬価】196.00円/A	【効】 ①アダムス・ストークス症候群(徐脈型)の発作時(高度徐脈, 心停止を含む)あるいは発作反復時. ②心筋梗塞や細菌内毒素等による急性心不全. ③手術後の低心拍出量症候群. ④気管支喘息の重症発作時 【用】(注) 点滴静注:0.2~1.0mgを等張溶液200~500mlに溶解し, 心拍数又は心電図をモニターしながら注入. 徐脈型アダムス・ストークス症候群においては, 心拍数を原則として毎分50~60に保つ. ショックないし低拍出量症候群においては, 心拍数を原則として毎分110前後に保つようにする. 緊急時:急速な効果発現を必要とする時には, 0.2mgを等張溶液20mlに溶解し, その2~20mlを静注(徐々に), 筋注又は皮下注. 心臓がまさに停止せんとする時には, 0.02~0.2mgを心内に与えてもよい

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
dl-イソプレナリン塩酸塩 <u>プロタノール S錠 15mg</u> (株) Proteranol S (興和) 15mg/T 【薬価】 21.30 円/T	【効】 各種の高度徐脈，殊にアダムス・ストークス症候群における発作防止 【用】 (内) 1回 15mgを1日3～4回
ドパミン塩酸塩 <u>イノバン注 100mg</u> (株) Inovan (協和キリン) 100mg5mL/A 【薬価】 188.00 円/A	【効】 ①急性循環不全(心原性ショック，出血性ショック)，②次のような急性循環不全状態：1) 無尿，乏尿や利尿剤で利尿が得られない状態，2) 脈拍数の増加した状態，3) 他の強心・昇圧剤により副作用が認められたり好ましい反応が得られない状態 【用】 (注) 1～5 μ g/kg/分を点滴静注，20 μ g/kgまで増量可，必要に応じて生理食塩液，ブドウ糖注射液，総合アミノ酸注射液，ブドウ糖・乳酸ナトリウム・無機塩類剤等で希釈する
ドパミン塩酸塩 <u>イノバン注 0.6% シリンジ</u> (株) Inovan (協和キリン) 300mg50mL/筒 【薬価】 1,423.00 円/筒	【効】 ①急性循環不全(心原性ショック，出血性ショック)，②次のような急性循環不全状態：1) 無尿，乏尿や利尿剤で利尿が得られない状態，2) 脈拍数の増加した状態，3) 他の強心・昇圧剤により副作用が認められたり好ましい反応が得られない状態 【用】 (注) 1～5 μ g/kg/分を持続静脈投与，20 μ g/kgまで
ドパミン塩酸塩 <u>ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mgキット「VTRS」</u> (株) Dopamine hydrochloride (ヴィアトリス) 0.3%200mL1袋 【薬価】 1,185.00 円/袋	【効】 ①急性循環不全(心原性ショック，出血性ショック)，②次のような急性循環不全状態：1) 無尿，乏尿や利尿剤で利尿が得られない場合，2) 脈拍数の増加した状態，3) 他の強心・昇圧剤により副作用が認められたり好ましい反応が得られない状態 【用】 (注) 1～5 μ g/kg/分を点滴静注，20 μ g/kgまで
ドブタミン塩酸塩 <u>ドブタミン点滴静注液 100mg「FJ」</u> (株) Dobutamine (富士製薬) 100mg5mL/A 【薬価】 201.00 円/A 【先発品】 ドブトレックス注射液 100mg	【効】 ①急性循環不全における心収縮力増強，②心エコー図検査における負荷 【用】 (注) ① 5%ブドウ糖注射液又は生理食塩液で希釈し，1～5 μ g/kg/分を点滴静注，20 μ g/kg/分まで増量可，② 1分間あたり5 μ g/kgから点滴静注を開始，病態が評価できるまで1分間あたり10，20，30，40 μ g/kgと3分毎に増量
ドブタミン塩酸塩 <u>ドブタミン持続静注 300mgシリンジ「KKC」</u> (株) Dobutamine hydrochloride (協和キリン) 300mg50mL/筒 【薬価】 897.00 円/筒	【効】 急性循環不全における心収縮力増強 【用】 (注) 1分間あたり1～5 μ g/kgを持続静注，必要ある場合には1分間あたり20 μ g/kgまで
ピモベンダン <u>ピモベンダン錠 1.25mg「TE」</u> Pimobendan (トーアエイヨー) 1.25mg/T 【薬価】 35.60 円/T	【効】 ①次記の状態，利尿剤等を投与しても十分な心機能改善が得られない場合：急性心不全，②次記の状態，ジギタリス製剤，利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が得られない場合：慢性心不全(軽症～中等症) 【用】 (内) ① 1回 2.5mg，患者の病態に応じ，1日2回，ジギタリス製剤等と併用，② 1回 2.5mgを1日2回食後，ジギタリス製剤，利尿剤等と併用
ミルリノン <u>ミルリール注射液 10mg</u> (株) Milrila (日医工) 10mg10mL/A 【薬価】 2,459.00 円/A	【効】 次記の状態での他の薬剤を投与しても効果が不十分な場合：急性心不全 【用】 (注) 注射液そのまま，又は必要に応じて生理食塩液，ブドウ糖注射液，乳酸リンゲル液，総合アミノ酸注射液等で希釈し，50 μ g/kgを10分間かけて静注し，引き続き0.5 μ g/kg/分を点滴静注，点滴投与量は患者の血行動態，臨床症状に応じて0.25～0.75 μ g/kg/分の範囲で増減できる，点滴静注から開始してもよい

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ユビデカレンノン <u>ノイキノン錠 10mg</u> Neuquinon (エーザイ) 10mg/T 【薬価】9.50 円 /T	【効】基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状 【用】(内) 1回 10mgを 1日 3回食後

212. 不整脈用剤

2121. プロカインアミド系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロカインアミド塩酸塩 <u>アミサリン錠 250mg</u> Amisalin (アルフレッサ) 250mg/T 【薬価】10.10 円 /T	【効】期外収縮（上室性・心室性）、急性心筋梗塞における心室性不整脈の予防、新鮮心房細動、発作性頻拍（上室性・心室性）の治療及び予防、発作性心房細動の予防、電気ショック療法との併用及びその後の洞調律の維持、手術及び麻酔に伴う不整脈の予防、陳旧性心房細動 【用】(内) 1回 0.25～0.5g, 3～6時間毎

2123. β - 遮断剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アテノロール ② <u>アテノロール錠 25mg 「タイヨー」【経過措置】(院内)</u> Atenolol (武田) 25mg/T 【薬価】5.90 円 /T 【先発品】テノーミン錠 25 ② <u>アテノロール錠 50mg 「タイヨー」【経過措置】</u> Atenolol (武田テバ) 50mg/T 【薬価】5.90 円 /T 【先発品】テノーミン錠 50 <u>テノーミン錠 25 (院外)</u> Tenormin (太陽ファルマ) 25mg/T 【薬価】9.80 円 /T <u>テノーミン錠 50 (院外)</u> Tenormin (太陽ファルマ) 50mg/T 【薬価】10.40 円 /T	【効】①本態性高血圧症（軽症～中等症）、②狭心症、③頻脈性不整脈（洞性頻脈、期外収縮） 【用】(内) 50mgを 1日 1回、1日 1回 100mgまで
アロチノロール塩酸塩 <u>アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」</u> Arotinolol hydrochloride (大日本住友) 10mg/T 【薬価】14.80 円 /T	【効】①本態性高血圧症（軽症～中等症）、狭心症、頻脈性不整脈、②本態性振戦 【用】(内) ① 1日 20mgを 2回に分割、1日 30mgまで増量可、② 1日量 10mgから開始し、1日 20mgを維持量として 2回に分割、1日 30mgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠 0.625mg (院外) Maintate (田辺三菱) 0.625mg/T 【薬価】11.80 円/T メインテート錠 2.5mg (院外) Maintate (田辺三菱) 2.5mg/T 【薬価】16.50 円/T ②ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「サワイ」 Bisoprolol fumarate (沢井) 0.625mg/T 【薬価】10.10 円/T 【先発品】メインテート錠 0.625mg ②ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「テバ」 Bisoprolol fumarate (武田) 2.5mg/T 【薬価】10.10 円/T 【先発品】メインテート錠 2.5mg</p>	<p>【効】 [2.5mg錠, 5mg錠] ①本態性高血圧症 (軽症～中等症), 狭心症, 心室性期外収縮. ②頻脈性心房細動. [0.625mg錠, 2.5mg錠, 5mg錠] ③次の状態で, アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシン II 受容体拮抗薬, 利尿薬, ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者: 虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全 【用】 (内) ① 1日1回 5mg. ② 1日1回 2.5mgから開始, 1日1回 5mgまで. ③ 1日1回 0.625mgから開始, 1日1回 0.625mgの用量で2週間以上投与し, 忍容性がある場合には, 1日1回 1.25mgに増量. その後忍容性がある場合には, 4週間以上の間隔で忍容性をみながら段階的に増量し, 忍容性がない場合は減量. 用量の増減は1回投与量を0.625, 1.25, 2.5, 3.75又は5mgとして必ず段階的に行い, いずれの用量においても, 1日1回投与とする. 維持量として1日1回 1.25～5mgを投与. 年齢, 症状により, 開始用量は更に低用量に, 増量幅は更に小さくしてもよい. 患者の本剤に対する反応性により, 維持量は増減するが, 1日1回 5mgまで</p>
<p>プロプラノロール塩酸塩 インデラル錠 10mg Ⓢ Inderal (太陽ファルマ) 10mg/T 【薬価】10.10 円/T</p>	<p>【効】 ①本態性高血圧症 (軽症～中等症). ②狭心症. ③期外収縮 (上室性・心室性), 発作性頻拍の予防, 頻拍性心房細動 (徐脈効果), 洞性頻脈, 新鮮心房細動, 発作性心房細動の予防. ④褐色細胞腫手術時. ⑤片頭痛発作の発症抑制. ⑥右心室流出路狭窄による低酸素発作の発症抑制 【用】 (内) ① 1日 30～60mgより投与をはじめ, 効果が不十分な場合は120mgまで漸増し, 1日3回に分割. ② ④ 1日 30mgより投与をはじめ, 効果が不十分な場合は60mg, 90mgと漸増し, 1日3回に分割. ③ 1日 30mgより投与をはじめ, 効果が不十分な場合は60mg, 90mgと漸増し, 1日3回に分割. 小児: 1日 0.5～2mg/kgを, 低用量から開始し, 1日3～4回に分割. 1日 4mg/kgまで増量可. 1日投与量として90mgまで. ⑤ 1日 20～30mgより投与をはじめ, 効果が不十分な場合は60mgまで漸増し, 1日2回あるいは3回に分割. ⑥ 乳幼児には1日 0.5～2mg/kgを低用量から開始し, 1日3～4回に分割. 効果不十分な場合は1日 4mg/kgまで増量可</p>
<p>ランジオロール塩酸塩 オノアクト点滴静注用 50mg Ⓢ Onoact (小野) 50mg/V 【薬価】4,091.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 <成人> ①手術時の次記の頻脈性不整脈に対する緊急処置: 心房細動, 心房粗動, 洞性頻脈. ②手術後の循環動態監視下における次記の頻脈性不整脈に対する緊急処置: 心房細動, 心房粗動, 洞性頻脈. ③心機能低下例における次記の頻脈性不整脈: 心房細動, 心房粗動. ④生命に危険のある次記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合: 心室細動, 血行動態不安定な心室頻拍. ⑤敗血症に伴う次記の頻脈性不整脈: 心房細動, 心房粗動, 洞性頻脈. <小児> 心機能低下例における次記の頻脈性不整脈: 上室頻拍, 心房細動, 心房粗動 【用】 <成人> (注) ① 0.125mg/kg/分で1分間静脈内持続投与した後, 0.04mg/kg/分で静脈内持続投与. 投与中は心拍数, 血圧を測定し0.01～0.04mg/kg/分の用量で適宜調節. ② 0.06mg/kg/分で1分間静脈内持続投与した後, 0.02mg/kg/分で静脈内持続投与を開始. 5～10分を目安に目標とする徐拍作用が得られない場合は, 0.125mg/kg/分で1分間静脈内持続投与した後, 0.04mg/kg/分で静脈内持続投与. 投与中は心拍数, 血圧を測定し0.01～0.04mg/kg/分の用量で適宜調節. ③ 1μg/kg/分の速度で静脈内持続投与を開始. 投与中は心拍数, 血圧を測定し1～10μg/kg/分の用量で調節. ④ 1μg/kg/分の速度で静脈内持続投与を開始. 投与中は心拍数, 血圧を測定し1～10μg/kg/分の用量で調節. 心室細動又は血行動態不安定な心室頻拍が再発し本剤投与が必要な場合, 心拍数, 血圧を測定し最大40μg/kg/分まで増量できる. ⑤ 1μg/kg/分の速度で静脈内持続投与を開始. 投与中は心拍数, 血圧を測定し, 維持量は適宜増減. 最大用量は20μg/kg/分を超えない. <小児> 小児の心機能低下例における頻脈性不整脈: 1μg/kg/分の速度で静脈内持続投与を開始. 投与中は心拍数, 血圧を測定し1～10μg/kg/分の用量で調節</p>

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ランジオロール塩酸塩 コアベータ静注用 12.5mg Ⓢ Corebeta (小野) 12.5mg/V 【薬価】2,616.00円/瓶	【効】コンピューター断層撮影による冠動脈造影における高心拍数時の冠動脈描出能の改善 【用】(注) 1回0.125mg/kgを1分間で静注

2129. その他の不整脈用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アプリンジン塩酸塩 アスペノンカプセル 10 (院外) Ⓢ Aspenon (バイエル) 10mg/cap 【薬価】23.00円/cap Ⓢ アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg「NP」 Ⓢ Aprindine hydrochloride (ニプロ) 10mg/cap 【薬価】12.90円/cap 【先発品】アスペノンカプセル 10	【効】次記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：頻脈性不整脈 【用】(内) 1日40mgよりはじめ、効果が不十分な場合は60mgまで増量し、1日2～3回に分割
アミオダロン塩酸塩 アンカロン注 150 Ⓢ Ancaron (サノフィ) 150mg3mL/A 【薬価】1,696.00円/A	【効】①生命に危険のある次記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合：心室細動、血行動態不安定な心室頻拍。②電気的除細動抵抗性の心室細動あるいは無脈性心室頻拍による心停止 【用】(注) ①次のとおり点滴静注。最大量として1日の総投与量は1250mgまで及び投与濃度は2.5mg/mLまで。 (1) 投与方法 (48時間まで) 1) 初期急速投与：125mg (2.5mL) を5%ブドウ糖液100mLに加え、容量型の持続注入ポンプを用い、600mL/時 (10mL/分) で10分間投与。 2) 負荷投与：750mg (15mL) を5%ブドウ糖液500mLに加え、容量型の持続注入ポンプを用い33mL/時で6時間投与。 3) 維持投与：17mL/時で合計42時間投与。(a) 6時間の負荷投与後、残液を33mL/時から17mL/時に投与速度を変更し、18時間投与。(b) 750mg (15mL) を5%ブドウ糖液500mLに加え、容量型の持続注入ポンプを用い17mL/時で24時間投与(アミオダロン塩酸塩として600mg)。 (2) 追加投与：血行動態不安定な心室頻拍あるいは心室細動が再発し、本剤投与が必要な場合には追加投与可。1回の追加投与は125mg (2.5mL) を5%ブドウ糖液100mLに加え、容量型の持続注入ポンプを用い、600mL/時 (10mL/分) で10分間投与。 (3) 継続投与 (3日以降)：48時間の投与終了後、継続投与が必要な場合には、継続投与可。750mg (15mL) を5%ブドウ糖液500mLに加え、容量型の持続注入ポンプを用い17mL/時で投与(アミオダロン塩酸塩として600mg/24時間)。 ② 300mg (6mL) 又は5mg/kgを5%ブドウ糖液20mLに加え、静脈内へボーラス投与。心室性不整脈が持続する場合には、150mg (3mL) 又は2.5mg/kgを5%ブドウ糖液10mLに加え、追加投与可
アミオダロン塩酸塩 アミオダロン塩酸塩錠 100mg「サワイ」 Ⓢ Amiodarone hydrochloride (沢井) 100mg/T 【薬価】77.40円/T	【効】生命に危険のある次記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合：心室細動、心室性頻拍、心不全(低心機能)又は肥大型心筋症に伴う心房細動 【用】(内) 導入期：1日400mgを1～2回に分割し1～2週間。維持期：1日200mgを1～2回に分割

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジソピラミド <u>リスモダンカプセル 100mg</u> ㊞ Rythmodan (クリニジェン) 100mg/cap 【薬価】 31.20 円 /cap	【効】 次記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：期外収縮、発作性上室性頻脈、心房細動 【用】 (内) 1回 100mg 1日 3回
ジソピラミドリン酸塩 <u>リスモダン R 錠 150mg</u> ㊞ Rythmodan R (クリニジェン) 150mg/T 【薬価】 26.80 円 /T	【効】 次記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：頻脈性不整脈 【用】 (内) 1回 1錠, 1日 2回
ジソピラミドリン酸塩 <u>リスモダン P 静注 50mg</u> ㊞ Rythmodan P (クリニジェン) 50mg5mL/A 【薬価】 369.00 円 /A	【効】 緊急治療を要する次記不整脈：①期外収縮 (上室性, 心室性). ②発作性頻拍 (上室性, 心室性). ③発作性心房細・粗動 【用】 (注) 1回 50～100mg (1～2mg/kg) をブドウ糖液などに溶解し, 5分以上かけ緩徐に静注
シベンゾリンコハク酸塩 <u>シベノール錠 100mg</u> ㊞ Cibenol (アステラス) 100mg/T 【薬価】 32.70 円 /T	【効】 次記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：頻脈性不整脈 【用】 (内) 1日 300mgよりはじめ, 450mgまで増量し, 1日 3回に分割
シベンゾリンコハク酸塩 <u>シベノール静注 70mg</u> ㊞ Cibenol (アステラス) 70mg5mL/A 【薬価】 778.00 円 /A	【効】 頻脈性不整脈 【用】 (注) 1回 1.4mg/kg (本剤として 0.1mL/kg) を生理食塩液又はブドウ糖液にて希釈し, 血圧及び心電図監視下 2～5分間かけて静注
ソタロール塩酸塩 <u>㊞ソタロール塩酸塩錠 40mg 「TE」</u> Sotalol hydrochloride (トーアエイヨー) 40mg/T 【薬価】 40.00 円 /T 【先発品】 ソタコール錠 40mg	【効】 生命に危険のある次記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合：心室頻拍, 心室細動 【用】 (内) 1日 80mgから開始し, 1日 320mgまで増量し, 1日 2回に分割
ニフェカラント塩酸塩 <u>シンビット静注用 50mg</u> ㊞ Shinbit (アステラス) 50mg/V 【薬価】 4,030.00 円 / 瓶	【効】 生命に危険のある次記の不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合：心室頻拍, 心室細動 【用】 (注) 単回静注法：1回 0.3mg/kgを 5分間かけて心電図の連続監視下に静注. 維持静注法：単回静注が有効で効果の維持を期待する場合には, 1時間あたり 0.4mg/kgを等速度で心電図の連続監視下に静注. 生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液で溶解して使用

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ピルシカイニド塩酸塩水和物 サンリズムカプセル 50mg (院外) Ⓢ Sunrythm (第一三共) 50mg/cap 【薬価】40.90 円 /cap Ⓢ後ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「CH」 Ⓢ Pilsicainide hydrochloride (日本ジェネリック) 50mg/cap 【薬価】21.50 円 /cap 【先発品】サンリズムカプセル 50mg</p>	<p>【効】次記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：頻脈性不整脈 【用】(内) 1日 150mgを3回に分割、1日 225mgまで</p>
<p>ピルシカイニド塩酸塩水和物 サンリズム注射液 50 Ⓢ Sunrythm (第一三共) 50mg5mL/A 【薬価】510.00 円 /A</p>	<p>【効】緊急治療を要する頻脈性不整脈(上室性及び心室性) 【用】(注) ①期外収縮：1回 0.75mg/kgを必要に応じて生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液などで希釈し、血圧ならびに心電図監視下に10分間で徐々に静注。②頻拍：1回 1.0mg/kgを必要に応じて生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液などで希釈し、血圧ならびに心電図監視下に10分間で徐々に静注</p>
<p>フレカイニド酢酸塩 タンボコール錠 50mg Ⓢ Tambacor (エーザイ) 50mg/T 【薬価】46.50 円 /T</p>	<p>【効】次記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：〔成人〕頻脈性不整脈(発作性心房細動・粗動、心室性)。(小児)頻脈性不整脈(発作性心房細動・粗動、発作性上室性、心室性) 【用】(内) 頻脈性不整脈(発作性心房細動・粗動)：1日 100mgから開始し、200mgまで増量し、1日2回に分割。適宜減量。頻脈性不整脈(心室性)：1日 100mgから開始し、200mgまで増量し、1日2回に分割。小児(頻脈性不整脈(発作性心房細動・粗動、発作性上室性、心室性))：〔6か月以上の乳児、幼児及び小児〕1日 50～100mg/m²を1日2～3回に分割。1日 200mg/m²まで。〔6か月未満の乳児〕1日 50mg/m²を1日2～3回に分割。1日 200mg/m²まで</p>
<p>ベプリジル塩酸塩水和物 ベプリコール錠 50mg Ⓢ BepriCOR (オルガノン) 50mg/T 【薬価】38.50 円 /T</p>	<p>【効】①次の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合：持続性心房細動、頻脈性不整脈(心室性)。②狭心症 【用】(内) 持続性心房細動：1日 100mgから開始し、200mgまで。1日2回に分割。適宜減量。頻脈性不整脈(心室性)及び狭心症：1日 200mgを1日2回に分割</p>
<p>ベラパミル塩酸塩 ワソラン静注 5mg Ⓢ Vasolan (エーザイ) 5mg2mL/A 【薬価】213.00 円 /A</p>	<p>【効】頻脈性不整脈(発作性上室性頻拍、発作性心房細動、発作性心房粗動) 【用】(注) 1回 5mgを、必要に応じて生理食塩液又はブドウ糖注射液で希釈し、5分以上かけて徐々に静注。小児：1回 0.1～0.2mg/kg(但し、1回 5mgまで)を、必要に応じて生理食塩液又はブドウ糖注射液で希釈し、5分以上かけて徐々に静注</p>
<p>メキシレチン塩酸塩 メキシチールカプセル 100mg Ⓢ Mexitil (太陽ファルマ) 100mg/cap 【薬価】14.90 円 /cap</p>	<p>【効】①頻脈性不整脈(心室性)。②糖尿病性神経障害に伴う自覚症状(自発痛、しびれ感)の改善 【用】(内) ①1日 300mgよりはじめ、効果が不十分な場合は450mgまで増量し、1日3回に分割し食後。②1日 300mgを1日3回に分割し食後</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メキシレチン塩酸塩 <u>メキシチール点滴静注 125mg</u> Ⓜ Mexitil (太陽ファルマ) 125mg5mL/A 【薬価】 786.00 円 / A	【効】 頻脈性不整脈 (心室性) 【用】 (注) ①静脈内 1 回投与法: 1 回 125mg, 2 ~ 3mg/kg を生理食塩液又はブドウ糖液等に希釈し, 心電図の監視下に臨床症状の観察, 血圧測定を頻回に行いながら 5 ~ 10 分間かけ徐々に静注. ②点滴静脈内投与法: 静脈内 1 回投与が有効で, 効果の持続を期待する場合に, 心電図の連続監視下に臨床症状の観察, 血圧測定を頻回に行いながら点滴静注. 次のいずれかの方法で投与. 1) シリンジポンプを用いる場合: 125mg を生理食塩液又はブドウ糖液等に希釈し, 1 時間に 0.4 ~ 0.6mg/kg の速度で. 2) 微量調整用の自動点滴装置又は微量調整用の輸液セットを用いる場合: 125mg を生理食塩液又はブドウ糖液等に 500mL に希釈し, 0.4 ~ 0.6mg/kg/時 (体重 50kg の場合 1 時間に 1.3 ~ 2.0mL に相当) の速度で

213. 利尿剤

2132. チアジド系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
トリクロルメチアジド <u>フルイトラン錠 2mg</u> Fluitran (塩野義) 2mg/T 【薬価】 9.80 円 / T	【効】 高血圧症 (本態性, 腎性等), 悪性高血圧, 心性浮腫 (うっ血性心不全), 腎性浮腫, 肝性浮腫, 月経前緊張症 【用】 (内) 1 日 2 ~ 8mg を 1 ~ 2 回に分割. 高血圧症に用いる場合には少量から開始して徐々に増量. 悪性高血圧に用いる場合には, 他の降圧剤と併用

2133. 抗アルドステロン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カンレノ酸カリウム <u>⑧カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」</u> Ⓜ Potassium canrenoate (沢井) 200mg/V 【薬価】 185.00 円 / 瓶	【効】 経口抗アルドステロン薬の服用困難な次記症状 (高アルドステロン症によると思われる) の改善: ①原発性アルドステロン症. ②心性浮腫 (うっ血性心不全), 肝性浮腫. ③開心術及び開腹術時における水分・電解質代謝異常 【用】 (注) 1 回 100 ~ 200mg を 1 日 1 ~ 2 回, ブドウ糖注射液, 生理食塩液又は注射用水 10 ~ 20mL に溶解して, ゆっくりと静注. 1 日量として 600mg まで. 期間は原則として 2 週間まで
スピロノラクトン <u>アルダクトン A 細粒 10%</u> Aldactone A (ファイザー) 100mg/g 【薬価】 56.50 円 / g <u>アルダクトン A 錠 25mg</u> Aldactone A (ファイザー) 25mg/T 【薬価】 14.50 円 / T	【効】 ①高血圧症 (本態性, 腎性等). ②心性浮腫 (うっ血性心不全), 腎性浮腫, 肝性浮腫, 特発性浮腫, 悪性腫瘍に伴う浮腫及び腹水, 栄養失調性浮腫. ③原発性アルドステロン症の診断及び症状の改善 【用】 (内) 1 日 50 ~ 100mg を分割. ③のほかは他剤と併用することが多い

2134. 炭酸脱水酵素阻害剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アセタゾラミド <u>ダイアモックス錠 250mg</u> Diamox (三和化学) 250mg/T 【薬価】 18.90 円 / T	【効】 ①緑内障. ②てんかん (他の抗てんかん薬で効果が不十分な場合に付加). ③肺気腫における呼吸性アシドーシスの改善, 心性浮腫, 肝性浮腫. ④月経前緊張症. ⑤メニエル病及びメニエル症候群. ⑥睡眠時無呼吸症候群 [ダイアモックス錠 250mg のみ] 【用】 (内) ① 1 日 250 ~ 1000mg を分割. ② 1 日 250 ~ 750mg を分割. ③ 1 日 1 回 250 ~ 500mg. ④ 1 日 1 回 125 ~ 375mg を月経前 5 ~ 10 日間又は症状が発現した日から. ⑤ 1 日 1 回 250 ~ 750mg. ⑥ 1 日 250 ~ 500mg を分割
アセタゾラミドナトリウム <u>ダイアモックス注射用 500mg</u> Diamox (三和化学) 500mg/V 【薬価】 479.00 円 / 瓶	【効】 ①緑内障. ②てんかん (他の抗てんかん薬で効果が不十分な場合に付加). ③肺気腫における呼吸性アシドーシスの改善. ④メニエル病及びメニエル症候群 【用】 (注) ① 1 日 250mg ~ 1g を分割して静注又は筋注. ② 1 日 250 ~ 750mg を分割して静注又は筋注. ③ 1 日 1 回 250 ~ 500mg を静注又は筋注. ④ 1 日 1 回 250 ~ 750mg を静注又は筋注. 注射液の調製法: 注射用水, 生理食塩液, 又は 5% ブドウ糖液で完全に溶解してから使用

21. 循環器官用薬

2139. その他の利尿剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アゾセミド <u>ダイアート錠 60mg (院外)</u> Diart (三和化学) 60mg/T 【薬価】 17.70 円 /T <u>後アゾセミド錠 30mg 「JG」</u> Azosemide (日本ジェネリック) 30mg/T 【薬価】 10.10 円 /T 【先発品】 ダイアート錠 30mg <u>後アゾセミド錠 60mg 「JG」</u> Azosemide (日本ジェネリック) 60mg/T 【薬価】 12.30 円 /T 【先発品】 ダイアート錠 60mg</p>	<p>【効】 心性浮腫 (うっ血性心不全), 腎性浮腫, 肝性浮腫 【用】 (内) 1 日 1 回 60mg</p>
<p>イソソルビド <u>イソソルビド内用液 70% 分包 40mL 「CEO」</u> Isosorbide (武田) 70%40mL/ 包 【薬価】 125.80 円 / 包 <u>イソバイドシロップ 70% 分包 30mL</u> Isobide (興和) 21.0g30mL/ 包 【薬価】 83.80 円 / 包</p>	<p>【効】 ①脳腫瘍時の脳圧降下, 頭部外傷に起因する脳圧亢進時の脳圧降下, 腎・尿管結石時の利尿, 緑内障の眼圧降下. ②メニエール病 【用】 (内) ① 1 日量 70 ~ 140mL を 2 ~ 3 回に分割. ② 1 日 1.5 ~ 2.0mL/kg を標準用量とし, 1 日量 90 ~ 120mL を毎食後 3 回に分割. 必要によって冷水で 2 倍程度に希釈</p>
<p>トラセミド <u>後トラセミド OD 錠 4mg 「TE」</u> Torasemide OD (アステラス) 4mg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 ルブラック錠 4mg</p>	<p>【効】 心性浮腫, 腎性浮腫, 肝性浮腫 【用】 (内) 1 日 1 回 4 ~ 8mg</p>
<p>トルバプタン <u>サムスカ OD 錠 7.5mg</u> Samsca OD (大塚) 7.5mg/T 【薬価】 836.30 円 /T</p>	<p>【効】 ①ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留. ②ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留. ③腎容積が既に増大しており, かつ, 腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性嚢胞腎の進行抑制. ④抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) における低ナトリウム血症の改善 【用】 (内) ① 15mg を 1 日 1 回. ② 7.5mg を 1 日 1 回. ③ 1 日 60mg を 2 回 (朝 45mg, 夕方 15mg) に分割して投与を開始. 1 日 60mg の用量で 1 週間以上投与し, 忍容性がある場合には, 1 日 90mg (朝 60mg, 夕方 30mg), 1 日 120mg (朝 90mg, 夕方 30mg) と 1 週間以上の間隔を空けて段階的に増量. 最高用量は 1 日 120mg まで. ④ 7.5mg を 1 日 1 回. 必要に応じて, 望ましい血清ナトリウム濃度に達するまで段階的に増量できる. 最高用量は 1 日 60mg まで</p>
<p>トルバプタン <u>サムスカ OD 錠 15mg</u> Samsca OD (大塚) 15mg/T 【薬価】 1,295.50 円 /T</p>	<p>【効】 ①ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留. ②腎容積が既に増大しており, かつ, 腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性嚢胞腎の進行抑制. ③抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) における低ナトリウム血症の改善 【用】 (内) ① 15mg を 1 日 1 回. ② 1 日 60mg を 2 回 (朝 45mg, 夕方 15mg) に分割して投与を開始. 1 日 60mg の用量で 1 週間以上投与し, 忍容性がある場合には, 1 日 90mg (朝 60mg, 夕方 30mg), 1 日 120mg (朝 90mg, 夕方 30mg) と 1 週間以上の間隔を空けて段階的に増量. 最高用量は 1 日 120mg まで. ③ 7.5mg を 1 日 1 回. 必要に応じて, 望ましい血清ナトリウム濃度に達するまで段階的に増量できる. 最高用量は 1 日 60mg まで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
トルバブタンリン酸エステルナトリウム <u>サムタス点滴静注用 8mg</u> (株) Samtasu (大塚) 8mg/瓶 【薬価】 1,155.00 円/瓶	【効】 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 【用】 (注) 16mgを1日1回1時間かけて点滴静注
フロセミド <u>ラシックス錠 20mg (院外)</u> Lasix (日医工) 20mg/T 【薬価】 9.80 円/T <u>ラシックス錠 40mg (院外)</u> Lasix (日医工) 40mg/T 【薬価】 11.60 円/T <u>後フロセミド錠 40mg 「NP」</u> Furosemide (ニプロ) 40mg/T 【薬価】 6.40 円/T 【先発品】 ラシックス錠 40mg	【効】 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧、心性浮腫(うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、末梢血管障害による浮腫、尿路結石排出促進 【用】 (内) 1日1回40～80mgを連日又は隔日、腎機能不全等の場合には更に大量に用いることもある。悪性高血圧に用いる場合には、他の降圧剤と併用
フロセミド <u>後フロセミド注 20mg 「トーウ」</u> Furosemide (東和薬品) 20mg2mL/A 【薬価】 58.00 円/A 【先発品】 ラシックス注 20mg	【効】 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧、心性浮腫(うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、脳浮腫、尿路結石排出促進 【用】 (注) 1日1回20mgを静注又は筋注。腎機能不全等の場合には更に大量に用いることもある。悪性高血圧に用いる場合には、他の降圧剤と併用

214. 血圧降下剤

2144. アンジオテンシン変換酵素阻害剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イミダプリル塩酸塩 <u>タナトリル錠 5 (院外)</u> Tanatril (田辺三菱) 5mg/T 【薬価】 34.00 円/T <u>後イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」</u> Imidapril hydrochloride (沢井) 5mg/T 【薬価】 16.20 円/T 【先発品】 タナトリル錠 5	【効】 ①高血圧症、腎実質性高血圧症。②1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症 【用】 (内) ①5～10mgを1日1回。重症高血圧症、腎障害を伴う高血圧症又は腎実質性高血圧症では2.5mgから開始が望ましい。②5mgを1日1回。重篤な腎障害を伴う患者では2.5mgから開始が望ましい
エナラプリルマレイン酸塩 <u>レニベース錠 5 (院外)</u> Renivace (MSD) 5mg/T 【薬価】 15.20 円/T <u>後エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「NikP」</u> Enalapril maleate (日医工) 5mg/T 【薬価】 11.10 円/T 【先発品】 レニベース錠 10	【効】 ①本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧。②次記の状態、ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が認められない場合：慢性心不全(軽症～中等症) 【用】 (内) ①5～10mgを1日1回。腎性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧の患者では2.5mgから開始することが望ましい。生後1か月以上の小児：0.08mg/kgを1日1回。②ジギタリス製剤、利尿剤等と併用。5～10mgを1日1回。腎障害を伴う患者又は利尿剤投与中の患者では2.5mg(初回量)から開始することが望ましい

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テモカプリル塩酸塩 <u>エースコール錠 1mg (院外)</u> Acecol (第一三共) 1mg/T 【薬価】 20.00 円 /T ② <u>テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「サワイ」</u> Temocapril hydrochloride (沢井) 1mg/T 【薬価】 10.10 円 /T 【先発品】 エースコール錠 1mg	【効】 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 【用】 (内) 1日1回2～4mg、1日1回1mgから開始し、必要に応じ4mgまで漸次増量

2145. メチルドパ製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メチルドパ水和物 <u>アルドメット錠 250</u> Aldomet (ミノファージェン) 250mg/T 【薬価】 16.80 円 /T	【効】 高血圧症 (本態性、腎性等)、悪性高血圧 【用】 (内) 初期1日250～750mgからはじめ、適当な降圧効果が得られるまで数日以上の間隔をおいて1日250mgずつ増量。維持量は1日250～2000mgで1～3回に分割

2149. その他の血圧降下剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アジルサルタン ② <u>アジルサルタン錠 40mg 「トーフ」</u> Azilsartan (東和薬品) 40mg/T 【薬価】 48.00 円 /T 【先発品】 アジルバ錠 40mg	【効】 高血圧症 【用】 (内) 20mgを1日1回、1日40mgまで
アゼルニジピン <u>カルブロック錠 16mg (院外)</u> Calblock (第一三共) 16mg/T 【薬価】 30.30 円 /T ② <u>アゼルニジピン錠 16mg 「NP」</u> Azelnidipine (ニプロ) 16mg/T 【薬価】 12.20 円 /T 【先発品】 カルブロック錠 16mg	【効】 高血圧症 【用】 (内) 8～16mgを1日1回朝食後、1回8mgあるいは更に低用量から開始し、1日16mgまで
イルベサルタン <u>アバプロ錠 100mg (院外)</u> Avapro (大日本住友) 100mg/T 【薬価】 47.90 円 /T ② <u>イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」</u> Irbesartan (沢井) 100mg/T 【薬価】 19.80 円 /T 【先発品】 アバプロ錠 100mg、イルベタン錠 100mg	【効】 高血圧症 【用】 (内) 50～100mgを1日1回、1日200mgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インダパミド ナトリックス錠 1 Natrix (大日本住友) 1mg/T 【薬価】 10.10 円/T	【効】 本態性高血圧症 【用】 (内) 1日1回 2mg朝食後, 少量から開始し漸増
ウラピジル エبرانチルカプセル 15mg Ebrantil (科研) 15mg/cap 【薬価】 15.80 円/cap	【効】 ①本態性高血圧症, 腎性高血圧症, 褐色細胞腫による高血圧症. ②前立腺肥大症に伴う排尿障害. ③神経因性膀胱に伴う排尿困難 【用】 (内) 以下を1日2回に分割し朝夕食後, ①1日30mgより開始, 1～2週間の間隔で1日120mgまで漸増. ②1日30mgより開始, 1～2週間の間隔で1日60～90mgまで漸増, 1日90mgまで. ③1日30mgより開始, 1～2週間の間隔で1日60mgに漸増, 1日90mgまで
エサキセレン ミネプロ OD 錠 2.5mg Minnebro OD (第一三共) 2.5mg/T 【薬価】 91.60 円/T	【効】 高血圧症 【用】 (内) 2.5mgを1日1回. 効果不十分な場合は, 5mgまで増量可
エブレレノン ②エブレレノン錠 50mg 「杏林」 Eplerenone (杏林) 50mg/T 【薬価】 22.80 円/T 【先発品】 セララ錠 50mg	【効】 ①高血圧症②次記の状態, アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシン II 受容体拮抗薬, β遮断薬, 利尿薬等の基礎治療を受けている患者, 慢性心不全 【用】 (内) ①1日1回 50mgから開始, 100mgまで増量可. ②1日1回 25mgから開始, 開始から4週間以降を目安に1日1回 50mgへ増量. 中等度の腎機能障害のある患者では, 1日1回隔日 25mgから開始し, 最大用量は1日1回 25mg. 血清カリウム値, 患者の状態に応じて適宜減量又は中断
オルメサルタンメドキシミル オルメテック OD 錠 20mg (院外) Olmetec OD (第一三共) 20mg/T 【薬価】 37.40 円/T ②オルメサルタン OD 錠 5mg 「DSEP」 Olmesartan OD (第一三共エスファ) 20mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 オルメテック OD 錠 5mg	【効】 高血圧症 【用】 (内) 10～20mgを1日1回. 1日5～10mgから開始し, 1日40mgまで
カルベジロール アーチスト錠 2.5mg (院外) Artist (第一三共) 2.5mg/T 【薬価】 12.90 円/T ②カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」 Carvedilol (沢井) 2.5mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アーチスト錠 2.5mg	【効】 ①次の状態で, アンジオテンシン変換酵素阻害薬, 利尿薬, ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者: 虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全. ②頻脈性心房細動 【用】 (内) ①1回1.25mg, 1日2回食後経口投与から開始. 1回1.25mg, 1日2回の用量に忍容性がある場合には, 1週間以上の間隔で忍容性をみながら段階的に増量し, 忍容性がない場合は減量. 用量の増減は必ず段階的に行い, 1回投与量は1.25mg, 2.5mg, 5mg又は10mgのいずれかとし, いずれの用量においても, 1日2回食後. 維持量として1回2.5～10mgを1日2回食後. 開始用量は更に低用量としてもよい. ②1回5mgを1日1回から開始, 効果が不十分な場合には10mgを1日1回, 20mgを1日1回へ段階的に増量. 最大投与量は20mgを1日1回まで

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カルベジロール <u>アーチスト錠 10mg (院外)</u> Artist (第一三共) 10mg/T 【薬価】 19.50 円/T <u>後カルベジロール錠 10mg 「サワイ」</u> Carvedilol (沢井) 10mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アーチスト錠 10mg</p>	<p>【効】 ①本態性高血圧症（軽症～中等症）、腎実質性高血圧症。②狭心症。③次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者：虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全。④頻脈性心房細動</p> <p>【用】(内) ① 1回 10～20mgを1日1回。② 1回 20mgを1日1回。③ 1回 1.25mg、1日2回食後経口投与から開始。1回 1.25mg、1日2回の用量に忍容性がある場合には、1週間以上の間隔で忍容性をみながら段階的に増量し、忍容性がない場合は減量。用量の増減は必ず段階的に行い、1回投与量は1.25mg、2.5mg、5mg又は10mgのいずれかとし、いずれの用量においても、1日2回食後。維持量として1回 2.5～10mgを1日2回食後。開始用量は更に低用量としてもよい。④ 1回 5mgを1日1回から開始。効果が不十分な場合には10mgを1日1回、20mgを1日1回へ段階的に増量。最大投与量は20mgを1日1回まで</p>
<p>シルニジピン <u>アテック錠 10 (院外)</u> Atelec (持田) 10mg/T 【薬価】 27.10 円/T <u>後シルニジピン錠 10mg 「サワイ」</u> Cilnidipine (沢井) 10mg/T 【薬価】 15.10 円/T 【先発品】 アテック錠 10</p>	<p>【効】 高血圧症</p> <p>【用】(内) 1日1回 5～10mgを朝食後。1日1回 20mgまで。重症高血圧症には1日1回 10～20mgを朝食後</p>
<p>テルミサルタン <u>ミカルディア錠 40mg</u> Micardis (アステラス) 40mg/T 【薬価】 38.20 円/T <u>後テルミサルタン錠 40mg 「ニプロ」</u> Telmisartan (ニプロ) 40mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 ミカルディア錠 40mg</p>	<p>【効】 高血圧症</p> <p>【用】(内) 40mgを1日1回。1日 20mgから開始し漸次増量。1日 80mgまで</p>
<p>ドキサゾシンメシル酸塩 <u>カルデナリン錠 2mg (院外)</u> Cardenalin (ファイザー) 2mg/T 【薬価】 20.20 円/T <u>後ドキサゾシン錠 2mg 「テバ」</u> Doxazosin (武田) 2mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 カルデナリン錠 2mg</p>	<p>【効】 ①高血圧症。②褐色細胞腫による高血圧症</p> <p>【用】(内) 1日1回 0.5mgより始め、効果が不十分な場合1～2週間の間隔をおいて1～4mgに漸増し、1日1回。1日 8mgまで。褐色細胞腫による高血圧症に対しては1日 16mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ニカルジピン塩酸塩 <u>⑨</u> ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg <u>「サワイ」</u> ㊞ Nicardipine hydrochloride (沢井) 2mg2mL/A 【薬価】 94.00 円/A 【先発品】 ベルジピン注射液 2mg <u>ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg</u> <u>「サワイ」</u> ㊞ Nicardipine hydrochloride (沢井) 10mg10mL/A 【薬価】 97.00 円/A	【効】 ①手術時の異常高血圧の救急処置。②高血圧性緊急症。③急性心不全（慢性心不全の急性増悪を含む） 【用】 (注) 生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液で希釈し、0.01～0.02% (1mL 当たり 0.1～0.2mg) 溶液を点滴静注。① 2～10 μ g/kg/分の点滴速度で開始し、目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら点滴速度を調節。急速に血圧を下げる必要がある場合には、本剤をそのまま 10～30 μ g/kg を静注。② 0.5～6 μ g/kg/分の点滴速度で、0.5 μ g/kg/分より開始し、目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら点滴速度を調節。③ 1 μ g/kg/分の点滴速度で、病態に応じて 0.5～2 μ g/kg/分の範囲で点滴速度を調節
ニトロプルシドナトリウム水和物 <u>ニトロプロ持続静注液 6mg</u> ㊞ Nitropro (丸石) 6mg2mL/A 【薬価】 638.00 円/A	【効】 ①手術時の低血圧維持。②手術時の異常高血圧の救急処置。③急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）。④高血圧性緊急症 【用】 (注) 5% ブドウ糖注射液で希釈し、0.06～0.1% (1mL 当たり 0.6～1mg) 溶液を持続静注。① 0.5 μ g/kg/分で開始。過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら投与速度を調節。2.5 μ g/kg/分以下の投与速度で目的とする血圧が得られ、それを維持することができる。最高投与速度は 3 μ g/kg/分を限度。開始投与速度は年齢、症状により適宜減量。② 0.5 μ g/kg/分で開始し。過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら投与速度を調節。2.0 μ g/kg/分以下の投与速度で目的とする血圧が得られ、それを維持することができる。最高投与速度は 3 μ g/kg/分を限度。開始投与速度は年齢、症状により適宜減量。③④小児には 0.5 μ g/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的とする血行動態を得るまで循環動態をモニターしながら投与速度を調節。3.0 μ g/kg/分以下の投与速度で目的とする血行動態が得られ、それを維持することができる。最高投与速度は 10 μ g/kg/分を限度。開始投与速度は年齢、症状により適宜減量
ニルバジピン <u>ニバジール錠 4mg (院外)</u> ㊞ Nivadil (アステラス) 4mg/T 【薬価】 17.80 円/T <u>⑨</u> ニルバジピン錠 4mg 「NIG」 ㊞ Nilvadipine (武田) 4mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 ニバジール錠 4mg	【効】 本態性高血圧症 【用】 (内) 1回 2～4mg を 1日 2回
バルサルタン <u>ディオバン錠 80mg (院外)</u> Diovan (ノバルティス) 80mg/T 【薬価】 27.90 円/T <u>⑨</u> バルサルタン錠 80mg 「ケミファ」 Valsartan (日本ケミファ) 80mg/T 【薬価】 14.60 円/T 【先発品】 ディオバン錠 80mg	【効】 高血圧症 【用】 (内) 40～80mg を 1日 1回。1日 160mg まで。〔6歳以上の小児〕体重 35kg 未満：20mg 1日 1回、1日 40mg まで。体重 35kg 以上：40mg を 1日 1回

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ビソプロロール <u>ビソノテープ4mg</u> Bisono (トーアエイヨー) 4mg/枚 【薬価】 60.10 円 / 枚</p>	<p>【効】 ①本態性高血圧症（軽症～中等症）. ②頻脈性心房細動 【用】 (外) ①8mgを1日1回, 胸部, 上腕部又は背部のいずれかに貼付し, 貼付後24時間ごとに貼りかえる. 年齢, 症状により1日1回4mgから投与を開始し, 1日8mgまで. ②1日1回4mgから開始, 効果不十分な場合1日1回8mgに増量. 胸部, 上腕部又は背部のいずれかに貼付し, 貼付後24時間ごとに貼りかえる. 1日8mgまで</p>
<p>マニジピン塩酸塩 <u>カルスロット錠 20 (院外)</u> Ⓢ Calslot (武田) 20mg/T 【薬価】 27.80 円 / T <u>後マニジピン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」</u> Ⓢ Manidipine hydrochloride (沢井) 20mg/T 【薬価】 10.10 円 / T 【先発品】 カルスロット錠 10</p>	<p>【効】 高血圧症 【用】 (内) 10～20mgを1日1回朝食後. 1日5mgから開始し, 漸次増量</p>
<p>メトプロロール酒石酸塩 <u>セロケン錠 20mg (院外)</u> Ⓢ Seloken (アストラゼネカ) 20mg/T 【薬価】 10.10 円 / T <u>後メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」</u> Ⓢ Metoprolol tartrate (沢井) 20mg/T 【薬価】 7.40 円 / T 【先発品】 セロケン錠 20mg, ロブレソール錠 20mg</p>	<p>【効】 ①本態性高血圧症（軽症～中等症）. ②狭心症, 頻脈性不整脈 【用】 (内) ①1日60～120mgを1日3回に分割. 240mgまで増量可. ②1日60～120mgを1日2～3回に分割</p>
<p>ロサルタンカリウム <u>ニューロタン錠 25mg (院外)</u> Nu lotan (MSD) 25mg/T 【薬価】 26.90 円 / T <u>後ロサルタンカリウム錠 25mg 「サンド」</u> Losartan potassium (サンド) 25mg/T 【薬価】 10.10 円 / T 【先発品】 ニューロタン錠 25mg</p>	<p>【効】 ①高血圧症. ②高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症 【用】 (内) ①25～50mgを1日1回. 1日100mgまで. ②50mgを1日1回. 血圧値をみながら1日100mgまで. 過度の血圧低下を起こす恐れのある患者等では25mgから開始</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アイミクス配合錠 HD</p> <p>Ⓢ Aimix HD (大日本住友) 1錠 【薬価】55.30円/T 1錠中： イルベサルタン 100mg アムロジピンとして 10mg (アムロジピンベシル酸塩 13.87mg)</p>	<p>【効】高血圧症 【用】(内)1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬として用いない</p>
<p>Ⓢイルアミクス配合錠 HD「ケミファ」</p> <p>Ⓢ Iluamix (日本ケミファ) 1錠 【薬価】22.70円/T 【先発品】アイミクス配合錠 HD 1錠中： イルベサルタン 100mg アムロジピンとして 10mg (アムロジピンベシル酸塩 13.87mg)</p>	
<p>エカード配合錠 HD</p> <p>Ecard HD (武田) 1錠 【薬価】50.70円/T 1錠中： カンデサルタン シレキセチル 8mg ヒドロクロチアジド 6.25mg</p>	
<p>エックスフォージ配合錠 (院外)</p> <p>Ⓢ Exforge (ノバルティス) 1錠 【薬価】32.40円/T 1錠中： バルサルタン 80mg アムロジピン 5mg</p>	
<p>Ⓢアムパロ配合錠「JG」</p> <p>Ⓢ Amvalo (日本ジェネリック) 100mg/T 【薬価】12.80円/T 【先発品】エックスフォージ配合錠 1錠中： バルサルタン 80mg アムロジピン 5mg</p>	
<p>Ⓢジilmロ配合錠 HD「ニプロ」</p> <p>Ⓢ Zilmlo (ニプロ) 1錠 【薬価】31.30円/T 【先発品】ザクラス配合錠 HD 1錠中： アジルサルタン 20mg アムロジピンベシル酸塩 6.93mg (アムロジピンとして5mg)</p>	

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ミカムロ配合錠 AP</p> <p>Ⓜ Micamlo AP (アステラス) 1錠 【薬価】40.50円/T 1錠中： テルミサルタン 40mg アムロジピンベシル酸塩 6.93mg (アムロジピンとして5mg)</p> <p>Ⓜ後テラムロ配合錠 AP「DSEP」</p> <p>Ⓜ Teramuro AP (第一三共エスファ) 1錠 【薬価】23.80円/T 【先発品】ミカムロ配合錠 AP 1錠中： テルミサルタン 40mg アムロジピンベシル酸塩 6.93mg (アムロジピンとして5mg)</p> <p>ミコンビ配合錠 AP</p> <p>Micombi AP (日本ベーリンガー) 1錠 【薬価】40.90円/T 1錠中： テルミサルタン 40mg ヒドロクロチアジド 12.5mg</p> <p>Ⓜ後テルチア配合錠 BP「トーフ」</p> <p>Telthia BP (東和薬品) 1錠 【薬価】35.10円/T 【先発品】ミコンビ配合錠 BP 1錠中： テルミサルタン 80mg ヒドロクロチアジド 12.5mg</p>	<p>【効】高血圧症 【用】(内) 1日1回1錠. 高血圧治療の第一選択薬として用いない</p>
<p>レザルタス配合錠 HD</p> <p>Rezaltas HD (第一三共) 1錠 【薬価】54.10円/T 1錠中： オルメサルタンメドキシミル 20mg アゼルニジピン 16mg</p>	<p>【効】高血圧症 【用】(内) 1日1回1錠を朝食後. 高血圧治療の第一選択薬として用いない</p>

216. 血管収縮剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>エレクトリプタン臭化水素酸塩 Ⓜ後エレクトリプタン錠 20mg「ファイザー」【経過措置】(院内)</p> <p>Ⓜ Eletriptan (ヴィアトリス) 20mg/T 【薬価】132.80円/T 【先発品】レルボックス錠 20mg</p>	<p>【効】片頭痛 【用】(内) 1回20mgを片頭痛の頭痛発現時. 追加することができるが, 前回の投与から2時間以上あける. 20mgで効果が不十分であった場合, 次回片頭痛発現時から40mg. 1日の総投与量を40mg以内</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スマトリプタン イミグラン点鼻液 20  Imigran (グラクソ・スミスクライン) 20mg0.1mL/個 【薬価】 509.30 円 / 個	【効】 片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛を除く） 【用】 (外) 1回 20mgを片頭痛の頭痛発現時に鼻腔内に。追加できるが、前回から2時間以上あける。1日 40mgまで
ナマトリプタン塩酸塩 アマーシ錠 2.5mg  Amerge (グラクソ・スミスクライン) 2.5mg/T 【薬価】 340.50 円 / T	【効】 片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛を除く） 【用】 (内) 1回 2.5mgを片頭痛の頭痛発現時。追加することができるが、前回から4時間以上あける。1日 5mg以内
フェニレフリン塩酸塩 ネオシネジンコーワ注 1mg  Neo synesin (興和) 1mg1mL/A 【薬価】 96.00 円 / A ネオシネジンコーワ注 5mg  Neo synesin (興和) 5mg1mL/A 【薬価】 102.00 円 / A	【効】 ①各種疾患若しくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療。②発作性上室頻拍。③局所麻酔時の作用延長 【用】 (注) [皮下注及び筋注] 1回 2～5mg, 増減の範囲は 1～10mg, 初回 5mgを超えないこと, 反復投与を行う場合 10～15分おき。[静注] 1回 0.2mgを注射液そのまま, 又は約 10mLの生食液, リンゲル液若しくは 5%ブドウ糖液等に混入して静注, 増減の範囲は 0.1～0.5mg, 反復投与を行う場合 10～15分おき。[点滴静注] 100mLの血液, リンゲル液又は 5%ブドウ糖液等に対し 0.5～1.0mgの割合で混入, 血圧を測定しながら滴数を加減。[局麻時の作用延長] 20mLの局所麻酔剤に対し 1mgの割合で混入して使用
ミドドリン塩酸塩 メトリジンD錠 2mg Metligine D (大正製薬) 2mg/T 【薬価】 16.10 円 / T	【効】 本態性低血圧, 起立性低血圧 【用】 (内) 1日 4mgを2回に分割。重症の場合は 1日 8mgまで。小児: 1日 4mgを2回に分割。1日 6mgまで
リザトリプタン安息香酸塩 マクスルト RPD錠 10mg  Maxalt RPD (エーザイ) 10mg/T 【薬価】 386.60 円 / T 後リザトリプタン OD錠 10mg 「VTRS」  Rizatriptan OD (ヴィアトリス) 10mg/T 【薬価】 81.90 円 / T 【先発品】 マクスルト RPD錠 10mg	【効】 片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛を除く） 【用】 (内) 1回 10mgを片頭痛の頭痛発現時。追加することができるが、前回から2時間以上あける。1日 20mg以内

21. 循環器官用薬

217. 血管拡張剤

2171. 冠血管拡張剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アムロジピンベシル酸塩 アムロジン OD 錠 2.5mg (院外) Ⓢ Amlodin OD (大日本住友) 2.5mg/T 【薬価】 13.10 円/T Ⓢ アムロジピン OD 錠 2.5mg 「ケミファ」 Ⓢ Amlodipine OD (日本ケミファ) 2.5mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アムロジン OD 錠 2.5mg, ノルバスク OD 錠 2.5mg Ⓢ アムロジピン OD 錠 5mg 「ケミファ」 Ⓢ Amlodipine OD (日本ケミファ) 5mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アムロジン OD 錠 5mg, ノルバスク OD 錠 5mg ノルバスク OD 錠 5mg (院外) Ⓢ Norvasc OD (ヴィアトリス) 5mg/T 【薬価】 15.20 円/T</p>	<p>【効】 ①高血圧症. ②狭心症 【用】 (内) ① 2.5～5mgを1日1回. 1日1回10mgまで. 6歳以上の小児: 2.5mgを1日1回. 1日5mgまで. ② 5mgを1日1回</p>
<p>一硝酸イソソルビド アイトロール錠 20mg (院外) Itorol (トーアエイヨー) 20mg/T 【薬価】 10.10 円/T Ⓢ 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 Isosorbide mononitrate (沢井) 20mg/T 【薬価】 7.70 円/T 【先発品】 アイトロール錠 20mg</p>	<p>【効】 狭心症 【用】 (内) 1回 20mg1日2回, 1回 40mg1日2回まで. 労作狭心症又は労作兼安静狭心症で発作回数及び運動耐容能の面で重症と判断された場合1回 40mg1日2回可</p>
<p>ジピリダモール ペルサンチン錠 25mg Persantin (日本ベーリンガー) 25mg/T 【薬価】 5.90 円/T</p>	<p>【効】 ①狭心症, 心筋梗塞(急性期を除く), その他の虚血性心疾患, うっ血性心不全. ②ワーファリンとの併用による心臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑制. ③次の疾患における尿蛋白減少: ステロイドに抵抗性を示すネフローゼ症候群 【用】 (内) ① 1回 25mgを1日3回. ② 1日 300～400mgを3～4回に分割. ③ 1日 300mgを3回に分割. 投薬開始後, 4週間を目標として投薬し, 尿蛋白量の測定を行い, 以後の投薬継続の可否を検討. 尿蛋白量の減少が認められない場合は, 投薬を中止するなど適切な処置をとる. 尿蛋白量の減少が認められ投薬継続が必要な場合は, 以後定期的に尿蛋白量を測定しながら投薬</p>
<p>硝酸イソソルビド ニトロール注 5mg Nitorol (エーザイ) 5mg10mL/A 【薬価】 169.00 円/A</p>	<p>【効】 ①急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む). ②不安定狭心症. ③冠動脈造影時の冠攣縮寛解 【用】 (注) ①②そのまま, 又は生理食塩液, 5%ブドウ糖注射液等で0.05～0.001%溶液とし, 点滴静注. ① 1.5～8mg/時, 10mg/時まで. ② 2～5mg/時. ③そのまま5mgをカテーテルを通し, バルサルバ洞内に1分以内に注入. 10mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
硝酸イソソルビド <u>フランドルテープ 40mg (院外)</u> Frandol (トーアエイヨー) 40mg/枚 【薬価】 42.90 円 / 枚 <u>後硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」</u> Isosorbide dinitrate (日医工) 40mg/枚 【薬価】 23.50 円 / 枚 【先発品】 フランドルテープ 40mg	【効】 狭心症, 心筋梗塞 (急性期を除く), その他の虚血性心疾患 【用】 (外) 1 回 1 枚 (40mg) を胸部, 上腹部又は背部のいずれかに貼付. 貼付後 24 時間又は 48 時間ごとに貼りかえる
ジラゼブ塩酸塩水和物 <u>コメリアンコーワ錠 50</u> Comelian (興和) 50mg/T 【薬価】 6.40 円 / T	【効】 ①狭心症, その他の虚血性心疾患 (心筋梗塞を除く). ②次記の疾患における尿蛋白減少: 腎機能障害軽度～中等度の IgA 腎症 【用】 (内) ① 1 回 50mg を 1 日 3 回. ② 1 回 100mg を 1 日 3 回
ジルチアゼム塩酸塩 <u>後シルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」</u> ㊦ Diltiazem hydrochloride (沢井) 50mg/V 【薬価】 282.00 円 / 瓶 【先発品】 ヘルベッサー注射用 50	【効】 ①頻脈性不整脈 (上室性). ②手術時の異常高血圧の救急処置. ③高血圧性緊急症. ④不安定狭心症 【用】 (注) 5mL 以上の生理食塩液又はブドウ糖注射液に用時溶解し, 次のごとく投与. ① 1 回 10mg を約 3 分間で緩徐に静注. ② 1 回静注の場合: 1 回 10mg を約 1 分間で緩徐に静注. 点滴静注の場合: 5～15 μ g/kg/分を点滴静注. 目標値まで血圧を下げ, 以後血圧をモニターしながら点滴速度を調節. ③ 5～15 μ g/kg/分を点滴静注. 目標値まで血圧を下げ, 以後血圧をモニターしながら点滴速度を調節. ④ 1～5 μ g/kg/分を点滴静注. 投与量は低用量から開始し, 患者の病態に応じて適宜増減するが, 5 μ g/kg/分まで
ジルチアゼム塩酸塩 <u>ヘルベッサー錠 30</u> Herbesser (田辺三菱) 30mg/T 【薬価】 7.90 円 / T	【効】 ①狭心症, 異型狭心症. ②本態性高血圧症 (軽症～中等症) 【用】 (内) ① 1 回 30mg を 1 日 3 回, 1 回 60mg を 1 日 3 回まで増量可. ② 1 回 30～60mg を 1 日 3 回
ジルチアゼム塩酸塩 <u>ヘルベッサー R カプセル 100mg (院外)</u> Herbesser R (田辺三菱) 100mg/cap 【薬価】 18.10 円 / cap <u>後シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「日医工」</u> Diltiazem hydrochloride (日医工) 100mg/cap 【薬価】 11.40 円 / cap 【先発品】 ヘルベッサー R カプセル 100mg	【効】 ①狭心症, 異型狭心症. ②本態性高血圧症 (軽症～中等症) 【用】 (内) ① 1 日 1 回 100mg. 1 日 1 回 200mg まで増量可. ② 1 日 1 回 100～200mg
ニコランジル <u>シグマート錠 5mg (院外)</u> Sigmart (中外) 5mg/T 【薬価】 8.90 円 / T <u>後ニコランジル錠 5mg 「サワイ」</u> Nicorandil (沢井) 5mg/T 【薬価】 5.90 円 / T 【先発品】 シグマート錠 5mg	【効】 狭心症 【用】 (内) 1 日量 15mg を 3 回に分割

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ニコランジル シグマート注 2mg Sigmart (中外) 2mg/瓶 【薬価】 171.00 円 / 瓶 シグマート注 12mg Sigmart (中外) 12mg/瓶 【薬価】 633.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①不安定狭心症. ②急性心不全 (慢性心不全の急性増悪期を含む) 【用】 (注) ①本剤を生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液で溶解して, 0.01 ~ 0.03% 溶液とする. 2mg/時の点滴静注から投与を開始. 6mg/時まで. ②生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液で溶解して, 0.04 ~ 0.25% 溶液とする. 0.2mg/kgを 5 分間程度かけて静注し, 引き続き 0.2mg/kg/時で持続静注を開始. 血圧の推移や患者の病態に応じて, 0.05 ~ 0.2mg/kg/時の範囲で調整</p>
<p>ニトログリセリン ②ニトログリセリン静注 5mg /10mL 「TE」 ㊞ Nitroglycerin (トーアエイヨー) 5mg/10mL/A 【薬価】 251.00 円 / A 【先発品】 ミリスロール注 5mg /10mL ②ニトログリセリン静注 25mg /50mL シリンジ 「TE」 ㊞ Nitroglycerin (トーアエイヨー) 25mg50mL/筒 【薬価】 1,528.00 円 / 筒</p>	<p>【効】 ①手術時の低血圧維持. ②手術時の異常高血圧の救急処置. ③急性心不全 (慢性心不全の急性増悪期を含む). ④不安定狭心症 【用】 (注) 注射液そのまま, 又は生理食塩液, 5% ブドウ糖注射液, 乳酸リンゲル液等で希釈し, 0.005 ~ 0.05% (50 ~ 500μg/mL) 溶液を点滴静注. 効能・効果ごとに次に基づき投与. ① 1 ~ 5μg/kg/分で開始し, 目的値まで血圧を下げ, 以後血圧をモニターしながら点滴速度を調節. ② 0.5 ~ 5μg/kg/分で開始し, 目的値まで血圧を下げ, 以後血圧をモニターしながら点滴速度を調節. ③ 0.05 ~ 0.1μg/kg/分で開始し, 目的とする血行動態を得るまで血圧, 左心室充満圧などの循環動態をモニターしながら 5 ~ 15 分ごとに 0.1 ~ 0.2μg/kg/分ずつ増量し, 最適点滴速度で維持. ④ 0.1 ~ 0.2μg/kg/分で開始し, 発作の経過及び血圧をモニターしながら約 5 分ごとに 0.1 ~ 0.2μg/kg/分ずつ増量し, 1 ~ 2μg/kg/分で維持. 効果がみられない場合 20 ~ 40μg/kgの静注を 1 時間ごとに併用. 静注する場合は 1 ~ 3 分かけて緩徐に</p>
<p>ニトログリセリン ニトロダーム TTS25mg ㊞ Nitroderm TTS (サンファーマ) 25mg (10 cm²) / 枚 【薬価】 46.20 円 / 枚</p>	<p>【効】 狭心症 【用】 (外) 1 日 1 回 1 枚 (25mg 含有) を胸部, 腰部, 上腕部のいずれかに貼付. 効果不十分の場合は 2 枚に増量</p>
<p>ニトログリセリン ②ニトロベン舌下錠 0.3mg ㊞ Nitrophen (日本化薬) 0.3mg/T 【薬価】 10.50 円 / T</p>	<p>【効】 狭心症, 心筋梗塞, 心臓喘息, アカラジアの一時的緩解 【用】 (内) 0.3 ~ 0.6mg を舌下投与, 狭心症に対し数分間で効果の現れない場合には 0.3 ~ 0.6mg 追加</p>
<p>ニトログリセリン ミオコールスプレー 0.3mg ㊞ Myocor (トーアエイヨー) 0.65%7.2g/缶 【薬価】 1,161.60 円 / 缶</p>	<p>【効】 狭心症発作の寛解 【用】 (外) 1 回 1 噴霧 (0.3mg) を舌下に投与. 効果不十分の場合は 1 噴霧を追加</p>
<p>ニフェジピン セパミットー R カプセル 10 ㊞ Sepamit-R (日本ジェネリック) 10mg/cap 【薬価】 10.10 円 / cap ②ニフェジピン L 錠 20mg 「サワイ」 ㊞ Nifedipine L (沢井) 20mg/T 【薬価】 5.90 円 / T</p>	<p>【効】 ①本態性高血圧症, 腎性高血圧症. ②狭心症 【用】 (内) ① 1 回 10 ~ 20mg を 1 日 2 回. ② 1 回 20mg を 1 日 2 回</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ニフェジピン <u>アダラート CR 錠 20mg (院外)</u> ㊟ Adalat CR (バイエル) 20mg/T 【薬価】 14.90 円/T <u>㊟ニフェジピン CR 錠 20mg 「サワイ」</u> ㊟ Nifedipine CR (沢井) 20mg/T 【薬価】 9.10 円/T 【先発品】 アダラート CR 錠 20mg	【効】 ①高血圧症. ②腎実質性高血圧症, 腎血管性高血圧症. ③狭心症, 異型狭心症 【用】(内) ① 20 ~ 40mgを1日1回. 1日10 ~ 20mgより開始し, 漸次増量. 1回40mg1日2回まで増量可. ② 20 ~ 40mgを1日1回. 1日10 ~ 20mgより開始し, 漸次増量. ③ 40mgを1日1回. 1日1回60mgまで
ニフェジピン <u>㊟セバミット細粒 1%</u> ㊟ Sepamit (日本ジェネリック) 10mg/g 【薬価】 13.40 円/g	【効】 ①本態性高血圧症, 腎性高血圧症. ②狭心症 【用】(内) 1回10mgを1日3回
ベニジピン塩酸塩 <u>コニール錠 4</u> ㊟ Coniel (協和キリン) 4mg/T 【薬価】 19.40 円/T	【効】 ①高血圧症, 腎実質性高血圧症. ②狭心症 【用】(内) ① 1日1回2 ~ 4mgを朝食後. 1日1回8mgまで. 重症高血圧症には1日1回4 ~ 8mgを朝食後. ② 1回4mgを1日2回朝・夕食後
ベラパミル塩酸塩 <u>ワソラン錠 40mg</u> Vasolan (ヴィアトリス) 40mg/T 【薬価】 7.20 円/T	【効】 頻脈性不整脈 (心房細動・粗動, 発作性上室性頻拍). 狭心症, 心筋梗塞 (急性期を除く), その他の虚血性心疾患. 小児: 頻脈性不整脈 (心房細動・粗動, 発作性上室性頻拍) 【用】(内) 1回40 ~ 80mgを1日3回. 小児: 1日3 ~ 6mg/kg (1日240mgまで)を1日3回に分割. 年齢, 症状により適宜減量

2179. その他の血管拡張剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カルペリチド (遺伝子組換え) <u>ハンブ注射用 1000</u> ㊟ Hanp (第一三共) 1,000 μ g/V 【薬価】 1,315.00 円/瓶	【効】 急性心不全 (慢性心不全の急性増悪期を含む) 【用】(注) 注射用水 5ml に溶解し, 生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液で希釈し, 0.1 μ g/kg/分を持続静注. 0.2 μ g/kg/分まで増量できる

218. 高脂血症用剤

2183. クロフィブラート系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェノフィブラート <u>リピディル錠 80mg</u> Lipidil (あすか) 80mg/T 【薬価】 21.20 円/T	【効】 高脂血症 (家族性を含む) 【用】(内) 1日1回106.6mg ~ 160mg食後. 年齢, 症状により適宜減量. 1日160mgまで

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベザフィブラート <u>ベザトール SR 錠 200mg (院外)</u> Bezatol SR (キッセイ) 200mg/T 【薬価】 15.20 円 /T <u>後ベザフィブラート SR 錠 200mg 「サワイ」</u> Bezafibrate SR (沢井) 200mg/T 【薬価】 10.10 円 /T 【先発品】 ベザトール SR 錠 200mg	【効】 高脂血症（家族性を含む） 【用】 (内) 1日 400mgを 2回に分割し朝夕食後、腎機能障害を有する患者及び高齢者に対しては適宜減量
ペマフィブラート <u>パルモディア XR 錠 0.2mg</u> Parmodia (興和) 0.2mg/T 【薬価】 60.00 円 /T	【効】 高脂血症（家族性を含む） 【用】 (内) 1回 0.2mgを 1日 1回、トリグリセライド高値の程度により、1回 0.4mgを 1日 1回まで

2189. その他の高脂血症用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アトルバスタチンカルシウム水和物 <u>後アトルバスタチン錠 10mg 「ケミファ」</u> Atorvastatin (日本ケミファ) 10mg/T 【薬価】 15.80 円 /T 【先発品】 リピトール錠 10mg <u>リピトール錠 10mg (院外)</u> Lipitor (アステラス) 10mg/T 【薬価】 28.50 円 /T	【効】 ①高コレステロール血症、②家族性高コレステロール血症 【用】 (内) ① 10mgを 1日 1回、重症の場合は 1日 20mgまで、② 10mgを 1日 1回、重症の場合は 1日 40mgまで
インクリシランナトリウム <u>レクビオ皮下注 300mg シリンジ</u> Leqvio (ノバルティス) 300mg/1.5mL/筒 【薬価】 443,548.00 円 /筒	【効】 家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症。次記のいずれも満たす場合に限る（心血管イベントの発現リスクが高い、HMG-CoA 還元酵素阻害剤で効果不十分、又は HMG-CoA 還元酵素阻害剤による治療が適さない） 【用】 (注) 1回 300mgを初回、3か月後に皮下注、以降6か月に1回の間隔で皮下注
エゼチミブ <u>後エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」</u> Ezetimibe (第一三共エスファ) 10mg/T 【薬価】 34.00 円 /T 【先発品】 ゼチア錠 10mg	【効】 高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症、ホモ接合体性シトステロール血症 【用】 (内) 1回 10mgを 1日 1回食後、年齢、症状により適宜減量
エボロクマブ（遺伝子組換え） <u>レパーサ皮下注 140mgペン</u> Repatha (アステラス) 140mg/本 【薬価】 24,302.00 円 /キット	【効】 家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症。次記のいずれも満たす場合に限る（心血管イベントの発現リスクが高い、HMG-CoA 還元酵素阻害剤で効果不十分、又は HMG-CoA 還元酵素阻害剤による治療が適さない） 【用】 (注) ①家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症：140mgを 2週間に 1回又は 420mgを 4週間に 1回皮下注。②家族性高コレステロール血症ホモ接合体：420mgを 4週間に 1回皮下注。効果不十分な場合には 420mgを 2週間に 1回皮下注可。LDL アフェレーシスの補助として本剤を使用する場合は開始用量として 420mgを 2週間に 1回皮下注可

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オメガ-3 脂肪酸エチル <u>②オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「ニプロ」</u> Omega-3-acid ethyl esters (ニプロ) 2g/包 【薬価】 78.30 円/包 【先発品】 ロトリガ粒状カプセル 2g	【効】 高脂血症 【用】 (内) 1回 2g を 1日 1回, 食直後, トリグリセライド高値の程度により 1回 2g, 1日 2回まで
コレスチミド <u>コレバイン錠 500mg</u> Cholebine (田辺三菱) 500mg/T 【薬価】 18.80 円/T	【効】 高コレステロール血症, 家族性高コレステロール血症 【用】 (内) 1回 1.5g を 1日 2回, 朝夕食前に水とともに, 朝夕食後投与とすることもできる. 1日 4g まで
シンバスタチン <u>②シンバスタチン錠 5mg 「武田テバ」</u> Simvastatin TAKEDA TEVA (武田) 5mg/T 【薬価】 11.10 円/T 【先発品】 リポバス錠 5 <u>リポバス錠 5</u> Lipovas (オルガノン) 5mg/T 【薬価】 26.80 円/T	【効】 高脂血症, 家族性高コレステロール血症 【用】 (内) 5mg を 1日 1回, LDL- コレステロール値の低下が不十分な場合は 1日 20mg まで増量可
ピタバスタチンカルシウム <u>②ピタバスタチン Ca 錠 1mg 「ケミファ」</u> Pitavastatin calcium (日本ケミファ) 1mg/T 【薬価】 13.60 円/T 【先発品】 リバロ錠 1mg <u>②ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「ケミファ」</u> Pitavastatin calcium (日本ケミファ) 2mg/T 【薬価】 25.40 円/T 【先発品】 リバロ錠 2mg	【効】 高コレステロール血症, 家族性高コレステロール血症 【用】 (内) 1～2mg を 1日 1回, LDL- コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが, 1日 4mg まで. 家族性高コレステロール血症の小児: 10 歳以上の小児に 1mg を 1日 1回, LDL- コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが, 1日 2mg まで
ピタバスタチンカルシウム <u>リバロ錠 1mg (院外)</u> Livalo (興和) 1mg/T 【薬価】 25.40 円/T <u>リバロ錠 2mg (院外)</u> Livalo (興和) 2mg/T 【薬価】 42.40 円/T	【効】 ①高コレステロール血症. ②家族性高コレステロール血症 【用】 (内) ① 1～2mg を 1日 1回, LDL- コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが, 1日 4mg まで. ② 1～2mg を 1日 1回, LDL- コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが, 1日 4mg まで. 小児: 10 歳以上に 1mg を 1日 1回, LDL- コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが, 1日 2mg まで

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>プラバスタチンナトリウム <u>メバロチン錠5 (院外)</u> Mevalotin (第一三共) 5mg/T 【薬価】15.20 円/T <u>メバロチン錠10 (院外)</u> Mevalotin (第一三共) 10mg/T 【薬価】22.60 円/T ②<u>プラバスタチン Na 錠5mg 「サワイ」</u> Pravastatin sodium (沢井) 5mg/T 【薬価】10.10 円/T 【先発品】メバロチン錠5 ②<u>プラバスタチン Na 錠10mg 「トーワ」</u> Pravastatin sodium (東和薬品) 10mg/T 【薬価】15.40 円/T 【先発品】メバロチン錠10</p>	<p>【効】 ①高脂血症. ②家族性高コレステロール血症 【用】 (内) 1日10mgを1回又は2回に分割. 1日20mgまで</p>
<p>ロスバスタチンカルシウム <u>クレストール OD 錠2.5mg (院外)</u> Crestor OD (アストラゼネカ) 2.5mg/T 【薬価】21.30 円/T <u>クレストール OD 錠5mg (院外)</u> Crestor OD (アストラゼネカ) 5mg/T 【薬価】36.30 円/T ②<u>ロスバスタチン OD 錠2.5mg 「DSEP」</u> Rosuvastatin OD (第一三共) 2.5mg/T 【薬価】11.40 円/T 【先発品】クレストール OD 錠2.5mg ②<u>ロスバスタチン OD 錠5mg 「DSEP」</u> Rosuvastatin OD (第一三共) 5mg/T 【薬価】20.60 円/T 【先発品】クレストール OD 錠5mg</p>	<p>【効】 高コレステロール血症, 家族性高コレステロール血症 【用】 (内) 1日1回2.5mgより開始, 早期にLDL-コレステロール値を低下させる場合5mgより開始してもよい. 開始後あるいは増量後, 4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合, 漸次10mgまで増量. 10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない, 家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り, 1日最大20mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アトゼット配合錠 LD (院外) Atozet LD (バイエル) 1錠 【薬価】75.30円/T 1錠中： エゼチミブ 10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 10.8mg (アトルバスタチンとして10mg)</p> <p>リバゼブ配合錠 LD Livazebe (興和) 【薬価】55.90円/T 1錠中： ピタバスタチンカルシウム 2.0mg エゼチミブ 10.0mg</p> <p>ロスゼット配合錠 HD Rosuzet (バイエル) 1錠 【薬価】75.30円/T 1錠中： エゼチミブ 10mg ロスバスタチンカルシウム 5.2mg (ロスバスタチンとして5mg)</p>	<p>【効】 高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症 【用】 (内) 1日1回1錠を食後</p>

219. その他の循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アメジニウムメチル硫酸塩 リズムック錠10mg (院外) Risumic (大日本住友) 10mg/T 【薬価】12.70円/T ② アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 Amezinium metilsulfate (沢井) 10mg/T 【薬価】6.70円/T 【先発品】リズムック錠10mg</p>	<p>【効】 ①本態性低血圧，起立性低血圧. ②透析施行時の血圧低下の改善 【用】 (内) ①1日20mgを1日2回に分割. ②透析開始時に1回10mg</p>

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アルガトロバン水和物 ノバスタンHI注10mg/2mL Novastan HI (田辺三菱) 10mg/2mL/A 【薬価】 1,264.00 円 / A</p>	<p>【効】 ①次記疾患に伴う神経症候（運動麻痺）、日常生活動作（歩行、起立、坐位保持、食事）の改善：発症後 48 時間以内の脳血栓症急性期（ラクネを除く）。②慢性動脈閉塞症（バージャー病・閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍、安静時疼痛ならびに冷感の改善。③次記患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析）：先天性アンチトロンビン III 欠乏患者、アンチトロンビン III 低下を伴う患者（アンチトロンビン III が正常の 70% 以下に低下し、かつ、ヘパリンナトリウム、ヘパリンカルシウムの使用では体外循環路内の凝血（残血）が改善しないと判断されたもの）、ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II 型患者。④ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II 型（発症リスクのある場合を含む）における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止。⑤ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II 型における血栓症の発症抑制</p> <p>【用】（注） ①はじめの 2 日間は 1 日 60mg を適当量の輸液で希釈し、24 時間かけて持続点滴静注。その後の 5 日間は 1 回 10mg を適当量の輸液で希釈し 1 日朝夕 2 回、1 回 3 時間かけて点滴静注。② 1 回 10mg を輸液で希釈し、1 日 2 回、1 回 2～3 時間かけて点滴静注。③体外循環開始時に 10mg を回路内に投与し、体外循環開始後は 25mg/時より投与を開始。凝固時間の延長、回路内凝血（残血）、透析効率及び透析終了時の止血状況等を指標に量を増減し、患者毎の量を決定するが、5～40mg/時を目安。④適当量の輸液で希釈し、0.1mg/kg を 3～5 分かけて静脈内投与し、術後 4 時間まで 6μg/kg/分を目安に静脈内持続投与。その後抗凝固療法法の継続が必要な場合は、0.7μg/kg/分に減量し静脈内持続投与。持続投与量は目安であり、適切な凝固能のモニタリングにより調節。⑤適当量の輸液で希釈し、0.7μg/kg/分より点滴静注を開始し、持続投与。肝機能障害のある患者や出血のリスクのある患者に対しては、低用量から開始。活性化部分トロンボプラスチン時間（aPTT）を指標に投与量を増減し、患者毎の投与量を決定</p>
<p>アルプロスタジル バルクス注 10μg Ⓢ Palux (大正製薬) 10μg/A 【薬価】 1,700.00 円 / A</p>	<p>【効】 ①慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善。②次記疾患における皮膚潰瘍の改善：進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス。③糖尿病における皮膚潰瘍の改善。④振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復。⑤動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存。⑥経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善</p> <p>【用】（注） ①②③④ 1 日 1 回 5～10μg をそのまま又は輸液に混和して緩徐に静注、又は点滴静注。⑤輸液に混和し、開始時 5ng/kg/分として持続静注し、その後は症状に応じて増減して有効最小量とする。⑥ 1 回 5μg を生理食塩液で 10mL に希釈し、造影剤注入 30 秒前に 3～5 秒間で経カテーテル的に上腸間膜動脈内に投与</p>
<p>アルプロスタジリアルファデクス 後アルプロスタジリアルファデクス注射用 20μg「タカタ」 Ⓢ Alprostadil alfadex (高田) 20μg/V 【薬価】 298.00 円 / 瓶 【先発品】 プロスタンディン注射用 20μg</p>	<p>【効】 ①動脈内投与：慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善。②静脈内投与：1) 振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復。2) 血行再建術後の血流維持。3) 動脈内投与が不適と判断される慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善。4) 動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存。③陰茎海綿体内投与：勃起障害の診断</p> <p>【用】（注） ① 20μg (1 バイアル) を生食液 5mL に溶かし、1 日 10～15μg (0.1～0.15ng/kg/分) をシリンジポンプを用い持続的に動脈内注射、症状により 0.05～0.2ng/kg/分の間で適宜増減。② 1)～3) 1 回 40～60μg (2～3 バイアル) を輸液 500mL に溶解し、2 時間かけて点滴静注 (5～10ng/kg/分)、投与速度は 1.2μg/kg/2 時間以下、1 日 1～2 回。4) 50～100ng/kg/分 で静脈内投与を開始、有効最小量で持続。③ 20μg (1 バイアル) を生理食塩液 1mL に溶かし、1 回量 20μg を陰茎海綿体へ注射</p>
<p>イバプラジン塩酸塩 コララン錠 2.5mg Ⓢ Coralan (小野) 2.5mg/T 【薬価】 82.90 円 / T</p>	<p>【効】 洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が 75 回 / 分以上の慢性心不全ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る</p> <p>【用】（内） 1 回 2.5mg を 1 日 2 回食後から開始。開始後は忍容性をみながら、目標とする安静時心拍数が維持できるように、2 週間以上の間隔で段階的に用量を増減。1 回投与量は 2.5、5 又は 7.5mg のいずれかとし、いずれの投与量においても、1 日 2 回食後。患者の状態により適宜減量</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イフェンプロジル酒石酸塩 <u>イフェンプロジル酒石酸塩錠</u> <u>10mg「あすか」</u> Ifenprodil tartrate (あすか) 10mg/T 【薬価】 5.70 円 / T 【先発品】 セロクラール錠 10mg	【効】 脳梗塞後遺症, 脳出血後遺症に伴うめまいの改善 【用】 (内) 1回 20mgを1日3回毎食後
塩酸ロメリジン <u>ミグシス錠 5mg</u> Migsis (ファイザー) 5mg/T 【薬価】 17.90 円 / T	【効】 片頭痛 【用】 (内) 1回 5mgを1日2回, 朝食後及び夕食後あるいは就寝前. 1日 20mgまで
クエン酸第二鉄水和物 <u>リオナ錠 250mg</u> Riona (鳥居) 250mg/T 【薬価】 72.60 円 / T	【効】 ①慢性腎臓病患者における高リン血症の改善. ②鉄欠乏性貧血 【用】 (内) ① 1回 500mgを開始用量とし, 1日3回食直後. 症状, 血清リン濃度の程度により適宜増減, 1日 6,000mgまで. ② 1回 500mgを1日1回食直後に. 最高用量は1回 500mgを1日2回まで
サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 <u>エンレスト錠 100mg</u> Entresto (ノバルティス) 100mg/T 【薬価】 97.20 円 / T	【効】 ①成人: 慢性心不全. ただし, 慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る. 小児: 慢性心不全. ②高血圧症 【用】 (内) ①成人: 1回 50mgを開始用量として1日2回. 忍容性が認められる場合は, 2~4週間の間隔で段階的に1回 200mgまで増量. 1回投与量は 50mg, 100mg又は 200mgとし, いずれの投与量においても1日2回. 忍容性に応じて適宜減量. 小児: 1歳以上の小児には, 次記のとおり体重に応じた開始用量を1日2回. 忍容性が認められる場合は, 2~4週間の間隔で段階的に目標用量まで増量. 忍容性に応じて適宜減量. 40kg未満: 開始用量 0.8mg/kg, 第1漸増用量 1.6mg/kg, 第2漸増用量 2.3mg/kg, 目標用量 3.1mg/kg. 40kg以上 50kg未満: 開始用量 0.8mg/kg, 第1漸増用量 50mg, 第2漸増用量 100mg, 目標用量 150mg. 50kg以上: 開始用量 50mg, 第1漸増用量 100mg, 第2漸増用量 150mg, 目標用量 200mg. ② 1回 200mgを1日1回. 最大投与量は1回 400mgを1日1回
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 <u>ロケルマ懸濁用散分包 5g</u> Lokelma (アストラゼネカ) 5g/包 【薬価】 1,024.30 円 / 包	【効】 高カリウム血症 【用】 (内) 開始用量として1回 10gを水で懸濁して1日3回, 2日間. 血清カリウム値や患者の状態に応じて, 最長3日間まで. 以後は, 1回 5gを水で懸濁して1日1回. 最高用量は1日1回 15gまで. 血液透析施行中の場合, 1回 5gを水で懸濁して非透析日に1日1回. 最高用量は1日1回 15gまで
シルデナフィルクエン酸塩 <u>レバチオ錠 20mg</u> Revatio (ヴィアトリス) 20mg/T 【薬価】 742.20 円 / T	【効】 肺動脈性肺高血圧症 【用】 (内) 成人: 1回 20mgを1日3回. 1歳以上の小児: 体重 20kg超の場合 1回 20mgを1日3回
スクロオキシ水酸化鉄 <u>ピートル顆粒分包 250mg</u> P-TOL (キッセイ) 250mg/包 【薬価】 146.60 円 / 包	【効】 透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善 【用】 (内) 1回 250mgを開始用量とし, 1日3回食直前. 最高用量は1日 3000mg
セレキシナブ <u>ウプトラビ錠 0.2mg</u> Uptravi (ヤンセン) 0.2mg/T 【薬価】 1,460.30 円 / T	【効】 肺動脈性肺高血圧症. 外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓性肺高血圧症 【用】 (内) 1回 0.2mgを1日2回食後から開始. 忍容性を確認しながら, 7日以上の間隔で1回量として 0.2mgずつ最大耐用量まで増量して維持用量を決定. 1回 1.6mgまでとし, 1日2回食後
炭酸ランタン水和物 <u>ホスレノール OD 錠 500mg</u> Fosrenol (バイエル) 250mg/T 【薬価】 115.80 円 / T	【効】 慢性腎臓病患者における高リン血症の改善 【用】 (内) 1日 750mgを開始用量とし, 1日3回に分割して食直後に. 最高用量は1日 2,250mg

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
沈降炭酸カルシウム カルタン錠 500 (院外) Caltan (扶桑) 500mg/T 【薬価】 6.40 円 /T ② 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」 Precipitated calcium carbonate (三和化学) 500mg/T 【薬価】 5.80 円 /T 【先発品】 カルタン錠 500	【効】 次記患者における高リン血症の改善：保存期及び透析中の慢性腎不全患者 【用】 (内) 1日 3.0g を 3回に分割して食直後
D-マンニトール 20% マンニトール注射液「YD」 Mannitol (陽進堂) 20%300mL/袋 【薬価】 444.00 円 / 袋	【効】 ①術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防及び治療する場合、 ②脳圧降下及び脳容積縮小を必要とする場合、③眼内圧降下を必要とする場合 【用】 (注) 1回 1.0～3.0g (5～15mL) /kgを点滴静注。1日量 200g まで、速度は 100mL/3～10分とする
テナパノル塩酸塩 フォゼベル錠 5mg Phozevel (協和キリン) 5mg/T 【薬価】 234.10 円 /T	【効】 透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善 【用】 (内) 1回 5mgを開始用量とし、1日 2回、朝食及び夕食直前。最高用量は 1 回 30mg
トコフェロールニコチン酸エステル ユベラ N カプセル 100mg Juvela N (エーザイ) 100mg/cap 【薬価】 5.90 円 /cap	【効】 ①次記に伴う随伴症状：高血圧症、高脂質血症。②次記に伴う末梢循環障害： 閉塞性動脈硬化症 【用】 (内) 1日 300～600mgを 3回に分割
ニセルゴリン サアミオン錠 5mg (院外) Sermion (田辺三菱) 5mg/T 【薬価】 16.50 円 /T ② ニセルゴリン錠 5mg 「NP」 Nicergoline (ニプロ) 5mg/T 【薬価】 9.80 円 /T 【先発品】 サアミオン錠 5mg	【効】 脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害による意欲低下の改善 【用】 (内) 1日量 15mgを 3回に分割
フィネレノン ケレンディア錠 10mg Kerendia (バイエル) 10mg/T 【薬価】 147.90 円 /T	【効】 2型糖尿病を合併する慢性腎臓病。ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く 【用】 (内) 次記の用量を 1日 1回。eGFR が 60mL/min/1.73m ² 以上：20mg、eGFR が 60mL/min/1.73m ² 未満：10mgから投与を開始し、血清カリウム値、eGFR に 応じて、投与開始から 4 週間後を目安に 20mgへ増量
ベルイシグアト ペリキューボ錠 5mg Verquvo (バイエル) 5mg/T 【薬価】 228.70 円 /T	【効】 慢性心不全。ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る 【用】 (内) 1回 2.5mgを 1日 1回食後から開始、2 週間間隔で 1回投与量を 5mg及び 10mgに段階的に増量。血圧等患者の状態に応じて適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ポリスチレンスルホン酸カルシウム カリメート経口液 20% Kalimate (興和) 5.0g25g/包 【薬価】 77.80 円 / 包 ② ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー 20% 分包 25g 「三和」 Calcium polystyrene sulfonate (三和化学) 20%25g/個 【薬価】 77.80 円 / 個	【効】 急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症 【用】 (内) 1日 15～30g (本剤として 75～150g) を 2～3回に分割
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ② ポリスチレンスルホン酸 Na「フゾン」原末 (院内) Sodium polystyrene sulfonate (扶桑) 5g/包 【薬価】 9.10 円 / g 【先発品】 ケイキサレート散	【効】 急性および慢性腎不全による高カリウム血症 【用】 (内) 1日量 30g を 2～3回に分割, その 1回量を水 50～150mL に懸濁し投与. (外) 1回 30g を水又は 2% メチルセルロース溶液 100mL に懸濁して注腸
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ケイキサレートドライシロップ 76% Kayexalate (鳥居) 76%3.27g/包 【薬価】 9.40 円 / g	【効】 急性および慢性腎不全による高カリウム血症 【用】 (内) 1日量 30g (本剤として 39.24g) を 2～3回に分割, その 1回量を水 50～150mL に懸濁し投与
マシテンタン オプスミット錠 10mg ② Opsumit (ヤンセン) 10mg/T 【薬価】 13,334.90 円 / T	【効】 肺動脈性肺高血圧症 【用】 (内) 10mg を 1日 1回
リオシグアト アデマス錠 0.5mg ② Adempas (バイエル) 0.5mg/T 【薬価】 685.90 円 / T アデマス錠 1.0mg ② Adempas (バイエル) 1.0mg/T 【薬価】 1,371.70 円 / T	【効】 ①外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症. ②肺動脈性肺高血圧症 【用】 (内) 用量調節期: 1回 1.0mg1日 3回から開始. 2週間継続して収縮期血圧が 95mmHg 以上で低血圧症状を示さない場合には, 2週間間隔で 1回用量を 0.5mgずつ増量するが, 最高用量は 1回 2.5mg1日 3回まで. 収縮期血圧が 95mmHg 未満でも低血圧症状を示さない場合は, 現行の用量を維持するが, 低血圧症状を示す場合には, 1回用量を 0.5mgずつ減量. 用量維持期: 用量調節期に決定した用量を維持. 用量維持期においても, 最高用量は 1回 2.5mg1日 3回までとし, 低血圧症状を示すなど, 忍容性がない場合には, 1回用量を 0.5mgずつ減量

21. 循環器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カデュエット配合錠4番 (株) Caduet (ファイザー) 1錠 【薬価】 78.00 円 / T 1錠中： アムロジピンベシル酸塩 6.94mg (アムロジピンとして5mg) アトルバスタチンカルシウム水和物 10.85mg (アトルバスタチンとして10mg)</p>	<p>【効】 アムロジピン及びアトルバスタチンによる治療が適切である次記の患者：高血圧症又は狭心症と、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症を併発している患者 アムロジピンとアトルバスタチンの効能・効果は次記のとおり。アムロジピン：高血圧症，狭心症。アトルバスタチン：高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症 【用】(内) 1日1回，次記のアムロジピンとアトルバスタチンの用法・用量に基づき，患者毎に用量を決めること。 アムロジピン 高血圧症：アムロジピンとして2.5～5mgを1日1回，1日1回10mgまで増量可。 狭心症：アムロジピンとして5mgを1日1回。 アトルバスタチン 高コレステロール血症：アトルバスタチンとして10mgを1日1回，1日20mgまで増量可。家族性高コレステロール血症：アトルバスタチンとして10mgを1日1回，1日40mgまで増量可</p>
<p>グリセレブ配合点滴静注 Glycereb (テルモ) 200mL / 袋 【薬価】 306.00 円 / 袋 200mL 中： 濃グリセリン 20g 果糖 10g</p>	<p>【効】 ①頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の治療。頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の改善による次の疾患に伴う意識障害，神経障害，自覚症状の改善：脳梗塞（脳血栓，脳塞栓），脳内出血，くも膜下出血，頭部外傷，脳腫瘍，脳髄膜炎，脳外科手術後の後療法。②脳外科手術時の脳容積縮小。③眼内圧下降を必要とする場合，眼科手術時の眼容積縮小 【用】(注) ①1回200～500mL 1日1～2回，500mLあたり2～3時間で点滴静注，期間1～2週間。②1回500mLを30分で点滴静注。③1回300～500mLを45～90分で点滴静注</p>

22. 呼吸器官用薬

221. 呼吸促進剤

2213. ジモルホラミン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジモルホラミン <u>テラプチック静注 45mg</u> Theraptique (エーザイ) 45mg3mL/A 【薬価】143.00円/A	【効】 次の場合の呼吸障害及び循環機能低下：新生児仮死，ショック，催眠剤中毒，溺水，肺炎，熱性疾患，麻酔剤使用時 【用】(注) 1回30～45mgを静注。新生児：1回7.5～15mgを臍帯静注。必要に応じ反復，1日250mgまで

2219. その他の呼吸促進剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ドキサプラム塩酸塩水和物 <u>ドプラム注射液 400mg</u> Ⓢ Dopram (キッセイ) 400mg20mL/V 【薬価】141.00円/mL/V	【効】 次記の状態における呼吸抑制ならびに覚醒遅延：①麻酔時，②中枢神経系抑制剤による中毒時，③遷延性無呼吸の鑑別診断，④急性ハイパーカプニアを伴う慢性肺疾患，⑤早産・低出生体重児における原発性無呼吸（未熟児無呼吸発作）但し，キサンチン製剤による治療で十分な効果が得られない場合に限る 【用】(注) ①0.5～1.0mg/kgを徐々に静注。5分間隔で通常量を投与し，総投与量は2.0mg/kgまで。点滴静注の場合は，はじめ約5mg/分の速度で投与し，速度を適宜調節。5.0mg/kgまで。②0.5～2.0mg/kgを徐々に静注。初回投与に反応があった患者には維持量として，通常量を5～10分間隔で投与し，1～2時間間隔で繰り返す。点滴静注の場合は1.0～3.0mg/kg/時で。③1.0～2.0mg/kgを静注。呼吸興奮が十分生じない場合は呼吸抑制の原因が筋弛緩剤の残存効果によることを考慮。④1.0～2.0mg/kg/時で点滴静注。開始後1～2時間は，動脈血ガスを30分毎に測定し，血液ガスの改善がみられないか，悪化する場合にはレスピレータの使用を考慮。血液ガスの改善がみられ，重篤な副作用が生じなければ継続してもよい。動脈血ガス分圧の測定は適宜行い，血液ガスが適当なレベルに達したら中断し，酸素吸入は必要に応じて継続。中断後，PaCO ₂ が上昇した場合には再投与を考慮。1日2400mgまで。⑤初回投与量1.5mg/kgを1時間かけて点滴静注，その後，維持投与として0.2mg/kg/hrの速度で点滴静注。なお，十分な効果が得られない場合は，0.4mg/kg/hrまで適宜増量
ナロキソン塩酸塩 <u>ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg</u> 「AFP」 Ⓢ Naloxone hydrochloride (アルフレッサ) 0.2mg1mL/A 【薬価】899.00円/A	【効】 麻薬による呼吸抑制ならびに覚醒遅延の改善 【用】(注) 1回0.2mgを静注。効果不十分の場合2～3分間隔で0.2mgを1～2回追加
フルマゼニル <u>後フルマゼニル静注液 0.2mg「ケミファ」</u> Ⓢ Flumazenil (日本ケミファ) 0.2mg/A 【薬価】518.00円/A <u>後フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」</u> Ⓢ Flumazenil (ニプロ) 0.5mg/A 【薬価】1,005.00円/A 【先発品】アネキセート注射液 0.5mg	【効】 ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静の解除及び呼吸抑制の改善 【用】(注) 初回0.2mgを緩徐に静注。投与後4分以内に望まれる覚醒状態が得られない場合は更に0.1mgを追加。1分間隔で0.1mgずつを総投与量1mgまで，ICU領域では2mgまで投与を繰り返す

22. 呼吸器官用薬

222. 鎮咳剤

2221. エフェドリン及びマオウ製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エフェドリン塩酸塩 <u>エフェドリン「ナガキ」注射液</u> 40mg (株) Ephedrin (日医工) 40mg 1mL/A 【薬価】 94.00 円 / A	【効】 ①次記疾患に伴う咳嗽：気管支喘息，喘息性（様）気管支炎，感冒，急性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，上気道炎（咽喉頭炎，鼻カタル）。②鼻粘膜充血・腫脹。③麻酔時の血圧降下 【用】 (注) ①② 1回 25～40mgを皮下注。③ 1回 4～8mgを静注

2223. デキストロメトルファン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 <u>メジコン錠 15mg</u> Medicon (塩野義) 15mg/T 【薬価】 5.70 円 / T	【効】 ①次記疾患に伴う咳嗽：感冒，急性気管支炎，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺炎，肺結核，上気道炎（咽喉頭炎，鼻カタル）。②気管支造影術及び気管支鏡検査時の咳嗽 【用】 (内) 1回 15～30mgを1日1～4回

2229. その他の鎮咳剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジメモルファンリン酸塩 <u>アストミン錠 10mg</u> Astomin (オーファンパシフィック) 10mg/T 【薬価】 6.80 円 / T	【効】 次の疾患に伴う鎮咳：上気道炎，肺炎，急性気管支炎，肺結核，珪肺及び珪肺結核，肺癌，慢性気管支炎 【用】 (内) 1回 10～20mgを1日3回

223. 去たん剤

2233. システイン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
L-カルボシステイン <u>ムコダイン錠 250mg (院外)</u> Mucodyne (杏林) 250mg/T 【薬価】 8.50 円 / T <u>後カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」</u> Carbocisteine (沢井) 250mg/T 【薬価】 6.70 円 / T 【先発品】 ムコダイン錠 250mg <u>後カルボシステイン錠 500mg 「サワイ」</u> Carbocisteine (沢井) 500mg/T 【薬価】 9.30 円 / T 【先発品】 ムコダイン錠 500mg	【効】 ①次記疾患の去痰：上気道炎（咽頭炎，喉頭炎），急性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺結核。②慢性副鼻腔炎の排膿 【用】 (内) 1回 500mgを1日3回

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
L-カルボシステイン <u>ムコダインシロップ 5% (院外)</u> Mucodyne (杏林) 50mg/mL 【薬価】 6.10 円/mL <u>後カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」</u> Carbocisteine (高田) 5%500mL/本 【薬価】 2.60 円/mL 【先発品】 ムコダインシロップ 5%	【効】 ①次記疾患の去痰：上気道炎（咽頭炎，喉頭炎），急性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺結核。②慢性副鼻腔炎の排膿。③滲出性中耳炎の排液 【用】 (内) 幼・小児：1日 30mg（本剤 0.6mL）/kgを 3回に分割
L-カルボシステイン <u>ムコダイン DS50% (院外)</u> Mucodyne (杏林) 500mg/g 【薬価】 16.40 円/g <u>後カルボシステイン DS50% 「タカタ」</u> Carbocisteine (高田) 500mg/g 【薬価】 12.50 円/g 【先発品】 ムコダイン DS50%	【効】 ①（成人・小児）次記疾患の去痰：上気道炎（咽頭炎，喉頭炎），急性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺結核。②（成人・小児）慢性副鼻腔炎の排膿。③（小児のみ）滲出性中耳炎の排液 【用】 (内) 1回 500mg（本剤 1.0g）を用時懸濁し，1日 3回。小児：1回 10mg/kg（本剤 0.02g/kg）を用時懸濁し，1日 3回
フドステイン <u>クリアナール錠 200mg</u> Cleanal (田辺三菱) 200mg/T 【薬価】 10.10 円/T	【効】 次の慢性呼吸器疾患における去痰：気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺結核，塵肺症，肺気腫，非定型抗酸菌症，びまん性汎細気管支炎 【用】 (内) 1回 400mg 1日 3回食後

2234. プロムヘキシシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロムヘキシシン塩酸塩 <u>ビソルボン吸入液 0.2% (院外)</u> Bisolvon (日本ベーリンガー) 0.2%45mL/本 【薬価】 11.10 円/mL <u>後プロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」</u> Bromhexine hydrochloride (テバ) 0.2%45mL/本 【薬価】 5.90 円/mL 【先発品】 ビソルボン吸入液 0.2%	【効】 次記疾患の去痰：急性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，手術後 【用】 (外) 1回 4mg（本剤として 2mL）を生理食塩液等で約 2.5 倍に希釈，1日 3回ネブライザーで吸入
プロムヘキシシン塩酸塩 <u>後プロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg 「クニヒロ」</u> Bromhexine hydrochloride (皇漢堂) 4mg/T 【薬価】 5.10 円/T	【効】 次記疾患の去痰：急性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，手術後 【用】 (内) 1回 4mgを 1日 3回

22. 呼吸器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ブロムヘキシン塩酸塩 ② ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg「 タイオー 」 Bromhexine hydrochloride (テバ) 4mg2mL/A 【薬価】57.00 円/A 【先発品】ピソルボン注 4mg	【効】①経口投与困難な場合における次記疾患ならびに状態の去痰:肺結核,塵肺症,手術後. ②気管支造影後の造影剤の排泄促進 【用】(注) 1回 4～8mgを1日1～2回筋注又は静注

2239. その他の去たん剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アンブロキシソール塩酸塩 ② アンブロキシソール塩酸塩徐放 OD錠 45mg「 サワイ 」 Ambroxol hydrochloride OD (沢井) 45mg/T 【薬価】16.10 円/T 【先発品】ムコソルバンL錠 45mg	【効】次記疾患の去痰:急性気管支炎,気管支喘息,慢性気管支炎,気管支拡張症,肺結核,塵肺症,手術後の喀痰咯出困難 【用】(内) 1回 45mgを1日1回
アンブロキシソール塩酸塩 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% Mucosolvan (帝人) 0.3%500mL/瓶 【薬価】6.70 円/mL	【効】次記疾患の去痰:急性気管支炎,気管支喘息 【用】(内) 幼・小児:1日 0.9mg/kg(本剤として0.3mL/kg)を3回に分割
アンブロキシソール塩酸塩 ムコサルドライシロップ1.5% Mucosal (サノフィ) 15mg/g 【薬価】20.80 円/g	【効】次記疾患の去痰:急性気管支炎,気管支喘息 【用】(内) 幼・小児:1日 0.9mg/kg(本剤として0.06g/kg)を3回に分割,用時溶解
アンブロキシソール塩酸塩 ムコソルバン錠 15mg(院外) Mucosolvan (帝人) 15mg/T 【薬価】8.60 円/T ② アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「 サワイ 」 Ambroxol hydrochloride(沢井) 15mg/T 【薬価】5.70 円/T 【先発品】ムコソルバン錠 15mg	【効】①次記疾患の去痰:急性気管支炎,気管支喘息,慢性気管支炎,気管支拡張症,肺結核,塵肺症,手術後の喀痰咯出困難. ②慢性副鼻腔炎の排膿 【用】(内) 1回 15mgを1日3回

224. 鎮咳去たん剤

2242. コデイン系製剤(家庭麻薬)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 【経過措置】 ㉑ Codeine phosphate (武田) 10mg/g 【薬価】10.20 円/g	【効】①各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮静. ②疼痛時における鎮痛. ③激しい下痢症状の改善 【用】(内) 1回 20mg(本剤として2g),1日 60mg(本剤として6g)

2249. その他の鎮咳去たん剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エブラジノン塩酸塩 <u>レスプレン錠 20mg</u> Resplen (中外) 20mg/T 【薬価】 10.30 円/T	【効】 次記呼吸器疾患時の鎮咳及び去痰:肺結核, 肺炎, 気管支拡張症, 気管支喘息, 急・慢性気管支炎, 上気道炎, 感冒 【用】(内) 1日 60～90mgを3回に分割, 幼・小児:次記量を1日量として3回に分割, 3歳以上6歳未満:20～30mg, 6歳以上10歳未満:30～45mg
チペピジンヒベンズ酸塩 <u>アスベリン散 10%</u> Asverin (田辺三菱) 100mg/g 【薬価】 11.90 円/g <u>アスベリンシロップ 0.5% (院外)</u> Asverin (田辺三菱) 5mg/mL 【薬価】 1.97 円/mL	【効】 次記疾患に伴う咳嗽及び喀痰咯出困難:感冒, 上気道炎(咽喉頭炎, 鼻カタル), 急性気管支炎, 慢性気管支炎, 肺炎, 肺結核, 気管支拡張症 【用】(内) 1日 60～120mg3回に分割, 小児:1日1歳未満5～20mg, 1歳以上3歳未満10～25mg, 3歳以上6歳未満15～40mgを3回に分割

225. 気管支拡張剤

2251. キサンチン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テオフィリン <u>テオドール錠 100mg (院外)</u> Theodur (田辺三菱) 100mg/T 【薬価】 6.70 円/T <u>②テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」</u> Theophylline (沢井) 100mg/T 【薬価】 5.70 円/T 【先発品】 テオドール錠 100mg	【効】 気管支喘息, 喘息性(様)気管支炎, 慢性気管支炎, 肺気腫 【用】(内) 1回 200mg, 小児1回 100～200mgを, 1日2回, 朝及び就寝前. 気管支喘息については, 成人1回 400mgを, 1日1回就寝前に投与もできる
テオフィリン <u>テオロング錠 50mg</u> Theolong (エーザイ) 50mg/T 【薬価】 5.90 円/T	【効】 気管支喘息, 喘息性(様)気管支炎, 慢性気管支炎, 肺気腫 【用】(内) 1回 200mg, 小児1回 100～200mgを, 1日2回, 朝及び就寝前
テオフィリン <u>②テオフィリンドライシロップ 20% 「タカタ」</u> ㊟ Theophylline (高田) 200mg/g 【薬価】 50.10 円/g	【効】 気管支喘息, 喘息性(様)気管支炎 【用】(内) 小児:1回 4～8mg/kg(本剤 20～40mg/kg)を, 1日2回, 朝及び就寝前. 用時, 水に懸濁して投与するが, 顆粒のまま投与も可

2254. サルブタモール製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
サルブタモール硫酸塩 <u>サルタノールインヘラー 100μg</u> Sultanol (グラクソ・スミスクライン) 100μg/本 【薬価】 535.40 円/瓶	【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解:気管支喘息, 小児喘息, 肺気腫, 急・慢性気管支炎, 肺結核 【用】(外) 1回 200μg(2吸入), 小児:1回 100μg(1吸入)を吸入

22. 呼吸器官用薬

2259. その他の気管支拡張剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イプラトロピウム臭化物水和物 アトロVENTエロゾル 20μg (院外) Atrovent (帝人) 20 μ g 【薬価】616.00円/瓶	【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫 【用】(外) 専用のアダプターを用いて，1回1～2噴射(20～40 μ g)を1日3～4回吸入
インダカテロールマレイン酸塩 オンブレス吸入用カプセル 150μg Onbrez (ノバルティス) 150 μ g/cap 【薬価】131.40円/cap	【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎，肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解 【用】(外) 1回150 μ g(1カプセル)を1日1回専用の吸入用器具を用いて吸入
ウメクリジニウム臭化物 エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30吸入用 Encruse (グラクソ・スミスクライン) 30吸入/キット 【薬価】4,303.00円/キット	【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎，肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解 【用】(外) 1吸入(62.5 μ g)を1日1回
クレンブテロール塩酸塩 スピロPENT錠 10μg (院外) Spiropent (帝人) 10 μ g/T 【薬価】8.30円/T ② クレンブテロール錠 10μg 「ハラサワ」 Clenbuterol (日本ジェネリック) 10 μ g/T 【薬価】5.80円/T 【先発品】スピロPENT錠 10 μ g	【効】①次記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気管支炎。②次記疾患に伴う尿失禁：腹圧性尿失禁 【用】(内) ①1回20 μ gを1日2回，朝及び就寝前。頓用として，1回20 μ g。5歳以上の小児：1回0.3 μ g/kgを1日2回，朝及び就寝前。頓用として，5歳以上の小児：1回0.3 μ g/kg。頓用を反復しなければならない場合には，早急に医師の指示を受けさせる。②1回20 μ gを1日2回，朝及び夕。60 μ g/日まで
クロモグリク酸ナトリウム インタール吸入液 1% Intal (サノフィ) 20mg2mL/A 【薬価】29.40円/A	【効】気管支喘息 【用】(外) 朝，昼及び就寝前ないしは朝，昼，夕及び就寝前1回20mg(1アンプル)ずつ，1日60～80mg(3～4アンプル)を電動式ネブライザーを用いて吸入。症状の緩解が得られれば，その後の経過を観察しながら1日40～60mg(2～3アンプル)に減量
チオトロピウム臭化物水和物 スピリーバ 2.5μg レスピマツト 60吸入 Spiriva (日本ベーリンガー) 2.5 μ g60吸入/本 【薬価】3,320.40円/キット	【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎，肺気腫)，気管支喘息の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解 【用】(外) 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎，肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解：1回2吸入(チオトロピウムとして5 μ g)を1日1回。気管支喘息の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解：スピリーバ1.25 μ g レスピマツト1回2吸入(チオトロピウムとして2.5 μ g)を1日1回。症状・重症度に応じて，スピリーバ2.5 μ g レスピマツト1回2吸入(チオトロピウムとして5 μ g)を1日1回吸入

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ツロブテロール ホクナリンテープ 0.5mg (院外) Hokunalin (マイラン EPD) 0.5mg/枚 【薬価】 21.60 円/枚 ホクナリンテープ 1mg (院外) Hokunalin (マイラン EPD) 1mg/枚 【薬価】 29.10 円/枚 ホクナリンテープ 2mg (院外) Hokunalin (マイラン EPD) 2mg/枚 【薬価】 43.10 円/枚 ④ツロブテロールテープ 0.5mg 「NP」 Tulobuterol (ニプロ) 0.5mg/枚 【薬価】 12.30 円/枚 【先発品】ホクナリンテープ 0.5mg, ツロブテロールテープ 0.5mg「サ ワイ」 ④ツロブテロールテープ 1mg 「NP」 Tulobuterol (ニプロ) 1mg/枚 【薬価】 15.90 円/枚 【先発品】ホクナリンテープ 1mg ④ツロブテロールテープ 2mg 「NP」 Tulobuterol (ニプロ) 2mg/枚 【薬価】 23.30 円/枚 【先発品】ホクナリンテープ 2mg</p>	<p>【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管支喘息，急性気管支炎，慢性気管支炎，肺気腫 【用】(外) 1日1回2mg，小児：0.5～3歳未満0.5mg，3～9歳未満1mg，9歳以上2mgを胸部，背部又は上腕部のいずれかに貼付</p>
<p>ツロブテロール塩酸塩 ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用 (院外) Hokunalin (マイラン EPD) 1mg/g 【薬価】 11.50 円/g</p>	<p>【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管支喘息，急性気管支炎，慢性気管支炎，喘息性気管支炎，肺気腫，珪肺症，塵肺症 【用】(内) 小児：1日0.04mg/kg（ドライシロップとして40mg/kg）を2回に分割，用時溶解。標準投与量は，次記の用量を1日2回に分割，用時溶解。0.5～3歳未満：1日量0.25～0.5mg（ドライシロップとして0.25～0.5g），3～9歳未満：1日量0.5～1mg（ドライシロップとして0.5～1g），9～15歳：1日量1～2mg（ドライシロップとして1～2g）</p>
<p>プロカテロール塩酸塩水和物 メプチン錠 50μg Meptin (大塚) 50μg/T 【薬価】 10.00 円/T</p>	<p>【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気管支炎 【用】(内) 1回50μgを1日1回就寝前ないしは1日2回，朝及び就寝前</p>
<p>プロカテロール塩酸塩水和物 メプチン吸入液ユニット 0.3mL Meptin (大塚) 100μg/mL (0.3mL/個) 【薬価】 25.00 円/個 メプチン吸入液 0.01% Meptin (大塚) 100μg/mL (30mL/V) 【薬価】 26.10 円/mL</p>	<p>【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫 【用】(外) 1回30～50μg（本剤として0.3～0.5mL），小児：1回10～30μg（本剤として0.1～0.3mL）を深呼吸しながらネブライザーを用いて吸入</p>

22. 呼吸器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロカテロール塩酸塩水和物 <u>メプチンエア-10μg吸入100回</u> Meptin (大塚) 143 μ g/g 5mL/キット (1回噴霧中 10 μ g) 【薬価】 894.90円/キット <u>メプチンスイングヘラー10μg吸入100回</u> Meptin (大塚) 1mg/キット (1吸入中10 μ g) 【薬価】 1,377.50円/キット	【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解:気管支喘息,慢性気管支炎,肺気腫 【用】(外) 1回20 μ g (2吸入), 小児:1回10 μ g (1吸入)
プロカテロール塩酸塩水和物 <u>メプチンキッドエア-5μg吸入100回(院外)</u> Meptin (大塚) 143 μ g/g (2.5mL/キット) 【薬価】 792.70円/キット	【効】 次記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解:気管支喘息,慢性気管支炎,肺気腫 【用】(外) 1回20 μ g (4吸入), 小児:1回10 μ g (2吸入)
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル <u>キューバル100エアゾール</u> Qvar (大日本住友) 15mg8.7g/本 (1回の噴霧主薬量: 100 μ g) 【薬価】 1,944.90円/瓶	【効】 気管支喘息 【用】(外) 1回100 μ gを1日2回口腔内に噴霧吸入, 1日800 μ gまで. 小児:1回50 μ gを1日2回口腔内に噴霧吸入, 1日200 μ gまで
<u>アノーロエリプタ30吸入用</u> Anoro ellipta (グラクソ・スミスクライン) 30吸入/キット 【薬価】 5,815.70円/キット 1ブリスター中: ウメクリジニウム臭化物 74.2 μ g (ウメクリジニウムとして62.5 μ g) ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40 μ g (ビランテロールとして25 μ g)	【効】 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤の併用が必要な場合) 【用】(外) 1吸入(ウメクリジニウムとして62.5 μ g及びビランテロールとして25 μ g)を1日1回投与
<u>ウルティプロ吸入用カプセル</u> Ultibro (ノバルティス) 1cap 【薬価】 178.20円/cap 1cap中: グリコピロニウム臭化物 63 μ g (グリコピロニウムとして50 μ g) インダカテロールマレイン酸塩 143 μ g (インダカテロールとして110 μ g)	【効】 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎,肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β 2刺激剤の併用が必要な場合) 【用】(外) 1回1カプセル(グリコピロニウムとして50 μ g及びインダカテロールとして110 μ g)を1日1回専用の吸入用器具を用いて吸入

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スピオルトレスピマット 60 吸入 Spiolto (日本ベーリンガー) 60 吸入 / キット 【薬価】 5,719.40 円 / キット 1 噴霧中： チオトロピウム 2.5 μ g (チオトロピウム臭化物水和物 として 3.124 μ g) オロダテロール 2.5 μ g (オロダテロール塩酸塩として 2.736 μ g)	【効】 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β 2 刺激剤の併用が必要な場合） 【用】 (外) 1 回 2 吸入（チオトロピウムとして 5 μ g 及びオロダテロールとして 5 μ g）を 1 日 1 回

226. 含嗽剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ④アズノールうがい液 4% Azunol (日本新薬) 4%5mL/ 本 【薬価】 26.90 円 / mL	【効】 咽頭炎, 扁桃炎, 口内炎, 急性歯肉炎, 舌炎, 口腔創傷 【用】 (外) 1 回 4 ~ 6mg (1 回押し切り分, 又は 5 ~ 7 滴) を, 適量 (約 100mL) の水又は微温湯に溶解し, 1 日数回含嗽
ポビドンヨード ポビドンヨードガーグル液 7%「明治」 Povidone-iodine (Meiji Seika) 7%30mL/ 本 【薬価】 3.20 円 / mL	【効】 咽頭炎, 扁桃炎, 口内炎, 抜歯創を含む口腔創傷の感染予防, 口腔内の消毒 【用】 (外) 用時 15 ~ 30 倍 (本剤 2 ~ 4mL を約 60mL の水) に希釈し, 1 日数回含嗽

229. その他の呼吸器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>オマリズマブ（遺伝子組換え） ゾレア皮下注 150mg シリンジ <small>（製）</small> Xolair （ノバルティス） 150mg 【薬価】 21,786.00 円 / 筒</p>	<p>【効】 ①気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る）。②季節性アレルギー性鼻炎（既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る）。最適使用推進ガイドライン対象。③特発性の慢性蕁麻疹（既存治療で効果不十分な患者に限る）</p> <p>【用】（注） ①② 1回 75～600mgを2又は4週間毎に皮下注（②は成人及び12歳以上の小児）。1回あたりの投与量並びに投与間隔は、初回投与前の血清中総IgE濃度及び体重に基づき、次の様に設定 〈投与前の血清中総IgE濃度（I.U./mL）及び体重（kg）ごとの1回投与量一覧〉 4週間毎投与（4週間毎投与の表に該当しない場合には2週間毎投与の表に従い投与すること）</p> <p>(1) IgE濃度\geq 30～100I.U./mLの場合：体重\geq 20～40kg 4週間毎1回75mg投与，体重$>$ 40～90kg 4週間毎1回150mg投与，体重$>$ 90～150kg 4週間毎1回300mg投与</p> <p>(2) IgE濃度$>$ 100～200I.U./mLの場合：体重\geq 20～40kg 4週間毎1回150mg投与，体重$>$ 40～90kg 4週間毎1回300mg投与，体重$>$ 90～125kg 4週間毎1回450mg投与，体重$>$ 125～150kg 4週間毎1回600mg投与</p> <p>(3) IgE濃度$>$ 200～300I.U./mLの場合：体重\geq 20～30kg 4週間毎1回150mg投与，体重$>$ 30～40kg 4週間毎1回225mg投与，体重$>$ 40～60kg 4週間毎1回300mg投与，体重$>$ 60～90kg 4週間毎1回450mg投与，体重$>$ 90～125kg 4週間毎1回600mg投与</p> <p>(4) IgE濃度$>$ 300～400I.U./mLの場合：体重\geq 20～30kg 4週間毎1回225mg投与，体重$>$ 30～40kg 4週間毎1回300mg投与，体重$>$ 40～70kg 4週間毎1回450mg投与，体重$>$ 70～90kg 4週間毎1回600mg投与</p> <p>(5) IgE濃度$>$ 400～500I.U./mLの場合：体重\geq 20～25kg 4週間毎1回225mg投与，体重$>$ 25～30kg 4週間毎1回300mg投与，体重$>$ 30～50kg 4週間毎1回450mg投与，体重$>$ 50～70kg 4週間毎1回600mg投与</p> <p>(6) IgE濃度$>$ 500～600I.U./mLの場合：体重\geq 20～30kg 4週間毎1回300mg投与，体重$>$ 30～40kg 4週間毎1回450mg投与，体重$>$ 40～60kg 4週間毎1回600mg投与</p> <p>(7) IgE濃度$>$ 600～700I.U./mLの場合：体重\geq 20～25kg 4週間毎1回300mg投与，体重$>$ 30～40kg 4週間毎1回450mg投与，体重$>$ 40～50kg 4週間毎1回600mg投与</p> <p>2週間毎投与（2週間毎投与の表に該当しない場合には4週間毎投与の表に従い投与すること）</p> <p>(1) IgE濃度$>$ 200～300I.U./mLの場合：体重$>$ 125～150kg 2週間毎1回375mg投与</p> <p>(2) IgE濃度$>$ 300～400I.U./mLの場合：体重$>$ 90～125kg 2週間毎1回450mg投与，体重$>$ 125～150kg 2週間毎1回525mg投与</p> <p>(3) IgE濃度$>$ 400～500I.U./mLの場合：体重$>$ 70～90kg 2週間毎1回375mg投与，体重$>$ 90～125kg 2週間毎1回525mg投与，体重$>$ 125～150kg 2週間毎1回600mg投与</p> <p>(4) IgE濃度$>$ 500～600I.U./mLの場合：体重$>$ 60～70kg 2週間毎1回375mg投与，体重$>$ 70～90kg 2週間毎1回450mg投与，体重$>$ 90～125kg 2週間毎1回600mg投与，体重$>$ 125～150kg 投与不可</p> <p>(5) IgE濃度$>$ 600～700I.U./mLの場合：体重$>$ 25～30kg 2週間毎1回225mg投与，体重$>$ 30～40kg 2週間毎1回300mg投与，体重$>$ 40～50kg 2週間毎1回375mg投与，体重$>$ 50～60kg 2週間毎1回450mg投与，体重$>$ 60～80kg 2週間毎1回525mg投与，体重$>$ 80～90kg 2週間毎1回600mg投与，体重$>$ 90～150kg 投与不可</p> <p>(6) IgE濃度$>$ 700～800I.U./mLの場合：体重\geq 20～30kg 2週間毎1回225mg投与，体重$>$ 30～40kg 2週間毎1回300mg投与，体重$>$ 40～50kg 2週間毎1回375mg投与，体重$>$ 50～70kg 2週間毎1回450mg投与，体重$>$ 70～80kg 2週間毎1回525mg投与，体重$>$ 80～90kg 2週間毎1回600mg投与，体重$>$ 90～150kg 投与不可</p> <p>(7) IgE濃度$>$ 800～900I.U./mLの場合：体重\geq 20～30kg 2週間毎1回225mg投与，体重$>$ 30～40kg 2週間毎1回300mg投与，体重$>$ 40～50kg 2週間毎1回375mg投与，体重$>$ 50～60kg 2週間毎1回450mg投与，体重$>$ 60～70kg 2週間毎1回525mg投与，体重$>$ 70～80kg 2週間毎1回600mg投与，体重$>$ 80～</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>150kg 投与不可</p> <p>(8) IgE 濃度 > 900 ~ 1000I.U./mL の場合：体重 ≥ 20 ~ 25kg 2 週間毎 1 回 225mg 投与，体重 > 25 ~ 30kg 2 週間毎 1 回 300mg 投与，体重 > 30 ~ 40kg 2 週間毎 1 回 375mg 投与，体重 > 40 ~ 50kg 2 週間毎 1 回 450mg 投与，体重 > 50 ~ 60kg 2 週間毎 1 回 525mg 投与，体重 > 60 ~ 70kg 2 週間毎 1 回 600mg 投与，体重 > 70 ~ 150kg 投与不可</p> <p>(9) IgE 濃度 > 1000 ~ 1100I.U./mL の場合：体重 ≥ 20 ~ 25kg 2 週間毎 1 回 225mg 投与，体重 > 25 ~ 30kg 2 週間毎 1 回 300mg 投与，体重 > 30 ~ 40kg 2 週間毎 1 回 375mg 投与，体重 > 40 ~ 50kg 2 週間毎 1 回 450mg 投与，体重 > 50 ~ 60kg 2 週間毎 1 回 600mg 投与，体重 > 60 ~ 150kg 投与不可</p> <p>(10) IgE 濃度 > 1100 ~ 1200I.U./mL の場合：体重 ≥ 20 ~ 30kg 2 週間毎 1 回 300mg 投与，体重 > 30 ~ 40kg 2 週間毎 1 回 450mg 投与，体重 > 40 ~ 50kg 2 週間毎 1 回 525mg 投与，体重 > 50 ~ 60kg 2 週間毎 1 回 600mg 投与，体重 > 60 ~ 150kg 投与不可</p> <p>(11) IgE 濃度 > 1200 ~ 1300I.U./mL の場合：体重 ≥ 20 ~ 25kg 2 週間毎 1 回 300mg 投与，体重 > 25 ~ 30kg 2 週間毎 1 回 375mg 投与，体重 > 30 ~ 40kg 2 週間毎 1 回 450mg 投与，体重 > 40 ~ 50kg 2 週間毎 1 回 525mg 投与，体重 > 50 ~ 150kg 投与不可</p> <p>(12) IgE 濃度 > 1300 ~ 1500I.U./mL の場合：体重 ≥ 20 ~ 25kg 2 週間毎 1 回 300mg 投与，体重 > 25 ~ 30kg 2 週間毎 1 回 375mg 投与，体重 > 30 ~ 40kg 2 週間毎 1 回 525mg 投与，体重 > 40 ~ 50kg 2 週間毎 1 回 600mg 投与，体重 > 50 ~ 150kg 投与不可</p> <p>本一覧では，臨床推奨用量である 0.008mg/kg/ [I.U./mL] 以上（2 週間間隔皮下投与時）又は 0.016mg/kg/ [I.U./mL] 以上（4 週間間隔皮下投与時）となるよう投与量が設定されている。③成人及び 12 歳以上の小児に 1 回 300mg を 4 週間毎に皮下注</p>
<p>ゲーファピキサントクエン酸塩 リフヌア錠 45mg Lyfnua (MSD) 45mg/T 【薬価】187.40 円/T</p>	<p>【効】 難治性の慢性咳嗽 【用】 (内) 1 回 45mg を 1 日 2 回</p>
<p>シクレソニド オルベスコ 200µg インヘラー 56 吸入用 Alvesco (帝人) 11.2mg3.3g/ 缶 56 回 (1 回吸入量：200µg) 【薬価】1,201.90 円/キット</p>	<p>【効】 気管支喘息 【用】 (外) 100 ~ 400µg を 1 日 1 回吸入投与，1 日 800µg まで，1 日 800µg を投与する場合は，朝，夜の 1 日 2 回に分割，小児：100 ~ 200µg を 1 日 1 回吸入投与，良好に症状がコントロールされている場合は 50µg 1 日 1 回まで減量可</p>
<p>テゼベルマブ（遺伝子組換え） テゼスパイア皮下注 210mgペン（院外） Ⓢ Tezspire (アストラゼネカ) 210mg1.91mL/ キット 【薬価】178,182.00 円/キット</p>	<p>【効】 気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る） 【用】 (注) 成人及び 12 歳以上の小児には 1 回 210mg を 4 週間隔で皮下注</p>
<p>ブデソニド パルミコート吸入液 0.25mg(院外) Pulmicort (アストラゼネカ) 0.25mg2mL/A 【薬価】117.30 円/A</p>	<p>【効】 気管支喘息 【用】 (外) 0.5mg を 1 日 2 回又は 1mg を 1 日 1 回，ネブライザーを用いて吸入投与，1 日 2mg まで，小児：0.25mg を 1 日 2 回又は 0.5mg を 1 日 1 回，ネブライザーを用いて吸入投与，1 日 1mg まで</p>
<p>ブデソニド パルミコート 200µg タービュヘイラー 56 吸入（院外） Pulmicort (アストラゼネカ) 11.2mg/ 本 (1 吸入量：200µg) 【薬価】996.00 円/瓶</p>	<p>【効】 気管支喘息 【用】 (外) 1 回 100 ~ 400µg を 1 日 2 回吸入，1 日 1600µg まで，小児：1 回 100 ~ 200µg を 1 日 2 回吸入，1 日 800µg まで，良好に症状がコントロールされている場合は 100µg 1 日 1 回まで減量可</p>

22. 呼吸器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フルチカゾンフランカルボン酸エステル <u>アニュイティ 100μg エリプタ 30 吸入用</u> Arnuity (グラクソ・スミスクライン) エリプタ 30 吸入 【薬価】 1,391.00 円 / キット	【効】 気管支喘息 【用】 (外) 1 日 1 回吸入
フルチカゾンプロピオン酸エステル <u>フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用 (院外)</u> Flutide (グラクソ・スミスクライン) 9.72mg10.6g / 缶 (1 吸入量: 50 μ g) 【薬価】 1,067.50 円 / 瓶 <u>フルタイド 50 ディスカス</u> Flutide (グラクソ・スミスクライン) 50 μ g60 ブリスター / 個 【薬価】 772.80 円 / 個 <u>フルタイド 100 ディスカス</u> Flutide (グラクソ・スミスクライン) 100 μ g60 ブリスター / 個 【薬価】 1,117.20 円 / 個	【効】 気管支喘息 【用】 (外) 1 回 100 μ g を 1 日 2 回吸入, 1 日 800 μ g まで. 小児: 1 回 50 μ g を 1 日 2 回吸入, 1 日 200 μ g まで
ベンラリズマブ (遺伝子組換え) <u>ファセンラ皮下注 30mg シリンジ</u> (商) (生) Fasentra (アストラゼネカ) 30mg / 筒 【薬価】 319,342.00 円 / 筒	【効】 気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る) 【用】 (注) 成人, 12 歳以上の小児及び体重 35kg 以上の 6 歳以上 12 歳未満の小児: 1 回 30mg を, 初回, 4 週後, 8 週後に皮下注, 以降, 8 週間隔で皮下注
メボリズマブ (遺伝子組換え) <u>ヌーカラ皮下注 100mg ペン</u> (商) (生) Nucala (グラクソ・スミスクライン) 100mg / 本 【薬価】 159,891.00 円 / キット	【効】 ①気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る), ②既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 【用】 (注) ①成人及び 12 歳以上の小児: 1 回 100mg を 4 週間ごとに皮下注. ② 1 回 300mg を 4 週間ごとに皮下注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アテキュラ吸入用カプセル高用量 Ateectura inhalation capsules (ノバルティス)</p> <p>高用量 【薬価】 171.60 円 /cap 1cap 中： インダカテロール酢酸塩 173μg (インダカテロールとして 150μg) モメタゾンフランカルボン酸エステル 320μg</p> <p>アテキュラ吸入用カプセル中用量 Ateectura inhalation capsules (ノバルティス)</p> <p>中用量 【薬価】 153.10 円 /cap 1cap 中： インダカテロール酢酸塩 173μg (インダカテロールとして 150μg) モメタゾンフランカルボン酸エステル 160μg</p>	<p>【効】 気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合）</p> <p>【用】（外） アテキュラ吸入用カプセル低用量 1 回 1 カプセルを 1 日 1 回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入，症状に応じて次記用量の 1 回 1 カプセルを 1 日 1 回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入 アテキュラ吸入用カプセル中用量 アテキュラ吸入用カプセル高用量</p>
<p>アドエア 100 ディスカス 60 吸入用（院外） Adoair (グラクソ・スミスクライン) 60 ブリスター / キット 【薬価】 3,290.40 円 / キット 1 ブリスター中： サルメテロールキシナホ酸塩 72.5μg (サルメテロールとして 50μg) フルチカゾンプロピオン酸エステル 100μg</p> <p>アドエア 250 エアゾール 120 吸入用（院外） Adoair (グラクソ・スミスクライン) 120 回噴霧 / 缶 【薬価】 4,601.60 円 / 瓶 1 回噴霧中： サルメテロールキシナホ酸塩含量 36.3μg (サルメテロールとして 25μg) フルチカゾンプロピオン酸エステル含量 250μg</p>	<p>【効】 気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合）</p> <p>【用】（外） 1 回サルメテロールとして 50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして 100μg を 1 日 2 回吸入。 アドエア 100 ディスカス 1 回 1 吸入 アドエア 50 エアゾール 1 回 2 吸入 症状に応じて以下のいずれかの用法・用量に従い投与 1 回サルメテロールとして 50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして 250μg を 1 日 2 回吸入 アドエア 250 ディスカス 1 回 1 吸入 アドエア 125 エアゾール 1 回 2 吸入 1 回サルメテロールとして 50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして 500μg を 1 日 2 回吸入。 アドエア 500 ディスカス 1 回 1 吸入 アドエア 250 エアゾール 1 回 2 吸入 小児：症状に応じて以下のいずれかの用法・用量に従い投与。 1 回サルメテロールとして 25μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50μg を 1 日 2 回吸入。 アドエア 50 エアゾール 1 回 1 吸入 1 回サルメテロールとして 50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして 100μg を 1 日 2 回吸入。 アドエア 100 ディスカス 1 回 1 吸入 アドエア 50 エアゾール 1 回 2 吸入</p>

22. 呼吸器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アドエア 125 エアゾール 120 吸入用 (院外) Adoair (グラクソ・スミスクライン) 120回噴霧/缶 【薬価】 4,170.60円/瓶 1回噴霧中： サルメテロールキシナホ酸塩含量 36.3μg (サルメテロールとして25μg) フルチカゾンプロピオン酸エステル含量 125μg</p>	<p>【効】 ①気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)、②慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) 【用】(外) ①1回サルメテロールとして50μg及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして100μgを1日2回吸入。 アドエア 100 ディスカス 1回1吸入 アドエア 50 エアゾール 1回2吸入 症状に応じて以下のいずれかの用法・用量に従い投与 1回サルメテロールとして50μg及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして250μgを1日2回吸入 アドエア 250 ディスカス 1回1吸入 アドエア 125 エアゾール 1回2吸入 1回サルメテロールとして50μg及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして500μgを1日2回吸入。 アドエア 500 ディスカス 1回1吸入 アドエア 250 エアゾール 1回2吸入 小児：症状に応じて以下のいずれかの用法・用量に従い投与。 1回サルメテロールとして25μg及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして50μgを1日2回吸入。 アドエア 50 エアゾール 1回1吸入 1回サルメテロールとして50μg及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして100μgを1日2回吸入。 アドエア 100 ディスカス 1回1吸入 アドエア 50 エアゾール 1回2吸入。 ②1回サルメテロールとして50μg及びフルチカゾンプロピオン酸エステルとして250μgを1日2回吸入 アドエア 250 ディスカス 1回1吸入 アドエア 125 エアゾール 1回2吸入</p>
<p>エナジア吸入用カプセル高用量 Enerzair inhalation capsules (ノバルティス) 高用量 【薬価】 331.50円/cap 1cap中： インダカテロール酢酸塩 173μg (インダカテロールとして150μg) グリコピロニウム臭化物 63μg (グリコピロニウムとして50μg) モメタゾンフランカルボン酸エステル 160μg エナジア吸入用カプセル中用量 Enerzair inhalation capsules (ノバルティス) 中用量 【薬価】 290.30円/cap 1cap中： インダカテロール酢酸塩 173μg (インダカテロールとして150μg) グリコピロニウム臭化物 63μg (グリコピロニウムとして50μg) モメタゾンフランカルボン酸エステル 80μg</p>	<p>【効】 気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入β2刺激剤及び長時間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要な場合) 【用】(外) エナジア吸入用カプセル中用量1回1カプセルを1日1回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入。症状に応じてエナジア吸入用カプセル高用量1回1カプセルを1日1回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>シムビコートタービューハイラー 60 吸入 Symbicort (アストラゼネカ) 60 吸入 / 本 【薬価】 2,859.60 円 / キット 1 回吸入量： ブデソニド 160μg ホルモテロールフマル酸塩水和物 4.5μg</p>	<p>【効】 ①気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）、②慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【用】(外) ①維持療法として1回1吸入（ブデソニドとして160μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として4.5μg）を1日2回吸入。維持療法としての1日の最高量は1回4吸入1日2回（合計8吸入：ブデソニドとして1280μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として36μg）まで 維持療法として1回1吸入あるいは2吸入を1日2回投与している患者は、発作発現時に頓用吸入を追加で行うことが可。維持療法に加えて頓用吸入する場合は、発作発現時に1吸入、数分経過しても発作が持続する場合には、さらに追加で1吸入、必要に応じてこれを繰り返すが、1回の発作発現につき、最大6吸入まで。 維持療法と頓用吸入を合計した本剤の1日の最高量は、通常8吸入までとするが、一時的に1日合計12吸入（ブデソニドとして1920μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として54μg）まで増量可。②1回2吸入（ブデソニドとして320μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として9μg）を1日2回吸入</p>
<p>テリルジー 100 エリプタ 30 吸入 用 Trelegy (グラクソ・スミスクライン) 合剤 【薬価】 8,805.10 円 / キット 1 プリスター中： フルチカゾンフランカルボン酸エステル 100μg ウメクリジニウム臭化物 74.2μg (ウメクリジニウムとして62.5μg) ピランテロールトリフェニル酢酸塩 40μg (ピランテロールとして25μg)</p>	<p>【効】 ①気管支喘息（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）、②慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【用】(外) ①テリルジー 100 エリプタ 1吸入を1日1回吸入。症状に応じてテリルジー 200 エリプタ 1吸入を1日1回吸入。②テリルジー 100 エリプタ 1吸入を1日1回吸入</p>
<p>テリルジー 200 エリプタ 30 吸入 用 Trelegy (グラクソ・スミスクライン) 合剤 【薬価】 10,043.30 円 / キット 1 プリスター中： フルチカゾンフランカルボン酸エステル 200μg ウメクリジニウム臭化物 74.2μg (ウメクリジニウムとして62.5μg) ピランテロールトリフェニル酢酸塩 40μg (ピランテロールとして25μg)</p>	<p>【効】 気管支喘息（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【用】(外) テリルジー 100 エリプタ 1吸入を1日1回吸入。症状に応じてテリルジー 200 エリプタ 1吸入を1日1回吸入</p>

22. 呼吸器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ビレーストリエアロスフィア 120 吸入 Breztri (アストラゼネカ) 120 吸入 / キット 【薬価】 8,771.90 円 / キット 1 回噴霧量： ブデソニド 160μg グリコピロニウム臭化物 9.0μg (グリコピロニウムとして 7.2μg) ホルモテロールフマル酸塩水和物 5.0μg (ホルモテロールフマル酸塩として 4.8μg)</p>	<p>【効】 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β 2 刺激剤の併用が必要な場合） 【用】（外） 1 回 2 吸入（ブデソニドとして 320μg、グリコピロニウムとして 14.4μg、ホルモテロールフマル酸塩として 9.6μg）を 1 日 2 回吸入</p>
<p>⑥ブデホル吸入粉末剤 60 吸入「MYL」 BudeForu (ヴィアトリス) 60 吸入 / 本 【薬価】 1,364.60 円 / キット 【先発品】 シムビコートタービュヘイラー 60 吸入 1 回吸入量： ブデソニド 160μg ホルモテロールフマル酸塩水和物 4.5μg</p>	<p>【効】 ①気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β 2 刺激剤の併用が必要な場合）、②慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β 2 刺激剤の併用が必要な場合） 【用】（外） ①維持療法として 1 回 1 吸入（ブデソニドとして 160μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として 4.5μg）を 1 日 2 回吸入、維持療法としての 1 日の最高量は 1 回 4 吸入 1 日 2 回（合計 8 吸入：ブデソニドとして 1280μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として 36μg）まで 維持療法として 1 回 1 吸入あるいは 2 吸入を 1 日 2 回投与している患者は、発作発現時に頓用吸入を追加で行うことが可。維持療法に加えて頓用吸入する場合は、発作発現時に 1 吸入、数分経過しても発作が持続する場合には、さらに追加で 1 吸入、必要に応じてこれを繰り返すが、1 回の発作発現につき、最大 6 吸入まで。 維持療法と頓用吸入を合計した本剤の 1 日の最高量は、通常 8 吸入までとするが、一時的に 1 日合計 12 吸入（ブデソニドとして 1920μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として 54μg）まで増量可。② 1 回 2 吸入（ブデソニドとして 320μg、ホルモテロールフマル酸塩水和物として 9μg）を 1 日 2 回吸入</p>
<p>フルティフォーム 50 エアゾール 56 吸入用 Flutiform (杏林) 56 吸入 / 瓶 【薬価】 2,126.70 円 / 瓶 1 回噴霧量： フルチカゾンプロピオン酸エステル 50μg ホルモテロールフマル酸塩水和物 5μg</p>	<p>【効】 気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β 2 刺激剤の併用が必要な場合） 【用】（外） 成人：フルティフォーム 50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50μg 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5μg）を 1 回 2 吸入、1 日 2 回投与。症状に応じてフルティフォーム 125 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 125μg 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5μg）を 1 回 2～4 吸入、1 日 2 回。小児：フルティフォーム 50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50μg 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5μg）を 1 回 2 吸入、1 日 2 回</p>
<p>フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用 Flutiform (杏林) 120 吸入 / 瓶 【薬価】 4,607.90 円 / 瓶 1 回噴霧量： フルチカゾンプロピオン酸エステル 125μg ホルモテロールフマル酸塩水和物 5μg</p>	

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>レルベア 100 エリプタ 30 吸入用 Relvar ellipta (グラクソ・スミスクライン) 30 吸入 / キット 【薬価】 4,857.80 円 / キット 1 プリスター中： ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40μg (ビランテロールとして 25μg) フルチカゾンフランカルボン酸エステル 100μg</p>	<p>【効】 ①気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）、②慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【用】（外） ①レルベア 100 エリプタ 1 吸入（ビランテロールとして 25μg 及びフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして 100μg）を 1 日 1 回吸入、症状に応じてレルベア 200 エリプタ 1 吸入（ビランテロールとして 25μg 及びフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして 200μg）を 1 日 1 回吸入、②レルベア 100 エリプタ 1 吸入（ビランテロールとして 25μg 及びフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして 100μg）を 1 日 1 回吸入</p>
<p>レルベア 200 エリプタ 30 吸入用 Relvar ellipta (グラクソ・スミスクライン) 30 吸入 / キット 【薬価】 5,402.70 円 / キット 1 プリスター中： ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40μg (ビランテロールとして 25μg) フルチカゾンフランカルボン酸エステル 200μg</p>	<p>【効】 気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合） 【用】（外） レルベア 100 エリプタ 1 吸入（ビランテロールとして 25μg 及びフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして 100μg）を 1 日 1 回吸入、症状に応じてレルベア 200 エリプタ 1 吸入（ビランテロールとして 25μg 及びフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして 200μg）を 1 日 1 回吸入</p>

23. 消化器官用薬

23. 消化器官用薬

231. 止しゃ剤, 整腸剤

2312. タンニン酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
タンニン酸アルブミン <u>タンニン酸アルブミン「NikP」【経 過措置】</u> Albumin tannate (岩城) 末 【薬価】 7.00 円 /g	【効】 下痢症 【用】 (内) 1日 3～4g を 3～4回に分割

2316. 活性生菌製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビフィズス菌 <u>⑥バイオフェルミン錠剤</u> Biofermin (バイオフェルミン) 12mg/T 【薬価】 5.70 円 /T	【効】 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 【用】 (内) 1日 36mg～72mg (本剤として 3～6錠) を 3回に分割
ビフィズス菌 <u>ラックビー微粒 N</u> Lac B (興和) 10mg/g 【薬価】 6.30 円 /g	【効】 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 【用】 (内) 1日 3～6g を 3回に分割
酪酸菌 <u>ミヤ BM 細粒</u> Miya BM (ミヤリサン) 40mg/g 【薬価】 6.30 円 /g	【効】 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 【用】 (内) 1日 1.5g～3g を 3回に分割
酪酸菌 <u>ミヤ BM 錠</u> Miya BM (ミヤリサン) 20mg/T 【薬価】 5.70 円 /T	【効】 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 【用】 (内) 1日 3～6錠 を 3回に分割

2318. ジメチコン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジメチコン <u>ガスコン錠 40mg</u> Gascon (キッセイ) 40mg/T 【薬価】 5.70 円 /T <u>⑥ジメチコン内用液 2%「ホリイ」</u> Dimethicone (堀井) 20mg/mL 【薬価】 3.00 円 /mL 【先発品】 ガスコンドロップ内用 液 2%	【効】 ①胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善. ②胃内視鏡検査時における胃 内有泡性粘液の除去. ③腹部 X 線検査時における腸内ガスの駆除 【用】 (内) ① 1日 120～240mg を食後又は食間の 3回に分割. ②検査 15～40分前 に 40～80mg を約 10mL の水とともに. ③検査 3～4日前より 1日 120～240mg を食 後又は食間の 3回に分割

2319. その他の止しゃ剤, 整腸剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
薬用炭 <u>薬用炭「日医工」</u> Medicinal carbon (日医工) 末 【薬価】 8.50 円 /g	【効】 下痢症, 消化管内の異常発酵による生成ガスの吸着, 自家中毒・薬物中毒に における吸着及び解毒 【用】 (内) 1日 2～20g を数回に分割

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ロペラミド塩酸塩 <u>ロペミン細粒 0.1%</u> Lopemin (ヤンセン) 1mg/g 【薬価】 15.60 円 /g <u>ロペミンカプセル 1mg</u> Lopemin (ヤンセン) 1mg/cap 【薬価】 11.20 円 /cap <u>ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg</u> <u>「サワイ」</u> Loperamide hydrochloride (沢井) 1mg/cap 【薬価】 5.90 円 /cap 【先発品】 ロペミンカプセル 1mg	【効】 下痢症 【用】 (内) 1日1～2mgを1～2回に分割
<u>フェロベリン配合錠</u> Phelloberin (日本ジェネリック) 1錠 【薬価】 8.90 円 /T 1錠中： ベルベリン塩化物水和物 37.5mg ゲンノショウコエキス 100.0mg	【効】 下痢症 【用】 (内) 1回2錠を1日3回

232. 消化性潰瘍用剤

2325. H₂ 遮断剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
シメチジン <u>シメチジン錠 200mg 「サワイ」</u> Cimetidine (沢井) 200mg/T 【薬価】 5.70 円 /T 【先発品】 タガメット錠 200mg	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍。②吻合部潰瘍，Zollinger-Ellison 症候群，逆流性食道炎，上部消化管出血（消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍，出血性胃炎による）。③次の疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期 【用】 (内) ①1日800mgを2回（朝食後・就寝前）に分割，4回（毎食後・就寝前）に分割もしくは1回（就寝前）も可。②1日800mgを2回（朝食後・就寝前）に分割，4回（毎食後・就寝前）に分割も可。上部消化管出血には注射剤で治療を開始，内服可能となった後，経口投与に切りかえる。③1日400mgを2回（朝食後・就寝前）に分割，1回（就寝前）も可
ニザチジン <u>アシノン錠 150mg</u> Acinon (ゼリア) 150mg/T 【薬価】 17.00 円 /T	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍。②逆流性食道炎 【用】 (内) ①1回150mgを1日2回（朝食後，就寝前），1回300mgを1日1回（就寝前）も可。②1回150mgを1日2回（朝食後，就寝前）

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ファモチジン <u>ガスター-D錠 10mg (院外)</u> Gaster D (アステラス) 10mg/T 【薬価】 13.70 円/T <u>ガスター-D錠 20mg (院外)</u> Gaster D (アステラス) 20mg/T 【薬価】 15.20 円/T <u>後ファモチジンD錠 10mg「サワイ」</u> Famotidine D (沢井) 10mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 ガスター-D錠 10mg <u>後ファモチジンD錠 20mg「サワイ」</u> Famotidine D (沢井) 20mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 ガスター-D錠 20mg	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，上部消化管出血（消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍，出血性胃炎による），逆流性食道炎，Zollinger-Ellison 症候群。②次記疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期 【用】 (内) ① 1回 20mg 1日 2回（朝食後・夕食後又は就寝前）。1回 40mg 1日 1回（就寝前）も可。上部消化管出血には注射剤で治療を開始し，内服可能になった後は経口投与に切りかえる。② 1回 10mg 1日 2回（朝食後・夕食後又は就寝前）。1回 20mg 1日 1回（就寝前）も可
ファモチジン <u>後ファモチジン静注液 20mg「日医工」</u> Famotidine (日医工) 20mg/A 【薬価】 97.00 円/A	【効】 ①上部消化管出血（消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍，出血性胃炎による），Zollinger-Ellison 症候群。②侵襲ストレス（手術後に集中管理を必要とする大手術，集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷）による上部消化管出血の抑制。③麻酔前投薬 【用】 (注) ①② 1回 20mg 1日 2回（12時間毎）緩徐に静注。又は輸液に混合して点滴静注。①では1週間以内に効果の発現をみるが，内服可能となった後は経口投与に切り換える。②は術後集中管理又は集中治療を必要とする期間（手術侵襲ストレスは3日間程度，その他の侵襲ストレスは7日間程度）の投与。③ 1回 20mgを麻酔導入1時間前に緩徐に静注
ラフチジン <u>プロテカジン錠 10 (院外)</u> Protacadin (大鵬) 10mg/T 【薬価】 16.40 円/T <u>後ラフチジン錠 10mg「日医工」</u> Lafutidine (日医工) 10mg/T 【薬価】 10.20 円/T 【先発品】 プロテカジン錠 10	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，逆流性食道炎。②次記疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期。③麻酔前投薬 【用】 (内) ① 1回 10mgを1日 2回（朝食後，夕食後又は就寝前）。② 1回 10mgを1日 1回（夕食後又は就寝前）。③ 1回 10mgを手術前日就寝前及び手術当日麻酔導入2時間前の2回
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 <u>アルタットカプセル 75mg</u> Altat (あすか) 75mg/cap 【薬価】 23.60 円/cap	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，逆流性食道炎。② Zollinger-Ellison 症候群。③麻酔前投薬。④次記疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期 【用】 (内) ① 1回 75mgを1日 2回（朝食後，就寝前又は夕食後）。1回 150mgを1日 1回（就寝前）投与も可。小児：体重 30kg未満では1回 37.5mgを，体重 30kg以上では1回 75mgを1日 2回（朝食後，就寝前又は夕食後）。② 1回 75mgを1日 2回（朝食後，就寝前又は夕食後）。小児：体重 30kg未満では1回 37.5mgを，体重 30kg以上では1回 75mgを1日 2回（朝食後，就寝前又は夕食後）。③ 1回 75mgを手術前日就寝前及び手術当日麻酔導入2時間前の2回。1回 150mgを手術前日就寝前に1回投与も可。小児：体重 30kg未満では1回 37.5mgを，体重 30kg以上では1回 75mgを手術前日就寝前及び手術当日麻酔導入2時間前の2回。④ 1回 75mgを1日 1回（就寝前又は夕食後）。小児：体重 30kg未満では1回 37.5mgを，体重 30kg以上では1回 75mgを1日 1回（就寝前又は夕食後）

2329. その他の消化性潰瘍用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アルギン酸ナトリウム アルロイド G 内液用 5% Alloid G (カイゲン) 5g/100mL 【薬価】 1.17 円/mL	【効】 ①次記疾患における止血及び自覚症状の改善：胃・十二指腸潰瘍，びらん性胃炎，逆流性食道炎における自覚症状の改善，②胃生検の出血時の止血 【用】(内) ① 1回1～3g（本剤として20～60mL）を1日3～4回，空腹時，経口投与が不可能な場合には，ゾンデで経鼻的に投与．② 1回0.5～1.5g（本剤として10～30mL）を経内視鏡的に投与するか，1回1.5g（本剤として30mL）を経口
アルジオキサ ②後アルジオキサ錠 100mg「あすか」 Aldioxa (あすか) 100mg/T 【薬価】 5.70 円/T	【効】 次記疾患における自覚症状及び他覚所見の改善：胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃炎 【用】(内) 1日300～400mgを3～4回に分割
エカベトナトリウム水和物 ガストローム顆粒 66.7% (院外) Gastrom (田辺三菱) 66.7%1.5g/包 【薬価】 12.20 円/g	【効】 ①胃潰瘍，②次記疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期 【用】(内) 1回1g（本剤として1.5g），1日2回（朝食後，就寝前）
エソメプラゾールマグネシウム水和物 ②後エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」 Esomeprazole (ニプロ) 20mg/cap 【薬価】 41.80 円/cap 【先発品】 ネキシウムカプセル 20mg	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，Zollinger-Ellison 症候群，②逆流性食道炎，③非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制，④低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制，⑤次記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助：胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃 MALT リンパ腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 【用】(内) ①成人：1回20mgを1日1回，胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週間まで，小児：体重20kg以上の幼児及び小児には1回10～20mgを1日1回，胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週間まで，②成人：1回20mgを1日1回，8週間まで，再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては，1回10～20mgを1日1回，小児：体重20kg以上の幼児及び小児には1回10～20mgを1日1回，8週間まで，③④1回20mgを1日1回，⑤エソメプラゾールとして1回20mg，アモキシシリン水和物として1回750mg及びクラリスロマイシンとして1回200mgの3剤を同時に1日2回，7日間，クラリスロマイシンは，増量可，ただし1回400mg1日2回まで，プロトンポンプインヒビター，アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は，これに代わる治療として，エソメプラゾールとして1回20mg，アモキシシリン水和物として1回750mg及びメトロニダゾールとして1回250mgの3剤を同時に1日2回，7日間
エソメプラゾールマグネシウム水和物 ネキシウム懸濁用顆粒分包装 20mg Nexium (アストラゼネカ) 20mg/包 【薬価】 93.90 円/包	【効】 ①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，Zollinger-Ellison 症候群，②逆流性食道炎，③非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制，④低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制，⑤次記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助：胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃 MALT リンパ腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 【用】(内) ①成人：1回20mgを用時水で懸濁して1日1回，胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週間まで，小児：1歳以上の幼児及び小児に体重20kg未満では1回10mg，体重20kg以上では1回10～20mgを用時水で懸濁して1日1回，胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週間まで，②成人：1回20mgを用時水で懸濁して1日1回，8週間まで，再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては，1回10～20mgを用時水で懸濁して1日1回，小児：1歳以上の幼児及び小児に体重20kg未満では1回10mg，体重20kg以上では1回10～20mgを用時水で懸濁して1日1回，8週間まで，③④1回20mgを用時水で懸濁して1日1回，⑤エソメプラゾールとして1回20mgを用時水で懸濁して，アモキシシリン水和物として1回750mg及びクラリスロマイシンとして1回200mgの3剤を同時に1日2回，7日間，クラリスロマイシンは，増量可，ただし1回400mg1日2回まで，プロトンポンプインヒビター，アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は，これに代わる治療として，エソメプラゾールとして1回20mgを用時水で懸濁して，アモキシシリン水和物として1回750mg及びメトロニダゾールとして1回250mgの3剤を同時に1日2回，7日間

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オメプラゾール <u>オメプラゾール注射用 20mg 「日 医工」</u> Omeprazole (日医工) 20mg/V 【薬価】 339.00 円 / 瓶	【効】 ①経口投与不可能な次記の疾患：出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変、②経口投与不可能な Zollinger-Ellison 症候群 【用】 (注) 1 回 20mg を、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液に混合して 1 日 2 回点滴静注、あるいは生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 20mL に溶解して 1 日 2 回緩徐に静注
スクラルファート水和物 <u>アルサルミン内用液 10% (院外)</u> Ulcerlmin (中外) 1g10mL/包 【薬価】 2.00 円 / mL <u>②スクラルファート内用液 10% 「NIG」</u> Sucralfate (武田) 1g10mL/包 【薬価】 1.80 円 / mL 【先発品】 アルサルミン内用液 10%	【効】 ①胃潰瘍、十二指腸潰瘍、②次記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善：急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期 【用】 (内) 1 回 10mL を 1 日 3 回
スルピリド <u>ドグマチール錠 50mg (院外)</u> Dogmatyl (アステラス) 50mg/T 【薬価】 10.10 円 / T <u>②スルピリド錠 50mg 「アメル」</u> Sulpiride (共和) 50mg/T 【薬価】 6.40 円 / T 【先発品】 ドグマチール錠 50mg	【効】 ①胃・十二指腸潰瘍、②統合失調症、③うつ病・うつ状態 【用】 (内) ① 1 日 150mg を 3 回に分割、② 1 日 300～600mg を分割、1 日 1200mg まで、③ 1 日 150～300mg を分割、1 日 600mg まで
テブレノン <u>②テブレノンカプセル 50mg 「サ ワイ」</u> Teprenone (沢井) 50mg/C 【薬価】 6.30 円 / cap 【先発品】 セルベックスカプセル 50mg	【効】 ①次記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善：急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期、②胃潰瘍 【用】 (内) 150mg を 1 日 3 回に分割食後
ボノプラザンフマル酸塩 <u>タケキャブ錠 10mg</u> Takecab (武田) 10mg/T 【薬価】 96.80 円 / T <u>タケキャブ錠 20mg</u> Takecab (武田) 20mg/T 【薬価】 144.80 円 / T	【効】 ①胃潰瘍、十二指腸潰瘍、②逆流性食道炎、③低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、④非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、⑤次記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 【用】 (内) ① 1 回 20mg を 1 日 1 回、胃潰瘍では 8 週間まで、十二指腸潰瘍では 6 週間まで、② 1 回 20mg を 1 日 1 回、通常 4 週間まで、効果不十分の場合は 8 週間まで、さらに再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1 回 10mg を 1 日 1 回、効果不十分の場合は、1 回 20mg を 1 日 1 回投与可、③④ 1 回 10mg を 1 日 1 回、⑤ボノプラザンとして 1 回 20mg、アモキシシリン水和物として 1 回 750mg 及びクラリスロマイシンとして 1 回 200mg の 3 剤を同時に 1 日 2 回、7 日間投与、なお、クラリスロマイシンは必要に応じて適宜増量可、1 回 400mg 1 日 2 回まで、プロトンポンプインヒビター、アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの 3 剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は、これに代わる治療として、ボノプラザンとして 1 回 20mg、アモキシシリン水和物として 1 回 750mg 及びメトロニダゾールとして 1 回 250mg の 3 剤を同時に 1 日 2 回、7 日間投与

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ポラプレジンク プロマック D錠 75 (院外) Promac D (ゼリア) 75mg/T 【薬価】 17.50 円 /T ※後 ポラプレジンク OD錠 75mg「サワイ」 Polaprezinc OD (沢井) 75mg/T 【薬価】 14.30 円 /T 【先発品】 プロマック D錠 75	【効】 胃潰瘍 【用】 (内) 1回 75mgを1日2回朝食後及び就寝前
ミソprostool サイトテック錠 200 (院外) ㉮ Cytotec (科研) 200 μ g/T 【薬価】 20.80 円 /T	【効】 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与時にみられる胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 【用】 (内) 1回 200 μ gを1日4回(毎食後及び就寝前)。妊娠する可能性のある婦人に投与する際には別途配布の安全対策リーフレットを参照
ラベプラゾールナトリウム バリエット錠 10mg (院外) Pariet (エーザイ) 10mg/T 【薬価】 43.60 円 /T	【効】 ①胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 吻合部潰瘍, Zollinger-Ellison 症候群. ②逆流性食道炎. ③非びらん性胃食道逆流症. ④低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制. ⑤次記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助: 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 胃 MALT リンパ腫, 特発性血小板減少性紫斑病, 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃, ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 【用】 (内) ① 1日1回 10mg, 病状により1日1回 20mg. 胃潰瘍, 吻合部潰瘍では8週間まで, 十二指腸潰瘍では6週間まで. ② 〈治療〉 1日1回 10mg, 病状により1日1回 20mg. 8週間まで. プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合, 1回 10mg又は1回 20mgを1日2回, さらに8週間投与可. 1回 20mg1日2回投与は重度の粘膜傷害を有する場合に限る. 〈維持療法〉 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては1日1回 10mg. プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な逆流性食道炎の維持療法においては, 1回 10mgを1日2回投与できる. ③ 1日1回 10mg. 4週間まで. ④ 1回 5mgを1日1回, 効果不十分な場合は1回 10mgを1日1回. ⑤ラベプラゾールナトリウムとして1回 10mg, アモキシシリン水和物として1回 750mg及びクラリスロマイシンとして1回 200mgの3剤を同時に1日2回, 7日間. クラリスロマイシンは, 1回 400mg1日2回を上限とする. プロトンポンプインヒビター, アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は, ラベプラゾールナトリウムとして1回 10mg, アモキシシリン水和物として1回 750mg及びメトロニダゾールとして1回 250mgの3剤を同時に1日2回, 7日間
ランソプラゾール タケプロン静注用 30mg Takepron (武田) 30mg/V 【薬価】 472.00 円 / 瓶	【効】 経口投与不可能な次記の疾患: 出血を伴う胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変 【用】 (注) 1回 30mgを, 生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液に混合して1日2回点滴静注, あるいは生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液 20mLに溶解して1日2回緩徐に静注

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ランソプラゾール <u>タケプロン OD 錠 15 (院外)</u> Takepron OD (武田) 15mg/T 【薬価】 23.30 円 /T</p>	<p>【効】 ①胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 吻合部潰瘍, Zollinger-Ellison 症候群. ②逆流性食道炎. ③次記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助: 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍, 胃 MALT リンパ腫, 特発性血小板減少性紫斑病, 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃, ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎. ④非びらん性胃食道逆流症 (OD 錠 15 のみ). ⑤低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 (OD 錠 15 のみ). ⑥非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合 (OD 錠 15 のみ)</p> <p>【用】 (内) ① 1 日 1 回 30mg. 胃潰瘍, 吻合部潰瘍では 8 週間まで, 十二指腸潰瘍では 6 週間まで. ② 1 日 1 回 30mg を 8 週間まで. 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては 1 日 1 回 15mg, 効果不十分な場合 1 日 1 回 30mg 投与できる. ③ ランソプラゾール 1 回 30mg, アモキシシリン水和物 1 回 750mg 及びクラリスロマイシン 1 回 200mg の 3 剤を同時に 1 日 2 回, 7 日間投与. クラリスロマイシンは必要に応じて 1 回 400mg 1 日 2 回まで. プロトンポンプインヒビター, アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの 3 剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は, これに代わる治療として, ランソプラゾール 1 回 30mg, アモキシシリン水和物 1 回 750mg 及びメトロニダゾール 1 回 250mg の 3 剤を同時に 1 日 2 回, 7 日間投与. ④ 1 日 1 回 15mg を 4 週間まで. ⑤⑥ 1 日 1 回 15mg</p>
<p>ランソプラゾール <u>後ランソプラゾール OD 錠 15mg 「武田テバ」</u> Lansoprazole OD (武田テバ) 15mg/T 【薬価】 12.40 円 /T 【先発品】 タケプロン OD 錠 15</p>	<p>【効】 ①胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 吻合部潰瘍, Zollinger-Ellison 症候群. ②逆流性食道炎. ③非びらん性胃食道逆流症. ④低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制. ⑤非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制. ⑥次記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助: 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 胃 MALT リンパ腫, 特発性血小板減少性紫斑病, 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃, ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎</p> <p>【用】 (内) ① 1 日 1 回 30mg. 胃潰瘍, 吻合部潰瘍では 8 週間まで, 十二指腸潰瘍では 6 週間まで. ② 1 日 1 回 30mg を 8 週間まで. 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては 1 日 1 回 15mg, 効果不十分な場合 1 日 1 回 30mg 投与できる. ③ 1 日 1 回 15mg. 4 週間まで. ④⑤ 1 日 1 回 15mg. ⑥ ランソプラゾール 1 回 30mg, アモキシシリン水和物 1 回 750mg 及びクラリスロマイシン 1 回 200mg の 3 剤を同時に 1 日 2 回, 7 日間投与. クラリスロマイシンは必要に応じて増量可. 1 回 400mg 1 日 2 回まで. プロトンポンプインヒビター, アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの 3 剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は, これに代わる治療として, ランソプラゾール 1 回 30mg, アモキシシリン水和物 1 回 750mg 及びメトロニダゾール 1 回 250mg の 3 剤を同時に 1 日 2 回, 7 日間投与</p>
<p>レバミピド <u>レバミピド錠 100mg 「オーツカ」</u> Rebamipide (大塚) 100mg/T 【薬価】 10.10 円 /T</p>	<p>【効】 ①胃潰瘍. ②次記疾患の胃粘膜病変 (びらん, 出血, 発赤, 浮腫) の改善: 急性胃炎, 慢性胃炎の急性増悪期</p> <p>【用】 (内) ① 1 回 100mg を 1 日 3 回, 朝, 夕及び就寝前. ② 1 回 100mg を 1 日 3 回</p>
<p><u>マーズレン S 配合顆粒</u> Marzulene S (EA) 顆粒 【薬価】 10.50 円 /g 1g 中: アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 3mg L-グルタミン 990mg</p>	<p>【効】 次記疾患における自覚症状及び他覚所見の改善: 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 胃炎</p> <p>【用】 (内) 1 日 1.5 ~ 2.0g を 3 ~ 4 回に分割</p>

233. 健胃消化剤

2331. 消化酵素製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>パンクレアチン <u>パンクレアチン「ヨシダ」</u> Pancreatin (吉田) 末 【薬価】 9.10 円 /g</p>	<p>【効】 消化異常症状の改善</p> <p>【用】 (内) 1 回 1g 1 日 3 回食後</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
パンクレリパーゼ <u>リパクレオン顆粒 300mg分包</u> Lipacreon (EA) 顆粒 300mg/包 【薬価】 56.40 円 / 包	【効】 膵外分泌機能不全における膵消化酵素の補充 【用】 (内) 1回 600mgを1日3回, 食直後

2335. 酸類製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
希塩酸 <u>希塩酸「コザカイ・M」</u> Dilute hydrochloric acid (吉田) 9.5～10.5w/v% 【薬価】 0.90 円 / mL	【効】 低・無酸症における消化異常症状の改善 【用】 (内) 1日量 0.5～1.0mLを約200mLの水にうすめるか, 又はリモナーデ剤として1～数回に分割

2339. その他の健胃消化剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
β-ガラクトシダーゼ (ペニシリウム) <u>ミルラクト細粒 50% (院外)</u> Millact (高田) 0.5g/包 【薬価】 56.60 円 / g	【効】 ①乳児の乳糖不耐により生じる消化不良の改善：一次性乳糖不耐症, 二次性乳糖不耐症 (単一症候性下痢症, 急性消化不良症, 感冒性下痢症, 白色便性下痢症, 慢性下痢症, 未熟児・新生児の下痢). ②経管栄養食, 経口流動食等摂取時の乳糖不耐により生じる下痢等の改善 【用】 (内) ① 1回 0.125～0.25g (本剤として 0.25～0.5g) を少量の水又はお湯 (50℃以上にならないこと) で溶解し, 哺乳時に. ② 摂取乳糖量 10g に対して 0.5g (本剤として 1g) を食餌と共に
<u>S・M 配合散</u> SM (アルフレッサ) 末 【薬価】 6.30 円 / g 1.3g 中： タカジアスターゼ 100mg メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 400mg 炭酸水素ナトリウム 300mg 沈降炭酸カルシウム 200mg チョウジ末 10mg ウイキョウ末 20mg ケイヒ末 74.5mg ショウキョウ末 24.5mg サンショウ末 1mg オウレン末 50mg カンゾウ末 118mg	【効】 次の消化器症状の改善：食欲不振, 胃部不快感, 胃もたれ, 嘔気・嘔吐 【用】 (内) 1回量として, 次の用量を1日3回, 毎食後に水又は温湯で. 成人：約1.3g, 7～14歳：成人の1/2量, 4～6歳：成人の1/3量, 2～3歳：成人の1/6量
<u>ベリチーム配合顆粒</u> Berizym (共和) 顆粒 【薬価】 21.00 円 / g 1g 中： 腸溶性部分： 濃厚膵臓性消化酵素 312.5mg 胃溶性部分： アスペルギルス産生消化酵素 75mg 細菌性脂肪分解酵素 62.5mg 繊維素分解酵素 37.5mg	【効】 消化異常症状の改善 【用】 (内) 1回 0.4～1gを1日3回食後

23. 消化器官用薬

234. 制酸剤

2343. アルミニウム化合物製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
天然ケイ酸アルミニウム アドソルビン原末 Adsorbin (アルフレッサ) 末 【薬価】0.75円/g	【効】下痢症 【用】(内) 1日3～10gを3～4回に分割

2344. 無機塩製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
酸化マグネシウム ④マグミット細粒 83% Magmitt (協和化学) 500g (0.2g, 1.2g) 【薬価】8.90円/g ④マグミット錠 250mg Magmitt (日本新薬) 250mg/T 【薬価】5.70円/T ④マグミット錠 330mg Magmitt (日本新薬) 330mg/T 【薬価】5.70円/T ④マグミット錠 500mg Magmitt (日本新薬) 500mg/T 【薬価】5.70円/T	【効】①次記疾患における制酸作用と症状の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎を含む），上部消化管機能異常（神経性食思不振，いわゆる胃下垂症，胃酸過多症を含む）．②便秘症．③尿路シュウ酸カルシウム結石の発症予防 【用】(内)①1日0.5～1.0gを数回に分割．②1日2gを食前又は食後の3回に分割，又は就寝前に1回．③1日0.2～0.6gを多量の水とともに
炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 Sodium bicarbonate (健栄) 結晶 【薬価】0.73円/g ④炭酸水素ナトリウム錠 500mg 「VTRS」 Sodium bicarbonate (ヴィアトリス) 500mg/T 【薬価】5.70円/T	【効】①次の疾患における制酸作用と症状の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎を含む），上部消化管機能異常（神経性食思不振，いわゆる胃下垂症，胃酸過多症を含む）．アシドーシスの改善，尿酸排泄の促進と痛風発作の予防．②含嗽・吸入：上気道炎の補助療法（粘液溶解） 【用】①(内) 1日3～5gを数回に分割．②（含嗽・吸入）1回1～2%液100mLを1日数回

235. 下剤，浣腸剤

2354. 植物性製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
センナエキス アジャストAコーワ錠 40mg Adjust A (興和) 40mg/T 【薬価】5.90円/T	【効】便秘症 【用】(内) 1回80mg就寝前．高度の便秘には1回160～240mgを頓用，連用の場合には1回40～80mg毎食後．小児（6～12歳）：1回40mg就寝前

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
センノシド <u>プルゼニド錠 12mg (院外)</u> Pursennid (田辺三菱) 12mg/T 【薬価】 5.70 円 /T <u>②センノシド錠 12mg 「サワイ」</u> Sennoside (沢井) 12mg/T 【薬価】 5.10 円 /T 【先発品】 プルゼニド錠 12mg	【効】 便秘症 【用】 (内) 1日1回12～24mg就寝前, 高度の便秘には1回48mgまで

2357. グリセリン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グリセリン <u>グリセリン浣腸「オヲタ」60</u> Glycerin enema (日医工) 50% 60mL/ 個 【薬価】 113.10 円 / 個 <u>グリセリン浣腸「オヲタ」120</u> Glycerin enema (日医工) 50% 120mL/ 個 【薬価】 151.30 円 / 個	【効】 便秘, 腸疾患時の排便 【用】 (外) 1回1個を直腸内に注入
グリセリン <u>グリセリン「マルイシ」</u> Glycerin (丸石) 500mL/ 瓶 【薬価】 1.31 円 /mL <u>グリセリン「ヨシダ」</u> Glycerin (吉田) 5mLx2 【薬価】 1.31 円 /mL	【効】 浣腸液の調剤に, また, 溶剤, 軟膏基剤, 湿潤・粘滑剤として調剤に用いる

2359. その他の下剤, 浣腸剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エロピキシバット水和物 <u>グーフイス錠 5mg</u> Goofice (持田) 5mg/T 【薬価】 84.20 円 /T	【効】 慢性便秘症 (器質疾患による便秘を除く) 【用】 (内) 10mgを1日1回食前, 最高用量1日15mgまで
ナルデメジントシル酸塩 <u>スインプロイク錠 0.2mg</u> Symproic (塩野義) 0.2mg/T 【薬価】 277.10 円 /T	【効】 オピオイド誘発性便秘症 【用】 (内) 0.2mgを1日1回
ピコスルファートナトリウム水和物 <u>②ピコスルファートナトリウム内 用液 0.75% 「イワキ」</u> Sodium picosulfate (岩城) 0.75%10mL/ 本 【薬価】 7.60 円 /mL 【先発品】 ラキソベロン内用液 0.75%	【効】 ①各種便秘症. ②術後排便補助. ③造影剤 (硫酸バリウム) 投与後の排便促進. ④手術前における腸管内容物の排除. ⑤大腸検査 (X線・内視鏡) 前処置における腸管内容物の排除 【用】 (内) ①1日1回0.67～1.0mL (10～15滴). 小児:1日1回, 次の基準で投与: 年齢7か月未満0.13mL (2滴), 7か月～1歳未満0.20mL (3滴), 1～3歳0.40mL (6滴), 4～6歳0.46mL (7滴), 7～14歳0.67mL (10滴). ②1日1回0.67～1.0mL (10～15滴). ③0.40～1.0mL (6～15滴). ④0.93mL (14滴). ⑤検査予定時間10～15時間前に20mL

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ピコスルファートナトリウム水和物 <u>ピコスルファート Na 錠 2.5mg「サワイ」</u> Sodium picosulfate (沢井) 2.5mg/T 【薬価】 5.90 円 / T	【効】 ①各種便秘症. ②術後排便補助. ③造影剤 (硫酸バリウム) 投与後の排便促進 【用】 (内) ① 1日1回 5～7.5mg. 7～15歳の小児: 1日1回 5mg. ②③ 1日1回 5～7.5mg
ビサコジル <u>テレミンソフト坐薬 2mg</u> Teleminsoft (EA) 2mg/個 【薬価】 19.70 円 / 個	【効】 ①便秘症. ②消化管検査時又は手術前後における腸管内容物の排除 【用】 (外) 通常1回, 乳幼児は2mgを, 1日1～2回肛門内に挿入
ビサコジル <u>テレミンソフト坐薬 10mg (院外)</u> Teleminsoft (EA) 10mg/個 【薬価】 20.30 円 / 個	【効】 ①便秘症. ②消化管検査時又は手術前後における腸管内容物の排除 【用】 (外) 1回10mgを1日1～2回肛門内に挿入
ルビプロストン <u>アミティーザカプセル 24μg</u> Amitiza (マイラン EPD) 24μg/cap 【薬価】 100.00 円 / cap	【効】 慢性便秘症 (器質的疾患による便秘を除く) 【用】 (内) 1回24μgを1日2回, 朝食後及び夕食後
<u>アローゼン顆粒</u> Alosenn (ポーラ) 0.5g/包 【薬価】 6.50 円 / g 1g 中: センナ 577.9mg センナジツ 385.3mg	【効】 ①便秘 (痙攣性便秘は除く). ②駆虫剤投与後の下剤 【用】 (内) 1回0.5～1.0gを1日1～2回
<u>新レシカルボン坐剤</u> New lecicarbon (ゼリア) 1個 【薬価】 70.90 円 / 個 1個 (2.6g) 中: 炭酸水素ナトリウム 0.500g 無水リン酸二水素ナトリウム 0.680g	【効】 便秘症 【用】 (外) 1～2個を出来るだけ肛門内深く挿入. 重症の場合には1日2～3個を数日間続けて挿入
<u>モビコール配合内用剤 LD</u> Movicol (持田) 6.8523g/包 【薬価】 65.70 円 / 包 1包 (6.8523g) 中: マクロゴール 4000 6.5625g 塩化ナトリウム 0.1754g 炭酸水素ナトリウム 0.0893g 塩化カルウム 0.0251g	【効】 慢性便秘症 (器質的疾患による便秘を除く) 【用】 (内) 水で溶解して経口投与. 2歳以上7歳未満の幼児: 初回用量としてLD1包を1日1回. 以降, 症状に応じて1日1～3回, 最大投与量は1日量としてLD4包まで又はHD2包まで (1回量としてLD2包又はHD1包まで). 増量は2日以上の間隔をあけて行い, 増量幅は1日量としてLD1包まで. 7歳以上12歳未満の小児: 初回用量としてLD2包又はHD1包を1日1回. 以降, 症状に応じて1日1～3回, 最大投与量は1日量としてLD4包又はHD2包まで (1回量としてLD2包又はHD1包まで). 増量は2日以上の間隔をあけて行い, 増量幅は1日量としてLD1包まで. 成人及び12歳以上の小児: 初回用量としてLD2包又はHD1包を1日1回. 以降, 症状に応じて1日1～3回, 最大投与量は1日量としてLD6包又はHD3包まで (1回量としてLD4包又はHD2包まで). 増量は2日以上の間隔をあけて行い, 増量幅は1日量としてLD2包又はHD1包まで

236. 利胆剤

2362. 胆汁酸製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ウルソデオキシコール酸 ウルソ錠 50mg Urso (田辺三菱) 50mg/T 【薬価】 9.00 円 /T ウルソ錠 100mg (院外) Urso (田辺三菱) 100mg/T 【薬価】 10.10 円 /T ②ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 Ursodeoxycholic acid (沢井) 100mg/T 【薬価】 8.70 円 /T 【先発品】 ウルソ錠 100mg	【効】 ①次記疾患における利胆：胆道（胆管・胆嚢）系疾患及び胆汁うっ滞を伴う肝疾患. ②慢性肝疾患における肝機能の改善. ③次記疾患における消化不良：小腸切除後遺症, 炎症性小腸疾患. ④外殻石灰化を認めないコレステロール系胆石の溶解. ⑤原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善. ⑥C型慢性肝疾患における肝機能の改善 【用】 (内) ①②③ 1回 50mgを1日3回. ④ 1日 600mgを3回に分割. ⑤⑥ 1日 600mgを3回に分割. 1日 900mgまで

239. その他の消化器官用薬

2391. 鎮吐剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アプレピタント ②アプレピタントカプセルセット 「サワイ」 Aprepitant (沢井) セット 【薬価】 2,607.30 円 / セット 【先発品】 イメンドカプセルセット ②アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 Aprepitant (沢井) 80mg/C 【薬価】 730.80 円 /cap 【先発品】 イメンドカプセル 80mg ②アプレピタントカプセル 125mg 「サワイ」 Aprepitant (沢井) 125mg/C 【薬価】 1,145.70 円 /cap 【先発品】 イメンドカプセル 125mg	【効】 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（遅発期を含む） 【用】 (内) 他の制吐剤との併用において、成人及び12歳以上の小児には抗悪性腫瘍剤投与1日目は125mg、2日目以降は80mgを1日1回
オンダンセトロン塩酸塩水和物 ②オンダンセトロン注 4mgシリンジ 「マルイシ」 Ondansetron (丸石) 4mg/筒 【薬価】 3,289.00 円 / 筒	【効】 ①抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）. ②術後の消化器症状（悪心、嘔吐） 【用】 (注) ① 1回 4mg, 1日 1回緩徐に静注. 同用量を追加できる. 小児: 1回 2.5mg/m ² , 1日 1回緩徐に静注. 同用量を追加できる. ② 1回 4mgを緩徐に静注. 小児: 1回 0.05 ~ 0.1mg/kg (最大 4mg) を緩徐に静注

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グラニセトロン塩酸塩 <u>②</u> ② グラニセトロン静注液 3mg 「サワイ」 ㊞ Granisetron (沢井) 3mg3mL/A 【薬価】 672.00 円/A 【先発品】 カイトリル注 3mg, グラニセトロン静注液 3mg 「F」, グラニセトロン静注液 3mg 「トローワ」, グラニセトロン静注液 3mg 「日医工」, グラニセトロン静注液 3mg 「明治」	【効】 ①抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）。②放射線照射に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）。③術後の消化器症状（悪心，嘔吐） 【用】 (注) ① 40μg/kgを1日1回静注又は点滴静注。40μg/kgを1回追加できる。小児：40μg/kgを1日1回点滴静注。40μg/kgを1回追加できる。② 1回 40μg/kgを点滴静注。1日2回まで。③ 1回 1mgを静注又は点滴静注。1日3mgまで
グラニセトロン塩酸塩 <u>②</u> ② グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」 ㊞ Granisetron (日本ケミファ) 2mg/包 【薬価】 588.20 円/包	【効】 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与及び放射線照射に伴う消化器症状（悪心，嘔吐） 【用】 (内) 1回 2mgを1日1回
パロノセトロン塩酸塩 <u>②</u> ② パロノセトロン静注 0.75mg /5mL 「タイホウ」 ㊞ Palonosetron (大鵬) 0.75mg/瓶 【薬価】 4,567.00 円/瓶 【先発品】 アロキシ静注 0.75mg	【効】 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）（遅発期を含む） 【用】 (注) 0.75mgを1日1回静注又は点滴静注
ホスネツピタント塩化物塩酸塩 <u>②</u> ② アロカリス点滴静注 235mg ㊞ Arokaris (大鵬) 235mg10mL/瓶 【薬価】 11,276.00 円/瓶	【効】 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）（遅発期を含む） 【用】 (注) 他の制吐剤との併用において，235mgを抗悪性腫瘍剤投与1日目に1回，点滴静注

2399. 他に分類されない消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アコチアミド塩酸塩水和物 <u>②</u> ② アコファイド錠 100mg Acofide (アステラス) 100mg/T 【薬価】 32.20 円/T	【効】 機能的ディスペプシアにおける食後膨満感，上腹部膨満感，早期満腹感 【用】 (内) 1回 100mgを1日3回，食前
イトプリド塩酸塩 <u>②</u> ② ガナトン錠 50mg (院外) Ganaton (アステラス) 50mg/T 【薬価】 10.20 円/T	【効】 慢性胃炎における消化器症状（腹部膨満感，上腹部痛，食欲不振，胸やけ，悪心，嘔吐） 【用】 (内) 1日 150mgを3回に分割，食前。年齢，症状により適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>インフリキシマブ(遺伝子組換え) レミケード点滴静注用 100   Remicade (田辺三菱) 100mg/V 【薬価】 54,950.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 既存治療で効果不十分な次記①～④の疾患：①関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、②ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎、③尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、④強直性脊椎炎、⑤腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病、⑥川崎病の急性期、⑦次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）：中等度から重度の活動期にある患者、外瘻を有する患者、⑧中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）</p> <p>【用】（注） ① 3mg/kgを1回量とし点滴静注。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で、6週の投与以後、効果不十分又は効果が減弱した場合には、投与量の増量や投与間隔の短縮が可能である。これらの投与量の増量や投与間隔の短縮は段階的に行う。1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mg。最短の投与間隔は4週間。メトレキサート製剤による治療に併用して用いる。1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。②⑧ 5mg/kgを1回量とし点滴静注。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で、1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。③ 5mg/kgを1回量とし点滴静注。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で、6週の投与以後、効果不十分又は減弱した場合は、増量や間隔の短縮が可能である。増量や間隔の短縮は段階的に行う。1回の体重1kg当たりの上限は、8週間の間隔で10mg、間隔を短縮した場合であれば6mg。最短の間隔は4週間。1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。④ 5mg/kgを1回量とし点滴静注。初回投与後、2週、6週に投与し、以後6～8週間の間隔で、1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。⑤ 5mg/kgを1回量とし点滴静注。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で、6週の投与以後、効果不十分又は効果が減弱した場合には、10mg/kgを1回量とする。1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。⑥ 5mg/kgを単回点滴静注。1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。⑦ 5mg/kgを1回量とし点滴静注。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で、6週の投与以後、効果が減弱した場合には、投与量は10mg/kgを1回量とすることができる。投与間隔は5mg/kgを1回量とし、最短4週間の間隔で投与できる。1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与</p>
<p>塩酸メトクロプラミド プリンペランシロップ 0.1% Primperan (アステラス) 1mg/mL 【薬価】 2.46 円 / mL</p>	<p>【効】 ①次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感）：胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後。② X線検査時のバリウムの通過促進</p> <p>【用】（内） 1日7.67～23.04mg（塩酸メトクロプラミドとして10～30mg、シロップ：10～30mL）を2～3回に分割、食前。小児：1日0.38～0.53mg/kg（塩酸メトクロプラミドとして0.5～0.7mg/kg、シロップ：0.5～0.7mL/kg）を2～3回に分割、食前</p>
<p>塩酸メトクロプラミド プリンペラン注射液 10mg Primperan (アステラス) 10mg（塩酸メトクロプラミド）（メトクロプラミドとして7.67mg） 2mL/A 【薬価】 58.00 円 / A</p>	<p>【効】 ①次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感）：胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後。② X線検査時のバリウムの通過促進</p> <p>【用】（注） 1回7.67mg（塩酸メトクロプラミドとして10mg、注射液1管）を1日1～2回筋注又は静注</p>
<p>カロテグラストメチル カログラ錠 120mg  Carogra (キッセイ) 120mg/T 【薬価】 199.70 円 / T</p>	<p>【効】 中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る）</p> <p>【用】（内） 1回960mgを1日3回食後</p>

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セビメリン塩酸塩水和物 サリグレンカプセル 30mg (院外) Saligren (日本化薬) 30mg/cap 【薬価】70.80 円 /cap	【効】シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善 【用】(内) 1回30mgを1日3回, 食後
デキサメタゾン ④デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」 Dexamethasone (日本化薬) 1mg/g 【薬価】39.00 円 /g 【先発品】アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	【効】びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎又は舌炎 【用】(外) 適量を1日1～数回患部に塗布
ドミフェン臭化物 オラドールトローチ 0.5mg Oradol (テバ) 0.5mg/T 【薬価】8.90 円 /T	【効】咽頭炎, 扁桃炎, 口内炎, 抜歯創を含む口腔創傷の感染予防 【用】(外) 1回0.5mgを1日3～6回, 口中で徐々に溶解
トリアムシノロンアセトニド アフタッチ口腔用貼付剤 25μg Aftach (アルフレッサ) 25μg/T 【薬価】26.30 円 /T	【効】アフタ性口内炎 【用】(外) 1患部に1回0.025mg (1錠) ずつを, 1日1～2回, 白色面を患部粘膜に付着させて用いる
トリアムシノロンアセトニド ④オルテクサー口腔用軟膏 0.1% (院外) Ortexer (日本ジェネリック) 5g/本 【薬価】63.20 円 /g	【効】慢性剥離性歯肉炎, びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎及び舌炎 【用】(外) 適量を1日1～数回患部に塗布
トリメブチンマレイン酸塩 ④トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 Trimebutine maleate (沢井) 100mg/T 【薬価】5.90 円 /T	【効】①慢性胃炎における消化器症状 (腹部疼痛, 悪心, あい気, 腹部膨満感), ②過敏性腸症候群 【用】(内) ①1日量300mgを3回に分割, ②1日量300～600mgを3回に分割
ドンペリドン ナウゼリン錠 10 (院外) Nauzelin (協和キリン) 10mg/T 【薬価】9.60 円 /T ④ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 Domperidone (日医工) 10mg/T 【薬価】5.90 円 /T 【先発品】ナウゼリン錠10	【効】次の疾患及び薬剤投与時の消化器症状 (悪心, 嘔吐, 食欲不振, 腹部膨満, 上腹部不快感, 腹痛, 胸やけ, あい気): ①成人: 慢性胃炎, 胃下垂症, 胃切除後症候群, 抗悪性腫瘍剤又はレボドパ製剤投与時. ②小児: 周期性嘔吐症, 上気道感染症, 抗悪性腫瘍剤投与時 【用】(内) ①1回10mg1日3回食前, レボドパ製剤投与時: 1回5～10mg1日3回食前. ②小児: 1日1.0～2.0mg/kgを3回に分割し食前, 1日30mgまで. 6歳以上: 1日最高1.0mg/kgまで
ドンペリドン ナウゼリン坐剤 10 Nauzelin (協和キリン) 10mg/個 【薬価】36.90 円 /個	【効】小児の次記疾患及び薬剤投与時の消化器症状 (悪心, 嘔吐, 食欲不振, 腹部膨満, 腹痛): ①周期性嘔吐症, 乳幼児下痢症, 上気道感染症. ②抗悪性腫瘍剤投与時 【用】(外) 3歳未満: 1回10mgを1日2～3回直腸内に, 3歳以上: 1回30mgを1日2～3回直腸内に
ドンペリドン ナウゼリン坐剤 60 Nauzelin (協和キリン) 60mg/個 【薬価】85.30 円 /個	【効】次記疾患及び薬剤投与時の消化器症状 (悪心, 嘔吐, 食欲不振, 腹部膨満, 上腹部不快感, 胸やけ): ①胃・十二指腸手術後. ②抗悪性腫瘍剤投与時 【用】(外) 1回60mgを1日2回直腸内に

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ピロカルピン塩酸塩 サラジェン錠 5mg (院外) (商) Salagen (キッセイ) 5mg/T 【薬価】 70.00 円/T	【効】 ①頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改善, ②シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善 【用】 (内) 1回 5mgを1日3回, 食後
複方ヨード・グリセリン 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 Compound iodine glycerin (小堺) 500mL/本 【薬価】 1.92 円/mL 100mL中: ヨウ素 1.2g 液状フェノール 0.5mL グリセリン 90mL	【効】 咽頭炎, 喉頭炎, 扁桃炎 【用】 (外) 適量を患部に塗布
ブデソニド コレチメント錠 9mg (院外) Cortiment (持田) 9mg/T 【薬価】 604.60 円/T	【効】 活動期潰瘍性大腸炎 (重症を除く) 【用】 (内) 9mgを1日1回朝
ブデソニド ゼンタコートカプセル 3mg Zentacort (マイラン EPD) 3mg/C 【薬価】 185.40 円/cap	【効】 軽症から中等症の活動期クローン病 【用】 (内) 1日1回 9mgを朝
ブデソニド レクタブル 2mg注腸フォーム 14回 Rectabul (キッセイ) 30.8g/瓶 【薬価】 4,860.80 円/瓶	【効】 潰瘍性大腸炎 (重症を除く) 【用】 (外) 1回1プッシュ (ブデソニドとして 2mg), 1日2回直腸内注入
ベドリズマブ (遺伝子組換え) エンタイビオ点滴静注用 300mg (商) (生) Entyvio for I.V. Infusion 300mg (武田) 300mg/瓶 【薬価】 279,573.00 円/瓶	【効】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る), 中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る) 【用】 (注) 1回 300mgを点滴静注. 初回投与後, 2週, 6週に投与し, 以降8週間隔で点滴静注
ポリカルボフィルカルシウム ポリフル錠 500mg Polyful (ヴィアトリス) 500mg/T 【薬価】 10.40 円/T	【効】 過敏性腸症候群における便通異常 (下痢, 便秘) 及び消化器症状 【用】 (内) 1日量 1.5 ~ 3.0g を3回に分割し, 食後に水とともに
ミリキズマブ (遺伝子組換え) オンボー点滴静注 300mg (商) (生) Omvoh intravenous infusion (持田) 300mg15mL/瓶 【薬価】 189,785.00 円/瓶	【効】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る) 【用】 (注) 1回 300mgを4週間隔で3回 (初回, 4週, 8週) 点滴静注. 12週時に効果不十分な場合はさらに1回 300mgを4週間隔で3回 (12週, 16週, 20週) 投与することができる. ミリキズマブ (遺伝子組換え) 皮下投与用製剤による維持療法中に効果が減弱した場合には, 1回 300mgを4週間隔で3回点滴静注することができる

23. 消化器官用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ミリキズマブ（遺伝子組換え） <u>オンボナー皮下注 100mgオートイン</u> <u>ジェクター（院外）</u> (株) 生 Omvoh subcutaneous injection autoinjectors (持田) 100mg/キット 【薬価】 125,123.00 円 / キット	【効】 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 【用】 (注) ミリキズマブ（遺伝子組換え）点滴静注製剤による導入療法終了4週後から、1回200mgを4週間隔で皮下注
メサラジン <u>アサコール錠 400mg</u> Asacol (ゼリア) 400mg/T 【薬価】 37.30 円 / T	【効】 潰瘍性大腸炎（重症を除く） 【用】 (内) 1日2,400mgを3回に分割し食後、寛解期には、必要に応じて1日1回2,400mg食後、活動期には、1日3,600mgを3回に分割し食後、患者の状態により適宜減量
メサラジン <u>ペンタサ顆粒 94%</u> Pentasa (杏林) 2000mg/包 【薬価】 104.90 円 / g <u>ペンタサ錠 500mg</u> Pentasa (杏林) 500mg/T 【薬価】 51.80 円 / T	【効】 ①潰瘍性大腸炎（重症を除く）、②クローン病 【用】 (内) ①1日1,500mgを3回に分割し食後、寛解期には、1日1回の投与可、1日2,250mgまで、活動期には、1日4,000mgを2回に分割投与可、小児：1日30～60mg/kgを3回に分割し食後、1日2,250mgまで、②1日1,500mg～3,000mgを3回に分割し食後、小児：1日40～60mg/kgを3回に分割し食後
メサラジン <u>ペンタサ坐剤 1g</u> Pentasa (杏林) 1g/個 【薬価】 196.60 円 / 個	【効】 潰瘍性大腸炎（重症を除く） 【用】 (外) 1日1g（1個）を、直腸内挿入
メサラジン <u>ペンタサ注腸 1g</u> Pentasa (杏林) 1g100mL/個 【薬価】 363.70 円 / 個	【効】 潰瘍性大腸炎（重症を除く） 【用】 (外) 1日1g（1個）を、直腸内注入
メサラジン <u>リアルダ錠 1200mg</u> Lialda (持田) 1200mg/T 【薬価】 159.90 円 / T	【効】 潰瘍性大腸炎（重症を除く） 【用】 (内) 1日1回2,400mgを食後、活動期は1日1回4,800mgを食後、患者の状態により適宜減量
メトクロプラミド <u>プリンペラン錠 5（院外）</u> Primperan (アステラス) 5mg/T 【薬価】 6.50 円 / T	【効】 ①次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感）：胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後、②X線検査時のバリウムの通過促進 【用】 (内) 1日7.67～23.04mg（塩酸メトクロプラミドとして10～30mg、2～6錠）を2～3回に分割、食前
メトクロプラミド <u>⑥メトクロプラミド錠 5mg「NIG」</u> Metoclopramide (武田) 5mg/T 【薬価】 5.70 円 / T 【先発品】 プリンペラン錠5	【効】 ①次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感）：胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後、②X線検査時のバリウムの通過促進 【用】 (内) 1日7.67～23.04mg（塩酸メトクロプラミドとして10～30mg）を2～3回に分割、食前
モサプリドクエン酸塩水和物 <u>ガスモチン散 1%</u> Gasmotin (大日本住友) 1%1g 分包 0.5g 【薬価】 21.60 円 / g	【効】 ①慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）、②経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助 【用】 (内) ①1日15mgを3回に分割、食前又は食後、②経口腸管洗浄剤の投与開始時に20mgを経口腸管洗浄剤（約180mL）で投与、経口腸管洗浄剤投与終了後、20mgを少量の水で投与

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
モサプリドクエン酸塩水和物 <u>モサプリドクエン酸塩錠 5mg</u> <u>「サンド」</u> Mosapride citrate hydrate (サンド) 5mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 ガスモチン錠 5mg	【効】 ①慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ，悪心・嘔吐），②経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X 線造影検査前処置の補助 【用】 (内) ① 1 日 15mg を 3 回に分割，食前又は食後，②経口腸管洗浄剤の投与開始時に 20mg を経口腸管洗浄剤（約 180mL）で投与。また，経口腸管洗浄剤投与終了後，20mg を少量の水で投与
ラモセトロン塩酸塩 <u>イリボー OD 錠 2.5μg</u> (株) Irribow OD (アステラス) 2.5 μ g/T 【薬価】 41.80 円/T <u>イリボー OD 錠 5μg</u> (株) Irribow OD (アステラス) 5 μ g/T 【薬価】 68.70 円/T	【効】 下痢型過敏性腸症候群 【用】 (内) 男性には 5 μ g を 1 日 1 回，1 日 10 μ g まで，女性には 2.5 μ g を 1 日 1 回，1 日は 5 μ g まで
リナクロチド <u>リンゼス錠 0.25mg</u> Linzess (アステラス) 0.25mg/T 【薬価】 69.10 円/T	【効】 ①便秘型過敏性腸症候群，②慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く） 【用】 (内) 0.5mg を 1 日 1 回食前，症状により 0.25mg に減量
<u>サリベートエアゾール</u> Saliveht (帝人) 50g/ 缶 【薬価】 406.10 円/ 個 1 缶（50g）中： 塩化ナトリウム 42.2mg 塩化カリウム 60.0mg 塩化カルシウム水和物 7.3mg 塩化マグネシウム 2.6mg リン酸二カリウム 17.1mg	【効】 次記疾患に対する諸症状の寛解，①シェーグレン症候群による口腔乾燥症，②頭頸部の放射線照射による唾液腺障害に基づく口腔乾燥症 【用】 (外) 1 回に 1～2 秒間口腔内に 1 日 4～5 回噴霧

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

241. 脳下垂体ホルモン剤

2411. ACTH 製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テトラコサクトド酢酸塩 <u>コートロシン注射用 0.25mg</u> Cortrosyn (アルフレッサ) 0.25mg/V 【薬価】 2,045.00 円 / 瓶	【効】 副腎皮質機能検査 【用】 (注) 1 日 1 回添付溶解液に溶解し, 次記量を使用. 必要があれば連続 2 ~ 3 日行う. 筋注・静注 (ラピッド・テスト) には, 0.25mg を使用. 点滴静注には 0.25 ~ 0.5mg を 5% ブドウ糖注射液, 生理食塩液, 注射用蒸留水等に加え, 4 ~ 8 時間点滴静注

2413. 性腺刺激ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
コリオゴナドトロピンアルファ (遺伝子組換え) <u>オビドレル皮下注シリンジ 250μg</u> Ⓢ Ovidrel (メルクバイオ) 250μg / 瓶 【薬価】 2,904.00 円 / 筒	【効】 ①視床下部 - 下垂体機能障害に伴う無排卵又は希発排卵における排卵誘発及び黄体化. ②生殖補助医療における卵胞成熟及び黄体化 【用】 (注) 250μg を単回皮下注

2414. 脳下垂体後葉ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
バソプレシン <u>ピトレスイン注射液 20</u> Pitressin (第一三共) 20 単位 1mL/A 【薬価】 551.00 円 / A	【効】 ①下垂体性尿崩症. ②下垂体性又は腎性尿崩症の鑑別診断. ③腸内ガスの除去 (鼓腸, 胆嚢撮影の前処置, 腎盂撮影の前処置). ④食道静脈瘤出血の緊急処置 【用】 (注) ① 1 回 2 ~ 10 単位を 1 日 2 ~ 3 回皮下又は筋注. ② 5 ~ 10 単位を皮下又は筋注するか, 0.1 単位を静注し, その後尿量の減少が著しく, かつ尿比重が 1.010 以上にまで上昇すれば, バソプレシン反応性尿崩症が考えられる. ③ 5 ~ 10 単位を皮下又は筋注. ④ 20 単位を 5% ブドウ糖液など 100 ~ 200mL に混和し, 0.1 ~ 0.4 単位 / 分の注入速度で持続的に静注

2419. その他の脳下垂体ホルモン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
デスマプレシン酢酸塩水和物 <u>ミニリンメルト OD錠 25μg (院外)</u> Ⓢ Minirinmelt OD (キッセイ) 25μg/T 【薬価】 44.70 円 / T	【効】 男性における夜間多尿による夜間頻尿 【用】 (内) 1 日 1 回就寝前に 50μg
デスマプレシン酢酸塩水和物 <u>ミニリンメルト OD錠 120μg (院外)</u> Ⓢ Minirinmelt OD (協和キリン) 120μg/T 【薬価】 132.90 円 / T	【効】 ①尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症. ②中枢性尿崩症 【用】 (内) ① 1 日 1 回就寝前に 120μg, 1 日 1 回就寝前に 240μg まで増量可. ② 1 回 60 ~ 120μg を 1 日 1 ~ 3 回. 飲水量, 尿量, 尿比重, 尿浸透圧により増減. 1 回投与量は 240μg までとし, 1 日投与量は 720μg まで

243. 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

2431. 甲状腺ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リオチロニンナトリウム <u>5mcg チロナミン錠</u> Thyronamin (武田) 5μg/T 【薬価】 9.80 円 / T	【効】 粘液水腫, クレチン症, 甲状腺機能低下症 (原発性及び下垂体性), 慢性甲状腺炎, 甲状腺腫 【用】 (内) 初回量 1 日 5 ~ 25μg. 1 ~ 2 週間間隔で少しずつ増量. 維持量 1 日 25 ~ 75μg

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボチロキシナトリウム水和物 チラーヂンS散 0.01% (院外) Ⓢ Thyradin S (あすか) 0.1mg/g 【薬価】59.10 円/g	【効】乳幼児甲状腺機能低下症 【用】(内) 乳幼児には1回10 μ g/kg (本剤100mg/kg)を1日1回, 未熟児に対しては1回5 μ g/kg (本剤50mg/kg)から開始して8日目から1回10 μ g/kg (本剤100mg/kg)を1日1回
レボチロキシナトリウム水和物 チラーヂンS錠 50μg Ⓢ Thyradin S (あすか) 50 μ g/T 【薬価】9.80 円/T	【効】粘液水腫, クレチン病, 甲状腺機能低下症 (原発性及び下垂体性), 甲状腺腫 【用】(内) 25 ~ 400 μ gを1日1回, 開始量には25 ~ 100 μ g, 維持量には100 ~ 400 μ gを投与することが多い

2432. 抗甲状腺ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
チアマゾール メルカゾール錠 5mg Mercazole (武田) 5mg/T 【薬価】9.80 円/T	【効】甲状腺機能亢進症 【用】(内) 初期量1日30mgを3~4回に分割, 症状が重症のときは, 1日40~60mgを使用, 機能亢進症状がほぼ消失したなら, 1~4週間ごとに漸減し, 維持量1日5~10mgを1~2回に分割, 小児: 初期量5歳以上~10歳未満では1日10~20mg, 10歳以上~15歳未満では1日20~30mgを2~4回に分割, 機能亢進症状がほぼ消失したなら, 1~4週間ごとに漸減し, 維持量1日5~10mgを1~2回に分割, 妊婦: 初期量1日15~30mgを3~4回に分割, 機能亢進症状がほぼ消失したなら, 1~4週間ごとに漸減し, 維持量1日5~10mgを1~2回に分割, 正常妊娠時の甲状腺機能検査値を低下しないよう, 2週間ごとに検査し, 必要最低限量を投与
プロピルチオウラシル プロパジール錠 50mg (院外) Propacil (あすか) 50mg/T 【薬価】9.80 円/T	【効】甲状腺機能亢進症 【用】(内) 初期量1日300mgを3~4回に分割, 症状が重症のときは1日400~600mgを使用, 機能亢進症状がほぼ消失したなら1~4週間ごとに漸減し, 維持量1日50~100mgを1~2回に分割, 小児: 初期量5歳以上~10歳未満では1日100~200mg, 10歳以上~15歳未満では, 1日200~300mgを2~4回に分割, 機能亢進症状がほぼ消失したなら, 1~4週間ごとに漸減し, 維持量1日50~100mgを1~2回に分割, 妊婦に対しては, 初期量1日150~300mgを3~4回に分割, 機能亢進症状がほぼ消失したなら, 1~4週間ごとに漸減し, 維持量1日50~100mgを1~2回に分割, 正常妊娠時の甲状腺機能検査値を低下しないよう, 2週間ごとに検査し, 必要最低限量を投与

2439. その他の甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テリパラチド (遺伝子組換え) フォルテオ皮下注キット 600μg Forteo (日本イーライリリー) 600 μ g/キット 【薬価】26,694.00 円/キット	【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症 【用】(注) 1日1回20 μ gを皮下注, 投与は24か月間まで
テリパラチド酢酸塩 テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター Teribone (旭化成) 28.2 μ g/キット 【薬価】5,995.00 円/キット	【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症 【用】(注) 28.2 μ gを1日1回, 週に2回皮下注, 24か月間まで

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

244. たん白同化ステロイド剤

2449. その他のたん白同化ステロイド剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メテノロン酢酸エステル <u>プリモボラン錠 5mg</u> Primobolan (バイエル) 5mg/T 【薬価】 12.10 円/T	【効】 ①骨粗鬆症. ②次記疾患による著しい消耗状態:慢性腎疾患, 悪性腫瘍, 外傷, 熱傷. ③次記疾患による骨髄の消耗状態:再生不良性貧血 【用】 (内) 1日 10~20mgを 2~3回に分割

245. 副腎ホルモン剤

2451. エピネフリン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アドレナリン <u>アドレナリン注0.1% シリンジ「テルモ」</u> (Ⓢ) Adrenaline (テルモ) 1mg1mL/本 【薬価】 314.00 円/筒	【効】 ①次記疾患に基づく気管支痙攣の緩解:気管支喘息, 百日咳. ②各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療. ③心停止の補助治療 【用】 (注) 1回 0.2~1mg (本剤として 0.2~1mL) を皮下注又は筋注. 蘇生などの緊急時には, 1回 0.25mg (本剤として 0.25mL) を超えない量を生理食塩液などで希釈し, できるだけゆっくりと静注. 必要があれば 5~15分ごとに繰り返す
アドレナリン <u>エピペン注射液 0.15mg</u> (Ⓢ) Epipen (マイラン EPD) 0.15mg/筒 【薬価】 9,673.00 円/筒 <u>エピペン注射液 0.3mg (院外)</u> (Ⓢ) Epipen (ファイザー) 2mg2mL/本 (1回注射液量 0.3mL) 【薬価】 10,203.00 円/筒	【効】 蜂毒, 食物及び薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療 (アナフィラキシーの既往のある人又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い人に限る) 【用】 (注) アドレナリンとして 0.01mg/kgが推奨用量であり, 患者の体重を考慮して, アドレナリン 0.15mg又は 0.3mgを筋注
アドレナリン <u>ボスミン注 1mg</u> (Ⓢ) Bosmin (第一三共) 1mg1mL/A 【薬価】 94.00 円/A	【効】 ①次記疾患に基づく気管支痙攣の緩解:気管支喘息, 百日咳. ②各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療. ③心停止の補助治療. ④局所麻酔薬の作用延長. ⑤手術時の局所出血の予防と治療. ⑥虹彩毛様体炎時における虹彩癒着の防止 【用】 (注) ①②③ 1回 0.2~1mg (0.2~1mL) を皮下注又は筋注. 蘇生などの緊急時には, 1回 0.25mg (0.25mL) を超えない量を生理食塩液などで希釈し, できるだけゆっくりと静注. 必要があれば 5~15分ごとに繰り返す. ④ 0.1% 溶液として, 血管収縮薬未添加の局所麻酔薬 10mL に 1~2 滴 (アドレナリン濃度 1:10~20 万) の割合に添加して用いる. ⑤ 0.1% 溶液として, 単独に, 又は局所麻酔薬に添加し, 局所注入. ⑥ 0.1% 溶液として, 点眼するか又は結膜下に 0.1mg (0.1mL) 以下を注射
アドレナリン <u>ボスミン外用液 0.1%</u> Bosmin (第一三共) 1mg/1mL 【薬価】 12.00 円/mL	【効】 ①次記疾患に基づく気管支痙攣の緩解:気管支喘息, 百日咳. ②局所麻酔薬の作用延長 (粘膜面の表面麻酔に限る). ③手術時の局所出血の予防と治療, 耳鼻咽喉科領域における局所出血, 耳鼻咽喉科領域における粘膜の充血・腫脹, 外創における局所出血 【用】 (外) ① 5~10 倍に希釈して吸入. 1回の投与量は 0.3mg以内. 2~5 分間たって効果が不十分な場合でも, 前記の投与をもう一度行うのを限度とする. 続けて用いる必要がある場合でも, 少なくとも 4~6 時間の間隔をおく. ②血管収縮薬未添加の局所麻酔薬 10mL に 1~2 滴 (アドレナリン濃度 1:10~20 万) の割合に添加して用いる. ③本剤をそのままか, 5~10 倍希釈液を直接塗布, 点鼻もしくは噴霧するか, 又はタンポンとして用いる

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ノルアドレナリン <u>ノルアドリナリン注 1mg</u> ㊞ Nor adrenalin （アルフレッサ） 1mg1mL/A 【薬価】 94.00 円/A	【効】 各種疾患若しくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療（心筋梗塞によるショック，敗血症によるショック，アナフィラキシー性ショック，循環血液量低下を伴う急性低血圧ないしショック，全身麻酔時の急性低血圧など） 【用】（注） ①点滴静注：1回 1mgを 250mLの生理食塩液，5%ブドウ糖液，血漿又は全血などに溶解して点滴静注．点滴の速度は 0.5～1.0mL/分であるが，血圧を絶えず観察して調節．②皮下注：1回 0.1～1mgを皮下注

2452. コルチゾン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヒドロコルチゾン コートリル錠 10mg Cortril (ファイザー) 10mg/T 【薬価】 7.40 円 / T	【効】 (1) 慢性副腎皮質機能不全 (原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性), 急性副腎皮質機能不全 (副腎クリーゼ), 副腎性器症候群, 亜急性甲状腺炎, 甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症, ACTH 単独欠損症 (2) 関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む), リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む) (3) エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状), 全身性血管炎 (大動脈炎症候群, 結節性動脈周囲炎, 多発性動脈炎, ヴェゲナ肉芽腫症を含む), 多発性筋炎 (皮膚筋炎), 強皮症 (4) ネフローゼ及びネフローゼ症候群 (5) 気管支喘息, 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹, 中毒疹を含む), 血清病 (6) 重症感染症 (化学療法と併用する) (7) 溶血性貧血 (免疫性又は免疫性機序の疑われるもの), 白血病 (急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病) (皮膚白血病を含む), 顆粒球減少症 (本態性, 続発性), 紫斑病 (血小板減少性及び血小板非減少性), 再生不良性貧血 (8) 限局性腸炎, 潰瘍性大腸炎 (9) 重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期, スプルーを含む) (10) 慢性肝炎 (活動型, 急性再燃型, 胆汁うっ滞型) (但し, 一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る), 肝硬変 (活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの) (11) サルコイドーシス (但し, 両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く) (12) 肺結核 (粟粒結核, 重症結核に限る) (抗結核剤と併用する), 結核性胸膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性腹膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性心嚢炎 (抗結核剤と併用する) (13) 脳脊髄炎 (脳炎, 脊髄炎を含む) (但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること), 末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む), 筋強直症, 多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む), 小舞蹈病, 顔面神経麻痺, 脊髄蜘蛛膜炎 (14) 悪性リンパ腫 (リンパ肉腫症, 細網肉腫症, ホジキン病, 皮膚細網症, 菌状息肉症) 及び類似疾患 (近縁疾患), 好酸性肉芽腫, 乳癌の再発転移 (15) 特発性低血糖症 (16) 原因不明の発熱 (17) 副腎摘除, 副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲 (18) 蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む) (19) 卵管整形術後の癒着防止 (20) ★湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと), ★痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (重症例に限る), 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), ★乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群], ★掌蹠膿疱症 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮症, ステブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍], ★円形脱毛症 (悪性型に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), ★紅皮症 (ヘブラ紅色靴糠疹を含む), 顔面播種状粟粒狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状靴糠疹を含む) (21) 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外眼及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎) (22) 急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>候群, 急性感音性難聴, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 進行性壞疽性鼻炎, 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法</p> <p>(23) 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの)</p> <p>★印: 外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること</p> <p>【用】 (内) 1日 10 ~ 120mgを 1 ~ 4回に分割</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム</p> <p>ソル・コルテフ注射用 100mg</p> <p>Solu cortef (ファイザー)</p> <p>100mg/V (溶解液付)</p> <p>【薬価】 264.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①内科・小児科領域</p> <p>(1) 内分泌疾患：1) 急性副腎皮質機能不全 (副腎クリーゼ)。(静注，点滴静注，筋注)。2) 甲状腺中毒症 [甲状腺 (中毒性) クリーゼ]。(静注，点滴静注，筋注※)。3) 慢性副腎皮質機能不全 (原発性，続発性，下垂体性，医原性)。(筋注)。4) ACTH 単独欠損症。(筋注※)。(2) 膠原病：リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む)，エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状)。(静注※，点滴静注※，筋注)。(3) アレルギー性疾患：1) 気管支喘息。(静注，点滴静注，ネブライザー)。2) 喘息発作重積状態，アナフィラキシーショック。(静注，点滴静注)。3) 喘息性気管支炎 (小児喘息性気管支炎を含む)。(筋注※，ネブライザー)。4) 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹，中毒疹を含む)。(静注※，点滴静注※，筋注※)。5) 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る)。(点滴静注※，筋注※)。(4) 神経疾患：1) 脳脊髄炎 (脳炎，脊髄炎を含む) (但し，一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)，重症筋無力症，多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む)。(静注，点滴静脈注，筋注※)。2) 末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む)。(静注※，点滴静注※，筋注※)。3) 小舞蹈病，顔面神経麻痺，脊髄蜘蛛膜炎。(筋注※)。4) 脊髄浮腫。(静注，硬膜外注射)。(5) 消化器疾患：限局性腸炎，潰瘍性大腸炎。(静注※，点滴静注※，筋注※，注腸)。(6) 呼吸器疾患：びまん性間質性肺炎 (肺線維症) (放射線肺臓炎を含む)。(静注※，点滴静注※，ネブライザー)。(7) 重症感染症：重症感染症 (化学療法と併用する)。(静注，点滴静注，筋注※)。(8) 新陳代謝疾患：特発性低血糖症。(静注，点滴静注，筋注※)。(9) その他内科的疾患：1) 重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期，スプルーを含む)。(静注※，点滴静注※，筋注※)。2) 悪性リンパ腫 (リンパ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン病，皮膚細網症，菌状息肉症) 及び類似疾患 (近縁疾患)。(3) 好酸性肉芽腫。(静注，点滴静注，筋注※)。4) 乳癌の再発転移。(筋注※)</p> <p>②外科領域</p> <p>(1) 副腎摘除。(静注，点滴静注，筋注)。(2) 臓器・組織移植，副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲。(筋注※)。(3) 侵襲後肺水腫。(静注，ネブライザー)。(4) 外科的ショック及び外科的ショック様状態，脳浮腫，輸血による副作用，気管支痙攣 (術中)。(静注)。(5) 手術後の腹膜癒着防止。(腹腔内注入)。(6) 蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む)。(筋注※)</p> <p>③整形外科領域</p> <p>(1) 関節リウマチ，若年性関節リウマチ (スチル病を含む)。(筋注，関節腔内注射)。(2) リウマチ性多発筋痛。(筋注)。(3) 強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎)。(筋注)。(4) 強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎) に伴う四肢関節炎。(関節腔内注射)</p> <p>④泌尿器科領域</p> <p>前立腺癌 (他の療法が無効の場合)，陰茎硬結。(筋注※)</p> <p>⑤眼科領域</p> <p>眼科領域の術後炎症。(静注※，筋注※，結膜下注射)</p> <p>⑥皮膚科領域</p> <p>(1) 湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など) (但し重症例以外は極力投与しないこと)。(筋注※★)。(2) 乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例)，乾癬性関節炎，乾癬性紅皮症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚炎，疱疹状膿痂疹，ライター症候群]。(点滴静注※★，筋注※★)。(3) 紅斑症 (★多形滲出性紅斑，結節性紅斑) (但し，多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る)。(筋注※)。(4) ウェーバークリスチャン病，粘膜皮膚眼症候群 (開口部びらん性外皮膚症，ステブンス・ジョンソン病，皮膚口内炎，フックス症候群，ペーチェット病 (眼症状のない場合)，リップシュッツ急性陰門潰瘍)，天疱瘡群 (尋常性天疱瘡，落葉状天疱瘡，Senear-Usher 症候群，増殖性天疱瘡)，デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡，妊娠性疱疹を含む)。(点滴静注※，筋注※)。(5) 帯状疱疹 (重症例に限る)。(筋注※)。(6) 潰瘍性慢性膿皮症。(筋注※)。(7) 紅皮症 (ヘブラ紅色皸癬疹を含む)。(点滴静注※★，筋注※★)</p> <p>⑦耳鼻咽喉科領域</p> <p>(1) メニエル病及びメニエル症候群，急性感音性難聴。(静注，点滴静注，筋注)。(2) 喉頭炎・喉頭浮腫。(静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，喉頭・気管注入)。(3) 食道の炎症 (腐蝕性食道炎，直達鏡使用後) 及び食道拡張術後。(静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，食道注入)。(4) アレルギー性鼻炎，花粉症 (枯草熱) (筋注，</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>ネブライザー, 鼻腔内注入). (5) 嗅覚障害. (静注※, 点滴静注※, 筋注※, ネブライザー, 鼻腔内注入). (6) 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの), (軟組織内注射)</p> <p>⑧口腔外科領域</p> <p>口腔外科領域手術後の後療法. (静注, 点滴静注, 筋注).</p> <p>注 (※・★印について): 次記の場合にのみ用いること. (1) ※印: 1) 静注及び点滴静注. 経口投与不能時, 緊急時及び筋注不適時. 2) 筋注: 経口投与不能時. (2) ★印: 外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること</p> <p>【用】(注) 静注・点滴静注・筋注: 1回 50～100mg, 1日 1～4回, 緊急時 1回 100～200mg. 関節腔内注射: 1回 5～25mg, 投与間隔 2週間以上. 軟組織内注射: 1回 12.5～25mg, 投与間隔 2週間以上. 硬膜外注射: 1回 12.5～50mg, 投与間隔 2週間以上. 腹腔内注入: 1回 40mg. 注腸: 1回 50～100mg. 結膜下注射: 1回 20～50mg/mL 溶液 0.2～0.5mL. ネブライザー・鼻腔内注入・喉頭・気管注入: 1回 10～15mg, 1日 1～3回. 食道注入: 1回 25mg. (気管支喘息における静脈注又は点滴静注) (1) 初回投与量 100～500mgを緩徐に静注又は点滴静注. 症状が改善しない場合には, 1回 50～200mgを 4～6時間毎に緩徐に追加投与. (2) 2歳以上の小児には, 初回投与量 5～7mg/kgを緩徐に静注又は点滴静注. 症状が改善しない場合には, 1回 5～7mg/kgを 6時間毎に緩徐に追加投与. (3) 2歳未満の小児には, 初回投与量 5mg/kgを緩徐に静注又は点滴静注. 症状が改善しない場合には, 1回 5mg/kgを 6～8時間毎に緩徐に追加投与</p>
<p>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム</p> <p>ソル・コーテフ静注用 250mg</p> <p>Solu cortef (ファイザー)</p> <p>250mg/V (溶解液付)</p> <p>【薬価】 833.00 円 / 瓶</p> <p>ソル・コーテフ静注用 500mg</p> <p>Solu cortef (ファイザー)</p> <p>500mg/V (溶解液付)</p> <p>【薬価】 1,100.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①急性循環不全 (出血性ショック, 外傷性ショック) 及びショック様状態における救急. ②気管支喘息</p> <p>【用】(注) ① 1回 250～1000mgを緩徐に静注又は点滴静注. ② (1) 初回投与量 100～500mgを緩徐に静注又は点滴静注. 症状が改善しない場合には, 1回 50～200mgを 4～6時間毎に緩徐に追加投与. (2) 2歳以上の小児には, 初回投与量 5～7mg/kgを緩徐に静注又は点滴静注. 症状が改善しない場合には, 1回 5～7mg/kgを 6時間毎に緩徐に追加投与. (3) 2歳未満の小児には, 初回投与量 5mg/kgを緩徐に静注又は点滴静注. 症状が改善しない場合には, 1回 5mg/kgを 6～8時間毎に緩徐に追加投与</p>
<p>ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム</p> <p>水溶性ハイドロコト注射液 100mg</p> <p>Hydrocortone (日医工)</p> <p>100mg2mL/V</p> <p>【薬価】 500.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 外科的ショック及びショック様状態における救急, 又は術中・術後のショック</p> <p>【用】(注) 1日 1回又は数回, 1回 100～1,000mgを静注又は点滴静注</p>
<p>フルドコルチゾン酢酸エステル</p> <p>フロリネフ錠 0.1mg</p> <p>Ⓜ</p> <p>Florinef (サンド)</p> <p>0.1mg/T</p> <p>【薬価】 232.50 円 / T</p>	<p>【効】 ①塩喪失型先天性副腎皮質過形成症. ②塩喪失型慢性副腎皮質機能不全 (アジソン病)</p> <p>【用】(内) 1日 0.02～0.1mgを 2～3回に分割. 新生児・乳児: 0.025～0.05mgより開始</p>

2454. フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
デキサメタゾン デカドロン錠 0.5mg Decadron (日医工) 0.5mg/T 【薬価】 5.70 円 /T デカドロン錠 4mg Decadron (日医工) 4mg/T 【薬価】 26.40 円 /T	<p>【効】 (1) 内分泌疾患:慢性副腎皮質機能不全 (原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性), 急性副腎皮質機能不全 (副腎クリーゼ), 副腎性器症候群, 亜急性甲状腺炎, 甲状腺中毒症 [甲状腺 (中毒性) クリーゼ], 甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症, ACTH 単欠損症, 特発性低血糖症, 下垂体抑制試験</p> <p>(2) リウマチ性疾患: 関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む), リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む), リウマチ性多発筋痛, 強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎)</p> <p>(3) 膠原病: エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状), 全身性血管炎 (高安動脈炎, 結節性多発動脈炎, 顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症を含む), 多発性筋炎 (皮膚筋炎), 強皮症</p> <p>(4) 腎疾患: ネフローゼ及びネフローゼ症候群</p> <p>(5) 心疾患: うっ血性心不全</p> <p>(6) アレルギー性疾患: 気管支喘息, 喘息性気管支炎 (小児喘息性気管支炎を含む), 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹, 中毒疹を含む), 血清病</p> <p>(7) 血液疾患: 紫斑病 (血小板減少性及び血小板非減少性), 再生不良性貧血, 白血病 (急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病) (皮膚白血病を含む), 溶血性貧血 (免疫性又は免疫性機序の疑われるもの), 顆粒球減少症 (本態性, 続発性)</p> <p>(8) 消化器疾患: 潰瘍性大腸炎, 限局性腸炎, 重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期, スプルーを含む)</p> <p>(9) 肝疾患: 劇症肝炎 (臨床的に重症とみなされるものを含む), 胆汁うっ滞型急性肝炎, 慢性肝炎 (活動型, 急性再燃型, 胆汁うっ滞型) (但し, 一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る), 肝硬変 (活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの)</p> <p>(10) 肺疾患: サルコイドーシス (但し, 両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く), びまん性間質性肺炎 (肺線維症) (放射線肺臓炎を含む)</p> <p>(11) 重症感染症: 重症感染症 (化学療法と併用する)</p> <p>(12) 結核性疾患: 肺結核 (粟粒結核, 重症結核に限る) (抗結核剤と併用する), 結核性髄膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性胸膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性腹膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性心嚢炎 (抗結核剤と併用する)</p> <p>(13) 神経疾患: 脳脊髄炎 (脳炎, 脊髄炎を含む) (但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること), 末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む), 筋強直症, 重症筋無力症, 多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む), 小舞蹈病, 顔面神経麻痺, 脊髄網膜炎</p> <p>(14) 悪性腫瘍: 悪性リンパ腫 (リンパ肉腫症, 細網肉腫症, ホジキン病, 皮膚細網症, 菌状息肉症) 及び類似疾患 (近縁疾患), 好酸性肉芽腫, 乳癌の再発転移</p> <p>(15) 抗悪性腫瘍剤 (シスプラチンなど) 投与に伴う消化器症状 (悪心・嘔吐)</p> <p>(16) 外科疾患: 副腎摘除, 副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲, 侵襲後肺水腫, 臓器・組織移植, 蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む), 原因不明の発熱</p> <p>(17) 産婦人科疾患: 卵管整形術後の癒着防止</p> <p>(18) 泌尿器科疾患: 前立腺癌 (他の療法が無効な場合), 陰茎硬結</p> <p>(19) 皮膚科疾患: ★湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと), ★痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る。また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい), 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), ★乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例), 関節症性乾癬, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群], ★掌蹠膿疱症 (重症例に限る), ★扁平苔癬 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), IgA 血管炎 (重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 (開口部びらん性皮膚症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチュット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍), レイノー病, ★円形脱毛症 (悪性例に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), ★紅皮症 (ヘブラ紅色皸癬疹を含む), 顔</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状秕糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレーマ</p> <p>(20) 眼科疾患: 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎), 眼科領域の術後炎症</p> <p>(21) 耳鼻咽喉科疾患: 急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症候群, 急性感音性難聴, 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 進行性壊疽性鼻炎, 喉頭炎・喉頭浮腫, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法, 嗅覚障害, 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎</p> <p>(22) 歯科・口腔外科疾患: 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの)</p> <p>(23) 代謝性疾患: 全身性 AL アミロイドーシス</p> <p>〈注釈〉★印の附されている適応に対しては, 外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることとされたものを示す</p> <p>【用】(内) ① 1日 0.5～8mgを 1～4回に分割. ②抗悪性腫瘍剤 (シスプラチンなど) 投与に伴う消化器症状 (悪心・嘔吐) の場合: 1日 4～20mgを 1～2回に分割. 1日最大 20mgまで. ③全身性 AL アミロイドーシスの場合: 他の薬剤との併用において, 1日 40mgを 1, 8, 15, 22日目に投与する. 28日を 1サイクルとして, 最大 6サイクルまで投与を繰り返す</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>デキサメタゾン デカドロンエリキシル 0.01%【経 過措置】 Decadron (日医工) 0.1mg/mL 【薬価】 4.30 円 /mL</p>	<p>【効】 (1) 内分泌疾患:慢性副腎皮質機能不全 (原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性), 急性副腎皮質機能不全 (副腎クリーゼ), 副腎性器症候群, 亜急性甲状腺炎, 甲状腺中毒症 [甲状腺 (中毒性) クリーゼ], 甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症, ACTH 単独欠損症, 特発性低血糖症, 下垂体抑制試験</p> <p>(2) リウマチ性疾患:関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む), リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む), リウマチ性多発筋痛, 強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎)</p> <p>(3) 膠原病:エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状), 全身性血管炎 (高安動脈炎, 結節性多発動脈炎, 顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症を含む), 多発性筋炎 (皮膚筋炎), 強皮症</p> <p>(4) 腎疾患:ネフローゼ及びネフローゼ症候群</p> <p>(5) 心疾患:うっ血性心不全</p> <p>(6) アレルギー性疾患:気管支喘息, 喘息性気管支炎 (小児喘息性気管支炎を含む), 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹, 中毒疹を含む), 血清病</p> <p>(7) 血液疾患:紫斑病 (血小板減少性及び血小板非減少性), 再生不良性貧血, 白血病 (急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病) (皮膚白血病を含む), 溶血性貧血 (免疫性又は免疫性機序の疑われるもの), 顆粒球減少症 (本態性, 続発性)</p> <p>(8) 消化器疾患:潰瘍性大腸炎, 限局性腸炎, 重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期, スプルーを含む)</p> <p>(9) 肝疾患:劇症肝炎 (臨床的に重症とみなされるものを含む), 胆汁うっ滞型急性肝炎, 慢性肝炎 (活動型, 急性再燃型, 胆汁うっ滞型) (但し, 一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る), 肝硬変 (活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの)</p> <p>(10) 肺疾患:サルコイドーシス (但し, 両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く), びまん性間質性肺炎 (肺線維症) (放射線肺臓炎を含む)</p> <p>(11) 重症感染症:重症感染症 (化学療法と併用する)</p> <p>(12) 結核性疾患:肺結核 (粟粒結核, 重症結核に限る) (抗結核剤と併用する), 結核性髄膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性胸膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性腹膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性心嚢炎 (抗結核剤と併用する)</p> <p>(13) 神経疾患:脳脊髄炎 (脳炎, 脊髄炎を含む) (但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること), 末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む), 筋強直症, 重症筋無力症, 多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む), 小舞蹈病, 顔面神経麻痺, 脊髄網膜炎</p> <p>(14) 悪性腫瘍:悪性リンパ腫 (リンパ肉腫症, 細網肉腫症, ホジキン病, 皮膚細網症, 菌状息肉症) 及び類似疾患 (近縁疾患), 好酸性肉芽腫, 乳癌の再発転移</p> <p>(15) 外科疾患:副腎摘除, 副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲, 侵襲後肺水腫, 臓器・組織移植, 蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む), 原因不明の発熱</p> <p>(16) 産婦人科疾患:卵管整形術後の癒着防止</p> <p>(17) 泌尿器科疾患:前立腺癌 (他の療法が無効な場合), 陰茎硬結</p> <p>(18) 皮膚科疾患:★湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと), ★痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る. また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい), 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), ★乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例), 関節症性乾癬, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, けい留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群], ★掌蹠膿疱症 (重症例に限る), ★扁平苔癬 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), IgA 血管炎 (重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 (開口部びらん性外皮症, ステブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍), レイノー病, ★円形脱毛症 (悪性例に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Seneear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), ★紅皮症 (ヘブラ紅色皴糠疹を含む), 顔面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状皴糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレーマ</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>(19) 眼科疾患：内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部症候群，眼筋麻痺），外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎），眼科領域の術後炎症</p> <p>(20) 耳鼻咽喉科疾患：急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエル病及びメニエル症候群，急性感音性難聴，血管運動（神経）性鼻炎，アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），進行性壊疽性鼻炎，喉頭炎・喉頭浮腫，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法，嗅覚障害，急性・慢性（反復性）唾液腺炎</p> <p>(21) 歯科・口腔外科疾患：難治性口内炎及び舌炎（局所療法で治癒しないもの）</p> <p>〈注釈〉★印の附されている適応に対しては，外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることとされたものを示す</p> <p>【用】（内）1日0.5～8mgを1～4回に分割，小児：1日0.15～4mgを1～4回に分割</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム ④デキサート注射液 3.3mg Dexart (富士製薬) デキサメタゾンとして 3.3mg1ml/A 【薬価】 173.00 円/A 【先発品】 デカドロン注射液 3.3mg ④デキサート注射液 6.0mg Dexart (富士製薬) デキサメタゾンとして 6.6mg2ml/V 【薬価】 197.00 円/瓶 【先発品】 デカドロン注射液 6.6mg</p>	<p>【効】 (1) 内分泌疾患:慢性副腎皮質機能不全(原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性) [筋肉内], 急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ) [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内], 副腎性器症候群 [▲筋肉内], 亜急性甲状腺炎 [▲筋肉内], 甲状腺中毒症(甲状腺(中毒性)クリーゼ) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症 [▲筋肉内], 特発性低血糖症 [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内]</p> <p>(2) リウマチ性疾患, 結合織炎及び関節炎:関節リウマチ [筋肉内, 関節腔内], 若年性関節リウマチ(スチル病を含む) [筋肉内, 関節腔内], リウマチ熱(リウマチ性心炎を含む) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, 筋肉内], リウマチ性多発筋痛 [筋肉内], 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎) [筋肉内], 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)に伴う四肢関節炎 [関節腔内], 関節周囲炎(非感染性のものに限る) [軟組織内, 腱鞘内, 滑液嚢内], 腱炎(非感染性のものに限る) [軟組織内, 腱鞘内], 腱鞘炎(非感染性のものに限る) [腱鞘内], 腱周囲炎(非感染性のものに限る) [軟組織内, 腱鞘内, 滑液嚢内], 滑液包炎(非感染性のものに限る) [滑液嚢内], 変形性関節症(炎症症状がはっきり認められる場合) [関節腔内], 非感染性慢性関節炎 [関節腔内], 痛風性関節炎 [関節腔内]</p> <p>(3) 膠原病:エリテマトーデス(全身性及び慢性円板状) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, 筋肉内], 全身性血管炎(高安動脈炎, 結節性多発動脈炎, 顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症を含む) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, 筋肉内], 多発性筋炎(皮膚筋炎) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, 筋肉内], 強皮症 [▲筋肉内]</p> <p>(4) 腎疾患:ネフローゼ及びネフローゼ症候群 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内]</p> <p>(5) 心疾患:うっ血性心不全 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内]</p> <p>(6) アレルギー性疾患:気管支喘息(但し, 筋注以外の投与方法では不適当な場合に限る) [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内, ネブライザー], 喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む) [▲筋肉内, ネブライザー], 喘息発作重積状態 [静脈内, 点滴静脈内], 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒(薬疹, 中毒疹を含む) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内], 血清病 [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], アナフィラキシーショック [静脈内, 点滴静脈内]</p> <p>(7) 血液疾患:紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 溶血性貧血(免疫性又は免疫性機序の疑われるもの) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 白血病(急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病)(皮膚白血病を含む) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 上記疾患のうち髄膜白血病 [脊髄腔内], 再生不良性貧血 [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 凝固因子の障害による出血性素因 [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 顆粒球減少症(本態性, 続発性) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内]</p> <p>(8) 消化器疾患:潰瘍性大腸炎 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内, 注腸], 限局性腸炎 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内, 注腸], 重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期, スプルーを含む) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内]</p> <p>(9) 肝疾患:劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む) [静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内], 肝硬変(活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの) [▲筋肉内]</p> <p>(10) 肺疾患:びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む) [▲静脈内, 点滴静脈内, ネブライザー]</p> <p>(11) 重症感染症:重症感染症(化学療法と併用する) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内]</p> <p>(12) 結核性疾患:結核性髄膜炎(抗結核剤と併用する) [脊髄腔内], 結核性胸膜炎(抗結核剤と併用する) [胸腔内]</p> <p>(13) 神経疾患:脳脊髄炎(脳炎, 脊髄炎を含む)(但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内, 脊髄腔内], 末梢神経炎(ギランバレー症候群を含む) [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内, 脊髄腔内], 重症筋無力症 [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内, 脊髄腔内], 多発性硬化症(視束脊髄炎を含む) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内, 脊髄腔内], 小舞蹈病 [▲筋肉内], 顔面神経麻痺 [▲筋肉内], 脊髄蜘蛛膜炎 [▲筋肉内]</p> <p>(14) 悪性腫瘍:悪性リンパ腫(リンパ肉腫症, 細網肉腫症, ホジキン病, 皮膚細網症, 菌状息肉症)及び類似疾患(近縁疾患) [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内, 脊髄腔内], 好酸性肉芽腫 [静脈内, 点滴静脈内, ▲筋肉内], 乳癌の再発転移 [▲筋肉内]</p> <p>(15) 以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法:多発性骨髄腫 [点</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>滴静脈内]</p> <p>(16) 抗悪性腫瘍剤 (シスプラチンなど) 投与に伴う消化器症状 (悪心・嘔吐) [静脈内, 点滴静脈内]</p> <p>(17) 外科疾患: 副腎摘除 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内], 臓器・組織移植 [▲筋肉内], 侵襲後肺水腫 [静脈内, ネブライザー], 副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲 [▲筋肉内], 外科的ショック及び外科的ショック様状態 [静脈内], 脳浮腫 [静脈内], 輸血による副作用 [静脈内], 気管支痙攣 (術中) [静脈内], 蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む) [▲筋肉内], 手術後の腹膜癒着防止 [腹腔内]</p> <p>(18) 整形外科疾患: 椎間板ヘルニアにおける神経根炎 (根性坐骨神経痛を含む) [硬膜外], 脊髄浮腫 [静脈内, 硬膜外]</p> <p>(19) 産婦人科疾患: 卵管整形術後の癒着防止 [▲筋肉内, 卵管腔内注入]</p> <p>(20) 泌尿器科疾患: 前立腺癌 (他の療法が無効な場合) [▲筋肉内], 陰茎硬結 [▲筋肉内, 局所皮内]</p> <p>(21) 皮膚科疾患: ★湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと, 局注は浸潤, 苔癬化の著しい場合のみとする) [▲筋肉内, 局所皮内], ★痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る. また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい) [▲筋肉内, 局所皮内], 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る) [▲点滴静脈内, ▲筋肉内], ★乾癬及び類症 (尋常性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿疱症, ライター症候群) [▲点滴静脈内, ▲筋肉内], 上記疾患のうち★尋常性乾癬 [局所皮内], ★掌蹠膿疱症 (重症例に限る) [▲筋肉内], ★扁平苔癬 (重症例に限る) [▲筋肉内, 局所皮内], 成年性浮腫性硬化症 [▲筋肉内], 紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る) [▲筋肉内], 粘膜皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮膚症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュット急性陰門潰瘍] [▲点滴静脈内, ▲筋肉内], ★円形脱毛症 (悪性型に限る) [局所皮内], 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡) [▲点滴静脈内, ▲筋肉内], デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む) [▲点滴静脈内, ▲筋肉内], 帯状疱疹 (重症例に限る) [▲筋肉内], ★紅皮症 (ヘブラ紅色秕糠疹を含む) [▲点滴静脈内, ▲筋肉内], ★早期ケロイド及びケロイド防止 [局所皮内], 新生児スクレレーマ [▲筋肉内]</p> <p>(22) 眼科疾患: 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺) [▲静脈内, ▲筋肉内, 結膜下, 球後, 点眼], 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎) [▲静脈内, ▲筋肉内, 結膜下, 球後], 眼科領域の術後炎症 [▲静脈内, ▲筋肉内, 結膜下, 点眼]</p> <p>(23) 耳鼻咽喉科疾患: 急性・慢性中耳炎 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内, 中耳腔内], 滲出性中耳炎・耳管狭窄症 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内, 中耳腔内, 耳管内], メニエル病及びメニエル症候群 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内], 急性感音性難聴 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内], 血管運動 (神経) 性鼻炎 [筋肉内, ネブライザー, 鼻腔内, 鼻甲介内], アレルギー性鼻炎 [筋肉内, ネブライザー, 鼻腔内, 鼻甲介内], 花粉症 (枯草熱) [筋肉内, ネブライザー, 鼻腔内, 鼻甲介内], 副鼻腔炎・鼻茸 [筋肉内, ネブライザー, 鼻腔内, 副鼻腔内, 鼻茸内], 進行性壞疽性鼻炎 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内, ネブライザー, 鼻腔内, 副鼻腔内, 喉頭・気管], 喉頭炎・喉頭浮腫 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内, ネブライザー, 喉頭・気管], 喉頭ポリープ・結節 [▲静脈内, ▲点滴静脈内, ▲筋肉内, ネブライザー, 喉頭・気管], 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内, ネブライザー, 食道], 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 [静脈内, 点滴静脈内, 筋肉内, 軟組織内, 局所皮内, ネブライザー, 鼻腔内, 副鼻腔内, 鼻甲介内, 喉頭・気管, 中耳腔内, 食道]</p> <p>(24) 歯科・口腔外科疾患: 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの) [軟組織内]</p> <p>〈注釈〉(1) □ 中は, 適応に対する注射部位又は投与法を示す. (2) ▲印の附されている注射部位又は投与法に対しては, 以下のような条件でのみ使用できるものを</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>示す(その事由がなくなった場合は,速やかに他の投与方法にきりかえること). 1) [▲静脈内] 及び [▲点滴静脈内] の場合:経口投与不能時,緊急時及び筋肉内注射不適時. 2) [▲筋肉内] の場合:経口投与不能時. (3) ★印の附されている適応に対しては,外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることとされたものを示す</p> <p>【用】 (注) [投与量はデキサメタゾンとして] 静注・筋注:1回1.65~6.6mg, 3~6時間毎. 点滴静注:1回1.65~8.3mg, 1日1~2回. 関節腔内注射:1回0.66~4.1mg (投与間隔を2週間以上とすること). 軟組織内注射:1回1.65~5.0mg (投与間隔を2週間以上とすること). 腱鞘内注射:1回0.66~2.1mg (投与間隔を2週間以上とすること). 滑液嚢内注入:1回0.66~4.1mg (投与間隔を2週間以上とすること). 硬膜外注射:1回1.65~8.3mg (投与間隔を2週間以上とすること). 脊髄腔内注入:1回0.83~4.1mg, 週1~3回. 胸腔内注入:1回0.83~4.1mg, 週1~3回. 腹腔内注入:1回1.65mg. 局所皮内注射:1回0.04~0.08mg宛0.83mgまで週1回, 生理食塩液で4倍に希釈して0.05~0.1mLを用いる. 卵管腔内注入:1回0.33~0.83mg. 注腸:1回0.33~5.0mg. 結膜下注射:1回0.33~2.1mg, その液量は0.2~0.5mL. 球後注射:1回0.83~4.1mg, その液量は0.5~1.0mL. 点眼:1回0.21~0.83mg/mL溶液1~2滴を1日3~8回, 4~16倍の生理食塩液希釈液を点眼. ネブライザー:1回0.08~1.65mg, 1日1~3回, 生理食塩液で10倍に希釈して0.25~5mLを用いる. 鼻腔内注入・副鼻腔内注入:1回0.08~1.65mg, 1日1~3回. 鼻甲介内注射・鼻茸内注射:1回0.66~4.1mg. 喉頭・気管注入・中耳腔内注入・耳管内注入:1回0.08~1.65mg, 1日1~3回. 食道注入:1回0.83~1.65mg. [多発性骨髄腫に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法] ピンクリスチン硫酸塩, ドキソルピシン塩酸塩との併用において, 1日量デキサメタゾンを33mgとし, 21日から28日を1クールとして, 第1日目から第4日目, 第9日目から第12日目, 第17日目から第20日目に, 点滴静注. [抗悪性腫瘍剤(シスプラチンなど)投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)] 1日3.3~16.5mgを, 1日1回又は2回に分割して静注又は点滴静注(16.5mgまで)</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>トリアムシノロンアセトニド ケナコルトー A 筋注用関節腔内 用水懸注 40mg/1mL Kenacort-A (ブリストル・マイヤーズ) 40mg1mL/V 【薬価】 785.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 <筋肉内注射> 慢性副腎皮質機能不全 (原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性), ※副腎性器症候群, ※亜急性甲状腺炎, ※甲状腺中毒症 [甲状腺 (中毒性) クリーゼ]. 関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む), リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む), リウマチ性多発筋痛, エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状), 全身性血管炎 (高動脈炎, 結節性多発動脈炎, 顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症を含む), 多発性筋炎 (皮膚筋炎), ※強皮症. ※ネフローゼ及びネフローゼ症候群. ※うっ血性心不全. 気管支喘息 (但し, 筋肉内注射以外の投与方法では不適當な場合に限る), ※薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹, 中毒疹を含む), ※血清病. ※重症感染症 (化学療法と併用する). ※溶血性貧血 (免疫性又は免疫性機序の疑われるもの), ※白血病 (急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病) (皮膚白血病を含む), ※顆粒球減少症 (本態性, 続発性), ※紫斑病 (血小板減少性及び血小板非減少性), ※再生不良性貧血, ※凝固因子の障害による出血性素因, ※限局性腸炎, ※潰瘍性大腸炎, ※重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期, スプルーを含む). ※肝硬変 (活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの). ※脳脊髄炎 (脳炎, 脊髄炎を含む) (但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること), ※末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む), ※重症筋無力症, ※多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む), ※小舞蹈病, ※顔面神経麻痺, ※脊髄蜘蛛膜炎, ※悪性リンパ腫 (リンパ肉腫症, 細網肉腫症, ホジキン病, 皮膚細網症, 菌状息肉症) 及び類似疾患 (近縁疾患), ※好酸性肉芽腫, ※乳癌の再発転移. ※特発性低血糖症. 副腎摘除, ※臓器・組織移植, ※副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲. ※蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む). 強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎), ※卵管整形術後の癒着防止. ※前立腺癌 (他の療法が無効な場合). ★※湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと), ★※痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る. また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい), ※蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), ★※乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群], ★※掌蹠膿疱症 (重症例に限る), ★※扁平苔癬 (重症例に限る), ※成年性浮腫性硬化症, ※紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), ※粘膜炎皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍], 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), ※デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), ※帯状疱疹 (重症例に限る), ★※紅皮症 (ヘブラ紅色枇糠疹を含む). ※内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), ※外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎). ※急性・慢性中耳炎, ※滲出性中耳炎・耳管狭窄症, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 喉頭炎・喉頭浮腫, ※喉頭ポリープ・結節, ※食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法. 口腔外科領域手術後の後療法</p> <p><関節腔内注射> 関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む). 強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎) に伴う四肢関節炎, 変形性関節症 (炎症症状がはっきり認められる場合), 外傷後関節炎, 非感染性慢性関節炎</p> <p><軟組織内注射> 関節周囲炎 (非感染性のものに限る), 腱炎 (非感染性のものに限る), 腱周囲炎 (非感染性のものに限る). 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法. 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの)</p> <p><腱鞘内注射> 関節周囲炎 (非感染性のものに限る), 腱炎 (非感染性のものに限る), 腱鞘炎 (非感染性のものに限る), 腱周囲炎 (非感染性のものに限る)</p> <p><滑液嚢内注入> 関節周囲炎 (非感染性のものに限る), 腱周囲炎 (非感染性のものに限る), 滑液包炎 (非感染性のものに限る)</p> <p><ネブライザー> 気管支喘息, びまん性間質性肺炎 (肺線維症) (放射線肺炎炎を含む). アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 喉頭炎・喉頭浮腫, 喉頭ポリープ・結節, 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術</p>

24. ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>後，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 〈鼻腔内注入〉アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），副鼻腔炎・鼻茸，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 〈副鼻腔内注入〉副鼻腔炎・鼻茸，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 〈鼻甲介内注射〉アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 〈鼻茸内注射〉副鼻腔炎・鼻茸 〈喉頭・気管注入〉喉頭炎・喉頭浮腫，喉頭ポリープ・結節，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 〈中耳腔内注入〉急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 〈耳管内注入〉滲出性中耳炎・耳管狭窄症 〈食道注入〉食道の炎症（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）及び食道拡張術後，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法 ※印 経口投与不能時にのみ用いること ★印 外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること 【用】（注）筋注：1回20～80mgを1～2週おき．関節腔内注射・軟組織内注射・腱鞘内注射・滑液嚢内注入：1回2～40mg．投与間隔を2週間以上とする．ネブライザー：1回2～10mgを1日1～3回．鼻腔内注入・副鼻腔内注入・喉頭・気管注入・中耳腔内注入・耳管内注入：1回2～10mgを1日1～3回．鼻甲介内注射・鼻茸内注射：1回2～40mg．食道注入：1回2mg</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベタメタゾン リンデロン錠 0.5mg Rinderon 0.5mg/T 【薬価】 10.80 円 / T (塩野義)	<p>【効】 ①内科・小児科領域</p> <p>(1) 内分泌疾患：慢性副腎皮質機能不全（原発性，続発性，下垂体性，医原性），急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ），副腎性器症候群，亜急性甲状腺炎，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症，ACTH 単独欠損症，下垂体抑制試験</p> <p>(2) リウマチ疾患：関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病を含む），リウマチ熱（リウマチ性心炎を含む），リウマチ性多発筋痛</p> <p>(3) 膠原病：エリテマトーデス（全身性及び慢性円板状），全身性血管炎（大動脈炎症候群，結節性動脈周囲炎，多発性動脈炎，ヴェゲナ肉芽腫症を含む），多発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症</p> <p>(4) 腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候群</p> <p>(5) 心疾患：うっ血性心不全</p> <p>(6) アレルギー性疾患：気管支喘息，喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含む），薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を含む），血清病</p> <p>(7) 重症感染症：重症感染症（化学療法と併用する）</p> <p>(8) 血液疾患：溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の疑われるもの），白血病（急性白血病，慢性骨髄性白血病の急性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性及び血小板非減少性），再生不良性貧血，凝固因子の障害による出血性素因</p> <p>(9) 消化器疾患：限局性腸炎，潰瘍性大腸炎</p> <p>(10) 重症消耗性疾患：重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルーを含む）</p> <p>(11) 肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症とみなされるものを含む），胆汁うっ滞型急性肝炎，慢性肝炎（活動型，急性再燃型，胆汁うっ滞型）（但し，一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る），肝硬変（活動型，難治性腹水を伴うもの，胆汁うっ滞を伴うもの）</p> <p>(12) 肺疾患：サルコイドーシス（但し，両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く），びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）</p> <p>(13) 結核性疾患（抗結核剤と併用する）：肺結核（粟粒結核，重症結核に限る），結核性髄膜炎，結核性胸膜炎，結核性腹膜炎，結核性心嚢炎</p> <p>(14) 神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること），末梢神経炎（ギランバレー症候群を含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症（視束脊髄炎を含む），小舞蹈病，顔面神経麻痺，脊髄蜘蛛膜炎</p> <p>(15) 悪性腫瘍：悪性リンパ腫（リンパ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン病，皮膚細網症，菌状息肉症）及び類似疾患（近縁疾患），好酸性肉芽腫，乳癌の再発転移</p> <p>(16) その他の内科的疾患：特発性低血糖症，原因不明の発熱</p> <p>②外科領域：副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）</p> <p>③整形外科領域：強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）</p> <p>④産婦人科領域：卵管整形術後の癒着防止，副腎皮質機能障害による排卵障害</p> <p>⑤泌尿器科領域：前立腺癌（他の療法が無効な場合），陰茎硬結</p> <p>⑥皮膚科領域：△印の付されている効能・効果に対しては，外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合のみ用いること。△湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼辺の湿疹・皮膚炎等）（但し，重症例以外は極力投与しないこと），△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を含む）（但し，重症例に限る。また，固定蕁麻疹は局注が望ましい），蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る），△乾癬及び類症〔尋常性乾癬（重症例），乾癬性関節炎，乾癬性紅皮症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚炎，疱疹状膿痂疹，ライター症候群〕，△類乾癬（重症例に限る），△掌蹠膿疱症（重症例に限る），△毛孔性紅色秕糠疹（重症例に限る），△扁平苔癬（重症例に限る），成年性浮腫性硬化症，紅斑疹〔△多形滲出性紅斑（重症例に限る），結節性紅斑〕，アナフィラクトイド紫斑（単純型，シェーンライン型，ヘノッホ型）（重症例に限る），ウェーバークリスチャン病，皮膚粘膜眼症候群〔開口部びらん性外皮症，ステブンス・ジョンソン病，皮膚口内炎，フックス症候群，ペーチェット病（眼症状のない場合），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕，レイノー病，△円形脱毛症（悪性型に限る），天疱瘡群（尋常性天疱瘡，落葉状天疱瘡，Senear-Usher 症候群，増殖性天疱瘡），</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), △紅皮症 (ヘブラ紅色秕糠疹を含む), 顔面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状秕糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレーマ</p> <p>⑦眼科領域: 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎), 眼科領域の術後炎症</p> <p>⑧耳鼻咽喉科領域: 急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症候群, 急性感音性難聴, 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 進行性壊疽性鼻炎, 喉頭炎・喉頭浮腫, 喉頭ポリープ・結節, 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法, 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの), 嗅覚障害, 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎</p> <p>【用】 (内) 1日 0.5～8mgを1～4回に分割</p>
<p>ベタメタゾン リンデロン坐剤 1.0mg Rinderon (塩野義) 1mg/個 【薬価】 61.30円/個</p>	<p>【効】 潰瘍性大腸炎 (直腸炎型)</p> <p>【用】 (外) 1日初期投与量 0.5～2.0mgを1～2回に分割し直腸内に挿入</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム <u>リンデロン注 2mg (0.4%)</u> Rinderon (塩野義) 2mg0.5mL/A 【薬価】 169.00 円/A <u>リンデロン注 4mg (0.4%)</u> Rinderon (塩野義) 4mg1mL/A 【薬価】 272.00 円/A	<p>【効】 ☆印の付されている投与法は以下のような条件でのみ使用できる。(その事由がなくなった場合は、速やかに他の投与法に切り替えること)。1. 静注及び点滴静注：経口投与不能時、緊急時及び筋注不適時。2. 筋注：経口投与不能時。</p> <p>①内科・小児科領域。(1) 内分泌疾患。1) 慢性副腎皮質機能不全(原発性、続発性、下垂体性、医原性)。用法：筋注。2) 急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)。用法：静注、点滴静注、筋注。3) 副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症。用法：筋注☆。4) 甲状腺中毒症(甲状腺(中毒性)クリーゼ)。用法：静注、点滴静注、筋注☆。(2) リウマチ疾患。1) 関節リウマチ、若年性関節リウマチ(スチル病を含む)。用法：筋注、関節腔内注射。2) リウマチ熱(リウマチ性心炎を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注。3) リウマチ性多発筋痛。用法：筋注。(3) 膠原病。1) エリテマトーデス(全身性及び慢性円板状)、全身性血管炎(高安動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症を含む)、多発性筋炎(皮膚筋炎)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注。2) 強皮症。用法：筋注☆。(4) 腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候群。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。(5) 心疾患：うっ血性心不全。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。(6) アレルギー性疾患。1) 気管支喘息(但し、筋注は他の投与法では不適当な場合に限る)。用法：静注、点滴静注、筋注、ネブライザー。2) 喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む)。用法：筋注☆、ネブライザー。3) 喘息発作重症状態、アナフィラキシーショック。用法：静注、点滴静注。4) 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒(薬疹、中毒疹を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。5) 血清病。用法：静注、点滴静注、筋注☆。(7) 重症感染症：重症感染症(化学療法と併用する)。用法：静注、点滴静注、筋注☆。(8) 血液疾患。1) 溶血性貧血(免疫性又は免疫性機序の疑われるもの)、白血病(急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病)(皮膚白血病を含む)、顆粒球減少症(本態性、続発性)、紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性)、再生不良性貧血、凝固因子の障害による出血性素因。用法：静注、点滴静注、筋注☆。2) 髄膜白血病。用法：脊髄腔内注入。(9) 消化器疾患：局限性腸炎、潰瘍性大腸炎。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆、注腸。(10) 重症消耗性疾患：重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期、スプルーを含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。(11) 肝疾患。1) 劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む)。用法：静注、点滴静注、筋注☆。2) 胆汁うっ滞型急性肝炎。用法：点滴静注☆、筋注☆。3) 肝硬変(活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの)。用法：筋注☆。(12) 肺疾患：びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、ネブライザー。(13) 結核性疾患(抗結核剤と併用する)。1) 結核性髄膜炎。用法：脊髄腔内注入。2) 結核性胸膜炎。用法：胸腔内注入。(14) 神経疾患。1) 脳脊髄炎(脳炎、脊髄炎を含む)(但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)、重症筋無力症、多発性硬化症(視束脊髄炎を含む)。用法：静注、点滴静注、筋注☆、脊髄腔内注入。2) 末梢神経炎(ギランバレー症候群を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆、脊髄腔内注入。3) 小舞蹈病、顔面神経麻痺、脊髄蜘蛛膜炎。用法：筋注☆。(15) 悪性腫瘍。1) 悪性リンパ腫(リンパ肉腫症、細網肉腫症、ホジキン病、皮膚細網症、菌状息肉症)及び類似疾患(近縁疾患)。用法：静注、点滴静注、筋注☆、脊髄腔内注入。2) 好酸性肉芽腫。用法：静注、点滴静注、筋注☆。3) 乳癌の再発転移。用法：筋注☆。(16) その他の内科的疾患。1) 特発性低血糖症。用法：静注、点滴静注、筋注☆。2) 原因不明の発熱。用法：筋注☆</p> <p>②外科領域。(1) 副腎摘除。用法：静注、点滴静注、筋注。(2) 臓器・組織移植、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲、蛇毒・昆虫毒(重症の虫さされを含む)。用法：筋注☆。(3) 侵襲後肺水腫。用法：静注、ネブライザー。(4) 外科的ショック及び外科的ショック様状態、脳浮腫、輸血による副作用、気管支痙攣(術中)。用法：静注</p> <p>③整形外科領域。(1) 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)。用法：筋注。(2) 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)に伴う四肢関節炎、変形性関節症(炎症症状がはっきり認められる場合)、外傷後関節炎、非感染性慢性関節炎、痛風性関節炎。用法：関節腔内注射。(3) 関節周囲炎(非感染性のものに限る)、腱周囲炎(非感染性のものに限る)。用法：軟組織内注射、腱鞘内注射、滑液嚢内注入。(4) 腱炎(非感染性のものに限る)。用法：軟組織内注射、腱鞘内注射。(5) 腱鞘炎(非感染性のものに限る)。用法：腱鞘内注射。(6) 滑液包炎(非感染性のものに限る)。用法：滑液嚢内注入。</p> <p>④産婦人科領域。(1) 卵管閉塞症(不妊症)に対する通水療法。用法：卵管腔内注</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>入。(2) 卵管整形術後の癒着防止。用法：筋注☆，卵管腔内注入。(3) 副腎皮質機能障害による排卵障害。用法：筋注☆。(4) 早産が予期される場合における，母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制。用法：筋注☆。</p> <p>⑤泌尿器科領域：前立腺癌（他の療法が無効な場合），陰茎硬結。用法：筋注☆。</p> <p>⑥皮膚科領域。△印の付されている効能・効果に対しては，外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合のみ用いること。(1) △湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（但し，重症例以外は極力投与しないこと）。△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を含む）（但し，重症例に限る。また，固定蕁麻疹は局注が望ましい）。△類乾癬（重症例に限る），△掌蹠膿疱症（重症例に限る），△毛孔性紅色秕糠疹（重症例に限る），成年性浮腫性硬化症，紅斑疹〔△多形滲出性紅斑（重症例に限る），結節性紅斑〕，レイノー病，先天性表皮水疱症，帯状疱疹（重症例に限る），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例に限る），潰瘍性慢性膿皮症，新生児スクレレマ。用法：筋注☆。(2) 蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る），△乾癬及び類乾癬〔尋常性乾癬（重症例），乾癬性関節炎，乾癬性紅皮症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚炎，疱疹状膿疱症，ライター症候群〕，アナフィラクトイド紫斑（単純型，シェーンライン型，ヘノッホ型）（重症例に限る），ウェーバークリスチャン病，皮膚粘膜眼症候群〔開口部びらん性外皮症，スチブンス・ジョンソン病，皮膚口内炎，フックス症候群，ベーチェット病（眼症状のない場合），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕，天疱瘡群（尋常性天疱瘡，落葉状天疱瘡，Senear-Usher 症候群，増殖性天疱瘡），デューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡，妊娠性疱疹を含む），△紅皮症（ヘブラ紅色秕糠疹を含む）。用法：点滴静注☆，筋注☆。</p> <p>⑦眼科領域。(1) 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部症候群，眼筋麻痺）。用法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，球後注射，点眼。(2) 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎）。用法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，球後注射。(3) 眼科領域の術後炎症。用法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，点眼</p> <p>⑧耳鼻咽喉科領域。(1) 急性・慢性中耳炎。用法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆，中耳腔内注入。(2) 滲出性中耳炎・耳管狭窄症。用法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆，中耳腔内注入，耳管内注入。(3) メニエル病及びメニエル症候群，急性感音性難聴，口腔外科領域手術後の後療法。用法：静注，点滴静注，筋注。(4) 血管運動（神経）性鼻炎，アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱）。用法：筋注，ネブライザー，鼻腔内注入，鼻甲介内注射。(5) 副鼻腔炎・鼻茸。用法：筋注，ネブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，鼻茸内注射。(6) 進行性壊疽性鼻炎。用法：静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，喉頭・気管注入。(7) 喉頭炎・喉頭浮腫。用法：静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，喉頭・気管注入。(8) 喉頭ポリープ・結節。用法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，喉頭・気管注入。(9) 食道の炎症（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）及び食道拡張術後。用法：静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，食道注入。(10) 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法。用法：静注，点滴静注，筋注，軟組織内注射，ネブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，鼻甲介内注射，喉頭・気管注入，中耳腔内注入，食道注入。(11) 難治性口内炎及び舌炎（局所療法で治癒しないもの）。用法：軟組織内注射。(12) 嗅覚障害。用法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，鼻腔内注入。(13) 急性・慢性（反復性）唾液腺炎。用法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆，唾液腺管内注入</p> <p>【用】（注）静注：1回2～8mgを3～6時間ごと。点滴静注：1回2～10mgを1日1～2回。筋注：1回2～8mgを3～6時間ごと，母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制に用いる場合，早産が予期される妊娠34週までの妊婦に対し，1回12mgを24時間ごとに計2回。関節腔内注射：1回1～5mg，投与間隔を2週間以上とすること。軟組織内注射：1回1～5mg，投与間隔を2週間以上とすること。腱鞘内注射：1回1～5mg，投与間隔を2週間以上とすること。滑液嚢内注入：1回1～5mg，投与間隔を2週間以上とすること。脊髄腔内注入：1回1～5mgを週1～3回。胸腔内注入：1回1～5mgを週1～3回。卵管腔内注入：1回0.4～1mg。注腸：1回0.4～6mg。結膜下注射：1回0.4～2mg，その際の液量は0.2～0.5mlとする。球後注射：1回0.8～4mg，その際の液量は0.5～1.0mlとする。点眼：1</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	回 0.25 ～ 1mg/mL 溶液 1 ～ 2 滴を 1 日 3 ～ 8 回. ネブライザー：1 回 0.1 ～ 2mg を 1 日 1 ～ 3 回. 鼻腔内注入：1 回 0.1 ～ 2mg を 1 日 1 ～ 3 回. 副鼻腔内注入：1 回 0.1 ～ 2mg を 1 日 1 ～ 3 回. 鼻甲介内注射：1 回 1 ～ 5mg. 鼻茸内注射：1 回 1 ～ 5mg. 喉頭・気管注入：1 回 0.1 ～ 2mg を 1 日 1 ～ 3 回. 中耳腔内注入：1 回 0.1 ～ 2mg を 1 日 1 ～ 3 回. 耳管内注入：1 回 0.1 ～ 2mg を 1 日 1 ～ 3 回. 食道注入：1 回 1 ～ 2mg. 唾液腺管内注入：1 回 0.5 ～ 1mg

2456. プレドニゾン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>プレドニゾン プレドニゾン散「タケダ」1% Prednisolone (武田) 10mg/g 【薬価】 6.50 円/g</p>	<p>【効】 ○慢性副腎皮質機能不全 (原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性), 急性副腎皮質機能不全 (副腎クリーゼ), 副腎性器症候群, 亜急性甲状腺炎, 甲状腺中毒症 [甲状腺 (中毒性) クリーゼ], 甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症, ACTH 単独欠損症 ○関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む), リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む), リウマチ性多発筋痛 ○エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状), 全身性血管炎 (高安動脈炎, 結節性多発動脈炎, 顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症を含む), 多発性筋炎 (皮膚筋炎), 強皮症 ○川崎病の急性期 (重症であり, 冠動脈障害の発生の危険がある場合) ○ネフローゼ及びネフローゼ症候群 ○うっ血性心不全 ○気管支喘息, 喘息性気管支炎 (小児喘息性気管支炎を含む), 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹, 中毒疹を含む), 血清病 ○重症感染症 (化学療法と併用する) ○溶血性貧血 (免疫性又は免疫性機序の疑われるもの), 白血病 (急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病) (皮膚白血病を含む), 顆粒球減少症 (本態性, 続発性), 紫斑病 (血小板減少性及び血小板非減少性), 再生不良性貧血, 凝固因子の障害による出血性素因 ○限局性腸炎, 潰瘍性大腸炎 ○重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期, スプルーを含む) ○劇症肝炎 (臨床的に重症とみなされるものを含む), 胆汁うっ滞型急性肝炎, 慢性肝炎 (活動型, 急性再燃型, 胆汁うっ滞型) (但し, 一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る), 肝硬変 (活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの) ○サルコイドーシス (但し, 両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く), びまん性間質性肺炎 (肺線維症) (放射線肺臓炎を含む) ○肺結核 (粟粒結核, 重症結核に限る) (抗結核剤と併用する), 結核性髄膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性胸膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性腹膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性心嚢炎 (抗結核剤と併用する) ○脳脊髄炎 (脳炎, 脊髄炎を含む) (但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること), 末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む), 筋強直症, 重症筋無力症, 多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む), 小舞蹈病, 顔面神経麻痺, 脊髄蜘蛛膜炎, デュシェンヌ型筋ジストロフィー ○悪性リンパ腫及び類似疾患 (近縁疾患), 多発性骨髄腫, 好酸性肉芽腫, 乳癌の再発転移 ○特発性低血糖症 ○原因不明の発熱 ○副腎摘除, 臓器・組織移植, 侵襲後肺水腫, 副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲 ○蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む) ○強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎) ○卵管整形術後の癒着防止, 副腎皮質機能障害による排卵障害 ○前立腺癌 (他の療法が無効な場合), 陰茎硬結 ○★湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと), ★痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る。また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい), 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), ★乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿疱疹, ライター症候群], ★掌蹠膿疱症 (重症例に限る), ★毛孔性紅色秕糠疹 (重症例に限る), ★扁平苔癬 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), IgA 血管炎 (重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮膚症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュツ急性陰門潰瘍], レイノー病, ★円形脱毛症 (悪性型に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), ★紅皮症 (ヘブラ紅色靴糠疹を含む), 顔面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状靴糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレーマ</p> <p>○内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎), 眼科領域の術後炎症</p> <p>○急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症候群, 急性感音性難聴, 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 進行性壊疽性鼻炎, 喉頭炎・喉頭浮腫, 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法, 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの)</p> <p>○嗅覚障害, 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎.</p> <p>注) ★印の附されている適応に対しては, 外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることを示す</p> <p>【用】 (内) 1日5～60mgを1～4回に分割. 悪性リンパ腫に用いる場合: 抗悪性腫瘍剤との併用で, 1日量100mg/m² (体表面積) まで投与できる. 川崎病の急性期に用いる場合: 1日2mg/kg (最大60mg) を3回に分割</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>プレドニゾロン プレドニゾロン錠 1mg (旭化成) Prednisolone (旭化成) 1mg/T 【薬価】 8.30 円 /T</p>	<p>【効】 ○内科・小児科領域</p> <p>4.1 内分泌疾患：慢性副腎皮質機能不全（原発性，続発性，下垂体性，医原性），急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ），副腎性器症候群，亜急性甲状腺炎，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症，ACTH 単独欠損症</p> <p>4.2 リウマチ疾患：関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病を含む），リウマチ熱（リウマチ性心炎を含む），リウマチ性多発筋痛</p> <p>4.3 膠原病：エリテマトーデス（全身性及び慢性円板状），全身性血管炎（高安動脈炎，結節性多発動脈炎，顕微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症を含む），多発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症</p> <p>4.4 川崎病の急性期（重症であり，冠動脈障害の発生の危険がある場合）</p> <p>4.5 腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候群</p> <p>4.6 心疾患：うっ血性心不全</p> <p>4.7 アレルギー性疾患：気管支喘息，喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含む），薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を含む），血清病</p> <p>4.8 重症感染症：重症感染症（化学療法と併用する）</p> <p>4.9 血液疾患：溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の疑われるもの），白血病（急性白血病，慢性骨髄性白血病の急性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性及び血小板非減少性），再生不良性貧血，凝固因子の障害による出血性素因</p> <p>4.10 消化器疾患：限局性腸炎，潰瘍性大腸炎</p> <p>4.11 重症消耗性疾患：重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルーを含む）</p> <p>4.12 肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症とみなされるものを含む），胆汁うっ滞型急性肝炎，慢性肝炎（活動型，急性再燃型，胆汁うっ滞型）（但し，一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る），肝硬変（活動型，難治性腹水を伴うもの，胆汁うっ滞を伴うもの）</p> <p>4.13 肺疾患：サルコイドーシス（但し，両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く），びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）</p> <p>4.14 結核性疾患（抗結核剤と併用する） 肺結核（粟粒結核，重症結核に限る），結核性髄膜炎，結核性胸膜炎，結核性腹膜炎，結核性心臓のう炎</p> <p>4.15 神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること），末梢神経炎（ギランバレー症候群を含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症（視束脊髄炎を含む），小舞蹈病，顔面神経麻痺，脊髄蜘蛛膜炎，デュシェンヌ型筋ジストロフィー</p> <p>4.16 悪性腫瘍：悪性リンパ腫及び類似疾患（近縁疾患），多発性骨髄腫，好酸性肉芽腫，乳癌の再発転移</p> <p>4.17 その他の内科的疾患：特発性低血糖症，原因不明の発熱</p> <p>○外科領域 副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）</p> <p>○整形外科領域 強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）</p> <p>○産婦人科領域 卵管整形術後の癒着防止，副腎皮質機能障害による排卵障害</p> <p>○泌尿器科領域 前立腺癌（他の療法が無効な場合），陰茎硬結</p> <p>○皮膚科領域 △印の付されている効能・効果に対しては，外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること。 △湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ピダール苔癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周囲の湿疹・皮膚炎など）（但し，重症例以外は極力投与しないこと），△痒疹群（小児ストロフルス，尋麻疹様苔癬，固定尋麻疹を含む）（但し，重症例に限る。また，固定尋麻疹は局注が望ましい），尋麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る），△乾癬及び類症〔尋常</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群, △掌蹠膿疱症 (重症例に限る), △毛孔性紅色秕糠疹 (重症例に限る), △扁平苔癬 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (△多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), IgA 血管炎 (重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍], レイノー病, △円形脱毛症 (悪性型に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Seneary-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), △紅皮症 (ヘブラ紅色秕糠疹を含む), 顔面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状秕糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレーマ</p> <p>○眼科領域 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎), 眼科領域の術後炎症</p> <p>○耳鼻咽喉科領域 急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症候群, 急性感音性難聴, 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 進行性壞疽性鼻炎, 喉頭炎・喉頭浮腫, 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法, 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの), 嗅覚障害, 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎</p> <p>【用】 (内) 1日 5～60mg を 1～4 回に分割. 悪性リンパ腫に用いる場合: 抗悪性腫瘍剤との併用で, 1日量 100mg/m² (体表面積) まで投与できる. 川崎病の急性期に用いる場合: 1日 2mg/kg (最大 60mg) を 3 回に分割</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>プレドニゾロン プレドニゾロン錠「タケダ」5mg Prednisolone (武田) 5mg/T 【薬価】 9.80 円 /T</p>	<p>【効】 ○慢性副腎皮質機能不全 (原発性, 続発性, 下垂体性, 医原性), 急性副腎皮質機能不全 (副腎クリーゼ), 副腎性器症候群, 亜急性甲状腺炎, 甲状腺中毒症 [甲状腺 (中毒性) クリーゼ], 甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症, ACTH 単独欠損症 ○関節リウマチ, 若年性関節リウマチ (スチル病を含む), リウマチ熱 (リウマチ性心炎を含む), リウマチ性多発筋痛 ○エリテマトーデス (全身性及び慢性円板状), 全身性血管炎 (高安動脈炎, 結節性多発動脈炎, 顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症を含む), 多発性筋炎 (皮膚筋炎), 強皮症 ○川崎病の急性期 (重症であり, 冠動脈障害の発生の危険がある場合) ○ネフローゼ及びネフローゼ症候群 ○うっ血性心不全 ○気管支喘息, 喘息性気管支炎 (小児喘息性気管支炎を含む), 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒 (薬疹, 中毒疹を含む), 血清病 ○重症感染症 (化学療法と併用する) ○溶血性貧血 (免疫性又は免疫性機序の疑われるもの), 白血病 (急性白血病, 慢性骨髄性白血病の急性転化, 慢性リンパ性白血病) (皮膚白血病を含む), 顆粒球減少症 (本態性, 続発性), 紫斑病 (血小板減少性及び血小板非減少性), 再生不良性貧血, 凝固因子の障害による出血性素因 ○限局性腸炎, 潰瘍性大腸炎 ○重症消耗性疾患の全身状態の改善 (癌末期, スプルーを含む) ○劇症肝炎 (臨床的に重症とみなされるものを含む), 胆汁うっ滞型急性肝炎, 慢性肝炎 (活動型, 急性再燃型, 胆汁うっ滞型) (但し, 一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る), 肝硬変 (活動型, 難治性腹水を伴うもの, 胆汁うっ滞を伴うもの) ○サルコイドーシス (但し, 両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く), びまん性間質性肺炎 (肺線維症) (放射線肺臓炎を含む) ○肺結核 (粟粒結核, 重症結核に限る) (抗結核剤と併用する), 結核性髄膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性胸膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性腹膜炎 (抗結核剤と併用する), 結核性心嚢炎 (抗結核剤と併用する) ○脳脊髄炎 (脳炎, 脊髄炎を含む) (但し, 一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ, かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること), 末梢神経炎 (ギランバレー症候群を含む), 筋強直症, 重症筋無力症, 多発性硬化症 (視束脊髄炎を含む), 小舞蹈病, 顔面神経麻痺, 脊髄蜘蛛膜炎, デュシェンヌ型筋ジストロフィー ○悪性リンパ腫及び類似疾患 (近縁疾患), 多発性骨髄腫, 好酸性肉芽腫, 乳癌の再発転移 ○特発性低血糖症 ○原因不明の発熱 ○副腎摘除, 臓器・組織移植, 侵襲後肺水腫, 副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲 ○蛇毒・昆虫毒 (重症の虫さされを含む) ○強直性脊椎炎 (リウマチ性脊椎炎) ○卵管整形術後の癒着防止, 副腎皮質機能障害による排卵障害 ○前立腺癌 (他の療法が無効な場合), 陰茎硬結 ○★湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感作性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと), ★痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る。また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい), 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), ★乾癬及び類症 [尋常性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群], ★掌蹠膿疱症 (重症例に限る), ★毛孔性紅色秕糠疹 (重症例に限る), ★扁平苔癬 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (★多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), IgA 血管炎 (重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍], レイノー病, ★円形脱毛症 (悪性型に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), ★紅皮症 (ヘブラ紅色 秕糠疹を含む), 顔面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及び その類症 (急性痘瘡様苔癬状秕糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレー マ</p> <p>○内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外 眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎), 眼科領域の術後炎症</p> <p>○急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症候群, 急性感音性難聴, 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 進行性壊疽性鼻炎, 喉頭炎・喉頭浮腫, 食道の炎症 (腐蝕性食道 炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法, 難治性 口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの)</p> <p>○嗅覚障害, 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎.</p> <p>注) ★印の附されている適応に対しては, 外用剤を用いても効果が不十分な場合あ るいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることを示す</p> <p>【用】 (内) 1日 5～60mgを 1～4回に分割. 悪性リンパ腫に用いる場合: 抗悪性腫 瘍剤との併用で, 1日量 100mg/m² (体表面積) まで投与できる. 川崎病の急性期 に用いる場合: 1日 2mg/kg (最大 60mg) を 3回に分割</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>プレドニゾロン プレドニゾロン錠 5mg (旭化成) (院外) Prednisolone (旭化成) 5mg/T 【薬価】 9.80 円 / T</p>	<p>【効】 ○内科・小児科領域</p> <p>4.1 内分泌疾患：慢性副腎皮質機能不全（原発性，続発性，下垂体性，医原性），急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ），副腎性器症候群，亜急性甲状腺炎，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症，ACTH 単独欠損症</p> <p>4.2 リウマチ疾患：関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病を含む），リウマチ熱（リウマチ性心炎を含む），リウマチ性多発筋痛</p> <p>4.3 膠原病：エリテマトーデス（全身性及び慢性円板状），全身性血管炎（高安動脈炎，結節性多発動脈炎，顕微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症を含む），多発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症</p> <p>4.4 川崎病の急性期（重症であり，冠動脈障害の発生の危険がある場合）</p> <p>4.5 腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候群</p> <p>4.6 心疾患：うっ血性心不全</p> <p>4.7 アレルギー性疾患：気管支喘息，喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含む），薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を含む），血清病</p> <p>4.8 重症感染症：重症感染症（化学療法と併用する）</p> <p>4.9 血液疾患：溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の疑われるもの），白血病（急性白血病，慢性骨髄性白血病の急性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性及び血小板非減少性），再生不良性貧血，凝固因子の障害による出血性素因</p> <p>4.10 消化器疾患：限局性腸炎，潰瘍性大腸炎</p> <p>4.11 重症消耗性疾患：重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルーを含む）</p> <p>4.12 肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症とみなされるものを含む），胆汁うっ滞型急性肝炎，慢性肝炎（活動型，急性再燃型，胆汁うっ滞型）（但し，一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る），肝硬変（活動型，難治性腹水を伴うもの，胆汁うっ滞を伴うもの）</p> <p>4.13 肺疾患：サルコイドーシス（但し，両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く），びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）</p> <p>4.14 結核性疾患（抗結核剤と併用する） 肺結核（粟粒結核，重症結核に限る），結核性髄膜炎，結核性胸膜炎，結核性腹膜炎，結核性心臓炎</p> <p>4.15 神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること），末梢神経炎（ギランバレー症候群を含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症（視束脊髄炎を含む），小舞蹈病，顔面神経麻痺，脊髄蜘蛛膜炎，デュシェンヌ型筋ジストロフィー</p> <p>4.16 悪性腫瘍：悪性リンパ腫及び類似疾患（近縁疾患），多発性骨髄腫，好酸性肉芽腫，乳癌の再発転移</p> <p>4.17 その他の内科的疾患：特発性低血糖症，原因不明の発熱</p> <p>○外科領域 副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）</p> <p>○整形外科領域 強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）</p> <p>○産婦人科領域 卵管整形術後の癒着防止，副腎皮質機能障害による排卵障害</p> <p>○泌尿器科領域 前立腺癌（他の療法が無効な場合），陰茎硬結</p> <p>○皮膚科領域 △印の付されている効能・効果に対しては，外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること。 △湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ピダール苔癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周囲の湿疹・皮膚炎など）（但し，重症例以外は極力投与しないこと），△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を含む）（但し，重症例に限る。また，固定蕁麻疹は局注が望ましい），蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る），△乾癬及び類症〔尋常</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>性乾癬 (重症例), 乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群, △掌蹠膿疱症 (重症例に限る), △毛孔性紅色秕糠疹 (重症例に限る), △扁平苔癬 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (△多形滲出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る), IgA 血管炎 (重症例に限る), ウェーバークリスチャン病, 粘膜皮膚眼症候群 [開口部びらん性外皮症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ベーチェット病 (眼症状のない場合), リップシュッツ急性陰門潰瘍], レイノー病, △円形脱毛症 (悪性型に限る), 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), 先天性表皮水疱症, 帯状疱疹 (重症例に限る), △紅皮症 (ヘブラ紅色秕糠疹を含む), 顔面播種状粟粒性狼瘡 (重症例に限る), アレルギー性血管炎及びその類症 (急性痘瘡様苔癬状秕糠疹を含む), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレーマ</p> <p>○眼科領域 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺), 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎), 眼科領域の術後炎症</p> <p>○耳鼻咽喉科領域 急性・慢性中耳炎, 滲出性中耳炎・耳管狭窄症, メニエル病及びメニエル症候群, 急性感音性難聴, 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱), 副鼻腔炎・鼻茸, 進行性壞疽性鼻炎, 喉頭炎・喉頭浮腫, 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後, 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法, 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの), 嗅覚障害, 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎</p> <p>【用】 (内) 1日 5～60mg を 1～4 回に分割. 悪性リンパ腫に用いる場合: 抗悪性腫瘍剤との併用で, 1日量 100mg/m² (体表面積) まで投与できる. 川崎病の急性期に用いる場合: 1日 2mg/kg (最大 60mg) を 3 回に分割</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>プレドニゾンコハク酸エステル ナトリウム 水溶性プレドニン 20mg Predonine (塩野義) 20mg/A 【薬価】 244.00 円 / A</p>	<p>【効】 ☆印の付されている投与法は以下のような条件でのみ使用できる。(その事由がなくなった場合は、速やかに他の投与法に切り替えること。) 1. 静注及び点滴静注：経口投与不能時、緊急時及び筋注不適時。2. 筋注：経口投与不能時</p> <p>①内科・小児科領域。(1) 内分泌疾患。1) 慢性副腎皮質機能不全(原発性、続発性、下垂体性、医原性)。用法：筋注。2) 急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)。用法：静注、点滴静注、筋注。3) 副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症、ACTH 単独欠損症。用法：筋注☆。4) 甲状腺中毒症〔甲状腺(中毒性)クリーゼ〕。用法：静注、点滴静注、筋注☆。(2) リウマチ疾患。1) 関節リウマチ、若年性関節リウマチ(ステル病を含む)。用法：筋注、関節腔内注射。2) リウマチ熱(リウマチ性心炎を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注。3) リウマチ性多発筋痛。用法：筋注。(3) 膠原病。1) エリテマトーデス(全身性及び慢性円板状)、全身性血管炎(高安動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症を含む)、多発性筋炎(皮膚筋炎)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注。2) 強皮症。用法：筋注☆。(4) 川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合)。用法：静注。(5) 腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候群。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。(6) 心疾患：うっ血性心不全。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。(7) アレルギー性疾患。1) 気管支喘息(但し、筋注は他の投与法では不適當な場合に限る)。用法：静注、点滴静注、筋注、ネブライザー。2) 喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む)。用法：筋注☆、ネブライザー。3) 喘息発作重積状態、アナフィラキシーショック。用法：静注、点滴静注。4) 薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒(薬疹、中毒疹を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。5) 血清病。用法：静注、点滴静注、筋注☆。(8) 重症感染症：重症感染症(化学療法と併用する)。用法：静注、点滴静注、筋注☆。(9) 血液疾患。1) 溶血性貧血(免疫性又は免疫性機序の疑われるもの)、白血病(急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病)(皮膚白血病を含む)、顆粒球減少症(本態性、続発性)、紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性)、再生不良性貧血、凝固因子の障害による出血性素因。用法：静注、点滴静注、筋注☆。2) 白血病(急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病)(皮膚白血病を含む)のうち髄膜白血病。用法：脊髄腔内注入。(10) 消化器疾患：限局性腸炎、潰瘍性大腸炎。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆、注腸。(11) 重症消耗性疾患：重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期、スブルーを含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆。(12) 肝疾患。1) 劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む)。用法：静注、点滴静注、筋注☆。2) 胆汁うっ滞型急性肝炎。用法：点滴静注☆、筋注☆。3) 肝硬変(活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの)。用法：筋注☆。(13) 肺疾患：びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、ネブライザー。(14) 結核性疾患(抗結核剤と併用する)。1) 結核性髄膜炎。用法：脊髄腔内注入。2) 結核性胸膜炎。用法：胸腔内注入。(15) 神経疾患。1) 脳脊髄炎(脳炎、脊髄炎を含む)(但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)、重症筋無力症。用法：静注、点滴静注、筋注☆、脊髄腔内注入。2) 多発性硬化症(視束脊髄炎を含む)。用法：静注、点滴静注、筋注、脊髄腔内注入。3) 末梢神経炎(ギランバレー症候群を含む)。用法：静注☆、点滴静注☆、筋注☆、脊髄腔内注入。4) 小舞蹈病、顔面神経麻痺、脊髄蜘蛛膜炎。用法：筋注☆。(16) 悪性腫瘍。1) 悪性リンパ腫(リンパ肉腫症、細網肉腫症、ホジキン病、皮膚細網症、菌状息肉症)及び類似疾患(近縁疾患)。用法：静注、点滴静注、筋注☆、脊髄腔内注入。2) 好酸性肉芽腫。用法：静注、点滴静注、筋注☆。3) 乳癌の再発転移。用法：筋注☆。(17) その他の内科的疾患。1) 特発性低血糖症。用法：静注、点滴静注、筋注☆。2) 原因不明の発熱。用法：筋注☆</p> <p>②外科領域。(1) 副腎摘除。用法：静注、点滴静注、筋注。(2) 臓器・組織移植、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲、蛇毒・昆虫毒(重症の虫さされを含む)。用法：筋注☆。(3) 侵襲後肺水腫。用法：静注、ネブライザー。(4) 外科的ショック及び外科的ショック様状態、脳浮腫、輸血による副作用、気管支痙攣(術中)。用法：静注</p> <p>③整形外科領域。(1) 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)。用法：筋注。(2) 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)に伴う四肢関節炎、変形性関節症(炎症症状がはっきり認められる場合)、非感染性慢性関節炎、痛風性関節炎。用法：関節腔内注射。(3) 関節周囲炎(非感染性のものに限る)、腱周囲炎(非感染性のものに限る)。用法：軟組織内注射、腱鞘内注射、滑液嚢内注入。(4) 腱炎(非感染性のものに限る)。用法：軟組織内注射、腱鞘内注射。(5) 腱鞘炎(非感染性のものに限る)。用法：</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p> 腱鞘内注射。(6) 滑液包炎 (非感染性のものに限る)。用法:滑液嚢内注入。(7) 脊髄浮腫。用法:静注 ④産婦人科領域。(1) 卵管閉塞症 (不妊症) に対する通水療法。用法:卵管腔内注入。(2) 卵管整形術後の癒着防止。用法:筋注☆, 卵管腔内注入。(3) 副腎皮質機能障害による排卵障害。用法:筋注☆。 ⑤泌尿器科領域。(1) 前立腺癌 (他の療法が無効な場合)。用法:筋注☆。(2) 陰茎硬結。用法:筋注☆, 局所皮内注射 ⑥皮膚科領域。△印の付されている効能・効果に対しては、外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合のみ用いること。(1) △湿疹・皮膚炎群 (急性湿疹, 亜急性湿疹, 慢性湿疹, 接触皮膚炎, 貨幣状湿疹, 自家感受性皮膚炎, アトピー皮膚炎, 乳・幼・小児湿疹, ビダール苔癬, その他の神経皮膚炎, 脂漏性皮膚炎, 進行性指掌角皮症, その他の手指の皮膚炎, 陰部あるいは肛門湿疹, 耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎, 鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等) (但し, 重症例以外は極力投与しないこと, 局注は浸潤, 苔癬化の著しい場合のみとする)。△痒疹群 (小児ストロフルス, 蕁麻疹様苔癬, 固定蕁麻疹を含む) (但し, 重症例に限る。また, 固定蕁麻疹は局注が望ましい)。用法:筋注☆, 局所皮内注射。(2) 蕁麻疹 (慢性例を除く) (重症例に限る), △乾癬及び類症 (乾癬性関節炎, 乾癬性紅皮症, 膿疱性乾癬, 稽留性肢端皮膚炎, 疱疹状膿痂疹, ライター症候群), 皮膚粘膜眼症候群 [開口部びらん性外皮膚症, スチブンス・ジョンソン病, 皮膚口内炎, フックス症候群, ペーチュット病 (眼症状のない場合), リップシュット急性陰門潰瘍], 天疱瘡群 (尋常性天疱瘡, 落葉状天疱瘡, Senear-Usher 症候群, 増殖性天疱瘡), デューリング疱疹状皮膚炎 (類天疱瘡, 妊娠性疱疹を含む), △紅皮症 (ヘブラ紅色靴糠疹を含む)。用法:点滴静注☆, 筋注☆。(3) △尋常性乾癬 (重症例)。用法:点滴静注☆, 筋注☆, 局所皮内注射。(4) △毛孔性紅色靴糠疹 (重症例に限る), 成年性浮腫性硬化症, 紅斑症 (△多形渗出性紅斑, 結節性紅斑) (但し, 多形渗出性紅斑の場合は重症例に限る), レイノー病, 帯状疱疹 (重症例に限る), 潰瘍性慢性膿皮症, 新生児スクレレマ。用法:筋注☆。(5) △円形脱毛症 (悪性型に限る), △早期ケロイド及びケロイド防止。用法:局所皮内注射。 ⑦眼科領域。(1) 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法 (ブドウ膜炎, 網脈絡膜炎, 網膜血管炎, 視神経炎, 眼窩炎性偽腫瘍, 眼窩漏斗尖端部症候群, 眼筋麻痺)。用法:静注☆, 筋注☆, 結膜下注射, 球後注射, 点眼。(2) 外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合 (眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 虹彩毛様体炎)。用法:静注☆, 筋注☆, 結膜下注射, 球後注射。(3) 眼科領域の術後炎症。用法:静注☆, 筋注☆, 結膜下注射, 点眼。 ⑧耳鼻咽喉科領域。(1) 急性・慢性中耳炎。用法:静注☆, 点滴静注☆, 筋注☆, 中耳腔内注入。(2) 滲出性中耳炎・耳管狭窄症。用法:静注☆, 点滴静注☆, 筋注☆, 中耳腔内注入, 耳管内注入。(3) 急性感音性難聴, 口腔外科領域手術後の後療法。用法:静注, 点滴静注, 筋注。(4) 血管運動 (神経) 性鼻炎, アレルギー性鼻炎, 花粉症 (枯草熱)。用法:筋注, ネブライザー, 鼻腔内注入, 鼻甲介内注射。(5) 副鼻腔炎・鼻茸。用法:筋注, ネブライザー, 鼻腔内注入, 副鼻腔内注入, 鼻茸内注射。(6) 進行性壊疽性鼻炎。用法:静注, 点滴静注, 筋注, ネブライザー, 鼻腔内注入, 副鼻腔内注入, 喉頭・気管注入。(7) 喉頭炎・喉頭浮腫。用法:静注, 点滴静注, 筋注, ネブライザー, 喉頭・気管注入。(8) 喉頭ポリープ・結節。用法:静注☆, 点滴静注☆, 筋注☆, ネブライザー, 喉頭・気管注入。(9) 食道の炎症 (腐蝕性食道炎, 直達鏡使用後) 及び食道拡張術後。用法:静注, 点滴静注, 筋注, ネブライザー, 食道注入。(10) 耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法。用法:静注, 点滴静注, 筋注, 軟組織内注射, 局所皮内注射, ネブライザー, 鼻腔内注入, 副鼻腔内注入, 鼻甲介内注射, 喉頭・気管注入, 中耳腔内注入, 食道注入。(11) 難治性口内炎及び舌炎 (局所療法で治癒しないもの)。用法:軟組織内注射。(12) 嗅覚障害。用法:静注☆, 点滴静注☆, 筋注☆, ネブライザー, 鼻腔内注入。(13) 急性・慢性 (反復性) 唾液腺炎。用法:静注☆, 点滴静注☆, 筋注☆, 唾液腺管内注入 【用】 (注) 静注:1回 10~50mgを3~6時間ごと。川崎病の急性期に用いる場合, 1日 2mg/kg (最大 60mg) を3回に分割静注。点滴静注:1回 20~100mgを1日 1~2回。筋注:1回 10~50mgを3~6時間ごと。関節腔内注射:1回 4~30mg。投与間隔を2週間以上とすること。軟組織内注射:1回 4~30mg。投与間隔を2週間以上とすること。腱鞘内注射:1回 4~30mg。投与間隔を2週間以上とすること。滑液嚢内注入:1回 4~30mg。投与間隔を2週間以上とすること。脊髄腔内注入:1回 5mgを週 2~3回。胸腔内注入:1回 5~25mgを週 1~2回。局所皮内注射:1 </p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	<p>回0.1～0.4mgずつ4mgまでを週1回、卵管腔内注入：2～5mg、注腸：2～30mg、結膜下注射：1回2.5～10mg、その際の液量は0.2～0.5mLとする、球後注射：1回5～20mg、その際の液量は0.5～1.0mLとする、点眼：1回1.2～5mg/mL溶液1～2滴を1日3～8回、ネブライザー：1回2～10mgを1日1～3回、鼻腔内注入：1回2～10mgを1日1～3回、副鼻腔内注入：1回2～10mgを1日1～3回、鼻甲介内注射：1回4～30mg、鼻茸内注射：1回4～30mg、喉頭・気管注入：1回2～10mgを1日1～3回、中耳腔内注入：1回2～10mgを1日1～3回、耳管内注入：1回2～10mgを1日1～3回、食道注入：1回2.5～5mg、唾液腺管内注入：1回1～2mg、前記用量は適宜増減。(川崎病の急性期に用いる場合を除く)</p>
<p>メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム ソル・メドロール静注用 40mg Solu medrol (ファイザー) 40mg/瓶 【薬価】 286.00円/瓶 ソル・メドロール静注用 125mg Solu medrol (ファイザー) 125mg/瓶 【薬価】 605.00円/瓶 ソル・メドロール静注用 500mg Solu medrol (ファイザー) 500mg/瓶 【薬価】 1,716.00円/瓶 ソル・メドロール静注用 1000mg Solu medrol (ファイザー) 1000mg/瓶 【薬価】 3,009.00円/瓶</p>	<p>【効】 [本剤40・125・500・1000] ①急性循環不全：出血性ショック、感染性ショック、②腎臓移植に伴う免疫反応の抑制、③受傷後8時間以内の急性脊髄損傷患者(運動機能障害及び感覚機能障害を有する場合)における神経機能障害の改善、④ネフローゼ症候群、⑤多発性硬化症の急性増悪、⑥治療抵抗性の下記リウマチ性疾患：全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、及び難治性リウマチ性疾患、⑦川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合) [本剤40・125] ⑧気管支喘息。 [本剤40・125・500] ⑨以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：再発又は難治性の悪性リンパ腫 【用】(注) ①出血性ショック：1回125～2000mgを緩徐に静注又は点滴静注、症状が改善しない場合は適宜追加、感染性ショック：1回1000mgを緩徐に静注又は点滴静注、症状が改善しない場合は1000mgを追加、②1日40～1000mgを緩徐に静注又は点滴静注、③受傷後8時間以内に30mg/kgを15分間かけて点滴静注、45分間休薬後、5.4mg/kg/時間を23時間点滴静注、④1日500～1000mgを緩徐に静注又は点滴静注、小児：1日30mg/kg(最大1000mg)を緩徐に静注又は点滴静注、⑤1日500～1000mgを緩徐に静注又は点滴静注、⑥1日500～1000mgを緩徐に静注又は点滴静注、小児：1日30mg/kgを緩徐に静注又は点滴静注、1日1000mgまで、⑦1日1回30mg/kg(最大1000mg)を、患者の状態に応じて1～3日間点滴静注、⑧初回量40～125mgを緩徐に静注又は点滴静注、その後40～80mgを4～6時間ごとに緩徐に追加、小児：1.0～1.5mg/kgを緩徐に静注又は点滴静注、その後1.0～1.5mg/kgを4～6時間ごとに緩徐に追加、⑨他の抗悪性腫瘍剤との併用において、250～500mgを1日1回5日間、緩徐に静注又は点滴静注、これを1コースとして3～4週ごとに繰り返す</p>

2459. その他の副腎ホルモン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>セレスタミン配合錠 (院外) Celestamine (高田) 1錠 【薬価】 8.00円/T 1錠中： ベタメタゾン 0.25mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg 後エンペラシン配合錠 Emperacin (沢井) 1錠 【薬価】 5.70円/T 【先発品】 セレスタミン配合錠 1錠中： ベタメタゾン 0.25mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg</p>	<p>【効】 蕁麻疹(慢性例を除く)、湿疹・皮膚炎群の急性期及び急性増悪期、薬疹、アレルギー性鼻炎 【用】(内) 1回1～2錠を1日1～4回</p>

246. 男性ホルモン剤

2461. テストステロン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テストステロンエナント酸エステル <u>エンアルモンデポー筋注 250mg</u> Enarmon depot (武田) 250mg1mL/A 【薬価】 1,297.00 円/A	【効】 ①男子性腺機能不全 (類宦官症). ②造精機能障害による男子不妊症. ③再生不良性貧血, 骨髄線維症, 腎性貧血 【用】 (注) ① 1回 100mgを7～10日間ごとに, 又は1回 250mgを2～4週間ごとに筋注. ② 1回 50～250mgを2～4週間ごとに無精子状態になるまで筋注. ③ 1回 100～250mgを1～2週間ごとに筋注

247. 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

2473. エストラジオール系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エストラジオール <u>エストラーナテープ 0.72mg</u> Estrana (久光) 0.72mg/1枚 (9cm ²) 【薬価】 79.30 円/枚	【効】 ①更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う次記症状: 血管運動神経症状 (Hot flush 及び発汗), 泌尿生殖器の萎縮症状. ②閉経後骨粗鬆症. ③性腺機能低下症, 性腺摘出又は原発性卵巣不全による低エストロゲン症. ④凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期. ⑤生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 【用】 (外) ①② 0.72mg (1枚)を下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替える. ③ 0.72mgから開始する. 下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替える. 小児: 0.09mgから開始. 下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替える. その後, 0.18mg, 0.36mg, 0.72mgへ段階的に増量. ④ 0.72～5.76mgを下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替え, 子宮内膜の十分な肥厚が得られた時点で, 黄体ホルモン剤の併用を開始して, 妊娠8週まで本剤の投与を継続. ⑤ 0.72mgを下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 21～28日間, 2日毎に貼り替え, 投与期間の後半に黄体ホルモン剤を併用
エストラジオール <u>ジュリナ錠 0.5mg (院外)</u> Julina (バイエル) 0.5mg/T 【薬価】 43.70 円/T	【効】 ①更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う次記症状: 血管運動神経系症状 (Hot flush 及び発汗), 腔萎縮症状. ②閉経後骨粗鬆症. ③生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整. ④凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期 【用】 (内) ① 1日1回 0.5mg, 1日1回 1.0mgまで. ② 1日1回 1.0mg. ③ 1日1回 0.5又は1.0mgを21～28日間投与し, 投与期間の後半に黄体ホルモン剤を併用. ④ 1日0.5～4.5mgを投与, 子宮内膜の十分な肥厚が得られた時点で, 黄体ホルモン剤の併用を開始して, 妊娠8週まで投与を継続. 1回投与量は2.0mgを超えない
エストラジオール <u>ディビゲル 1mg (院外)</u> Divigel (サンファーマ) 1mg/包 【薬価】 36.60 円/包	【効】 ①更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経症状 (Hot flush 及び発汗). ②生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整. ③凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期 【用】 (外) ① 1mgを1日1回左右いずれかの大腿部もしくは下腹部に, 約400cm ² の範囲に塗布. ② 1mgを1日1回, 21～28日間, 左右いずれかの大腿部もしくは下腹部に, 約400cm ² の範囲に塗布, 投与期間の後半に黄体ホルモン剤を併用. ③ 1mgを2～4包 (2.0～4.0g)を1日2回左右いずれかの大腿部もしくは下腹部に, 1包あたり約400cm ² の範囲に塗布, 子宮内膜の十分な肥厚が得られた時点で, 黄体ホルモン剤の併用を開始, 妊娠8週まで本剤の投与を継続
エストラジオール吉草酸エステル <u>プロギノン・デポー筋注 10mg</u> Progynon depot (富士製薬) 10mg/管 【薬価】 310.00 円/A	【効】 無月経, 月経周期異常 (稀発月経, 多発月経), 月経量異常 (過少月経, 過多月経), 月経困難症, 機能性子宮出血, 子宮発育不全症, 卵巣欠落症状, 更年期障害, 不妊症 【用】 (注) 1回 5～10mgを1～4週間毎に筋注

2475. エストリオール系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エストリオール <u>ホーリン錠 1mg</u> Holin (あすか) 1mg/T 【薬価】 12.50 円/T	【効】 ①更年期障害, 腔炎 (老人, 小児及び非特異性), 子宮頸管炎並びに子宮腔部びらん. ②老人性骨粗鬆症 【用】 (内) ① 1回 0.1～1.0mgを1日1～2回. ② 1回 1.0mgを1日2回

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

2478. 合成黄体ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロルマジノン酢酸エステル <u>プロスタール錠 25 (院外)</u> Prostal (あすか) 25mg/T 【薬価】 41.10 円 /T ② <u>クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「YD」</u> Chlormadinone acetate (日本ジェネリック) 25mg/T 【薬価】 11.40 円 /T 【先発品】 プロスタール錠 25	【効】 ①前立腺肥大症。②前立腺癌 (但し、転移のある前立腺癌症例に対しては、他療法による治療の困難な場合に使用する) 【用】 (内) ① 1回 25mgを 1日 2回食後。② 1回 50mgを 1日 2回食後
ジドロゲステロン <u>デュファストン錠 5mg (院外)</u> Duphaston (マイラン EPD) 5mg/T 【薬価】 27.10 円 /T	【効】 ①切迫流早産、習慣性流早産、無月経、月経周期異常 (稀発月経、多発月経) 又は生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整、月経困難症、機能性子宮出血、黄体機能不全による不妊症、子宮内膜症。②調節卵巣刺激下における早発排卵の防止。③生殖補助医療における黄体補充 【用】 (内) ① 1日 5～15mgを 1～3回に分割。子宮内膜症には 1日 5～20mg。② 月経周期 2～5日目より 1日 20mgを 1又は 2回。③ 1回 10mgを 1日 3回
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル <u>プロベラ錠 2.5mg (院外)</u> Provera (ファイザー) 2.5mg/T 【薬価】 18.80 円 /T	【効】 無月経、月経周期異常 (稀発月経、多発月経)、月経量異常 (過少月経、過多月経)、機能性子宮出血、黄体機能不全による不妊症、切迫流早産、習慣性流早産 【用】 (内) 1日 2.5～15mgを 1～3回に分割
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル <u>ヒスロンH錠 200mg (院外)</u> Hysron H (協和キリン) 200mg/T 【薬価】 124.20 円 /T	【効】 ①乳癌。②子宮体癌 (内膜癌) 【用】 (内) ① 1日 600～1200mgを 3回に分割。② 1日 400～600mgを 2～3回に分割

2479. その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
結合型エストロゲン <u>プレマリン錠 0.625mg (院外)</u> Premarin (ファイザー) 0.625mg/T 【薬価】 28.40 円 /T	【効】 ①卵巣欠落症状。②卵巣機能不全症。③更年期障害。④腔炎 (老人、小児及び非特異性)。⑤機能性子宮出血 【用】 (内) 1日 0.625～1.25mg。機能性子宮出血又は腔炎に対しては、1日 0.625～3.75mg

248. 混合ホルモン剤

2481. 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<u>プリモジアン・デポー筋注</u> Primodian depot (富士製薬) 1mL/管 【薬価】 530.00 円 /A 1管 1mL中： テストステロンエナント酸エステル 90.2mg エストラジオール吉草酸エステル 4mg	【効】 更年期障害、卵巣欠落症状、骨粗鬆症 【用】 (注) 2～4週ごとに 1回 1mLを筋注

2482. 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プラノバル配合錠 (院外) Planovar (あすか) 1錠 【薬価】 13.50 円 / T 1錠中： ノルゲストレル 0.5mg エチニルエストラジオール 0.05mg	【効】 ①機能性子宮出血. ②月経困難症, 月経周期異常 (稀発月経, 頻発月経) 又は生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整, 過多月経, 子宮内膜症, 卵巣機能不全 【用】 (内) ① 1日1錠を7～10日間連続投与. ② 1日1錠を月経周期第5日より約3週間連続投与
メノエイドコンビパッチ (院外) Menoaid (あすか) 枚 【薬価】 247.50 円 / 枚 1枚 (9 cm ²) 中： エストラジオール 0.62mg 酢酸ノルエチステロン 2.70mg	【効】 更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経系症状 (Hot flush 及び発汗) 【用】 (外) 1枚を3～4日ごとに1回 (週2回) 下腹部に貼付
ルテストデポー注 (クリニックのみ) Lutes (持田) 1mL / 管 【薬価】 329.00 円 / A 1管 1mL 中： ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg エストラジオール安息香酸エステル 10mg	【効】 機能性子宮出血 【用】 (注) 1回 1mL を筋注
ルナベル配合錠 LD (院外) Lunabell LD (日本新薬) 【薬価】 151.10 円 / T 1錠中： ノルエチステロン 1mg エチニルエストラジオール 0.035mg ルナベル配合錠 ULD (院外) Lunabell ULD (日本新薬) 1錠 【薬価】 170.80 円 / T 1錠中： ノルエチステロン 1mg エチニルエストラジオール 0.02mg	【効】 ①月経困難症. ②生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 【用】 (内) ① 1日1錠を毎日一定の時刻に21日間投与し, その後7日間休薬. 以上28日間を投与1周期とし, 出血が終わっているか続いているかにかかわらず, 29日目から次の周期の錠剤を投与し, 以後同様に繰り返す. ② 1日1錠を毎日一定の時刻に, 14～21日間投与
ヤーズフレックス配合錠 (院外) Yaz Flex (バイエル) 1錠 【薬価】 280.10 円 / T 1錠中： ドロスピレノン 3mg エチニルエストラジオールベータデクスとして エチニルエストラジオール 0.020mg	【効】 ①子宮内膜症に伴う疼痛の改善. ②月経困難症. ③生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 【用】 (内) ① 1日1錠. 24日目までは出血の有無にかかわらず連続投与. 25日目以降に3日間連続で出血 (点状出血を含む) が認められた場合又は連続投与が120日に達した場合は, 4日間休薬. 休薬後は出血が終わっているか続いているかにかかわらず, 連続投与を開始. 以後同様に連続投与と休薬を繰り返す. ②次記のいずれかを選択. ・1日1錠. 24日目までは出血の有無にかかわらず連続投与. 25日目以降に3日間連続で出血 (点状出血を含む) が認められた場合又は連続投与が120日に達した場合は4日間休薬. 休薬後は出血が終わっているか続いているかにかかわらず, 連続投与を開始. 以後同様に連続投与と休薬を繰り返す. ・1日1錠を24日間連続経口投与し4日間休薬. 以上28日間を投与1周期とし, 出血が終わっているか続いているかにかかわらず, 29日目から次の周期の錠剤を投与し, 以後同様に繰り返す. ③ 1日1錠を, 14～28日間連続投与

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

249. その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

2491. 循環ホルモン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カリジノゲナーゼ ② 後カリジノゲナーゼ錠 50 単位 「NIG」 Kallidinogenase (武田) 50 単位 / T 【薬価】 10.30 円 / T 【先発品】 カルナクリン錠 50	【効】 ①次記疾患における末梢循環障害の改善：高血圧症，メニエール症候群，閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病），②次記症状の改善：更年期障害，網脈絡膜の循環障害 【用】 (内) 1 日 30 ～ 150 単位を 1 日 3 回に分割

2492. すい臓ホルモン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インスリンアスパルト (遺伝子組換え) ② 後インスリンアスパルト BS 注ソロスター NR 「サノフィ」 ㊟ Insulin aspart BS (サノフィ) 300 単位 / キット 【薬価】 1,248.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 持続型インスリン製剤と併用する超速効型インスリンアナログ製剤，初期は 1 回 2 ～ 20 単位を毎食直前に皮下注，持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 4 ～ 100 単位
インスリングルラルギン (遺伝子組換え) ② 後インスリングルラルギン BS 注ミリオベン 「リリー」 ㊟ Insulin glargine BS (日本イーライリリー) 300 単位 3mL / キット 【薬価】 1,095.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 初期は 1 日 1 回 4 ～ 20 単位を皮下注，ときに他のインスリン製剤を併用，注射時刻は朝食前又は就寝前のいずれでもよいが，毎日一定とする，投与量は，患者の症状及び検査所見に応じて増減する，その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は，通常 1 日 4 ～ 80 単位，必要により上記用量を超えて使用することがある
インスリングルラルギン (遺伝子組換え) ② 後ランタス XR 注ソロスター ㊟ Lantus (サノフィ) 450 単位 1.5mL / キット 【薬価】 2,078.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 初期は 1 日 1 回 4 ～ 20 単位を皮下注，ときに他のインスリン製剤を併用，注射時刻は毎日一定とする，投与量は患者の症状及び検査所見に応じて増減，その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 4 ～ 80 単位，必要により上記用量を超えて使用することがある
インスリンデグルデク (遺伝子組換え) ② 後トレスィバ注フレックスタッチ ㊟ Tresiba (ノボノルディスク) 300 単位 3mL / キット 【薬価】 1,976.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 初期は 1 日 1 回 4 ～ 20 単位を皮下注，注射時刻は毎日一定とする，他のインスリン製剤を併用することがあるが，他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は，1 日 4 ～ 80 単位，必要により上記用量を超えて使用することがある，注射時刻は原則として毎日一定とするが，必要な場合は注射時刻を変更できる，小児：1 日 1 回皮下注射，注射時刻は毎日一定，他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は，1 日 0.5 ～ 1.5 単位 / kg，必要により上記用量を超えて使用することがある
インスリンリスプロ (遺伝子組換え) ② 後インスリンリスプロ BS 注ソロスター HU 「サノフィ」 ㊟ Insulin lispro (サノフィ) 300 単位 / キット 【薬価】 956.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 1 回 2 ～ 20 単位を毎食直前に皮下注射，ときに回数を増やしたり，持続型インスリン製剤と併用したりすることがある，持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては 1 日 4 ～ 100 単位

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インスリンリスプロ (遺伝子組換え) <u>ヒューマログミックス 50 注ミリオペン</u> (株) Humalog (日本イーライリリー) 300 単位 3mL/ キット 【薬価】 1,218.00 円/ キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 超速効型インスリンアナログであるインスリンリスプロと中間型インスリンリスプロを 50 : 50 の割合で含有する混合製剤。1 回 4 ~ 20 単位を 1 日 2 回、朝食直前と夕食直前に皮下注。投与回数増減可、その場合においても食直前に投与。1 日 1 回投与の時は朝食直前に皮下注。維持量としては 1 日 4 ~ 80 単位
インスリンリスプロ (遺伝子組換え) <u>ルムジェブ注ミリオペン</u> (株) Lyumjev (日本イーライリリー) 300 単位 / キット 【薬価】 1,305.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 1 回 2 ~ 20 単位を毎食事開始時に皮下注、必要な場合は食事開始後の投与とすることもできる。ときに投与回数を増やしたり、持続型インスリン製剤と併用したりすることがある。持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては 1 日 4 ~ 100 単位
グルカゴン <u>バクスマー一点鼻粉末剤 3mg</u> (株) Baqsimi (日本イーライリリー) 3mg / 瓶 【薬価】 8,368.60 円 / 瓶	【効】 低血糖時の救急処置 【用】 (外) 1 回 3mg を鼻腔内に投与
ヒトインスリン (遺伝子組換え) <u>イノレット 30R 注【経過措置】 (院外)</u> (株) InnoLet 30R (ノボノルディスク) 300 単位 3mL/ 筒 【薬価】 1,411.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 速効型インスリンと中間型インスリンを 3 : 7 の割合で含有する混合製剤である。1 回 4 ~ 20 単位を 1 日 2 回、朝食前と夕食前 30 分以内に皮下注。1 日 1 回投与のときは朝食前に皮下注。維持量は 1 日 4 ~ 80 単位。必要により上記用量を超えて使用することがある
ヒトインスリン (遺伝子組換え) <u>ノボリン R 注 100 単位 / mL</u> (株) Novolin R (ノボノルディスク) 1000 単位 10mL/V 【薬価】 264.00 円 / mLV	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 初期は 1 回 4 ~ 20 単位を毎食前に皮下注、ときに回数を増やしたり、他のインスリン製剤を併用。維持量は 1 日 4 ~ 100 単位。糖尿病昏睡には、必要に応じ皮下、筋注、静注又は持続静注を行う
ヒトインスリン (遺伝子組換え) <u>ノボリン R 注フレックスペン</u> (株) Novolin R (ノボノルディスク) 300 単位 / 本 【薬価】 1,296.00 円 / キット	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 持続型インスリン製剤と併用する速効型インスリン製剤。毎食前に 2 ~ 20 単位を皮下注。持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 4 ~ 100 単位
<u>ライゾデグ配合注フレックススタツチ</u> (株) Ryzodeg (ノボノルディスク) 300 単位 / キット 【薬価】 1,781.00 円 / キット 1 筒 (3mL) 中： インスリンデグルデク (遺伝子組換え) 210 単位 インスリンアスパルト (遺伝子組換え) 90 単位	【効】 インスリン療法が適応となる糖尿病 【用】 (注) 超速効型インスリン (インスリン アスパルト) と持効型インスリン (インスリン デグルデク) を 3 : 7 のモル比で含有する溶解インスリン製剤。初期は 1 回 4 ~ 20 単位を 1 日 1 ~ 2 回皮下注。1 日 1 回投与のときは、主たる食事の直前に投与し、毎日一定とする。1 日 2 回投与のときは、朝食直前と夕食直前に投与。維持量は通常 1 日 4 ~ 80 単位。必要により上記用量を超えて使用することがある

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

2499. 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>オクトレオチド酢酸塩 <u>後オクトレオチド酢酸塩皮下注</u> <u>100μg「サンド」(院内)</u> ㉞ Octreotide acetate (サンド) 100μg/管 【薬価】 724.00 円/A 【先発品】 サンドスタチン皮下注 用 100μg</p>	<p>【効】 ①次記疾患に伴う諸症状の改善：消化管ホルモン産生腫瘍（VIP 産生腫瘍，カルチノイド症候群の特徴を示すカルチノイド腫瘍，ガストリン産生腫瘍），次記疾患における成長ホルモン，ソマトメジン-C 分泌過剰状態及び諸症状の改善：先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置，他剤による治療で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合），②進行・再発癌患者の緩和医療における消化管閉塞に伴う消化器症状の改善，③先天性高インスリン血症に伴う低血糖（他剤による治療で効果が不十分な場合） 【用】(注) ① 1 日量 100 又は 150μg よりはじめ，効果が不十分な場合は 1 日量 300 μg まで漸増し，2～3 回に分割し皮下注．② 1 日量 300μg を 24 時間持続皮下注．③ 1 日量 5μg/kg を，3～4 回に分けて皮下注又は 24 時間持続皮下注．最大投与量は 1 日量 25μg/kg まで</p>
<p>クロミフェンクエン酸塩 <u>クロミッド錠 50mg (院外)</u> Clomid (富士製薬) 50mg/T 【薬価】 92.40 円/T</p>	<p>【効】 ①排卵障害に基づく不妊症の排卵誘発．②乏精子症における精子形成の誘導．③生殖補助医療における調節卵巣刺激 【用】(内) ①無排卵症の患者に対して排卵誘発を試みる場合には，まず Gestagen, Estrogen test を必ず行って，消退性出血の出現を確認し，子宮性無月経を除外した後，開始．第 1 クール 1 日 50mg5 日間で開始し，無効の場合は 1 日 100mg5 日間に増量．1 日 100mg5 日間を限度．② 1 回 50mg を隔日．③ 1 日 50mg を月経周期 3 日目から 5 日間投与．効果が不十分な場合は，次周期以降の用量を 1 日 100mg に増量できる</p>
<p>ゲメプロスト <u>プレグランディン腔坐剤 1mg (院内)</u> ㉞ Preglandin (小野) 1mg/個 【薬価】 3,947.50 円/個</p>	<p>【効】 妊娠中期における治療的流産 【用】(外) 1 回 1mg を 3 時間毎に後陰門蓋部へ挿入．1 日 5mg まで．1 日総量 5mg を投与し，効果の認められない場合は投与を中止し，翌日あるいは以降に再開するか，あるいは他の方法に切り替える．投与開始後，有効陣痛が来ると，子宮内容物の排出が認められたとき，投与を中止</p>
<p>ゴセレリン酢酸塩 <u>ゾラデックス 3.6mg デポ</u> ㉞ Zoladex (アストラゼネカ) 3.6mg/筒 (ゴセレリンとして) 【薬価】 22,661.00 円/筒</p>	<p>【効】 ①前立腺癌．②閉経前乳癌 【用】(注) 3.6mg を前腹部に 4 週 (28 日) ごとに 1 回皮下注</p>
<p>ゴセレリン酢酸塩 <u>ゾラデックス LA10.8mg デポ</u> ㉞ Zoladex LA (アストラゼネカ) 10.8mg/本 (ゴセレリンとして) 【薬価】 37,821.00 円/筒</p>	<p>【効】 ①前立腺癌．②閉経前乳癌 【用】(注) 10.8mg を前腹部に 12～13 週ごとに 1 回皮下注</p>
<p>ジェノゲスト <u>ディナゲスト錠 0.5mg (院外)</u> Dinagest (持田) 0.5mg/T 【薬価】 104.40 円/T</p>	<p>【効】 月経困難症 【用】(内) 1 日 1mg を 2 回に分け，月経周期 2～5 日目より投与</p>
<p>ジェノゲスト <u>ディナゲスト錠 1mg (院外)</u> Dinagest (持田) 1mg/T 【薬価】 124.20 円/T</p>	<p>【効】 子宮内膜症，子宮腺筋症に伴う疼痛の改善 【用】(内) 1 日 2mg を 2 回に分割し，月経周期 2～5 日目より経口投与</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ジノプロスト 【後】ジノプロスト注射液 1000μg[F]  Dinoprost (富士製薬) 1mg1mL/A 【薬価】 232.00 円/A 【先発品】 プロスタルモン・F 注射液 1000</p>	<p>【効】 ①静脈内注射投与：1) 妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進。2) 次記における腸管蠕動亢進：胃腸管の手術における術後腸管麻痺の回復遅延の場合、麻痺性イレウスにおいて他の保存的治療で効果が認められない場合。②卵膜外投与：治療的流産</p> <p>【用】(注) ① 1～2mLを静脈内に点滴又は持続注入。(a) 点滴静注：本剤1mLに5%ブドウ糖注射液又は糖液を加えて500mLに希釈し、0.1μg/kg/分の割合で点滴静注。希釈する輸液の量及び種類は患者の状態に応じて適切に選択。(b) シリンジポンプによる静注(持続注入)：本剤1mLに生理食塩液を加えて50mLに希釈し、0.1μg/kg/分(0.05～0.15μg/kg/分)の割合で静注。2) 1回1,000～2,000μg(本剤1～2mL)を輸液500mLに希釈し、1～2時間(10～20μg/分の投与速度)で1日2回点滴静注。手術侵襲の程度ならびに他の処置などを考慮して慎重に行うこと。3日間投与しても効果が認められないときは直ちに投与を中止し他の療法にきりかえる。</p> <p>②〔妊娠12週以降〕本剤1mLに生理食塩液を加え4mLに希釈し、この液を子宮壁と卵膜の間に数回に分け注入。1) 薬液注入カテーテルの固定：通常フォーリーカテーテルを用いる。カテーテルを子宮頸管を通じ挿入、カテーテルのバルーン部が子宮口を通過して、子宮下部まで到達した後、バルーン部に生理食塩液を充満、内子宮口を閉鎖し、カテーテルの脱出と腔への薬液漏出を防止す。次にカテーテルを大腿部内側へテープで固定する。2) 薬液の注入：(a) 初回量：希釈液(ジノプロスト250μg/mL)1mLを注入し、薬液がカテーテル内に残らないように引き続きカテーテルの内腔量を若干上回る生理食塩液を注入する(通例、16号カテーテルでは約3.5mL)。(b) 2回目以降：2時間ごとに希釈液3～4mL(750～1,000μg)を反復投与するが、初回投与による子宮収縮、その他の反応が強すぎる場合には、次の投与量を2mL(500μg)に減量又は4時間後に投与。(c) 本剤の投与は原則として2時間々隔で行うが、本剤による効果及びその他の反応を観察しながら適宜投与量及び投与間隔を1～4時間の間で調節する。(d) 本投与方法においては薬剤注入の度に、カテーテルの内腔量を若干上回る生理食塩液を引き続き注入することに注意すること。</p> <p>〔妊娠12週未満〕胎状奇胎、合併症で全身麻酔が困難な症例、頸管拡張の困難な症例又はその場合の除去術の前処置に使用する。その際本剤の注入は、硫酸アトロピン、鎮痛剤の投与後、前麻酔効果があらわれてから行うことが望ましい。1) チューブの挿入：通常F4～5号の合成樹脂製の細いチューブを用い、使用前にチューブ内腔に生理食塩液を満たしておく。チューブを鉗子ではさみ、外子宮口より子宮腔内にゆっくりと約7cm位まで挿入する。直視下で薬液の注入を行う以外は、チューブの排出をふせぐためチューブをとりかこむようにガーゼを腔内につめる。注射器をチューブに接続し、チューブを大腿部内側にテープで固定する。2) 薬液の注入：(a) 分割注入法：妊娠12週以降の場合に準じ、本剤1mLに生理食塩液を加え4mLに希釈した液を用い分割注入する。初回量は希釈液1mL(ジノプロスト250μg/mL)を注入し、また薬液がチューブ内に残らないように引き続きチューブ内腔量を若干上回る生理食塩液を注入する。2回目以降の注入は、原則として1時間ごとに希釈液3～4mL(750～1,000μg)を反復投与するが、初回投与による子宮収縮、その他の反応が強すぎる場合には、次の投与量を2mL(500μg)に減量又は投与時間々隔をおくらせる。本剤の投与は原則として総投与量3,000μgとし、また1時間々隔で行うが、本剤による効果及びその他の反応を観察しながら適宜に投与量及び投与時間々隔を調節する。本投与方法においては薬剤注入の度にチューブの内腔量を若干上回る生理食塩液を引き続き注入することに注意する。(b) 一回注入法：通常ジノプロスト1,000μg/mL含有注射剤を希釈しないで、一回に2,000～3,000μg(2～3mL)をゆっくり注入する。本剤による効果及びその反応を観察しながら適宜に投与量を増減する。注入後チューブの内腔量を若干上回る生理食塩液を引き続き注入する。チューブは薬液注入が終了すれば抜きとる</p>
<p>セマグルチド (遺伝子組換え) 【後】オゼンピック皮下注 2mg  Ozempic (ノボノルディスク) 2mg1.5mL/キット 【薬価】 10,879.00 円/キット</p>	<p>【効】 2型糖尿病</p> <p>【用】(注) 週1回0.5mgを維持用量とし、皮下注。週1回0.25mgから開始し、4週間投与した後、週1回0.5mgに増量。週1回0.5mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、週1回1.0mgまで増量可</p>

24. ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>セマグルチド (遺伝子組換え) リベルサス錠 3mg  Rybelsus (ノボノルディスク) 3mg/T 【薬価】 139.60 円/T リベルサス錠 7mg  Rybelsus (ノボノルディスク) 7mg/T 【薬価】 325.70 円/T</p>	<p>【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 1日1回7mgを維持用量とする。1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量。1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量することができる</p>
<p>チルゼパチド マンジャロ皮下注 5mgアテオス  Mounjaro ATEOS (田辺三菱) 5mg/キット 【薬価】 3,848.00 円/キット マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス  Mounjaro ATEOS (田辺三菱) 2.5mg/キット 【薬価】 1,924.00 円/キット</p>	<p>【効】 2型糖尿病 【用】 (注) 週1回5mgを維持用量とし、皮下注。週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量。週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量。最大用量は週1回15mgまで</p>
<p>デガレリクス酢酸塩 ゴナックス皮下注用 80mg  Gonax (アステラス) 80mg/V (溶解液付き) 【薬価】 18,840.00 円/瓶 ゴナックス皮下注用 120mg  Gonax (アステラス) 120mg/V (溶解液付き) 【薬価】 22,899.00 円/瓶</p>	<p>【効】 前立腺癌 【用】 (注) 初回240mgを1カ所あたり120mgずつ腹部2カ所に皮下注。2回目以降は、初回投与4週間後より、維持用量を投与。4週間間隔で投与を繰り返す場合は、80mgを維持用量とし、腹部1カ所に皮下注。12週間間隔で投与を繰り返す場合は、480mgを維持用量、1カ所あたり240mgずつ腹部2カ所に皮下注。 初回投与：1カ所あたり、120mgバイアルに注射用水3.0mLを注入し、溶解後速やかに3.0mLを皮下注。(3.0mLで溶解することにより、40mg/mLとなる。) 維持用量を4週間間隔で投与する場合：80mgバイアルに注射用水4.2mLを注入し、溶解後速やかに4.0mLを皮下注。(4.2mLで溶解することにより、20mg/mLとなる)。 維持用量を12週間間隔で投与する場合：1カ所あたり、240mgバイアルに注射用水4.2mLを注入し、溶解後速やかに4.0mLを皮下注。(4.2mLで溶解することにより、60mg/mLとなる。)</p>
<p>デュタステリド  デュタステリド錠 0.5mgAV 「DSEP」  Dutasteride (第一三共エスファ) 0.5mg/C 【薬価】 29.20 円/T</p>	<p>【効】 前立腺肥大症 【用】 (内) 1回0.5mgを1日1回</p>
<p>デュラグルチド (遺伝子組換え) トルリシティ皮下注 0.75mgアテオス  Trulicity (大日本住友) 0.75mg/キット 【薬価】 2,749.00 円/キット</p>	<p>【効】 2型糖尿病 【用】 (注) 0.75mgを週に1回、皮下注</p>
<p>フィナステリド フィナステリド錠 1mg「VTRS」  Finasteride (ヴィアトリス) 1mg/T</p>	<p>【効】 男性における男性型脱毛症の進行遅延 【用】 (内) 0.2mgを1日1回、1日1mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リュープロレリン酢酸塩 <u>リュープリン注射用 3.75mg</u> (株) Leuplin (武田) 3.75mg/瓶 【薬価】 27,353.00 円 / 瓶	【効】 ①子宮内膜症. ②過多月経, 下腹痛, 腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫における筋腫核の縮小及び症状の改善. ③閉経前乳癌. ④前立腺癌. ⑤中枢性思春期早発症 【用】(注) ① 4週に1回 3.75mgを皮下注. 体重が50kg未満の患者では1.88mgを投与できる. 初回は月経周期1～5日目に. ② 4週に1回 1.88mgを皮下注. 体重の重い患者, 子宮腫大が高度の患者では3.75mgを投与. 初回は月経周期1～5日目に行う. ③④ 4週に1回 3.75mgを皮下注. ⑤ 4週に1回 30 μ g/kgを皮下注. 症状に応じて180 μ g/kgまで増量できる
リュープロレリン酢酸塩 <u>リュープリンSR注射用キット 11.25mg</u> (株) Leuplin SR (武田) 11.25mg/本 【薬価】 44,498.00 円 / 筒	【効】 ①前立腺癌. ②閉経前乳癌. ③球脊髄性筋萎縮症の進行抑制 【用】(注) 12週に1回 11.25mgを皮下注
リュープロレリン酢酸塩 <u>リュープリンPRO注射用キット 22.5mg</u> (株) Leuplin PRO (武田) 22.5mg/筒 【薬価】 66,947.00 円 / 筒	【効】 ①前立腺癌. ②閉経前乳癌 【用】(注) 24週に1回 22.5mgを皮下注
リュープロレリン酢酸塩 <u>後リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg 「NP」</u> (株) Leuprorelin acetate (ニプロ) 1.88mg/Vi 【薬価】 14,661.00 円 / 筒 【先発品】 リュープリン注射用キット 1.88mg	【効】 ①子宮内膜症. ②過多月経, 下腹痛, 腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫における筋腫核の縮小及び症状の改善. ③中枢性思春期早発症 【用】(注) ① 4週に1回 3.75mgを皮下注. 体重が50kg未満の患者では1.88mgを投与できる. 初回は月経周期1～5日目に. ② 4週に1回 1.88mgを皮下注. 体重の重い患者, 子宮腫大が高度の患者では3.75mgを投与. 初回は月経周期1～5日目に行う. ③ 4週に1回 30 μ g/kgを皮下注. 症状に応じて180 μ g/kgまで増量できる
リュープロレリン酢酸塩 <u>後リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg 「NP」</u> (株) Leuprorelin acetate (ニプロ) 3.75mg/筒 【薬価】 17,611.00 円 / 筒 【先発品】 リュープリン注射用キット 3.75mg	【効】 ①子宮内膜症. ②過多月経, 下腹痛, 腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫における筋腫核の縮小及び症状の改善. ③閉経前乳癌. ④前立腺癌. ⑤中枢性思春期早発症 【用】(注) ① 4週に1回 3.75mgを皮下注. 体重が50kg未満の患者では1.88mgを投与できる. 初回は月経周期1～5日目に. ② 4週に1回 1.88mgを皮下注. 体重の重い患者, 子宮腫大が高度の患者では3.75mgを投与. 初回は月経周期1～5日目に行う. ③④ 4週に1回 3.75mgを皮下注. ⑤ 4週に1回 30 μ g/kgを皮下注. 症状に応じて180 μ g/kgまで増量できる
リラグルチド (遺伝子組換え) <u>ビクターザ皮下注 18mg</u> (株) Victoza (ノボノルディスク) 18mg3mL/筒 【薬価】 8,902.00 円 / キット	【効】 2型糖尿病 【用】(注) 0.9mgを維持用量とし, 1日1回朝又は夕に皮下注. 1日1回0.3mgから開始し, 1週間以上の間隔で0.3mgずつ増量. 1日0.9mgで効果不十分な場合には, 1週間以上の間隔で0.3mgずつ最高1.8mgまで増量可
レルゴリクス <u>レルミナ錠 40mg (院外)</u> (株) Relumina (あすか) 40mg/T 【薬価】 858.10 円 / T	【効】 子宮筋腫に基づく次記諸症状の改善: 過多月経, 下腹痛, 腰痛, 貧血. 子宮内膜症に基づく疼痛の改善 【用】(内) 40mgを1日1回食前. 初回投与は月経周期1～5日目に行う

24. ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>メフィーゴバック（院内） <small>㉔</small> Mefeego pack（ラインファーマ） 1パック メフィーゴバック 1剤目： ミフェプリストン錠 200mg 1錠</p> <p>メフィーゴバック 2剤目： ミソプロストールバックル錠 200μg 4錠</p>	<p>【効】 子宮内妊娠が確認された妊娠 63 日（妊娠 9 週 0 日）以下の者に対する人工妊娠中絶</p> <p>【用】（内） ミフェプリストン錠 1 錠（ミフェプリストンとして 200mg），その 36～48 時間後の状態に応じて，ミソプロストールバックル錠 4 錠（ミソプロストールとして計 800μg）を左右の臼歯の歯茎と頬の間に 2 錠ずつ 30 分間静置．30 分間静置した後，口腔内にミソプロストールの錠剤が残った場合には飲み込む</p>

25. 泌尿生殖器官及び肛門用薬

251. 泌尿器官用剤

2519. その他の泌尿器官用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
D-ソルビトール <u>ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3%</u> Uromatic S (バクスター・ジャパン) 3%3L/袋 【薬価】 929.30 円 / 袋	【効】 前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手術時，その他泌尿器科手術時並びに術後の洗浄 【用】 (外) 使用量は目的に応じて 1000～15000mL とする

252. 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

2521. 生殖器官用抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロラムフェニコール <u>クロマイ腔錠 100mg</u> Chlomy (アルフレッサ) 100mg/T 【薬価】 71.70 円 / T	【効】 細菌性腔炎。〈適応菌種〉クロラムフェニコール感性菌 【用】 (外) 1 回 100mg 1 日 1 回局所に挿入

2529. その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エストリオール <u>ホーリン V 腔用錠 1mg</u> Holin V (あすか) 1mg/T 【薬価】 23.90 円 / T	【効】 腔炎（老人，小児及び非特異性），子宮頸管炎並びに子宮腔部びらん 【用】 (外) 1 日 1 回 0.5～1.0mg を腔内に挿入
オキシコナゾール硝酸塩 <u>オキナゾール腔錠 100mg (院外)</u> Okinazole (田辺三菱) 100mg/T 【薬価】 46.60 円 / T	【効】 カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎 【用】 (外) 1 日 1 回 100mg を腔深部に挿入し，6 日間継続。真菌学的効果（一次効果）が得られない場合は，更に 1 日 1 回 100mg 6 日間継続
オキシコナゾール硝酸塩 <u>オキナゾール腔錠 600mg</u> Okinazole (田辺三菱) 600mg/T 【薬価】 279.20 円 / T	【効】 カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎 【用】 (外) 1 週 1 回 600mg を腔深部に挿入，真菌学的効果が得られない場合更に 1 回 600mg 使用
メトロニダゾール <u>フラジール腔錠 250mg</u> Flagyl (富士製薬) 250mg/T 【薬価】 54.30 円 / T	【効】 ①トリコモナス腔炎。②細菌性腔症。〈適応菌種〉本剤に感性のペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス・フラジリス，プレボテラ・ビビア，モビルンカス属，ガードネラ・バジナリス 【用】 (外) ① 1 クールとして，1 日 1 回 250mg を 10～14 日間腔内に挿入。② 1 日 1 回 250mg を 7～10 日間腔内に挿入
レボノルゲストレル <u>ミレーナ 52mg (院内)</u> Mirena (バイエル) 52mg/個 【薬価】 26,206.70 円 / 個	【効】 避妊，過多月経，月経困難症 【用】 (外) 本剤 1 個を子宮腔内に装着

25. 泌尿生殖器官及び肛門用薬

254. 避妊剤

2549. その他の避妊剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボノルゲストレル <u>ノルレボ錠 1.5mg (院外)</u> Norlevo (武田) 1.5mg/T	【効】 緊急避妊 【用】 (内) 性交後 72 時間以内に 1.5mg を 1 回
<u>アンジュ 28 錠 (院外)</u> Ange (あすか) (28 日分) 1 組 (赤褐色錠 6 錠, 白色錠 5 錠, 黄色錠 10 錠, 赤色 錠 7 錠) 1 錠中: (赤褐色錠) レボノルゲストレル 0.050mg エチニルエストラジオール 0.030mg (白色錠) レボノルゲストレル 0.075mg エチニルエストラジオール 0.040mg (黄色錠) レボノルゲストレル 0.125mg エチニルエストラジオール 0.030mg (赤色錠) プラセボ	【効】 避妊 【用】 (内) 1 周期目は 1 日 1 錠を毎日一定の時刻に赤褐色錠から開始し, 指定され た順番に従い 28 日間連続経口投与. 2 周期目は, 1 周期服用開始 29 日目より 1 周 期目と同様に赤褐色錠から 1 日 1 錠を 28 日間連続投与し, 3 周期目以降は 2 周期 目と同様に投与

255. 痔疾用剤

2559. その他の痔疾用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<u>強力カステリザン (軟膏)</u> Posterisan forte (マルホ) 2g/本 【薬価】 20.40 円/g 1g 中: 大腸菌死菌浮遊液 0.163mL (大腸菌死菌約 2.59 億個含有) ヒドロコルチゾン 2.50mg	【効】 痔核・裂肛の症状 (出血, 疼痛, 腫脹, 痒感) の緩解, 肛門部手術創, 肛門 周囲の湿疹・皮膚炎, 軽度な直腸炎の症状の緩解 【用】 (外) 1 日 1 ~ 3 回適量を患部に塗布又は注入
<u>ジオン注無痛化剤付</u> Ⓜ Zione (田辺三菱) 10mL/V 【薬価】 4,519.00 円 / 瓶 1 バイアル 10mL 中: 硫酸アルミニウムカリウム水和 物 400mg (4w/v%) タンニン酸 14mg (0.14w/v%) 希釈液 (1 バイアル 10mL 中): リドカイン 43.27mg	【効】 脱出を伴う内痔核 【用】 (注) 本剤の投与に先立ち, 局所麻酔により肛門括約筋を弛緩させる. 用時, ジオン注無痛化剤付 1 バイアル (10mL) に添付の希釈液 10mL を加えて 20mL とし, 硫酸アルミニウムカリウム水和物として 2% 溶液に調製する. 1 つの主痔核あたり 2% 溶液として 9 ~ 13mL を分割して粘膜下に投与. 1 回の治療あたりの総投与量は 2% 溶液として 60mL 以内

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
④ネリザ坐剤 Neriza (ジェイドルフ) 1個 【薬価】 23.70円/個 1個中： ジフルコルトロン吉草酸エステル 0.2mg リドカイン 40mg	【効】 痔核に伴う症状（出血，疼痛，腫脹）の緩解 【用】 (外) 1回1個を1日2回肛門内に挿入
プロクトセディル軟膏 Proctosedyl (EA) 2g/本 【薬価】 19.40円/g 1g中： ヒドロコルチゾン 5mg フラジオマイシン硫酸塩 7.1mg ジブカイン塩酸塩 5mg エスクロシド 10mg	【効】 痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，腫脹，痒感）の緩解，肛門周囲の湿疹・皮膚炎 【用】 (外) 1日1～3回適量を患部に塗布又は注入
④ヘモナーゼ配合錠（院外） Hemonase (堀井) 1錠 【薬価】 10.10円/T 1錠中： プロメライン 35,000プロメライン単位 トコフェロール酢酸エステル 10mg	【効】 痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，腫脹，痒感）の緩解，肛門部手術創 【用】 (内) 1回1錠を1日3～4回

259. その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イミダフェナシン ④イミダフェナシン OD 錠 0.1mg 「サワイ」 Imidafenacin OD (沢井) 0.1mg/T 【薬価】 17.80円/T 【先発品】 ウリトス OD 錠 0.1mg， ステープラ OD 錠 0.1mg	【効】 過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁 【用】 (内) 1回0.1mgを1日2回，朝食後及び夕食後，1回0.2mg，1日0.4mgまで
ウラジログシエクス ウロカルン錠 225mg Urocalun (日本新薬) 225mg/T 【薬価】 5.90円/T	【効】 腎結石・尿管結石の排出促進 【用】 (内) 1回450mg，1日3回
オキシブチニン塩酸塩 ネオキシテープ 73.5mg（院外） Neoxy (久光) 73.5mg/枚 【薬価】 144.40円/枚	【効】 過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁 【用】 (外) 1日1回，1枚（73.5mg）を下腹部，腰部又は大腿部のいずれかに貼付し，24時間毎に貼り替える
コハク酸ソリフェナシン ④ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg「トーワ」 Solifenacin succinate (東和薬品) 5mg/T 【薬価】 37.30円/T 【先発品】 ベシケア錠 5mg	【効】 過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁 【用】 (内) 5mgを1日1回，1日10mgまで

25. 泌尿生殖器官及び肛門用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>シルデナフィルクエン酸塩 <u>バイアグラ錠 25mg (院外)</u> Viagra (ヴィアトリス) 25mg/T 【薬価】914.60 円 /T <u>バイアグラ錠 50mg (院外)</u> Viagra (ヴィアトリス) 50mg/T 【薬価】1,214.80 円 /T</p>	<p>【効】勃起不全(満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者) 【用】(内)1日1回25～50mgを性行為の約1時間前に. 高齢者(65歳以上), 肝障害のある患者及び重度の腎障害(Ccr < 30mL/分)のある患者については, 本剤の血漿中濃度が増加することが認められているので, 25mgを開始用量とする. 1日1回とし, 間隔は24時間以上</p>
<p>シロドシン <u>シロドシン OD 錠 4mg 「DSEP」 (院内)</u>  Silodosin OD (第一三共エスファ) 4mg/T 【薬価】14.50 円 /T 【先発品】ユリーフ OD 錠 4mg</p>	<p>【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害 【用】(内)1回4mgを1日2回朝夕食後. 症状に応じて適宜減量</p>
<p>タダラフィル <u>タダラフィル OD 錠 5mgZA 「トーフ」</u> Tadalafil OD (東和薬品) 5mg/T 【薬価】40.20 円 /T</p>	<p>【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害 【用】(内)1日1回5mg</p>
<p>タムスロシン塩酸塩 <u>ハルナール D 錠 0.1mg (水江)</u> Harnal D (アステラス) 0.1mg/T 【薬価】17.80 円 /T <u>タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.2mg 「VTRS」 (院内)</u> Tamsulosin hydrochloride OD (ヴィアトリス) 0.2mg/T 【薬価】16.90 円 /T 【先発品】ハルナール D 錠 0.2mg</p>	<p>【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害 【用】(内)0.2mgを1日1回食後</p>
<p>ナフトピジル <u>フリバス OD 錠 25mg</u> Flivas OD (旭化成) 25mg/T 【薬価】21.40 円 /T</p>	<p>【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害 【用】(内)1日1回25mgより始め, 効果が不十分な場合は1～2週間の間隔をおいて50～75mgに漸増し, 1日1回食後. 1日75mgまで</p>
<p>ビベグロン <u>ベオーバ錠 50mg</u> Beova (キッセイ) 50mg/T 【薬価】152.70 円 /T</p>	<p>【効】過活動膀胱における尿意切迫感, 頻尿及び切迫性尿失禁 【用】(内)50mgを1日1回食後</p>
<p>フェンテロジンフマル酸塩 <u>トピエース錠 4mg</u> Toviaz (ファイザー) 4mg/T 【薬価】142.30 円 /T</p>	<p>【効】①過活動膀胱における尿意切迫感, 頻尿及び切迫性尿失禁. ②神経因性膀胱における排尿管理 【用】(内)①4mgを1日1回, 1日1回8mgまで増量可. ②体重25kg超の小児には4mgを開始用量として1日1回. 投与開始から1週間後以降に, 1日1回8mgまで増量可</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロピペリン塩酸塩 <u>バップフォー錠 10</u> Bup-4 (大鵬) 10mg/T 【薬価】 28.00 円 /T	【効】 ①次記疾患又は状態における頻尿，尿失禁：神経因性膀胱，神経性頻尿，不安定膀胱，膀胱刺激状態（慢性膀胱炎，慢性前立腺炎）. ②過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁 【用】 (内) 20mgを1日1回食後，20mgを1日2回まで
ミラベグロン <u>ベタニス錠 25mg</u> (株) Betanis (アステラス) 25mg/T 【薬価】 87.00 円 /T	【効】 過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁 【用】 (内) 50mgを1日1回食後
<u>エビプロスタット配合錠 DB</u> Eviprostat (日本新薬) 1錠 【薬価】 28.10 円 /T 1錠中： オオウメガサソウエキス 1mg ハコヤナギエキス 1mg セイヨウオキナグサエキス 1mg スギナエキス 3mg 精製小麦胚芽油 30mg	【効】 前立腺肥大に伴う排尿困難，残尿及び残尿感，頻尿 【用】 (内) 1回1錠，1日3回

26. 外皮用薬

261. 外皮用殺菌消毒剤

2612. ヨウ素化合物

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ポビドンヨード <u>②</u> ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」 Povidone-iodine (岩城) 10%250mL/本 【薬価】 1.09 円 /mL 【先発品】 イソジン液 10%	【効】 ①手術部位（手術野）の皮膚の消毒，手術部位（手術野）の粘膜の消毒，②皮膚・粘膜の創傷部位の消毒，熱傷皮膚面の消毒，感染皮膚面の消毒 【用】 (外) ①塗布，②患部に塗布
ポビドンヨード <u>②</u> ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「ケンエー」 Povidone-iodine (健栄) 0.075 【薬価】 1.69 円 /mL 【先発品】 イソジンスクラブ液 7.5%	【効】 ①手指・皮膚の消毒，②手術部位（手術野）の皮膚の消毒 【用】 (外) ①適量を用い，少量の水を加えて摩擦し，よく泡立たせたのち，流水で洗う，②塗布するか，又は少量の水を加えて摩擦し，泡立たせたのち，滅菌ガーゼで拭う
ポビドンヨード <u>②</u> ポピヨドンゲル 10% Popiyodon (吉田) 10%90g/本 【薬価】 3.50 円 /g 【先発品】 イソジンゲル 10%	【効】 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒，熱傷皮膚面の消毒 【用】 (外) 患部に塗布

2614. 過酸化水素製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オキシドール <u>②</u> オキシドール「コザカイ・M」 Oxydol (東豊) 500mL/本 【薬価】 0.75 円 /mL	【効】 ①創傷・潰瘍の殺菌・消毒，②外耳・中耳の炎症，鼻炎，咽喉頭炎，扁桃炎などの粘膜の炎症，③口腔粘膜の消毒，う窩及び根管の清掃・消毒，歯の清浄，④口内炎の洗口 【用】 (外) ①原液のままあるいは2～3倍希釈して塗布・洗浄，②原液のまま塗布，滴下あるいは2～10倍（耳科の場合，時にグリセリン，アルコールで希釈）希釈して洗浄，噴霧，含嗽，③原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃，④10倍希釈して洗口

2615. アルコール製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エタノール <u>②</u> 消毒用エタノール「マルイシ」(今回限定) Ethanol for disinfection (丸石) 500mL/本 【薬価】 1.87 円 /mL <u>②</u> 消毒用エタライト液 Ethalight (日医工) 76.9～81.4vol% 【薬価】 1.13 円 /mL 【先発品】 消毒用エタノール B 液「ケンエー」 <u>②</u> 消毒用エタライト B 液 Ethalight B (日医工) 76.9～81.4vol% 【薬価】 1.13 円 /mL 【先発品】 消毒用エタノール B 液「ケンエー」	【効】 手指・皮膚の消毒，手術部位（手術野）の皮膚の消毒，医療機器の消毒 【用】 (外) そのまま消毒部位に塗布

2616. 石けん類製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベンゼトニウム塩化物 エンゼトニン液 0.025 Enzetonin (吉田) 0.025w/v%500mL/本 【薬価】0.48円/mL	【効】①手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、②感染皮膚面の消毒、③腔洗浄、④結膜嚢の洗浄・消毒 【用】(外)①0.01～0.025%溶液を用いる、②0.01%溶液を用いる、③0.025%溶液を用いる、④0.02%溶液を用いる
ベンゼトニウム塩化物 ハイアミン液 10% Hyamine (アルフレッサ) 10w/v%1000mL/本 【薬価】1.27円/mL	【効】①手指・皮膚の消毒、②手術部位(手術野)の皮膚の消毒、③手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、④感染皮膚面の消毒、⑤腔洗浄、⑥結膜嚢の洗浄・消毒、⑦医療機器の消毒、⑧手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒 【用】(外)①通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、0.05～0.1%溶液(本剤の100～200倍希釈液)に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭、術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシング、②手術前局所皮膚面を、0.1%溶液(本剤の100倍希釈液)で約5分間洗い、その後ベンゼトニウム塩化物0.2%溶液(本剤の50倍希釈液)を塗布する、③0.01～0.025%溶液(本剤の400～1,000倍希釈液)を用いる、④0.01%溶液(本剤の1,000倍希釈液)を用いる、⑤0.025%溶液(本剤の400倍希釈液)を用いる、⑥0.02%溶液(本剤の500倍希釈液)を用いる、⑦0.1%溶液(本剤の100倍希釈液)に10分間浸漬するか、厳密に消毒する際には、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、0.1%溶液(本剤の100倍希釈液)中で15分間煮沸、⑧0.05～0.2%溶液(本剤の50～200倍希釈液)を布片で塗布・清拭するか、噴霧

2619. その他の外皮用殺菌消毒剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アルキルジアミノエチルグリシン 塩酸塩 ⑤エルエイジー 10液 LAG (吉田) 10%500mL/本 【薬価】0.66円/mL	【効】①医療機器の消毒、②手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒、③手指・皮膚の消毒、④手術部位(手術野)の皮膚の消毒、⑤手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒 【用】(外)①0.05～0.2%液に10～15分間浸漬、②0.05～0.2%液を布片で塗布・清拭又は噴霧、③0.05～0.2%液で約5分間洗った後、滅菌ガーゼ又は布片で清拭、④0.1%液で約5分間洗った後0.2%溶液を塗布、⑤0.01～0.05%液、結核領域で①②に用いる場合：0.2～0.5%液
クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05%ヘキサック水W Hexizac W (吉田) 0.05%500mL/本 【薬価】0.58円/mL	【効】①皮膚の創傷部位の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒、②結膜嚢の洗浄・消毒、③産婦人科・泌尿器科における外陰・外性器の皮膚消毒 【用】(外)①0.05%の水溶液を用いる、②0.05%以下の水溶液を用いる、③0.02%水溶液を用いる
クロルヘキシジングルコン酸塩 0.5%ヘキサック水W Hexizac (吉田) 0.5%500mL/本 【薬価】0.64円/mL	【効】①手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚消毒、医療機器の消毒、②皮膚の創傷部位の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒、③結膜嚢の洗浄・消毒、④産婦人科・泌尿器科における外陰・外性器の皮膚消毒 【用】(外)①0.1～0.5%水溶液を用いる、②0.05%水溶液を用いる、③0.05%以下の水溶液を用いる、④0.02%水溶液を用いる
クロルヘキシジングルコン酸塩 マスクインR・エタノール液(0.5W/V%) Maskin R (丸石) 0.5%500mL/本 【薬価】0.70円/mL	【効】①手術部位(手術野)の皮膚の消毒、②医療機器の消毒 【用】(外)①本剤をそのまま消毒部位(着色又は脱脂等を必要とする部位)に用いる、②本剤をそのまま用いる
フェノール 液状フェノール「タイセイ」(院内) ㉠ Liquefied phenol (吉田) 88.0%以上500mL/本 【薬価】1.15円/mL	【効】①手指・皮膚の消毒、②医療機器、手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒、③排泄物の消毒、④次の疾患の鎮痒：痒疹(小児ストロフルスを含む)、蕁麻疹、虫さされ 【用】(外)①1.5～2%液、②2～5%液、③3～5%液、④1～2%液又は2～5%軟膏として

26. 外皮用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
⑥ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」 Hypo ethanol (吉田) 2%500mL/本 【薬価】 0.89 円/mL 1000mL中： チオ硫酸ナトリウム水和物 20g	【効】 皮膚面及び手術用器具類・布類に付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱色、消毒 【用】(外) ヨードチンキ塗布による皮膚面（手術部位及び手術者の皮膚）及び手術用器具類・布類に付着したヨウ素の脱色並びに消毒剤として塗布又は洗浄等にそのまま使用

263. 化膿性疾患用剤

2633. 外用サルファ製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スルファジアジン銀 ゲーベックリーム 1% Geben (田辺三菱) 1%100g/本 【薬価】 12.80 円/g	【効】 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，びらん・潰瘍の二次感染。〈適応菌種〉本剤に感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，緑膿菌，カンジダ属 【用】(外) 1日1回，滅菌手袋などを用いて，創面を覆うに必要なかつ十分な厚さ（約2～3mm）に直接塗布。又は，ガーゼ等と同様の厚さにのぼし，貼付し，包帯を行う。第2日目以後の塗布に際しては，前日に塗布した本剤を清拭又は温水浴等で洗い落としのち，新たに本剤を塗布

2634. 外用抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロラムフェニコール クロロマイセチン局所用液 5% Chloromycetin (第一三共) 5%25mL/本 【薬価】 35.40 円/mL	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，びらん・潰瘍の二次感染，外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，抜歯創・口腔手術創の二次感染。〈適応菌種〉本剤に感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，髄膜炎菌，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，インフルエンザ菌 【用】(外) 〔皮膚・外科〕点滴，灌注あるいはガーゼ，綿球に浸して貼付，挿入。深在性皮膚感染症に対しては他の薬剤で効果が期待できない場合に使用。〔点耳・点鼻〕通常プロピレングリコールで0.5～1%の割合に溶解し，罹患部に適量を1日1～数回用いる。〔歯科・口腔外科〕綿線，ペーパーポイントに浸して用いたり，局所に直接注入するかあるいはドレナージガーゼに含ませて挿入
ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン軟膏 0.1% Gentacin (MSD) 0.1%10g/本 【薬価】 11.00 円/g	【効】 表在性皮膚感染症，慢性膿皮症，びらん・潰瘍の二次感染。〈適応菌種〉ゲンタマイシンに感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属（肺炎球菌を除く），大腸菌，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロピデンシア属，緑膿菌 【用】(外) 1日1～数回患部に塗布するか，あるいはガーゼなどにのぼしたものを患部に貼付
テトラサイクリン塩酸塩 アクロマイシン軟膏 3% Achromycin (ポーラ) 3%25g/本 【薬価】 19.60 円/g	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染。〈適応菌種〉テトラサイクリンに感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロピデンシア属 【用】(外) 症状により適量を1日1～数回，直接患部に塗布又は無菌ガーゼにのぼして貼付

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テトラサイクリン塩酸塩 <u>アクロマイシン末</u> Achromycin (ポーラ) 末 【薬価】 187.60 円 / g	【効】 (経口) 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 乳腺炎, 骨髄炎, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 肺膿瘍, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 尿道炎, 淋菌感染症, 軟性下疳, 性病性(鼠径)リンパ肉芽腫, 子宮内感染, 脳膿瘍, 涙囊炎, 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 歯周組織炎, 猩紅熱, 炭疽, プルセラ症, 百日咳, 野兔病, ガス壊疽, 回帰熱, ワイル病, 発疹チフス, 発疹熱, つつが虫病. <適応菌種> テトラサイクリンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, 淋菌, 炭疽菌, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属, インフルエンザ菌, 軟性下疳菌, 百日咳菌, プルセラ属, 野兔病菌, ガス壊疽菌群, 回帰熱ボレリア, ワイル病レプトスピラ, リケッチア属, クラミジア属, 肺炎マイコプラズマ (マイコプラズマ・ニューモニエ). (トローチ) 抜歯創・口腔手術創の二次感染, 感染性口内炎. <適応菌種> テトラサイクリンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属, インフルエンザ菌. (口腔) [挿入剤] 抜歯創・口腔手術創の二次感染. <適応菌種> テトラサイクリン感性菌. [軟膏剤] 歯周組織炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染, ドライソケット, 感染性口内炎. <適応菌種> テトラサイクリン感性菌. (外皮) 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染. <適応菌種> テトラサイクリンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属. (眼科) 眼瞼炎, 涙囊炎, 麦粒腫, 結膜炎, 角膜炎 (角膜潰瘍を含む), 眼外傷・眼科周術期の無菌化療法. <適応菌種> テトラサイクリンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, 淋菌, モラクセラ・ラクナータ (モラー・アクセンフェルト菌), 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属, インフルエンザ菌, ヘモフィルス・エジプチウス (コッホ・ウィークス菌), トラコーマクラミジア (クラミジア・トラコマティス) 【用】 (経口) 1日 1g を 4 回に分割, 小児: 1日 30mg/kg を 4 回に分割. (トローチ) 1日 4~9 錠 [1錠中 15mg を含有] を数回に分け, 口中, 舌下, 頬腔で溶かしながら用いる. (口腔) [挿入剤] 抜歯創, 口腔手術創に 1~3 個 [1個中 5mg を含有] 挿入. [軟膏剤] 適量を 1日 1~数回患部に塗布. (外皮) [軟膏剤 (3%)] としての使用) 適量を 1日 1~数回, 直接患部に塗布又は無菌ガーゼにのぼして貼付する. (眼科) [末] 眼軟膏として: 無刺激性の軟膏基剤を用いて 0.5~1.0% 眼軟膏とし, 1日 1~数回塗布. 点眼液として: 滅菌精製水等の水性溶剤又は植物油等の非水性溶剤を用いて 0.5~1.0% 点眼液とし, 1日 1~数回点眼. 調製後は, 冷所に保存し, 1週間以内に使用すること
フラジオマイシン硫酸塩 <u>ソフラチュール貼付剤 10 cm</u> Sofratulle (サノフィ) (10.8mg) 10 cm × 10 cm / 枚 【薬価】 77.50 円 / 枚	【効】 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, びらん・潰瘍の二次感染. <適応菌種> フラジオマイシンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属 (肺炎球菌を除く) 【用】 (外) 1枚~数枚を直接患部に当て, その上を無菌ガーゼで覆う
ポリミキシン B 硫酸塩 <u>ポリミキシン B 硫酸塩散 50 万単位「ファイザー」</u> Polymyxin B sulfate (ファイザー) 50 万単位 / 瓶 【薬価】 349.90 円 / 瓶	【効】 (局所投与) ①外傷・熱傷及び手術創等の二次感染. ②骨髄炎, 関節炎, 中耳炎, 副鼻腔炎. ③膀胱炎. ④結膜炎, 角膜炎 (角膜潰瘍を含む). <適応菌種> ポリミキシン B に感性の大腸菌, 肺炎桿菌, エンテロバクター属, 緑膿菌. (経口投与) ⑤白血病治療時の腸管内殺菌 【用】 (外) ① 50 万単位を注射用蒸留水又は生理食塩液 5~50mL に溶解し, 散布. 1回の最高投与量は 50 万単位まで. ② 50 万単位を注射用蒸留水又は生理食塩液 10~50mL に溶解し, 注入, 噴霧, もしくは散布. 1回の最高投与量は 50 万単位まで. ③ 50 万単位を滅菌精製水又は生理食塩液 10~500mL に溶解し, 1日 1~2 回に分割し, 膀胱内に注入又は洗浄. 1回の最高投与量は 50 万単位まで. ④ 50 万単位を注射用蒸留水又は生理食塩液 20~50mL に溶解し, 点眼. (内) ⑤ 1日 300 万単位を 3 回に分割し経口投与

2639. その他の化膿性疾患用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オゼノキサシン ゼビアックスローション 2% Zebiax (マルホ) 10g/本 【薬価】56.40円/g	【効】表在性皮膚感染症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）。〈適応菌種〉オゼノキサシンに感性のブドウ球菌属、アクネ菌 【用】(外) 適量を1日1回、患部に塗布。ざ瘡に対しては洗顔後、患部に塗布
ナジフロキサシン アクアチムクリーム 1% Acuatim (大塚) 1%10g/本 【薬価】22.10円/g	【効】表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属、アクネ菌 【用】(外) 適量を1日2回、患部に塗布。ざ瘡に対しては洗顔後に塗布
バラマイシン軟膏 Baramycin (小野) 10g/本 【薬価】7.60円/g 1g中： バシトラシン 250単位 フラジオマイシン硫酸塩 2mg	【効】表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腋臭症。〈適応菌種〉バシトラシン/フラジオマイシン感性菌 【用】(外) 1日1～数回直接患部に塗布又は塗擦するか、あるいは無菌ガーゼ等にのぼして貼付

264. 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

2642. 外用抗ヒスタミン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジフェンヒドラミン レスタミンコーワクリーム 1% Restamin (興和) 1%500g/本 【薬価】2.32円/g	【効】蕁麻疹、湿疹、小児ストロフルス、皮膚そう痒症、虫さされ 【用】(外) 症状により適量を1日数回、患部に塗布又は塗擦

2646. 副腎皮質ホルモン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロベタゾールプロピオン酸エステル コムクロシャンプー 0.05% Comclo (マルホ) 125mL/本 【薬価】20.00円/g	【効】頭部の尋常性乾癬、湿疹・皮膚炎 【用】(外) 1日1回、乾燥した頭部に患部を中心に適量を塗布し、約15分後に水又は湯で泡立て、洗い流す
クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベート軟膏 0.05% Dermovate (グラクソ・スミスクライン) 0.05%5g/本 【薬価】16.70円/g デルモベートクリーム 0.05% (院外) Dermovate (グラクソ・スミスクライン) 0.05%5g/本 【薬価】16.70円/g	【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール苔癬、日光皮膚炎を含む）、痒疹群（蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む）、掌蹠膿疱症、乾癬、虫さされ、薬疹・中毒疹、ジベルばら色枇糠疹、慢性円板状エリテマトーデス、扁平紅色苔癬、紅皮症、肥厚性癬痕・ケロイド、肉芽腫症（サルコイドーシス、環状肉芽腫）、アミロイド苔癬、天疱瘡群、類天疱瘡（ジューリング疱疹状皮膚炎を含む）、悪性リンパ腫（菌状息肉症を含む）、円形脱毛症（悪性を含む） 【用】(外) 1日1～数回適量を塗布

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロベタゾールプロピオン酸エステル <u>デルモベートスカルブローション</u> <u>0.05%</u> ㉞ Dermovate (グラクソ・スミスクライン) 0.05%10g/本 【薬価】 16.70 円 /g	【効】 主として頭部の皮膚疾患：湿疹・皮膚炎群，乾癬 【用】 (外) 1日1～数回適量を塗布
クロベタゾン酪酸エステル <u>キンダベート軟膏 0.05%</u> Kindavate (グラクソ・スミスクライン) 0.05%5g/本 【薬価】 16.00 円 /g	【効】 アトピー性皮膚炎 (乳幼児湿疹を含む)，顔面・頸部・腋窩・陰部における湿疹・皮膚炎 【用】 (外) 1日1～数回適量を患部に塗布
デキサメタゾンプロピオン酸エステル <u>メサデルムクリーム 0.1%</u> ㉞ Methaderm (大鵬) 0.1%5g/本 【薬価】 9.80 円 /g <u>デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1%「日医工」(院内)</u> ㉞ Dexamethasone propionate (日医工) 5g/本 【薬価】 13.40 円 /g <u>デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1%「日医工」</u> ㉞ Dexamethasone propionate (日医工) 0.1% 5g/本 【薬価】 13.40 円 /g	【効】 湿疹・皮膚炎群 (進行性指掌角皮症，ビダール苔癬，日光皮膚炎を含む)，痒疹群 (蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹を含む)，虫さされ，薬疹・中毒疹，乾癬，掌蹠膿疱症，扁平紅色苔癬，紅皮症，慢性円板状エリテマトーデス，紅斑症 (多形滲出性紅斑，ダリエ遠心性環状紅斑，遠心性丘疹性紅斑)，毛孔性紅色秕糠疹，特発性色素性紫斑 (マヨッキー紫斑，シャンバーク病，紫斑性色素性苔癬様皮膚炎)，肥厚性瘢痕・ケロイド，肉芽腫症 (サルコイドーシス，環状肉芽腫)，悪性リンパ腫 (菌状息肉症を含む)，アミロイド苔癬，斑状アミロイドーシス，天疱瘡群，家族性良性慢性天疱瘡，類天疱瘡，円形脱毛症 【用】 (外) 1日1～数回適量を患部に塗布
デプロドンプロピオン酸エステル <u>エクラープラスター 20μg/cm²</u> Eclar (久光) 1.5mg/枚 【薬価】 41.50 円	【効】 湿疹・皮膚炎群 (進行性指掌角皮症，ビダール苔癬を含む)，虫さされ，痒疹群 [蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，結節性痒疹 (固定蕁麻疹) を含む]，乾癬，掌蹠膿疱症，肥厚性瘢痕・ケロイド，扁平紅色苔癬，慢性円板状エリテマトーデス，環状肉芽腫 【用】 (外) 患部を軽く洗浄し，よく乾燥させた後，本品を膏体面被覆ポリエステルフィルムに付着させたまま適当な大きさに切り取り，ポリエステルフィルムを取り除き，患部に膏体面を当てて貼付する。貼付後12時間又は24時間毎に貼りかえる。必要な場合，夜間のみ貼付する方法もある。貼りかえるときにも患部の洗浄及び乾燥を行う
ヒドロコルチゾン酪酸エステル <u>ロコイドクリーム 0.1%</u> Locoid (鳥居) 0.1%5g/本 【薬価】 14.90 円 /g	【効】 湿疹・皮膚炎群 (進行性指掌角皮症，ビダール苔癬，脂漏性皮膚炎を含む)，痒疹群 (蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹を含む)，乾癬，掌蹠膿疱症 【用】 (外) 1日1～数回適量を塗布

26. 外皮用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フルオシノニド <u>トプシムクリーム 0.05%</u> ㊉ Topsym (田辺三菱) 0.05%5g/本 【薬価】14.80円/g <u>トプシムローション 0.05%</u> ㊉ Topsym (田辺三菱) 0.05%10g/本 【薬価】14.80円/g	【効】 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，女子顔面黒皮症，ビダール苔癬，放射線皮膚炎，日光皮膚炎を含む），痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹を含む），乾癬，掌蹠膿疱症，円形脱毛症（悪性を含む），尋常性白斑 【用】 (外) 1日1～3回，適量を患部に塗布
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル <u>スピラゾン軟膏 0.3%</u> Spirazon (岩城) 0.3% 5g/本 【薬価】14.70円/g <u>スピラゾンクリーム 0.3%</u> Spirazon (岩城) 0.3% 5g/本 【薬価】14.70円/g <u>リドメックスコーワローション 0.3%</u> Lidomex (興和) 0.3%10g/本 【薬価】14.70円/g	【効】 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，ビダール苔癬を含む），痒疹群（固定蕁麻疹，ストロフルスを含む），虫さされ，乾癬，掌蹠膿疱症 【用】 (外) 1日1～数回，適量を患部に塗布。症状により密封法を行う
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル <u>ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05%</u> 【MYK】 ㊉ Betamethasone butyrate propionate (佐藤製薬) 0.05% 5g/本 【薬価】18.90円/g	【効】 湿疹・皮膚炎群（手湿疹，進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎を含む），乾癬，虫さされ，薬疹・中毒疹，痒疹群（ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，結節性痒疹を含む），紅皮症，紅斑症（多形滲出性紅斑，ダリエ遠心性環状紅斑），ジベル薔薇色枇糠疹，掌蹠膿疱症，扁平紅色苔癬，慢性円板状エリテマトーデス，肉芽腫症（サルコイドーシス，環状肉芽腫），特発性色素性紫斑（マヨッキー紫斑，シャンパーク病），円形脱毛症，肥厚性癬痕・ケロイド，悪性リンパ腫（菌状息肉症を含む），アミロイド苔癬，水疱症（天疱瘡群，ジューリング疱疹状皮膚炎・水疱性類天疱瘡） 【用】 (外) 1日1～数回，適量を患部に塗布

2647. 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<u>リンデロン-VG 軟膏 0.12%</u> Rinderon-VG (塩野義) 5g/本 【薬価】27.70円/g 1g中： ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2mg ゲンタマイシン硫酸塩 1mg <u>リンデロン-VG クリーム 0.12%</u> Rinderon-VG (塩野義) 5g/本 【薬価】27.70円/g 1g中： ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2mg ゲンタマイシン硫酸塩 1mg	【効】 ①湿潤，びらん，結痂を伴うか，又は二次感染を併発している次の疾患：湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎を含む），乾癬，掌蹠膿疱症．②外傷・熱傷及び手術創等の二次感染．〈適応菌種〉ゲンタマイシン感性菌 【用】 (外) 1日1～数回，適量を塗布

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リンデロン-VG ローション Rinderon-VG (塩野義) 10mL/本 【薬価】 27.70 円/mL 1mL中： ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2mg ゲンタマイシン硫酸塩 1mg	【効】 湿潤，びらん，結痂を伴うか，又は二次感染を併発している次の疾患：湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎を含む），乾癬，掌蹠膿疱症，〈適応菌種〉ゲンタマイシン感性菌 【用】 (外) 1日1～数回，適量を塗布

2649. その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
亜鉛華単軟膏 ②亜鉛華 (10%) 単軟膏「ヨシダ」 Zinc oxide (吉田) 10%500g/瓶 【薬価】 2.67 円/g	【効】 次記皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐：外傷，熱傷，凍傷，湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，面皰，せつ，よう，その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面 【用】 (外) 1日1～数回，患部に塗擦又は貼布
亜鉛華軟膏 ②ボチシート 20% Bochi (日医工) 20%30g/枚 (10 cm × 15 cm) 【薬価】 3.44 円/g	【効】 次記皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐：外傷，熱傷，凍傷，湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，面皰，せつ，よう，その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面 【用】 (外) 患部の大きさに合わせ適当な大きさに切り，症状に応じ1日1～数回患部に貼付
インドメタシン イドメシンコーワゲル 1% Idomethine (興和) 1%35g/本 【薬価】 3.80 円/g	【効】 次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛 【用】 (外) 症状により，適量を1日数回患部に塗擦
インドメタシン イドメシンコーワパップ 70mg Idomethine (興和) 70mg10 cm × 14 cm / 枚 (1袋：5枚入) 【薬価】 17.10 円/枚	【効】 次の疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛 【用】 (外) 1日2回患部に貼付
ウフェナマート フエナゾールクリーム 5% Fenazol (マイラン EPD) 10g/本 【薬価】 14.90 円/g	【効】 急性湿疹，慢性湿疹，脂漏性湿疹，貨幣状湿疹，接触皮膚炎，アトピー皮膚炎，おむつ皮膚炎，酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎，帯状疱疹 【用】 (外) 適量を1日数回患部に塗布又は貼布
クロタミトン オイラックスクリーム 10% Eurax (ノバルティス) 10%10g/本 【薬価】 5.81 円/g	【効】 湿疹，蕁麻疹，神経皮膚炎，皮膚そう痒症，小児ストロフルス 【用】 (外) 1日数回患部に塗布又は塗擦
ケトプロフェン ミルタックスパップ 30mg (水江) Miltax (第一三共エスファ) 30mg10g/枚 (10 cm × 14 cm / 枚) (1袋：6枚入) 【薬価】 17.10 円/枚	【効】 次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛 【用】 (外) 1日2回患部に貼付

26. 外皮用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ケトプロフェン <u>モーラステープ L40mg (院外)</u> Mohrus L (久光) 40mg2g/枚 (10 cm×14 cm / 枚) (1袋：7枚) 【薬価】 28.60 円 / 枚 <u>モーラスパップ XR120mg (院外)</u> Mohrus (久光) 10 cm×14 cm / 枚 【薬価】 29.70 円 / 枚 <u>②ケトプロフェンテープ 40mg「日医工」</u> Ketoprofen (日医工) 40mg/枚 (10 cm×14 cm / 枚) (1袋：7枚) 【薬価】 17.10 円 / 枚 【先発品】 モーラステープ L40mg	【効】 ①次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎：腰痛症（筋・筋膜性腰痛症，変形性脊椎症，椎間板症，腰椎捻挫），変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛。②関節リウマチにおける関節局所の鎮痛 【用】 (外) 1日1回患部に貼付
ジクロフェナクナトリウム <u>②ジクロフェナク Na クリーム 1%「日本臓器」</u> Diclofenac sodium (日本臓器) 1%50g/本 【薬価】 3.30 円 / g	【効】 次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛（筋・筋膜性腰痛症等），外傷後の腫脹・疼痛 【用】 (外) 適量を1日数回患部に塗擦
ジメチルイソプロピルアズレン <u>アズノール軟膏 0.033%</u> Azunol (日本新薬) 0.033%20g/本 【薬価】 5.30 円 / g	【効】 ①湿疹。②熱傷・その他の疾患によるびらん及び潰瘍 【用】 (外) 症状により適量を1日数回塗布
ビタミン A 油 <u>ザーネ軟膏 0.5%</u> Sahne (エーザイ) 0.5%500g/瓶 【薬価】 2.20 円 / g	【効】 角化性皮膚疾患（尋常性魚鱗癬，毛孔性苔癬，単純性秕糠疹） 【用】 (外) 1日2～3回患部に塗擦
フェノール・亜鉛華リニメント <u>カチリ「ホエイ」【経過措置】</u> Kachiri (ファイザー) 500g/本 【薬価】 1.33 円 / g 1g 中： 液状フェノール 0.022mL 酸化亜鉛 100mg	【効】 皮膚そう痒症，汗疹，蕁麻疹，小児ストロフルス，虫さされ 【用】 (外) 1日1～数回塗布
フェルビナク <u>②フェルビナクローション3%「三笠」</u> Felbinac (三笠) 3%60mL/本 【薬価】 2.80 円 / mL 【先発品】 ナバゲルンローション 3%	【効】 次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症，筋・筋膜性腰痛症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛 【用】 (外) 1日数回患部に塗布
フェルビナク <u>フェルビナクステック軟膏3%「三笠」</u> Felbinac (三笠) 3%40g/本 【薬価】 4.80 円 / g	【効】 次の疾患並びに症状の鎮痛・消炎：変形性関節症，筋・筋膜性腰痛症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛 【用】 (外) 1日数回患部に塗擦

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェルピナク <u>セルタッチパップ 70 (水江)</u> Seltouch (ファイザー) 70mg14.0g/枚(10 cm×14 cm/枚) (1袋:6枚) 【薬価】 17.10 円/枚	【効】 次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎:変形性関節症, 肩関節周囲炎, 腱・腱鞘炎, 腱周囲炎, 上腕骨上顆炎(テニス肘等), 筋肉痛, 外傷後の腫脹・疼痛 【用】(外) 1日2回患部に貼付
フルルピロフェン <u>アドフィードパップ 40mg</u> Adofeed (科研) 40mg12g/枚(10 cm×14 cm/枚)(1袋:7枚入) 【薬価】 17.10 円/枚	【効】 次記疾患並びに症状の鎮痛・消炎:変形性関節症, 肩関節周囲炎, 腱・腱鞘炎, 腱周囲炎, 上腕骨上顆炎(テニス肘等), 筋肉痛, 外傷後の腫脹・疼痛 【用】(外) 1日2回, 患部に貼付
ロキソプロフェンナトリウム水和物 <u>ロキソニンテープ 100mg (院外)</u> Loxonin (第一三共) 100mg2g/枚(10 cm×14 cm/枚)(1袋:7枚入り) 【薬価】 18.40 円/枚 <u>ロキソニンパップ 100mg (院外)</u> Loxonin (第一三共) 100mg10g/枚(10 cm×14 cm/枚)(1袋:7枚入り) 【薬価】 18.40 円/枚 ② <u>ロキソプロフェンナトリウム</u> <u>テープ 100mg 「ケミファ」</u> Loxoprofen sodium (日本ケミファ) 100mg2g/枚(10 cm×14 cm/枚)(1袋:7枚入り) 【薬価】 17.10 円/枚 【先発品】 ロキソニンテープ 100mg, ロキソプロフェン Na テープ 100mg 「タカタ」 ③ <u>ロキソプロフェンナトリウム</u> <u>パップ 100mg 「ケミファ」</u> Loxoprofen sodium (日本ケミファ) 100mg10g/枚(10 cm×14 cm/枚)(1袋:7枚入り) 【薬価】 17.10 円/枚 【先発品】 ロキソニンパップ 100mg, ロキソプロフェン Na パップ 100mg 「タカタ」	【効】 次記疾患並びに症状の消炎・鎮痛:変形性関節症, 筋肉痛, 外傷後の腫脹・疼痛 【用】(外) 1日1回, 患部に貼付
<u>エキザルベ</u> Eksalb (マルホ) 5g/本 【薬価】 29.80 円/g 1g中: 混合死菌浮遊液 0.166mL (大腸菌死菌・ブドウ球菌死菌 各約1.5億個, レンサ球菌死菌・ 緑膿菌死菌各約0.15億個を含有) ヒドロコルチゾン 2.5mg	【効】 ①湿潤, びらん, 結痂を伴うか, 又は二次感染を併発している次記疾患:湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症, ビダール苔癬, 放射線皮膚炎, 日光皮膚炎を含む), 熱傷, 術創. ②湿疹様変化を伴う膿皮症(感染性湿疹様皮膚炎, 湿疹様膿痂疹) 【用】(外) 1日1~数回直接患部に塗布又は塗擦するか, 無菌ガーゼ等にのばして貼付

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>④ MS 温シップ「タカミツ」 MS (三和化学) 10 cm × 14 cm (20g) 5枚 / 袋 【薬価】0.86 円 / g 100g (700 cm²) 中： サリチル酸メチル 1.0g dl-カンフル 0.5g トウガラシエキス 0.165g</p> <p>④ MS 冷シップ「タイホウ」 MS (大鵬) 40g / 枚 (1袋：5枚入) 【薬価】0.86 円 / g 100g (700 cm²) 中： サリチル酸メチル 2.0g dl-カンフル 0.5g l-メントール 0.3g</p>	<p>【効】次記における鎮痛・消炎：捻挫，打撲，筋肉痛，関節痛，骨折痛 【用】(外) ①表面のプラスチック膜をはがして，患部に貼付。②1日1～2回使用</p>
<p>強カレスタミンコーチゾンコーワ 軟膏 (院外) Strong restamin cortisone (興和) 10g / 本 【薬価】12.30 円 / g 1g 中： ヒドロコルチゾン酢酸エステル 10mg フラジオマイシン硫酸塩 3.5mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 1mg</p>	<p>【効】①深在性皮膚感染症，慢性膿皮症。②湿潤，びらん，結痂を伴うか，又は二次感染を併発している次の疾患：湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，ビダール苔癬，放射線皮膚炎，日光皮膚炎を含む），皮膚そう痒症，痒疹群（ストロフルスを含む），掌蹠膿疱症。〈適応菌種〉フラジオマイシン感性菌 【用】(外) 1日1～数回直接患部に塗布又は塗擦するか，無菌ガーゼ等にのぼして貼付</p>
<p>ユベラ軟膏 Juvela (エーザイ) 56g / 本 【薬価】2.50 円 / g 1g 中： トコフェロール 20mg ビタミンA油 5mg (ビタミンAとして5,000 ビタミンA単位)</p>	<p>【効】凍瘡，進行性指掌角皮症，尋常性魚鱗癬，毛孔性苔癬，単純性糝糠疹，掌蹠角化症 【用】(外) 1日1～数回適量を患部に塗布</p>
<p>ロコアテープ Ⓢ Loqoa (大正製薬) 7枚 / 袋 【薬価】35.40 円 / 枚 1枚 10 cm × 14 cm (膏体 1.73g/140 cm²) 中： エスフルルピプロフェン 40mg ハッカ油 36.2mg</p>	<p>【効】変形性関節症における鎮痛・消炎 【用】(外) 1日1回，患部に貼付，同時に2枚を超えて貼付しないこと</p>

265. 寄生性皮膚疾患用剤

2652. 外用サリチル酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
④ 10% サリチル酸ワセリン軟膏 東豊(院外) Salicylic acid (日医工) 10%500g/瓶 【薬価】 4.31 円/g 1g 中： サリチル酸 100mg 白色ワセリン 900mg	【効】 乾癬，白癬（頭部浅在性白癬，小水疱性斑状白癬，汗疱状白癬，頑癬），癬風，紅色秕糠疹，紅色陰癬，角化症（尋常性魚鱗癬，先天性魚鱗癬，毛孔性苔癬，先天性手掌足底角化症（腫），ダリエー病，遠山連圈状秕糠疹），湿疹（角化を伴う），口囲皮膚炎，掌蹠膿疱症，ヘブラ氏秕糠疹，アトピー性皮膚炎，ざ瘡，せつ，腋臭症，多汗症，その他角化性の皮膚疾患 【用】 (外) 1日1～2回塗布

2655. イミダゾール系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロトリマゾール エンペシドクリーム 1% Empecid (バイエル) 1%10g/本 【薬価】 12.30 円/g	【効】 次記の皮膚真菌症の治療。①白癬：足部白癬（汗疱状白癬，趾間白癬），頑癬，斑状小水疱性白癬。②カンジダ症：指間びらん症，間擦疹，乳児寄生菌性紅斑，皮膚カンジダ症，爪囲炎。③癬風 【用】 (外) 1日2～3回患部に塗布
ケトコナゾール ニゾラルクリーム 2% Nizoral (ヤンセン) 2%10g/本 【薬価】 18.40 円/g ニゾラルローション 2% Nizoral (ヤンセン) 10g/本 【薬価】 22.10 円/g	【効】 次記の皮膚真菌症の治療。①白癬：足白癬，体部白癬，股部白癬。皮膚カンジダ症：指間びらん症，間擦疹（乳児寄生菌性紅斑を含む）。癬風。②脂漏性皮膚炎 【用】 (外) ①1日1回患部に塗布。②1日2回患部に塗布
ルリコナゾール ルリコンクリーム 1% Lulicon (ポーラ) 1%10g/本 【薬価】 30.30 円/g	【効】 次記の皮膚真菌症の治療：①白癬：足白癬，体部白癬，股部白癬。②カンジダ症：指間びらん症，間擦疹。③癬風 【用】 (外) 1日1回患部に塗布

2659. その他の寄生性皮膚疾患用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テルビナフィン塩酸塩 ラミシールクリーム 1% Lamisil (サンファーマ) 1%10g/本 【薬価】 20.30 円/g	【効】 次の皮膚真菌症の治療：白癬（足白癬，体部白癬，股部白癬），皮膚カンジダ症（指間びらん症，間擦疹〈乳児寄生菌性紅斑を含む〉），癬風 【用】 (外) 1日1回患部に塗布
ブテナフィン塩酸塩 メンタックス外用液 1%【経過措置】(水江) Mentax (科研) 1%10mL/本 【薬価】 24.10 円/mL	【効】 次記の皮膚真菌症の治療：①白癬：足部白癬，股部白癬，体部白癬。②癬風 【用】 (外) 1日1回患部に塗布
リラナフタート ゼフナート外用液 2% Zefnart (鳥居) 2%10mL/本 【薬価】 27.80 円/mL	【効】 白癬：足白癬，体部白癬，股部白癬 【用】 (外) 1日1回患部に塗布

26. 外皮用薬

266. 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む.）

2661. 有機酸製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
サリチル酸 スピール膏 M Speel plaster M (ニチバン) 0.8925g/枚 (25 cm ² /枚) 【薬価】 74.20 円 / 枚	【効】 疣贅, 鶏眼, 胼胝腫の角質剥離 【用】 (外) 本剤を患部大に切って貼付し, 移動しないように固定する. 2～5 日目ごとに取りかえる

2669. その他の皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む.）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
尿素 ケラチナミンコーワクリーム 20% Keratinamin kowa (興和) 20% (25g/本) 【薬価】 4.10 円 / g	【効】 魚鱗癬, 老人性乾皮症, アトピー皮膚, 進行性指掌角皮症（主婦湿疹の乾燥型）, 足趾部皸裂性皮膚炎, 掌蹠角化症, 毛孔性苔癬 【用】 (外) 1 日 1～数回, 患部に塗擦
イオウ・カンフルーション「東豊」 Sulfur and camphor (丸石) 100mL/本 【薬価】 3.09 円 / mL 1mL 中： イオウ 60mg dl-カンフル 5mg	【効】 ざ瘡, 酒さ 【用】 (外) 1 日 2 回患部に塗布. 朝は上清液, 晩は混濁液を用いる

267. 毛髪用剤（発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤）

2679. その他の毛髪用剤（発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カルプロニウム塩化物 ④ フロジン外用液 5% Furozin (第一三共) 5%30mL/本 【薬価】 19.70 円 / mL	【効】 ①次記のごとき疾患における脱毛防止ならびに発毛促進：円形脱毛症（多発性円形脱毛症を含む）, 悪性脱毛症, びまん性脱毛症, 枇糠性脱毛症, 壮年性脱毛症, 症候性脱毛症など. 乾性脂漏. ②尋常性白斑 【用】 (外) ① 1 日 2～3 回適量を患部に塗布, あるいは被髪部全体にふりかけ軽くマッサージする. ② 1 日 3～4 回適量を塗布

269. その他の外皮用薬

2691. 外用ビタミン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カルシポトリオール ドボネックス軟膏 50μg/g Ⓢ Dovonex (鳥居) 0.005%10g/本 【薬価】 75.60 円 / g	【効】 尋常性乾癬 【用】 (外) 1 日 2 回適量を患部に塗布
マキサカルシトール オキサロール軟膏 25μg/g Ⓢ Oxarol (マルホ) 0.0025%10g/本 【薬価】 58.30 円 / g	【効】 尋常性乾癬, 魚鱗癬群, 掌蹠角化症, 掌蹠膿疱症 【用】 (外) 1 日 2 回適量を患部に塗擦

2699. 他に分類されない外用用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アダバレン <u>ディフェリンゲル 0.1%</u> ㊞ Differin (塩野義) 0.1%15g/本 【薬価】 58.20 円/g	【効】 尋常性ざ瘡 【用】 (外) 1日1回, 洗顔後, 患部に適量を塗布
アルプロスタジルアルファデクス <u>プロスタンディン軟膏 0.003%</u> ㊞ Prostandin (小野) 0.003%30g/本 【薬価】 37.50 円/g	【効】 褥瘡, 皮膚潰瘍(熱傷潰瘍, 糖尿病性潰瘍, 下腿潰瘍, 術後潰瘍) 【用】 (外) 症状及び病巣の大きさに応じて適量を使用. 潰瘍周囲から潰瘍部にかけて消毒・清拭した後, 1日2回, 適量をガーゼなどにのぼしてこれを潰瘍部に貼付するか, 潰瘍部に直接塗布し, ガーゼなどで保護
ジアフェニルスルホン <u>レクチゾール錠 25mg</u> Lectisol (田辺三菱) 25mg/T 【薬価】 76.30 円/T	【効】 ①持久性隆起性紅斑, デューリング疱疹状皮膚炎, 天疱瘡, 類天疱瘡, 色素性痒疹. ②ハンセン病. <適応菌種> 本剤に感性のらい菌 【用】 (内) ① 1日 50~100mgを2~3回に分割. ② 1日 75~100mg. 他剤と併用して使用
ジファミラスト <u>モイゼルト軟膏 1%</u> Moizerto (大塚) 10g/本 【薬価】 150.40 円/g	【効】 アトピー性皮膚炎 【用】 (外) 成人: 1%製剤を1日2回, 適量を患部に塗布. 小児: 0.3%製剤を1日2回, 適量を患部に塗布. 症状に応じて, 1%製剤を1日2回, 適量を患部に塗布できる
タクロリムス水和物 <u>プロトピック軟膏 0.03% 小児用</u> ㊞ Protopic (マルホ) 0.03%5g/本 【薬価】 78.60 円/g	【効】 アトピー性皮膚炎 【用】 (外) 小児: 1日1~2回, 適量を患部に塗布. 1回あたりの塗布量は5gまで
タクロリムス水和物 <u>プロトピック軟膏 0.1%</u> ㊞ Protopic (マルホ) 0.1%5g/本 【薬価】 66.00 円/g	【効】 アトピー性皮膚炎 【用】 (外) 1日1~2回, 適量を患部に塗布. 1回あたりの塗布量は5gまで
デルゴシチニブ <u>コレクチム軟膏 0.25% (院外)</u> Corectim (鳥居) 0.25%1g 【薬価】 137.60 円/g <u>コレクチム軟膏 0.5%</u> Corectim (鳥居) 5g/本 【薬価】 143.00 円/g	【効】 アトピー性皮膚炎 【用】 (外) 成人: 0.5%製剤を1日2回, 適量を患部に塗布. 1回あたりの塗布量は5gまで. 小児: 0.25%製剤を1日2回, 適量を患部に塗布. 症状に応じて, 0.5%製剤を1日2回塗布できる. 1回あたりの塗布量は5gまでとするが, 体格を考慮する
トラフェルミン(遺伝子組換え) <u>フィブラストスプレー 500</u> Fiblast (科研) 500 μ g/V(溶解液付) 【薬価】 7,390.40 円/瓶	【効】 褥瘡, 皮膚潰瘍(熱傷潰瘍, 下腿潰瘍) 【用】 (外) 添付溶解液 1mL 当たり 100 μ g を用時溶解し, 潰瘍面を清拭後, 本剤専用の噴霧器を用い, 1日1回, 潰瘍の最大径が6cm以内の場合は, 潰瘍面から約5cm離して5噴霧(30 μ g)する. 潰瘍の最大径が6cmを超える場合は, 薬剤が同一潰瘍面に5噴霧されるよう, 潰瘍面から約5cm離して同様の操作を繰り返す
メトロニダゾール <u>ロゼックスゲル 0.75%</u> Rozex (大塚) 0.75% 15g/本 【薬価】 97.50 円/g	【効】 ①がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減. ②酒さ 【用】 (外) ①症状及び病巣の広さに応じて適量を使用. 潰瘍面を清拭後, 1日1~2回ガーゼ等のにぼして貼付するか, 患部に直接塗布しその上をガーゼ等で保護. ② 1日2回, 患部を洗浄後, 適量を塗布

26. 外皮用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ヨウ素 カデックス軟膏 0.9% Cadex(スミス・アンド・ネフュー) 40g/本 【薬価】53.90円/g</p>	<p>【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿潰瘍） 【用】（外）潰瘍面を清拭後1日1回患部に約3mmの厚さに塗布（目安：直径4cmあたり3g），滲出液の量が多い場合1日2回</p>
<p>ドボベット軟膏 Ⓜ Dovobet（協和キリン） 30g/本 【薬価】170.90円/g 1g中： カルシポトリオール水和物 52.2μg （カルシポトリオールとして 50.0μg） ベタメタゾンジプロピオン酸エ ステル 0.643mg ドボベットゲル Ⓜ Dovobet（協和キリン） 15g/本 【薬価】170.90円/g 1g中： カルシポトリオール水和物 52.2μg （カルシポトリオールとして 50.0μg） ベタメタゾンジプロピオン酸エ ステル 0.643mg ドボベットフォーム Ⓜ Dovobet（協和キリン） 60g/本 【薬価】170.90円/g 原液1g中： カルシポトリオール水和物 52.2μg （カルシポトリオールとして 50.0μg） ベタメタゾンジプロピオン酸エ ステル 0.643mg</p>	<p>【効】尋常性乾癬 【用】（外）1日1回，患部に適量塗布</p>
<p>ユーバスタコーク軟膏（院外） U pasta（興和） 100g/本 【薬価】12.40円/g 100g中： 精製白糖 70.0g ポビドンヨード 3.0g ネグミンシュガー軟膏 Negmin sugar（ファイザー） 100g/本 【薬価】8.10円/g 【先発品】ユーバスタコーク軟膏， ソアナース軟膏 100g中： 精製白糖 70.0g ポビドンヨード 3.0g</p>	<p>【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿潰瘍） 【用】（外）症状及び病巣の広さに応じて適量を使用。潰瘍面を清拭後，1日1～2回ガーゼにのぼして貼付するか，又は患部に直接塗布しその上をガーゼで保護</p>

27. 歯科口腔用薬

271. 歯科用局所麻酔剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミノ安息香酸エチル ④ジンジカインゲル 20% Gingicaine (白水貿易) 30g/本 【薬価】 67.90 円 /g	【効】 歯科領域における表面麻酔 【用】 (外) 適量とり局所に塗布

279. その他の歯科口腔用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベンゼトニウム塩化物 ネオステリングリーンうがい液 0.2% Neostelin green (日本歯科) 0.2%40mL/本 【薬価】 5.40 円 /mL	【効】 ①口腔内の消毒, ②抜歯創の感染予防 【用】 (外) ① 0.004% (50 倍希釈) 溶液として洗口, ② 0.01 ~ 0.02% (10 ~ 20 倍希釈) 溶液として洗浄

29. その他の個々の器官系用医薬品

29. その他の個々の器官系用医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セファランチン セファランチン錠 1mg Cepharanthin (化研) 1mg/T 【薬価】 6.50 円 /T	【効】 ①放射線による白血球減少症. ②円形脱毛症・黚糠性脱毛症 【用】 (内) ① 1日3～6mgを2～3回に分割し食後. ② 1日1.5～2mgを2～3回に分割し食後

3. 代謝性医薬品

31. ビタミン剤

311. ビタミン A 及び D 剤

3111. 合成ビタミン A 製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビタミン A <u>チョコラ A 錠 1万単位 (院外)</u> Chocola A (エーザイ) 10,000 単位 /T 【薬価】 7.80 円 /T	【効】 ①ビタミン A 欠乏症の治療 (夜盲症, 結膜乾燥症, 角膜乾燥症, 角膜軟化症). ②次記疾患のうち, ビタミン A 欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合: 角化性皮膚疾患 【用】 (内) 治療の目的には, 1日 10000 ~ 100000 ビタミン A 単位. 通常 1日 3,000 ~ 100,000 ビタミン A 単位

3112. 合成ビタミン D 製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アルファカルシドール <u>アルファロール内用液 0.5µg/ml</u> Ⓢ Alfamol (中外) 0.5µg/ml 【薬価】 34.10 円 /ml	【効】 次記疾患におけるビタミン D 代謝異常に伴う諸症状 (低カルシウム血症, テタニー, 骨痛, 骨病変等) の改善: ①慢性腎不全, ②副甲状腺機能低下症, ③ビタミン D 抵抗性クル病・骨軟化症, ④未熟児, ⑤骨粗鬆症 【用】 (内) ①⑤ 1日 1回 0.5 ~ 1.0µg. ②③ 1日 1回 1.0 ~ 4.0µg. 小児: ①②③ 1日 1回 0.05 ~ 0.1µg/kg. ⑤ 1日 1回 0.01 ~ 0.03µg/kg. 未熟児: ④ 1日 1回 0.008 ~ 0.1µg/kg
アルファカルシドール <u>ワンアルファ錠 0.5µg (院外)</u> Ⓢ Onealfa (帝人) 0.5µg/T 【薬価】 9.60 円 /T <u>後アルファカルシドール錠 0.5µg 「アメル」</u> Ⓢ Alfacalcidol (共和) 0.5µg/T 【薬価】 5.90 円 /T 【先発品】 ワンアルファ錠 0.5µg	【効】 次記疾患 (①②) におけるビタミン D 代謝異常に伴う諸症状 (低カルシウム血症, テタニー, 骨痛, 骨病変等) の改善: ①慢性腎不全. ②副甲状腺機能低下症, ビタミン D 抵抗性クル病・骨軟化症. ③骨粗鬆症 【用】 (内) 患者の血清カルシウム濃度の十分な管理のもとに, 投与量を調整. ①③ 1日 1回 0.5 ~ 1.0µg, ② 1日 1回 1.0 ~ 4.0µg. 小児: ①② 1日 1回 0.05 ~ 0.1µg/kg, ③ 1日 1回 0.01 ~ 0.03µg/kg
エルデカルシトール <u>後エルデカルシトールカプセル 0.5µg 「サワイ」</u> Ⓢ Eldecalcitol (沢井) 0.5µg/C 【薬価】 14.10 円 /cap 【先発品】 エディロールカプセル 0.5µg <u>後エルデカルシトールカプセル 0.75µg 「サワイ」</u> Ⓢ Eldecalcitol (沢井) 0.75µg/C 【薬価】 19.90 円 /cap 【先発品】 エディロールカプセル 0.75µg	【効】 骨粗鬆症 【用】 (内) 1日 1回 0.75µg, 症状により 1日 1回 0.5µg に減量

31. ビタミン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カルシトリオール <u>ロカルトロールカプセル 0.25 (院外)</u> (株) Rocaltrol (中外) 0.25μg/cap 【薬価】9.90円/cap <u>後カルシトリオールカプセル 0.25 μg 「YD」</u> (株) Calcitriol (陽進堂) 0.25μg/cap 【薬価】5.90円/cap 【先発品】ロカルトロールカプセル 0.25</p>	<p>【効】①骨粗鬆症. 次の疾患におけるビタミンD代謝異常に伴う諸症状(低カルシウム血症, しびれ, テタニー, 知覚異常, 筋力低下, 骨痛, 骨病変等)の改善: ②慢性腎不全. ③副甲状腺機能低下症, クル病・骨軟化症 【用】(内) ①1日0.5μgを2回に分割. ②1日1回0.25～0.75μg. ③1日1回0.5～2.0μg</p>
<p>マキサカルシトール <u>後マキサカルシトール静注透析用 2.5μg 「ニプロ」</u> (株) Maxacalcitol (ニプロ) 2.5μg1mL/A 【薬価】213.00円/A 【先発品】オキサロール注 2.5μg <u>後マキサカルシトール静注透析用 5μg 「ニプロ」</u> (株) Maxacalcitol (ニプロ) 5μg1mL/A 【薬価】275.00円/A 【先発品】オキサロール注 5μg</p>	<p>【効】維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 【用】(注) 透析終了直前に1回2.5～10μg週3回, 透析回路静脈側に注入. 血清副甲状腺ホルモン(PTH)の改善効果が得られない場合, 高カルシウム血症の発現等に注意し1回20μgを上限に慎重に漸増</p>

312. ビタミン B₁ 剤

3121. ビタミン B₁ 剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>チアミン塩化物塩酸塩 <u>メタボリン注射液 50mg</u> Metabolin (武田) 50mg1mL/A 【薬価】94.00円/A</p>	<p>【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び治療. ②ビタミンB1の需要が増大し, 食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患, 甲状腺機能亢進症, 妊産婦, 授乳婦, はげしい肉体労働時など). ③ウェルニッケ脳炎. ④脚気衝心. ⑤次記疾患のうちビタミンB1の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合: 神経痛, 筋肉痛, 関節痛, 末梢神経炎, 末梢神経麻痺, 心筋代謝障害. ⑤の適応に対して, 効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(注) 1日1～50mgを皮下注, 筋注又は静注</p>
<p>チアミン塩化物塩酸塩 <u>メタボリンG注射液 10mg</u> Metabolin G (武田) 10mg1mL/A 【薬価】84.00円/A</p>	<p>【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び治療. ②ビタミンB1の需要が増大し, 食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患, 甲状腺機能亢進症, 妊産婦, 授乳婦, はげしい肉体労働時など). ③ウェルニッケ脳炎. ④脚気衝心. ⑤次記疾患のうち, ビタミンB1の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合: 神経痛, 筋肉痛・関節痛. 末梢神経炎・末梢神経麻痺. 心筋代謝障害. ⑤の適応に対して, 効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(注) 1日1～50mgを皮下注, 筋注又は静注</p>

3122. ビタミン B₁ 誘導体制剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フルスルチアミン <u>25mg アリナミン F 糖衣錠</u> Alinamin F (武田) 25mg/T 【薬価】 5.90 円 / T	【効】 ①ビタミン B ₁ 欠乏症の予防及び治療。②ビタミン B ₁ の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦、激しい肉体労働時等）。③ウェルニッケ脳症。④脚気衝心。⑤次記疾患のうちビタミン B ₁ 欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺、心筋代謝障害、便秘等の胃腸運動機能障害、術後腸管麻痺。⑤の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 (内) 1 日量 25 ～ 100mg を 1 日 1 ～ 3 回に分割し食直後
プロスルチアミン <u>アリナミン注射液 10mg</u> Alinamin (武田) 10mg 2mL/A 【薬価】 95.00 円 / A	【効】 ①ビタミン B ₁ 欠乏症の予防及び治療。②ビタミン B ₁ の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦、激しい肉体労働時等）。③ウェルニッケ脳症。④脚気衝心。⑤次記疾患のうちビタミン B ₁ 欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺、心筋代謝障害、便秘等の胃腸運動機能障害、術後腸管麻痺。⑤の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 (注) 1 日量 10mg を静注

313. ビタミン B 剤（ビタミン B₁ 剤を除く。）3131. ビタミン B₂ 剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リポフラビン酪酸エステル <u>ハイボン錠 20mg</u> Hibon (田辺三菱) 20mg/T 【薬価】 5.70 円 / T	【効】 ①高コレステロール血症。②ビタミン B ₂ 欠乏症の予防及び治療。③次の疾患のうち、ビタミン B ₂ の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎。④ビタミン B ₂ の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、激しい肉体労働時等）。①③の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと 【用】 (内) ① 1 日 60 ～ 120mg 2 ～ 3 回に分割。②③④ 1 日 5 ～ 20mg 2 ～ 3 回に分割

3132. ニコチン酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ニコチン酸アミド <u>ニコチン酸アミド散 10%「ソネ」</u> Nicotinamide (ゾンネボード) 末 【薬価】 10.70 円 / g	【効】 ①ニコチン酸欠乏症の予防及び治療（ペラグラ等）、ニコチン酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、激しい肉体労働時等）。②次の疾患のうちニコチン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：口角炎、口内炎、舌炎、接触皮膚炎、急・慢性湿疹、光線過敏性皮膚炎、メニエル症候群、末梢循環障害（レイノー病、四肢冷感、凍瘡、凍傷）、耳鳴、難聴 ②の適応（効能又は効果）に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 (内) 1 日 25 ～ 200mg

3133. パントテン酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
パンテチン <u>パントシン散 20%</u> Pantosin (アルフレッサ) 200mg/g 【薬価】 12.00 円 / g	【効】 ①パントテン酸欠乏症の予防および治療。②パントテン酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など）。③次記疾患のうち、パントテン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：高脂血症、弛緩性便秘、ストレプトマイシンおよびカナマイシンによる副作用の予防および治療、急・慢性湿疹、血液疾患の血小板数ならびに出血傾向の改善。なお、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 (内) 1 日 30 ～ 180mg を 1 ～ 3 回に分割。血液疾患、弛緩性便秘には、1 日 300 ～ 600mg を 1 ～ 3 回に分割。高脂血症には、1 日 600mg を 3 回に分割

31. ビタミン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
パンテノール パントール注射液 500mg Pantol (トーアエイヨー) 500mg2mL/A 【薬価】 57.00 円 /A	【効】 ①パントテン酸欠乏症の予防及び治療。②パントテン酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦等）。③次記疾患のうち、パントテン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：ストレプトマイシン及びカナマイシンによる副作用の予防及び治療、接触皮膚炎、急・慢性湿疹、術後腸管麻痺（③に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。） 【用】 （注）1回 20～100mgを1日1～2回、術後腸管麻痺には1回 50～500mgを1日1～3回、必要に応じて6回まで、皮下注、筋注又は静注

3134. ビタミン B₆ 剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビリドキサルリン酸エステル水和物 ピドキサル錠 10mg Pydoxal (太陽ファルマ) 10mg/T 【薬価】 5.70 円 /T ピドキサル錠 20mg Pydoxal (太陽ファルマ) 20mg/T 【薬価】 5.90 円 /T	【効】 ①次記疾患のうち、ビタミン B6 欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：口角炎、口唇炎、舌炎、口内炎、急・慢性湿疹、脂漏性湿疹、接触皮膚炎、アトピー皮膚炎、尋常性ざ瘡、末梢神経炎、放射線障害（宿酔）。②ビタミン B6 の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）。③ビタミン B6 依存症（ビタミン B6 反応性貧血等）。④ビタミン B6 欠乏症の予防及び治療（薬物投与によるものを含む。例えばイソニアジド）。上記適応（効能・効果）のうち、①の疾患に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 （内）1日 10～60mgを1～3回に分割。極めてまれに依存症の場合に、より大量を用いる必要がある場合もある

3135. 葉酸製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
葉酸 フォリアミン錠 Foliamin (武田) 5mg/T 【薬価】 9.80 円 /T	【効】 ①葉酸欠乏症の予防及び治療。②葉酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）。③吸収不全症候群（スプルー等）。④悪性貧血の補助療法。⑤次記疾患のうち、葉酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：栄養性貧血、妊娠性貧血、小児貧血、抗痙攣剤、抗マラリア剤投与に起因する貧血。⑥アルコール中毒及び肝疾患に関連する大赤血球性貧血。⑦再生不良性貧血。⑧顆粒球減少症。⑤の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 （内）1日 5～20mgを2～3回に分割、小児：1日 5～10mgを2～3回に分割。消化管に吸収障害のある場合、あるいは症状が重篤な場合は注射を行う方がよい
葉酸 フォリアミン注射液 Foliamin (武田) 15mg1mL/A 【薬価】 96.00 円 /A	【効】 ①葉酸欠乏症の予防及び治療。②葉酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）。③吸収不全症候群（スプルー等）。④悪性貧血の補助療法。⑤次記疾患のうち、葉酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：栄養性貧血、妊娠性貧血、小児貧血、抗痙攣剤、抗マラリア剤投与に起因する貧血。⑥アルコール中毒及び肝疾患に関連する大赤血球性貧血。⑦再生不良性貧血。⑧顆粒球減少症。⑤の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 （注）1回 15mgを1日1回、皮下注又は筋注

3136. ビタミン B₁₂ 剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヒドロキソコバラミン酢酸塩 フレスミン S 注射液 1000μg Fresmin S (陽進堂) 1000μg1mL/A 【薬価】 101.00 円 /A	【効】 ①ビタミン B12 欠乏症の予防及び治療。②ビタミン B12 の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦等）。③巨赤芽球性貧血。④広節裂頭条虫症。⑤悪性貧血に伴う神経障害。⑥吸収不全症候群（スプルー等）。⑦次記疾患のうち、ビタミン B12 の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：栄養性及び妊娠性貧血、胃切除後の貧血、肝障害に伴う貧血、放射線による白血球減少症、神経痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺、筋肉痛、関節痛 ⑦の適応に対しては、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】 （注）1回 1,000μg までを筋注又は静注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メコバラミン <u>メチコバル錠 500μg</u> Methycobal (エーザイ) 500 μ g/T 【薬価】10.10 円 /T	【効】末梢性神経障害 【用】(内) 1日 1500 μ g を 3回に分割
メコバラミン <u>メチコバル注射液 500μg</u> Methycobal (エーザイ) 500 μ g1mL/A 【薬価】98.00 円 /A	【効】①末梢性神経障害. ②ビタミン B12 欠乏による巨赤芽球性貧血 【用】(注) ① 1日 1回 500 μ g を週 3回, 筋注又は静注. ② 1日 1回 500 μ g を週 3回, 筋注又は静注. 約 2 か月投与した後, 維持療法として 1~3 か月に 1回 500 μ g

314. ビタミン C 剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アスコルビン酸 <u>ハイシー顆粒 25%</u> Hicce (武田) 250mg/g 【薬価】6.30 円 /g	【効】①ビタミン C 欠乏症の予防及び治療 (壊血病, メルレル・バロー病). ②ビタミン C の需要が増大し, 食事からの摂取が不十分な際の補給 (消耗性疾患, 妊産婦, 授乳婦, はげしい肉體労働時など). ③次記疾患のうち, ビタミン C の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 (効果が無いのに月余にわたって漫然と使用しないこと): 毛細管出血 (鼻出血, 歯肉出血, 血尿など), 薬物中毒, 副腎皮質機能障害, 骨折時の骨基質形成・骨癒合促進, 肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着, 光線過敏性皮膚炎 【用】(内) 1日 50~2,000mg (本剤として 0.2~8g) を 1~数回に分割
アスコルビン酸 <u>ビタミン注射液 500mg</u> Vitacimin (武田) 500mg2mL/A 【薬価】88.00 円 /A	【効】①ビタミン C 欠乏症の予防及び治療 (壊血病, メルレル・バロー病). ②ビタミン C の需要が増大し, 食事からの摂取が不十分な際の補給 (消耗性疾患, 妊産婦, 授乳婦, 激しい肉體労働時等). ③次記疾患のうち, ビタミン C 欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合: 毛細管出血 (鼻出血, 歯肉出血, 血尿等), 薬物中毒, 副腎皮質機能障害, 骨折時の骨基質形成・骨癒合促進, 肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着, 光線過敏性皮膚炎. ③の効能・効果に対して, 効果が無いのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(注) 1日 50~2000mg を 1~数回に分割し静注

316. ビタミン K 剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フィトナジオン <u>ケーワン錠 5mg</u> Kaywan (エーザイ) 5mg/T 【薬価】9.40 円 /T	【効】①ビタミン K 欠乏症の予防及び治療: 各種薬剤 (クマリン系抗凝血薬, サリチル酸, 抗生物質など) 投与中に起こる低プロトロンビン血症, 胆道及び胃腸障害に伴うビタミン K の吸収障害, 新生児の低プロトロンビン血症, 肝障害に伴う低プロトロンビン血症. ②ビタミン K 欠乏が推定される出血 【用】(内) 1日 5~15mg, 新生児出血の予防には母体に対し 10mg, 薬剤投与中に起こる低プロトロンビン血症等には 20~50mg を分割投与
メナテトレノン <u>グラケカプセル 15mg</u> Glakay (エーザイ) 15mg/cap 【薬価】16.50 円 /cap	【効】骨粗鬆症における骨量・疼痛の改善 【用】(内) 1日 45mg を 3回に分割し食後
メナテトレノン <u>ケイツーシロップ 0.2% (院外)</u> Kaytwo (エーザイ) 2mg/mL 【薬価】23.70 円 /mL	【効】①新生児出血症及び新生児低プロトロンビン血症の治療. ②新生児・乳児ビタミン K 欠乏性出血症の予防 【用】(内) ① 1日 1回 2mg (本剤として 1mL). 症状に応じて 6mg (本剤として 3mL) まで増量. ②出生後, 哺乳が確立したことを確かめてから, 1回 2mg (本剤として 1mL). その後, 2回目として生後 1週間又は産科退院時のいずれか早い時期, 3回目として生後 1か月時にそれぞれ 1回 2mg (本剤として 1mL)

31. ビタミン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メナテトレノン ケイツー N 静注 10mg Kaytwo N (エーザイ) 10mg2mL/A 【薬価】 62.00 円/A	【効】 ビタミン K 欠乏による次の疾患及び症状：①胆道閉塞・胆汁分泌不全による低プロトロンビン血症，分娩時出血，クマリン系抗凝血薬投与中に起こる低プロトロンビン血症．②新生児低プロトロンビン血症．③クマリン系殺鼠剤中毒時に起こる低プロトロンビン血症 【用】(注) ① 1日1回 10～20mgを静注．②生後直ちに1回1～2mgを静注し，症状に応じて2～3回反復静注．③1回20mgを静注し，症状，血液凝固能検査結果に応じて1日量40mgまで増量

317. 混合ビタミン剤（ビタミン A・D 混合製剤を除く.）

3179. その他の混合ビタミン剤（ビタミン A・D 混合製剤を除く.）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
高カロリー輸液用総合ビタミン ダイメジン・マルチ注 Daimedin multi (日医工) 1V 【薬価】 223.00 円/瓶 1バイアル中： チアミン塩化物塩酸塩 3mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5.08mg (リボフラビンとして4mg) ピリドキシン塩酸塩 4mg シアノコバラミン 10μg ニコチン酸アミド 40mg 葉酸 0.4mg パンテノール 14.04mg (パントテン酸として15mg) ビオチン 0.1mg アスコルビン酸 100mg レチノールパルミチン酸エステル 3300 ビタミン A 単位 エルゴカルシフェロール 10μg トコフェロール酢酸エステル 15mg フィトナジオン 2mg	【効】 経口，経腸管栄養補給が不能・不十分で高カロリー静脈栄養に頼らざるを得ない場合のビタミン補給 【用】(注) 1日1バイアル，高カロリー経静脈栄養輸液に溶解し点滴静注
総合ビタミン剤 調剤用パンビタン末 Panvitan (武田) 末 【薬価】 6.30 円/g 1g 中： レチノールパルミチン酸エステル (レチノールとして) 2500I.U. チアミン硝化物 1mg リボフラビン 1.5mg ピリドキシン塩酸塩 1mg シアノコバラミン 1μg アスコルビン酸 37.5mg エルゴカルシフェロール 200I.U. トコフェロール酢酸エステル 1.1mg (トコフェロールとして1mg) パントテン酸カルシウム 5mg ニコチン酸アミド 10mg 葉酸 0.5mg	【効】 本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し，食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）．効果が無いのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(内) 1日1～2g

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>シナール配合顆粒 Cinal (塩野義) 顆粒 【薬価】6.30円/g 1g中： アスコルビン酸 200mg パントテン酸カルシウム 3mg</p>	<p>【効】本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）、炎症後の色素沈着。効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(内) 1回1～3gを1日1～3回</p>
<p>ノイロビタン配合錠 Neurovitan (アステラス) 1錠 【薬価】5.80円/T 1錠中： オクトチアミン 25mg リボフラビン 2.5mg ピリドキシリン塩酸塩 40mg シアノコバラミン 0.25mg</p>	<p>【効】①本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）。②次の疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺。効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(内) 1日1～3錠</p>
<p>ビタノイリンカプセル25 Vitaneurin (武田) 1cap 【薬価】5.90円/cap 1カプセル中： フルスルチアミン (TTFD) 25mg (フルスルチアミン塩酸塩 27.285mg) ピリドキサルリン酸エステル水和物 15mg ヒドロキソコバラミン 125μg (ヒドロキソコバラミン酢酸塩 130.5μg) リボフラビン (ビタミンB2) 2.5mg</p>	<p>【効】本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）。次の疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺。効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(内) 1日1～4カプセル</p>
<p>ビタメジン配合カプセル B25 Vitamedin (第一三共) 1cap 【薬価】5.70円/cap 1カプセル中： ベンフォチアミン 34.58mg (チアミン塩化物塩酸塩として 25mg) ピリドキシリン塩酸塩 25mg シアノコバラミン 250μg</p>	<p>【効】①本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）。②次記疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺。効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(内) 1日3～4カプセル</p>
<p>ビタメジン静注用 Vitamedin (第一三共) 1V 【薬価】156.00円/瓶 1バイアル中： リン酸チアミンジスルフィド 107.13mg (チアミン塩化物塩酸塩として 100mg) ピリドキシリン塩酸塩 100mg シアノコバラミン 1mg</p>	<p>【効】①本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）。②次記疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺。効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない 【用】(注) 1日1バイアルをブドウ糖注射液又は生理食塩液若しくは注射用水20mLに溶解し、静注あるいは点滴静注。静注の場合3分以上時間をかけて極めて緩徐に</p>

31. ビタミン剤

319. その他のビタミン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビオチン ビオチン散 0.2%「ホエイ」(院外) Biotin (マイラン) 末 【薬価】6.50円/g	【効】急・慢性湿疹，小児湿疹，接触皮膚炎，脂漏性湿疹，尋常性ざ瘡 【用】(内) 1日 0.5～2mg (本剤として 0.25～1.0g) を 1～3回に分割

32. 滋養強壯薬

321. カルシウム剤

3211. 乳酸カルシウム製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
乳酸カルシウム水和物 乳酸カルシウム「ケンエー」 Calcium lactate hydrate (健栄) 末 【薬価】 3.84 円 /g	【効】 ①低カルシウム血症に起因する次記症候の改善：テタニー、②次記代謝性骨疾患におけるカルシウム補給：妊婦・産婦の骨軟化症、③発育期におけるカルシウム補給 【用】 (内) 1回 1g を 1日 2～5回

3213. グルコン酸カルシウム製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グルコン酸カルシウム水和物 カルチコール末(経過措置)(水江) Calcicol (日医工) 末 【薬価】 7.90 円 /g	【効】 ①低カルシウム血症に起因する次の症候の改善：テタニー、テタニー関連症状、②小児脂肪便におけるカルシウム補給 【用】 (内) 1日 1～5g を 3回に分割
グルコン酸カルシウム水和物 カルチコール注射液 8.5%5mL Calcicol (日医工) 425mg5mL/A 【薬価】 84.00 円 /A	【効】 ①低カルシウム血症に起因する次記症候の改善：テタニー、テタニー関連症状、②小児脂肪便におけるカルシウム補給 【用】 (注) 0.4～2.0g (本剤 4.7～23.5mL = カルシウムとして 1.83～9.17mEq) を 8.5w/v% (0.39mEq/mL) 液として、1日 1回緩徐に (カルシウムとして毎分 0.68～1.36mEq = 本剤毎分 1.7～3.5mL) 静注。小児脂肪便に用いる場合は、経口投与不能時に限る

3214. 有機酸カルシウム製剤 (乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く.)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
L-アスパラギン酸カルシウム水和物 アスパー CA 錠 200 Aspara-CA (田辺三菱) 200mg/T 【薬価】 5.70 円 /T	【効】 低カルシウム血症に起因する次の症候の改善：テタニー、テタニー関連症状、次の代謝性骨疾患におけるカルシウム補給：骨粗鬆症、骨軟化症、発育期におけるカルシウム補給、妊娠・授乳時におけるカルシウム補給 【用】 (内) 1日 1.2g (6錠) を 2～3回に分割

3219. その他のカルシウム剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
デノタスチュアブル配合錠 Denotas chewable (第一三共) 錠 【薬価】 12.00 円 /T 1錠中： 沈降炭酸カルシウム 762.5mg (カルシウムとして 305mg) コレカルシフェロール 0.005mg (200IU) 炭酸マグネシウム 59.2mg (マグネシウムとして 15mg)	【効】 RANKL 阻害剤 (デノスマブ (遺伝子組換え) 等) 投与に伴う低カルシウム血症の治療及び予防 【用】 (内) 1日 1回 2錠

322. 無機質製剤

3221. ヨウ素化合物製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」 (院外) Potassium iodide (日医工) 50mg/丸 【薬価】5.70円/丸	【効】①甲状腺腫(甲状腺機能亢進症を伴うもの)。②次記疾患に伴う喀痰喀出困難:慢性気管支炎,喘息。③第三期梅毒。④放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減 【用】(内)①1日5~50mgを1~3回に分割。②③1回0.1~0.5gを1日3~4回。④13歳以上:1回100mg。3歳以上13歳未満:1回50mg。生後1か月以上3歳未満:1回32.5mg。新生児:1回16.3mg

3222. 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
含糖酸化鉄 フェジン静注 40mg Fesin (日医工) 鉄として40mg2mL/A 【薬価】127.00円/A	【効】鉄欠乏性貧血 【用】(注)経口鉄剤の投与が困難又は不適当な場合に限り使用。鉄として1日40~120mg(本剤として2~6mL)を2分以上かけて徐々に静注
クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア錠 50mg Ferromia (エーザイ) 50mg/T 【薬価】6.40円/T	【効】鉄欠乏性貧血 【用】(内)鉄として1日100~200mg(本剤として2~4錠)を1~2回に分割し食後
デルイソマルトース第二鉄 モノヴァー静注 500mg MonoVer (日本新薬) 500mg/瓶 【薬価】6,189.00円/瓶	【効】鉄欠乏性貧血 【用】(注)体重50kg以上:鉄として1回あたり1000mgを上限として週1回点滴静注,又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回徐々に静注。体重50kg未満:鉄として1回あたり20mg/kgを上限として週1回点滴静注,又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回徐々に静注。治療終了時までの総投与鉄量は,患者のヘモグロビン濃度及び体重に依るが,鉄として2000mg(体重50kg未満は1000mg)を上限とする
溶性ピロリン酸第二鉄 ⑥インクレミンシロップ 5% Incremin (アルフレッサ) 50mg(鉄として6mg)/mL 【薬価】6.20円/mL	【効】鉄欠乏性貧血 【用】(内)鉄として次の量を1日量とし,3~4回に分割。1歳未満:12~24mg(2~4mL)。1~5歳:18~60mg(3~10mL)。6~15歳:60~90mg(10~15mL)

3229. その他の無機質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
L-アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム錠 300mg Aspara potassium (田辺三菱) 300mg(K ⁺ :1.8mEq)/T 【薬価】5.90円/T	【効】次記疾患又は状態におけるカリウム補給:①降圧利尿剤,副腎皮質ホルモン,強心配糖体,インスリン,ある種の抗生物質などの連用時。②低カリウム血症型周期性四肢麻痺。③心疾患時の低カリウム状態。④重症嘔吐,下痢,カリウム摂取不足及び手術後 【用】(内)1日0.9~2.7gを3回に分割。症状により1回3gまで
L-アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム注 10mEq Aspara potassium (田辺三菱) 1712mg(K ⁺ :10mEq)10mL/A 【薬価】60.00円/A	【効】次記疾患又は状態におけるカリウム補給:①降圧利尿剤,副腎皮質ホルモン,強心配糖体,インスリン,ある種の抗生物質などの連用時。②低カリウム血症型周期性四肢麻痺。③心疾患時の低カリウム状態。④重症嘔吐,下痢,カリウム摂取不足及び手術後 【用】(注)1回1.71~5.14g(カリウムとして10~30mEq:本剤1~3管)を注射用水,5%ブドウ糖注射液,生理食塩液又は他の適当な希釈剤で希釈する。その液の濃度は0.68w/v%(カリウムとして40mEq/L)以下として,8mL/分以下の速度で点滴静注。1日投与量は17.1g(カリウムとして100mEq:本剤10管)まで
塩化カリウム 塩化カリウム「フソー」 Potassium chloride (扶桑) 末 【薬価】1.37円/g	【効】①次記疾患又は状態におけるカリウム補給:降圧利尿剤,副腎皮質ホルモン,強心配糖体,インスリン,ある種の抗生物質などの連用時。低カリウム血症型周期性四肢麻痺,重症嘔吐,下痢,カリウム摂取不足及び手術後。②低クロル性アルカローシス 【用】(内)1日2~10gを数回に分割し,多量の水とともに

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
塩化カリウム ㊞塩化カリウム徐放錠 600mg「St」 Potassium chloride (佐藤薬品) 600mg/T (K: 8mEq/T) 【薬価】 5.90 円 / T	【効】 低カリウム血症の改善 【用】 (内) 1回 1200mgを1日2回食後
グルコン酸カリウム グルコンサンK 細粒 4mEq/g Gluconsan K (サンファーマ) 1g/包 【薬価】 6.90 円 / g	【効】 低カリウム状態時のカリウム補給 【用】 (内) 1回カリウム 10mEq 相当量を1日3～4回
高カロリー輸液用微量元素製剤 ㊞シザナリン配合点滴静注液 Cizanarine N (日新製薬) 2mL/管 【薬価】 59.00 円 / A 【先発品】 エレメンミック注 1管 (2mL) 中： 塩化第二鉄 9.460mg 塩化マンガン 0.1979mg 硫酸亜鉛水和物 17.25mg 硫酸銅 1.248mg ヨウ化カリウム 0.1660mg 元素量： Fe 35μmol Mn 1μmol Zn 60μmol Cu 5μmol I 1μmol	【効】 経口，経腸管栄養補給が不能又は不十分で高カロリー静脈栄養に頼らざるを得ない場合の亜鉛，鉄，銅，マンガン及びヨウ素の補給 【用】 (注) 1日 2mLを高カロリー静脈栄養輸液に添加し，点滴静注
ホスリボン配合顆粒 Phosribbon (ゼリア) 100mg/包 【薬価】 71.10 円 / 包 1包 (0.48g) 中： リン 100mg リン酸二水素ナトリウム一水和物 330mg 無水リン酸水素二ナトリウム 119mg	【効】 低リン血症 【用】 (内) リンとして1日あたり 20～40mg/kgを目安とし，数回に分割．リンとして1日あたり 3,000mgまで

323. 糖類剤

3231. ブドウ糖製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ブドウ糖 大塚糖液 5% Glucose (大塚) 5%20mL/A 【薬価】66.00 円/A 大塚糖液 5% Glucose (大塚) 5%250mL/ 袋 【薬価】284.00 円/ 袋 大塚糖液 5% Glucose (大塚) 5%500mL/ 袋 【薬価】332.00 円/ 袋 大塚糖液 10% Glucose (大塚) 10%500mL/ 袋 【薬価】240.00 円/ 袋 大塚糖液 20% Glucose (大塚) 20%20mL/A 【薬価】67.00 円/A 大塚糖液 50% Glucose (大塚) 50%500mL/ 袋 【薬価】431.00 円/ 袋 ブドウ糖注 50%PL「フソー」 Glucose (扶桑) 50%20mL/A 【薬価】99.00 円/A	【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給, 薬物・毒物中毒, 肝疾患. ②循環虚脱, 低血糖時の糖質補給, 高カリウム血症, 心疾患 (GIK 療法), その他非経口的に水・エネルギー補給を必要とする場合. ③注射剤の溶解希釈剤 【用】(注) ①1回5%液500~1000mLを静注. ②1回10~50%液20~500mLを静注. 点滴静注する場合はブドウ糖として0.5g/kg/時以下. ③適量
ブドウ糖 大塚糖液 5%2 ポート 50mL Glucose (大塚) 5%50mL/ 本 【薬価】224.00 円/ キット 大塚糖液 5%2 ポート 100mL Glucose (大塚) 5%100mL/ 本 【薬価】236.00 円/ キット	【効】注射剤の溶解希釈剤 【用】(注) 注射剤の溶解希釈に用いる

325. たん白アミノ酸製剤

3253. 混合アミノ酸製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
肝硬変用アミノ酸製剤 リーバクト配合顆粒 Livact (EA) 4.15g/ 包 【薬価】134.00 円/ 包 1 包 (4.15g) 中: L- イソロイシン 952mg L- ロイシン 1904mg L- バリン 1144mg	【効】食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善 【用】(内) 1回4.15g (1 包) を1日3回食後

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
肝硬変用アミノ酸製剤 <u>リーバクト配合経ロゼリー</u> Livact (EA) 20g/個 【薬価】 180.00円/個 1個(20g)中： L-イソロイシン 952mg L-ロイシン 1904mg L-バリン 1144mg	【効】 食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善 【用】 (内) 1回1個を1日3回食後
肝不全用アミノ酸製剤 <u>テルフィス点滴静注</u> Terufis (テルモ) 500mL/袋 【薬価】 903.00円/袋 組成：添付文書参照	【効】 慢性肝障害時における脳症の改善 【用】 (注) 1回500～1000mLを点滴静注，500mL/180～300分を基準．経中心静脈輸液法を用いる場合：500～1000mLを糖質輸液等に混和し24時間かけて中心静脈内に持続注入
腎不全用アミノ酸製剤 <u>キドミン輸液</u> Kidmin (大塚) 200mL/袋 【薬価】 429.00円/袋 組成：添付文書参照	【効】 次記の状態にある①急性腎不全・②慢性腎不全時のアミノ酸補給：低蛋白血症，低栄養状態，手術前後 【用】 (注) ①1日600mLを高カロリー輸液法にて中心静脈内に持続点滴注入．生体のアミノ酸利用率上，投与窒素1g(本剤：100mL)あたり300kcal以上の非蛋白熱量を投与．②末梢静脈投与：1日1回200mLを緩徐に点滴静注．投与速度は100mLあたり60分を基準とし，小児，高齢者，重篤な患者には更に緩徐に注入．透析療法施行時には透析終了90～60分前より透析回路の静脈側に注入．生体のアミノ酸利用率上，摂取熱量を1500kcal/日以上とすることが望ましい．高カロリー輸液法：1日400mLを中心静脈内に持続点滴注入．生体のアミノ酸利用率上，投与窒素1g(本剤：100mL)あたり300kcal以上の非蛋白熱量を投与
総合アミノ酸製剤 <u>アミゼットB輸液</u> Amizet B (テルモ) 200mL/袋 【薬価】 654.00円/袋 組成：添付文書参照	【効】 次の状態時のアミノ酸補給：低蛋白血症，低栄養状態，手術前後 【用】 (注) 末梢静脈内投与：1回200～400mLを緩徐に点滴静注，アミノ酸の量として10g/時前後が体内利用に望ましく，200mL/120分を基準とし，小児，老人，重篤な患者には更に緩徐に，糖類輸液剤と同時投与することが望ましい．中心静脈内投与：1日400～800mLを高カロリー輸液法により中心静脈内に持続点滴注入
総合アミノ酸製剤 <u>プロテアミン12注射液</u> Proteamin 12 (テルモ) 200mL/袋 【薬価】 570.00円/袋 1袋(200mL)中： L-イソロイシン 1,194mg L-ロイシン 2,276mg L-リジン塩酸塩 1,960mg L-メチオニン 866mg L-フェニルアラニン 1,948mg L-トレオニン 1,008mg L-トリプトファン 374mg L-バリン 1,380mg L-シスチン 46mg L-チロジン 114mg L-アルギニン塩酸塩 2,976mg L-塩酸ヒスチジン 1,412mg L-アラニン 1,642mg L-アスパラギン酸 404mg L-グルタミン酸 204mg グリシン 3,136mg L-プロリン 2,126mg L-セリン 934mg	【効】 次記状態時のアミノ酸補給：手術前後，消化管障害，食事制限など蛋白質の摂取又は吸収に障害のある場合，手術，熱傷などで蛋白質の損失が著しい場合，各種疾患で低蛋白血症があり，かつ経口摂取が不良な場合，熱性・消耗性疾患など蛋白質の消耗並びに需要が著しく増大している場合 【用】 (注) 1回量として，本剤200mLを点滴静注．注入速度は本剤200mL/120分を基準とする．経中心静脈輸液法に用いる場合は，本剤を糖液などと配合し，中心静脈内に24時間持続点滴注入

3259. その他のたん白アミノ酸製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液 エネフリード輸液 Enefluid (大塚) 1100mL/キット 【薬価】 1,036.00円/キット 組成：添付文書参照	【効】 次記状態時のアミノ酸，電解質，カロリー，脂肪酸，水溶性ビタミン及び水分の補給：①経口摂取不十分で，軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合。②手術前後 【用】 (注) 1回 550mLを末梢静脈内に点滴静注。投与速度は，成人 550mL当たり120分を基準とする。最大投与量は1日 2200mLまで
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ビーフリード輸液 Bfluid (大塚) 500mL/袋 【薬価】 539.00円/キット 組成：添付文書参照	【効】 次記状態時のアミノ酸，電解質，ビタミン B1 及び水分の補給：①経口摂取不十分で，軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合。②手術前後 【用】 (注) 用時に隔壁を開通して上室液と下室液をよく混合。1回 500mLを末梢静脈内に点滴静注。投与速度は，500mLあたり120分を基準とし，高齢者，重篤な患者には更に緩徐に注入。1日 2500mLまで
肝不全用成分栄養剤 アミノレバン EN 配合散 Aminoleban EN (大塚) 10g 【薬価】 8.88円/g 組成：添付文書参照	【効】 肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善 【用】 (内) 1回量として1包 (50g) を約 180mLの水又は温湯に溶かし (約 200kcal/200mL) 1日 3回食事と共に摂取。年齢・症状に応じて適宜増減
経腸成分栄養剤 (消化態) エレントール配合内用剤 Elental (EA) 10g 【薬価】 5.86円/g 組成：添付文書参照	【効】 本剤は，消化をほとんど必要としない成分で構成された極めて低残渣性・易吸収性の経腸的高カロリー栄養剤でエレメンタルダイエット又は成分栄養と呼ばれる。手術前・後の患者に対し，未消化態蛋白を含む経管栄養剤による栄養管理が困難な時利用できるが，特に次記の場合に使用する。①未消化態蛋白を含む経管栄養剤の適応困難時の術後栄養管理。②腸内の清浄化を要する疾患の栄養管理。③術直後の栄養管理。④消化管異常病態下の栄養管理 (縫合不全，短腸症候群，各種消化管瘻等)。⑤消化管特殊疾患時の栄養管理 (クローン氏病，潰瘍性大腸炎，消化不全症候群，痔疾患，蛋白漏出性腸症等)。⑥高カロリー輸液の適応が困難となった時の栄養管理 (広範囲熱傷等) 【用】 (内) 本剤 80g を 300mL となるような割合で常水又は微温湯に溶かし (1kcal/mL)，鼻腔ゾンデ，胃瘻，又は腸瘻から，十二指腸あるいは空腸内に1日 24時間持続的に注入 (注入速度は 75～100mL/時間)。必要により本溶液を1回又は数回に分けて経口投与もできる。標準量として1日 480～640g (1800～2400kcal) を投与。初期量は，1日量の約 1/8 (60～80g) を所定濃度の約 1/2 (0.5kcal/mL) で投与開始し，患者の状態により，徐々に濃度及び投与量を増加し，4～10日後に標準量に達するようにする
経腸成分栄養剤 (半消化態) イノラス配合経腸用液 Enoras (大塚) 187.5mL/袋 【薬価】 1.41円/mL 組成：添付文書参照	【効】 一般に，手術後患者の栄養保持に用いることができるが，特に長期にわたり，経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する 【用】 (内) 1日 562.5～937.5mL (900～1,500kcal) を経管又は経口投与。経管投与の投与速度は 50～400mL/時間とし，持続的又は1日数回に分けて投与。経口投与は1日1回又は数回に分けて投与
経腸成分栄養剤 (半消化態) エンシュア・H Ensure H (アボット) 250mL/缶 (バニラ・コーヒー・バナナ，黒糖，ストロベリー) 【薬価】 0.91円/mL 組成：添付文書参照	【効】 一般に，手術後患者の栄養保持に用いることができるが，特に長期にわたり経口的食事摂取が困難で，単位量当たり高カロリー (1.5kcal/mL) の経腸栄養剤を必要とする次の患者の経管栄養補給に使用する：水分の摂取制限が必要な患者 (心不全や腎不全を合併している患者等)，安静時エネルギー消費量が亢進している患者 (熱傷患者，感染症を合併している患者等)，経腸栄養剤の投与容量を減らしたい患者 (容量依存性の腹部膨満感を訴える患者等)，経腸栄養剤の投与時間の短縮が望ましい患者 (口腔外科や耳鼻科の術後患者等) 【用】 (内) 1日 1000～1500mL。経口：1日1回又は数回に分割。経管：50～100mL/時，持続的又は1日数回に分割。400mL/時まで可

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
経腸成分栄養剤（半消化態） <u>ラコールNF 配合経腸用液</u> Racol NF (大塚) 200mL/袋 【薬価】 1.08 円/mL 組成：添付文書参照	【効】 一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する 【用】(内) 標準量として1日1200～2000mL (1200～2000kcal) を経鼻チューブ、胃瘻又は腸瘻より胃、十二指腸又は空腸に1日12～24時間かけて投与。投与速度は75～125mL/時。経口摂取可能な場合は1日1回又は数回に分割して経口投与も可。投与開始時は、1日当たり400mL (400kcal) を水で希釈 (0.5kcal/mL程度) して、低速度 (約100mL/時以下) で投与し、臨床症状に注意しながら増量して3～7日で標準量に達するようにする
経腸成分栄養剤（半消化態） <u>ラコールNF 配合経腸用半固形剤</u> Racol NF (大塚) 300g/袋 【薬価】 1.08 円/g 組成：添付文書参照	【効】 一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する 【用】(内) 1日1,200～2,000g (1,200～2,000kcal) を胃瘻より胃内に1日数回に分けて投与。投与時間は100g当たり2～3分 (300g当たり6～9分) とし、1回の最大投与量は600gまで。初めて投与する場合は、投与後によく観察を行い臨床症状に注意しながら増量して数日で標準量に達するようにする。年齢、体重、症状により投与量、投与時間を適宜増減する
糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素 <u>エルネオパNF1号輸液</u> Elneopa-NF No.1 (大塚工場) 1000mL/袋 【薬価】 1,244.00 円/キット 組成：添付文書参照 <u>エルネオパNF2号輸液</u> Elneopa-NF No.2 (大塚工場) 1000mL/袋 【薬価】 1,336.00 円/キット 組成：添付文書参照 <u>エルネオパNF2号輸液</u> Elneopa-NF No.2 (大塚工場) 1000mL/袋 【薬価】 2,352.00 円/キット 組成：添付文書参照 <u>エルネオパNF2号輸液</u> Elneopa-NF No.2 (大塚工場) 1500mL/袋 【薬価】 1,957.00 円/キット 組成：添付文書参照 <u>エルネオパNF2号輸液</u> Elneopa-NF No.2 (大塚工場) 1500mL/袋 【薬価】 2,352.00 円/キット 組成：添付文書参照	【効】 経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補給 【用】(注) エルネオパNF1号輸液：経中心静脈栄養法の開始時で、耐糖能が不明の場合や耐糖能が低下している場合の開始液として、あるいは侵襲時等で耐糖能が低下しており、ブドウ糖を制限する必要がある場合の維持液として用いる。用時に上下2室の隔壁と上室内にある黄褐色及び赤褐色の小室を同時に開通し十分に混合して、開始液又は維持液とする。1日2000mLの開始液又は維持液を24時間かけて中心静脈内に持続点滴注入 エルネオパNF2号輸液：経中心静脈栄養法の維持液として用いる。用時に上下2室の隔壁と上室内にある黄褐色及び赤褐色の小室を同時に開通し十分に混合して、維持液とする。1日2000mLの維持液を24時間かけて中心静脈内に持続点滴注入

326. 臓器製剤

3262. 肝臓製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<u>アデラビン9号注1mL【経過措置】</u> Adelavin (ファイザー) 1mL/A 【薬価】 146.00 円/A 1管 (1mL) 中： フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 10.56mg (フラビンアデニンジヌクレオチドとして10mg) 肝臓エキス 15 μ L	【効】 ①慢性肝疾患における肝機能の改善。②次記疾患のうちビタミンB2欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合：湿疹・皮膚炎群、口唇炎・口角炎・口内炎、びまん性表層角膜炎。③ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給 (消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等) 【用】(注) 1日1～2mLを1～2回に分割し皮下注、筋注又は静注

32. 滋養強壯薬

329. その他の滋養強壯薬

3299. 他に分類されない滋養強壯薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ダイズ油 イントラリポス輸液 10% Intralipos (大塚) 10%250mL/袋 【薬価】 1,058.00 円 / 袋	【効】 次の場合における栄養補給：術前・術後，急・慢性消化器疾患，消耗性疾患，火傷（熱傷）・外傷，長期にわたる意識不明状態時 【用】（注） 1日 500mL（10%液）を3時間以上かけて点滴静注．1日脂肪として 2g/kg（本剤 20mL）以内
ダイズ油 イントラリポス輸液 20% Intralipos (大塚) 20%100mL/袋 【薬価】 817.00 円 / 袋	【効】 次の場合における栄養補給：術前・術後，急・慢性消化器疾患，消耗性疾患，火傷（熱傷）・外傷，長期にわたる意識不明状態時 【用】（注） 1日 250mL（20%液）を3時間以上かけて点滴静注．1日脂肪として 2g（本剤 10mL）/kg以内

33. 血液・体液用薬

331. 血液代用剤

3311. 生理食塩液類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
塩化ナトリウム 大塚食塩注 10% Sodium chloride (大塚) 10%20mL/A 【薬価】 97.00 円 / A	【効】 ナトリウム欠乏時の電解質補給 【用】 (注) 電解質補給の目的で、輸液剤などに添加して必要量を静注又は点滴静注
生理食塩液 大塚生食注 Isotonic sodium chloride solution (大塚) 20mL/A 【薬価】 62.00 円 / A 大塚生食注 Isotonic sodium chloride solution (大塚) 250mL/ 袋 【薬価】 246.00 円 / 袋 大塚生食注 Isotonic sodium chloride solution (大塚) 500mL/V 【薬価】 236.00 円 / 瓶 大塚生食注 Isotonic sodium chloride solution (大塚) 500mL/ 袋 【薬価】 236.00 円 / 袋 生理食塩液「ヒカリ」 Isotonic sodium chloride solution (光) 50mL/V 【薬価】 143.00 円 / 瓶 生理食塩液バッグ「フソー」 Isotonic sodium chloride solution (扶桑) 1L/ 袋 【薬価】 356.00 円 / 袋 生理食塩液バッグ「フソー」 Isotonic sodium chloride solution (扶桑) 1.5L/ 袋 【薬価】 354.00 円 / 袋 生理食塩液 PL「フソー」 Isotonic sodium chloride solution (扶桑) 100mL/V 【薬価】 147.00 円 / 瓶 生理食塩液 PL「フソー」 Isotonic sodium chloride solution (扶桑) 2L/ 袋 【薬価】 416.00 円 / 袋	【効】 ①注射：1) 細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、2) 注射剤の溶解希釈剤。②外用：1) 皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、2) 含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進。③その他：医療用器具の洗浄 【用】 (注) ① 1) 20～1000mLを皮下注、静注又は点滴静注。2) 適量を取り、注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。(外) ② 1) 皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。2) 含嗽、噴霧吸入に用いる。(その他) ③医療用器具の洗浄に用いる

33. 血液・体液用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
生理食塩液 大塚生食注2ポート50mL Isotonic sodium chloride solution (大塚) 50mL/キット 【薬価】 213.00円/キット 大塚生食注2ポート100mL Isotonic sodium chloride solution (大塚) 100mL/キット 【薬価】 212.00円/キット	【効】 注射剤の溶解希釈剤 【用】 (注) 注射用医薬品の溶解, 希釈に用いる
生理食塩液 生食注シリンジ「オーツカ」5mL Isotonic sodium chloride solution (大塚) 5mL/筒 【薬価】 100.00円/筒 生食注シリンジ「オーツカ」20mL Isotonic sodium chloride solution (大塚) 20mL/筒 【薬価】 111.00円/筒	【効】 ①注射: 1) 細胞外液欠乏時, ナトリウム欠乏時, クロール欠乏時, 2) 注射剤の溶解希釈剤. ②外用: 1) 皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布, 2) 含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進. ③その他: 医療用器具の洗浄 【用】 (注) ① 1) 20～1000mLを皮下注, 静注又は点滴静注. 2) 適量を取り, 注射用医薬品の希釈, 溶解に用いる. (外) ② 1) 皮膚, 創傷面, 粘膜の洗浄, 湿布に用いる. 2) 含嗽, 噴霧吸入に用いる. (その他) ③医療用器具の洗浄に用いる

3319. その他の血液代用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
塩化カリウム Ⓜ KCL注20mEqキット「テルモ」 KCL (テルモ) 1.491g20mL/キット 【薬価】 225.00円/キット 1キット中: K ⁺ 20mEq Cl ⁻ 20mEq	【効】 電解質補液の電解質補正 【用】 (注) 電解質補液の補正用として, 体内の水分, 電解質の不足に応じて電解質補液に添加して点滴静注するか, 腹膜透析液に添加して腹腔内投与
ヒドロキシエチルデンプン 130000 ボルベン輸液6% Voluven (大塚) 30g500mL/袋 【薬価】 865.00円/袋 電解質濃度: Na ⁺ 154mEq/L Cl ⁻ 154mEq/L	【効】 循環血液量の維持 【用】 (注) 持続的に静脈内投与, 1日50mL/kgまで
ヴィーンD輸液 Veen D (扶桑) 500mL/袋 【薬価】 222.00円/袋 500mL中: ブドウ糖 25.0g 塩化ナトリウム 3.0g 塩化カリウム 0.15g 塩化カルシウム水和物 0.10g 酢酸ナトリウム水和物 1.90g	【効】 循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正, 代謝性アシドーシスの補正, エネルギー補給 【用】 (注) 1回500mL～1000mLを点滴静注. ブドウ糖として0.5g/kg/時以下

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グルアセト 35 注 Gluceto (光) 500mL/ 袋 【薬価】 237.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持，エネルギー補給 【用】 (注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注．ブドウ糖として 0.5g/kg/ 時以下
ソリター T4 号輸液 Solita-T No.4 (陽進堂) 500mL/ 袋 【薬価】 255.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 ①術後早期及び乳幼児手術に関連しての水分・電解質の補給．②カリウム貯留の可能性のある場合の水分・電解質の補給 【用】 (注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注．300 ～ 500mL/ 時，小児：50 ～ 100mL/ 時
ソリュージェン F 注 Solyugen F (光) 500mL/ ソフトバック 【薬価】 191.00 円 / 袋 500mL 中： 塩化ナトリウム 3.0g 塩化カリウム 0.15g 塩化カルシウム水和物 0.10g 酢酸ナトリウム水和物 1.90g	【効】 循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正，代謝性アシドーシスの補正 【用】 (注) 1 回 500mL ～ 1000mL を点滴静注．10mL/kg/ 時以下
低分子デキストラン L 注 Low molecular dextran L (大塚) 250mL/ 袋 【薬価】 440.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 ①代用血漿として急性出血の治療，特に急性大量出血の際の初期治療として有効．②外傷，熱傷，出血などに基づく外科的ショックの予防及び治療．③手術時における輸血量の節減．④体外循環灌流液として用い，灌流を容易にして手術中の併発症の危険を減少する 【用】 (注) 1 回 500mL を緩徐に静注．体外循環灌流液として用いる場合，デキストラン 40 として 2 ～ 3g (20 ～ 30mL) /kg を注入
ピカネイト輸液 Bicanate (大塚) 1000mL/ 袋 【薬価】 504.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正，代謝性アシドーシスの補正 【用】 (注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注，10mL/kg/ 時以下
フィジオ 140 輸液 Physio (大塚) 500mL/ 袋 【薬価】 212.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正，代謝性アシドーシスの補正 【用】 (注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注．15mL/kg/ 時以下
ラクテック注 Lactec (大塚) 500mL/ 袋 【薬価】 231.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 ①循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正．②代謝性アシドーシスの補正 【用】 (注) 1 回 500 ～ 1000mL 点滴静注，300 ～ 500mL/ 時
ラクテック G 輸液 Lactec G (大塚) 500mL/ 袋 【薬価】 228.00 円 / 袋 組成：添付文書参照	【効】 ①循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正．②代謝性アシドーシスの補正．③エネルギー補給 【用】 (注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注．D- ソルビトールとして 0.5g/kg/ 時以下

33. 血液・体液用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL Sodium phosphate corrective (大塚)</p> <p>20mL</p> <p>【薬価】 143.00 円 / A 20mL 中： リン酸水素ナトリウム水和物 1.79g リン酸二水素ナトリウム水和物 0.780g</p> <p>〈電解質組成〉 Na⁺ 15mEq P と し て 10mmol (310mg /20mL, 15.5mg/mL)</p>	<p>【効】 電解質補液の電解質補正</p> <p>【用】(注) 電解質補液の電解質の補正用として、体内の水分、電解質の不足に応じて電解質液に添加</p>
<p>YD ソリター T1 号輸液 YD Solita-T No.1 (陽進堂) 200mL/ 袋</p> <p>【薬価】 139.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p> <p>YD ソリター T1 号輸液 YD Solita-T No.1 (陽進堂) 500mL/ 袋</p> <p>【薬価】 177.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p>	<p>【効】 脱水症及び病態不明時の水分・電解質の初期補給、手術前後の水分・電解質の補給</p> <p>【用】(注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注. 300 ～ 500mL/ 時, 小児：50 ～ 100mL/ 時</p>
<p>YD ソリター T3 号輸液 YD Solita-T No.3 (陽進堂) 200mL/ 袋</p> <p>【薬価】 173.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p> <p>YD ソリター T3 号輸液 YD Solita-T No.3 (陽進堂) 500mL/ 袋</p> <p>【薬価】 176.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p>	<p>【効】 経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持</p> <p>【用】(注) 1 回 500 ～ 1000mL を点滴静注. 300 ～ 500mL/ 時, 小児：50 ～ 100mL/ 時</p>

332. 止血剤

3321. カルバゾクロム系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物</p> <p>アドナ錠 10mg Adona (田辺三菱) 10mg/T</p> <p>【薬価】 5.90 円 / T</p> <p>アドナ錠 30mg Adona (田辺三菱) 30mg/T</p> <p>【薬価】 8.10 円 / T</p>	<p>【効】 ①毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向（例えば紫斑病等）、②毛細血管抵抗性の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内臓からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血、③毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血</p> <p>【用】(内) 1 日 30 ～ 90mg を 3 回に分割</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ④カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」 Carbazochrome sodium sulfonate (日医工) 50mg10mL/A 【薬価】 57.00 円 /A 【先発品】 アドナ注 (静脈用) 50mg ④カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」 Carbazochrome sodium sulfonate (日医工) 100mg20mL/A 【薬価】 57.00 円 /A 【先発品】 アドナ注 (静脈用) 100mg	【効】 ①毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向 (例えば紫斑病等). ②毛細血管抵抗性の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内臓からの出血, 眼底出血・腎出血・子宮出血. ③毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血 【用】 (注) 1日 25～100mgを静注又は点滴静注

3322. ゼラチン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ゼラチン ゼルフォーム Gelfoam (ファイザー) 2 cm × 6 cm × 0.7 cm / 枚 【薬価】 177.50 円 / 枚	【効】 ①各種外科領域における止血. ②褥瘡潰瘍 【用】 (外) 適量を乾燥状態のまま, 又は生理食塩液かトロンビン溶液に浸し, 皮膚或は臓器の傷創面に貼付し, 滲出する血液を吸収させ固着する. 本品は組織に容易に吸収されるので体内に包埋しても差し支えない

3323. 臓器性止血製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
トロンビン トロンビン液モチダソフトボトル 5千 Ⓢ Thrombin (持田) 5,000 単位 5mL/V 【薬価】 1,015.30 円 / キット	【効】 通常の結紮によって止血困難な小血管, 毛細血管及び実質臓器からの出血 (例えば, 外傷に伴う出血, 手術中の出血, 骨性出血, 膀胱出血, 抜歯後の出血, 鼻出血及び上部消化管からの出血など) 【用】 (外) 出血局所に本剤をそのまま噴霧もしくは灌注するか, 又は撒布. (内) 上部消化管出血の場合, 適当な緩衝剤で希釈した液 (トロンビンとして 200～400 単位 / mL)

3327. 抗プラスミン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
トラネキサム酸 ④トラネキサム酸注 1g 「NP」 Tranexamic acid (ニプロ) 1g10mL/A 【薬価】 69.00 円 /A 【先発品】 トランサミン注 10%	【効】 ①全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向 (白血病, 再生不良性貧血, 紫斑病等, 及び手術中・術後の異常出血). ②局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血 (肺出血, 鼻出血, 性器出血, 腎出血, 前立腺手術中・術後の異常出血). ③次記疾患における紅斑・腫脹・そう痒等の症状: 湿疹及びその類症, 蕁麻疹, 薬疹・中毒疹. ④次記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状: 扁桃炎, 咽喉頭炎. ⑤口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター 【用】 (注) 1日 250～500mgを1～2回に分割し静注又は筋注. 術中・術後等には必要に応じ1回 500～1000mgを静注するか, 500～2500mgを点滴静注
トラネキサム酸 ④トランサミン錠 250mg Transamin (第一三共) 250mg/T 【薬価】 10.10 円 /T	【効】 ①全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向 (白血病, 再生不良性貧血, 紫斑病等, 及び手術中・術後の異常出血). ②局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血 (肺出血, 鼻出血, 性器出血, 腎出血, 前立腺手術中・術後の異常出血). ③次記疾患における紅斑・腫脹・そう痒等の症状: 湿疹及びその類症, 蕁麻疹, 薬疹・中毒疹. ④次記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状: 扁桃炎, 咽喉頭炎. ⑤口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター 【用】 (内) 1日 750～2000mgを3～4回に分割

3329. その他の止血剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロタミン硫酸塩 プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」 Protamine sulfate (持田) 100mg10mL/V 【薬価】 68.30 円/mLV	【効】 ヘパリン過量投与時の中和, 血液透析・人工心肺・選択的脳灌流冷却法等の血液体外循環後のヘパリン作用の中和 【用】(注) ヘパリン 1000 単位に対して, 10～15mg (本剤 1.0～1.5mL). ヘパリンの中和に要するプロタミン硫酸塩量は, 投与したヘパリン量及びヘパリン投与後の時間経過により異なるので, 本剤の投与量はプロタミンによる中和試験により決める. 1回につき 50mg (本剤 5mL) を超えない量を, 生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 100～200mL に希釈し, 10 分以上をかけて徐々に静注
ポリドカノール エトキシスクレロール 1% 注射液 Ⓢ Aethoxysklerol (カイゲン) 0.3g30mL/V 【薬価】 15,947.00 円/瓶	【効】 食道静脈瘤出血の止血及び食道静脈瘤の硬化退縮 【用】(注) 経内視鏡的食道静脈瘤硬化療法に用いるものである. 1 穿刺あたり 1～3mL を食道静脈瘤周囲に注入. 注入量は静脈瘤の状態及び患者の病態により適宜増減するが, 1 内視鏡治療あたりの総注入量は 30mL 以内
ポリドカノール ポリドカスクレロール 1% 注 2mL Ⓢ Polidocasklerol (ゼリア) 20mg2mL/A 【薬価】 719.00 円/A	【効】 一次性下肢静脈瘤の硬化退縮 【用】(注) 液状硬化療法で使用する場合: 直径 1mm 以上 3mm 未満の一次性下肢静脈瘤を対象に, 1 穿刺あたり 0.5～1mL を基準として静脈瘤内に 1 箇所又は 2 箇所以上投与. 1 回の総投与量は 2mg/kg 以下. 1 回の処置で治療が終了しない場合, 次回の投与は 1 週間後. フォーム硬化療法で使用する場合: 小型の一次性下肢静脈瘤を対象に, 静脈瘤内に 1 箇所又は 2 箇所以上投与. 1 穿刺あたりの最大投与量は, 対象となる静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化剤として 2～6mL. 1 回の総投与量は 2mg/kg 以下, かつ, フォーム硬化剤として 10mL 以下. 1 回の処置で治療が終了しない場合, 次回の投与は 1 週間後
ポリドカノール ポリドカスクレロール 3% 注 2mL Ⓢ Polidocasklerol (ゼリア) 60mg2mL/A 【薬価】 835.00 円/A	【効】 一次性下肢静脈瘤の硬化退縮 【用】(注) 液状硬化療法で使用する場合: 直径 3mm 以上 8mm 以下の一次性下肢静脈瘤を対象に, 1 穿刺あたり 0.5～1mL を基準として静脈瘤内に 1 箇所又は 2 箇所以上投与. 1 回の総投与量は 2mg/kg 以下. 1 回の処置で治療が終了しない場合, 次回の投与は 1 週間後. フォーム硬化療法で使用する場合: 中型又は大型の一次性下肢静脈瘤を対象に, 静脈瘤内に 1 箇所又は 2 箇所以上投与. 1 穿刺あたりの最大投与量は, 対象となる静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化剤として 4～6mL. なお, 1 回の総投与量はポリドカノールとして 2mg/kg 以下, かつ, フォーム硬化剤として 10mL 以下. 1 回の処置で治療が終了しない場合, 次回の投与は 1 週間後
モノエタノールアミノレイン酸塩 オルダミン注射用 1g Ⓢ Oldamin (あすか) 10%10g/V 【薬価】 15,313.00 円/瓶	【効】 ①食道静脈瘤出血の止血及び食道静脈瘤の硬化退縮. ②胃静脈瘤の退縮 【用】(注) ①経内視鏡的食道静脈瘤硬化療法に用いる. 用時 1 バイアルあたり 10mL の注射用水又は血管造影用 X 線造影剤を加え 5% 溶液に調製. 静脈瘤 1 条あたり 5%1～5mL を食道静脈瘤内に注入. 1 内視鏡治療あたりの総注入量は 20mL 以内. ②バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術に用いる. 用時 1 バイアルあたり 10mL の血管造影用 X 線造影剤を加え 5% 溶液に調製. 1 治療あたり 0.4mL/kg 以内を胃静脈瘤内に注入. 1 治療あたりの総注入量は 30mL 以内

333. 血液凝固阻止剤

3332. ジクマロール系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ワルファリンカリウム ワーファリン顆粒 0.2% Warfarin (エーザイ) 2mg/g 【薬価】 9.80 円/g ワーファリン錠 1mg Warfarin (エーザイ) 1mg/T 【薬価】 9.80 円/T ワーファリン錠 5mg (院外) Warfarin (エーザイ) 5mg/T 【薬価】 10.10 円/T	【効】 血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋梗塞症，肺塞栓症，脳塞栓症，緩徐に進行する脳血栓症等）の治療及び予防 【用】 (内) 血液凝固能検査（プロトロンビン時間及びトロンボテスト）の検査値に基づいて，投与量を決定し，血液凝固能管理を十分に行いつつ使用．初回投与量を1日1回投与した後，数日間かけて血液凝固能検査で目標治療域に入るように用量調節し，維持投与量を決定．ワルファリンに対する感受性には個体差が大きく，同一個人でも変化することがあるため，定期的に血液凝固能検査を行い，維持投与量を必要に応じて調節．抗凝固効果の発現を急ぐ場合には，初回投与時ヘパリン等の併用を考慮．初回投与量：1～5mgを1日1回．小児における維持投与量(mg/kg/日)の目安を次記に示す．12か月未満：0.16mg/kg/日．1歳以上15歳未満：0.04～0.10mg/kg/日

3334. ヘパリン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ダルテパリンナトリウム ダルテパリン Na 静注 5000 単位 /20mL シリンジ「ニプロ」 Ⓢ Dalteparin sodium (ニプロ) 5,000 低分子ヘパリン I.U. (抗第 Xa 因子活性) 20mL/筒 【薬価】 728.00 円/筒	【効】 ①血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析）．② DIC 【用】 (注) ①直接又は生理食塩液により希釈して投与．(1) 出血性病変又は出血傾向を有しない患者：体外循環開始時，15～20I.U./kgを回路内に単回投与，体外循環開始後は7.5～10I.U./kg/時を抗凝固薬注入ラインより持続注入．(2) 出血性病変又は出血傾向を有する患者：体外循環開始時，10～15I.U./kgを回路内に単回投与，体外循環開始後は7.5I.U./kg/時を抗凝固薬注入ラインより持続注入．②1日量75I.U./kgを24時間かけて静脈内持続投与
ヘパリンカルシウム Ⓢヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 /0.2mL シリンジ「モチダ」 Ⓢ Heparin calcium (持田) 5,000 単位 0.2mL/筒 【薬価】 522.00 円/筒	【効】 ① DIC の治療．② 血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋梗塞症，肺塞栓症，脳塞栓症，四肢動脈血栓塞栓症，手術中・術後の血栓塞栓症等）の治療及び予防 【用】 (注) 投与後，全血凝固時間（Lee-White 法）又は全血活性化部分トロンボラスチン時間（WBAPTT）が正常値の2～3倍になるよう適宜用量をコントロール．初回に15,000～20,000単位，続いて維持量として1回10,000～15,000単位を1日2回，12時間間隔で皮下注．手術後又は心筋梗塞等に続発する静脈血栓症の予防には，5,000単位を12時間ごとに7～10日間皮下注
ヘパリンナトリウム Ⓢヘパフィルド透析用 250 単位 /mL シリンジ 20mL Ⓢ Hepafilled (ジェイ・エム・エス) 5,000 ヘパリン単位 20mL/筒 【薬価】 255.00 円/筒	【効】 血液透析の体外循環装置使用時の血液凝固の防止 【用】 (注) 投与後，全血凝固時間（Lee-White 法）又は全血活性化部分トロンボラスチン時間（WBAPTT）が正常値の2～3倍になるように適宜用量をコントロール．体外循環時（血液透析）における使用法：人工腎では各患者の適切な用量を透析前に各々のヘパリン感受性試験の結果に基づいて算出するが，全身ヘパリン化法の場合，透析開始に先だって，1,000～3,000単位を投与し，透析開始後は，500～1,500単位/時を持続的に，又は1時間毎に500～1,500単位を間歇的に追加．局所ヘパリン化法の場合，1,500～2,500単位/時を持続注入し，体内灌流時にプロタミン硫酸塩で中和

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ヘパリンナトリウム <u>ヘパリンナトリウム注 N5 千単位</u> <u>/5mL「AY」</u> ㊞ Heparin sodium (陽進堂) 5,000 単位 5mL/A 【薬価】 165.00 円 / A <u>ヘパリンナトリウム注 1 万単位</u> <u>/10mL「AY」</u> ㊞ Heparin sodium (陽進堂) 10,000 単位 10mL/V 【薬価】 391.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ① DIC の治療. ② 血液透析・人工心肺その他の体外循環装置使用時の血液凝固の防止. ③ 血管カテーテル挿入時の血液凝固の防止. ④ 輸血及び血液検査の際の血液凝固の防止. ⑤ 血栓塞栓症（静脈血栓症, 心筋梗塞症, 肺塞栓症, 脳塞栓症, 四肢動脈血栓塞栓症, 手術中・術後の血栓塞栓症等）の治療及び予防</p> <p>【用】 (注) 投与後, 全血凝固時間 (Lee-White 法) 又は全血活性化部分トロンボプラスチン時間 (WBAPTT) が正常値の 2～3 倍になるよう用量をコントロール.</p> <p>静脈内点滴注射法: 10000～30000 単位を 5% ブドウ糖注射液, 生理食塩液, リンゲル液 1000mL で希釈し, 最初 30 滴 / 分前後の速度で, 続いて全血凝固時間又は WBAPTT が投与前の 2～3 倍になれば 20 滴 / 分前後の速度で, 点滴静注.</p> <p>静脈内間歇注射法: 1 回 5000～10000 単位を 4～8 時間毎に静注. 注射開始 3 時間後から, 2～4 時間毎に全血凝固時間又は WBAPTT を測定し, 投与前の 2～3 倍になるようにコントロール.</p> <p>皮下注・筋注法: 1 回 5000 単位を 4 時間毎に皮下注又は筋注. 筋注にあたっては, 組織・神経等への影響を避けるため, 次記の点に配慮. 1) 神経走行部位を避けるよう注意. 2) 繰り返し注射する場合, 注射部位を変え, 例えば左右交互に注射するなど行う. 乳・幼・小児には連用しないことが望ましい. 3) 注射針を刺入したとき, 激痛を訴えたり, 血液の逆流をみた場合は, 直ちに針を抜き, 部位を変えて注射.</p> <p>体外循環時 (血液透析・人工心肺) における使用法: 1) 人工腎では各患者の適切な使用量を透析前に各々のヘパリン感受性試験の結果に基づいて算出するが, 全身ヘパリン化法の場合, 透析開始に先だて, 1000～3000 単位を投与し, 透析開始後は, 500～1500 単位 / 時を持続的に, 又は 1 時間毎に 500～1500 単位を間歇的に追加. 局所ヘパリン化法の場合は, 1500～2500 単位 / 時を持続注入し, 体内灌流時にプロタミン硫酸塩で中和. 2) 術式・方法によって多少異なるが, 人工心肺灌流時には, 150～300 単位 / kg を投与し, 更に体外循環時間の延長とともに必要に応じて追加. 体外循環後は, 術後出血を防止し, ヘパリンの作用を中和するためにプロタミン硫酸塩を用いる.</p> <p>輸血及び血液検査の際の血液凝固防止法: 輸血の際の血液凝固の防止には, 血液 100mL に対して 400～500 単位を用いる. 血液検査の際の血液凝固の防止にもほぼ同様に, 血液 20～30mL に対して 100 単位を用いる</p>
<p>ヘパリンナトリウム <u>ヘパリン Na ロック用 10 単位 /</u> <u>mL シリンジ「オーツカ」10mL</u> ㊞ Heparin sodium (大塚) 10 単位 10mL / 本 【薬価】 126.00 円 / 筒 <u>ヘパリン Na ロック用 100 単位 /</u> <u>mL シリンジ「オーツカ」10mL</u> ㊞ Heparin Na lock (大塚) 1000 単位 10mL / 筒 【薬価】 158.00 円 / 筒</p>	<p>【効】 静脈内留置ルート内の血液凝固の防止</p> <p>【用】 (注) 静脈内留置ルート内を充填するのに十分な量を注入</p>

3339. その他の血液凝固阻止剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アビキサバン <u>エリキュース錠 5mg</u> Eliquis (ファイザー) 5mg / T 【薬価】 212.30 円 / T</p>	<p>【効】 ① 非弁膜症性心細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制. ② 静脈血栓塞栓症 (深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症) の治療及び再発抑制</p> <p>【用】 (内) ① 1 回 5mg を 1 日 2 回. 年齢, 体重, 腎機能に応じて, 1 回 2.5mg 1 日 2 回投与へ減量. ② 1 回 10mg を 1 日 2 回, 7 日間投与後, 1 回 5mg を 1 日 2 回投与</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エドキサバントシル酸塩水和物 リクシアナ OD 錠 30mg Lixiana OD (第一三共) 30mg/T 【薬価】 411.30 円 / T	【効】 ①非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制。②静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制。③次記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制：膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術 【用】 (内) ①以下の用量を1日1回。体重60kg以下：30mg。体重60kg超：60mg。腎機能、併用薬に応じて1日1回30mgに減量。出血リスクが高い高齢の患者では、年齢、患者の状態に応じて1日1回15mgに減量できる。②以下の用量を1日1回。体重60kg以下：30mg。体重60kg超：60mg。腎機能、併用薬に応じて1日1回30mgに減量。③30mgを1日1回
ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩 ブラザキサカプセル 75mg Prazaxa (日本ベーリンガー) 75mg/cap 【薬価】 127.00 円 / cap ブラザキサカプセル 110mg Prazaxa (日本ベーリンガー) 110mg/cap 【薬価】 224.60 円 / cap	【効】 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 【用】 (内) 1回150mg（75mgカプセルを2カプセル）を1日2回、必要に応じて、1回110mg（110mgカプセルを1カプセル）を1日2回投与へ減量
トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え） リコモジュリン点滴静注用 12800 ㊦ Recomodulin (旭化成) 12800U/V 【薬価】 33,347.00 円 / 瓶	【効】 汎発性血管内血液凝固症（DIC） 【用】 (注) 1日1回380U/kgを約30分かけて点滴静注。症状に応じ適宜減量
ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション 0.3% Hirudoid (マルホ) 0.3%50g/本 【薬価】 18.50 円 / g	【効】 皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、凍瘡、肥厚性癬痕・ケロイドの治療と予防、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後の硬結並びに疼痛）、血栓性静脈炎（痔核を含む）、外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸（乳児期） 【用】 (外) 1日1～数回適量を患部に塗布
ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (院外) Hirudoid (マルホ) 0.3%25g/本 【薬価】 18.50 円 / g ⑥ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」 Heparinoid (ニプロ) 0.3%25g/本 【薬価】 5.10 円 / g 【先発品】 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% ⑥ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」 Heparinoid (ニプロ) 0.3%100g/本 【薬価】 5.10 円 / g 【先発品】 ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	【効】 皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、凍瘡、肥厚性癬痕・ケロイドの治療と予防、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後の硬結並びに疼痛）、凍瘡、肥厚性癬痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸（乳児期） 【用】 (外) 1日1～数回適量を患部に塗擦又はガーゼ等にのぼして貼付
ヘパリン類似物質 ヒルドイドフォーム 0.3% Hirudoid (マルホ) 92g/缶 【薬価】 18.70 円 / g	【効】 血栓性静脈炎（痔核を含む）、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後の硬結並びに疼痛）、凍瘡、肥厚性癬痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸（乳児期） 【用】 (外) 1日1～数回適量を患部に塗布

33. 血液・体液用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リバーロキサバン <u>イグザレルト OD 錠 10mg</u> Xarelto OD (バイエル) 10mg/T 【薬価】 342.90 円 / T <u>イグザレルト OD 錠 15mg</u> Xarelto OD (バイエル) 15mg/T 【薬価】 481.90 円 / T	【効】 ①成人：非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制. ②成人：静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制. ③小児：静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制. ④小児：Fontan 手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制 【用】 (内) ①成人：15mgを1日1回食後. 腎障害のある患者に対しては、腎機能の程度に応じて10mg1日1回に減量. ②成人：発症後の初期3週間は15mgを1日2回食後、その後は15mgを1日1回食後. ③小児：体重30kg以上の小児には15mgを1日1回食後. ④小児：体重50kg以上の小児に10mgを1日1回

339. その他の血液・体液用薬

3399. 他に分類されない血液・体液用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アスピリン <u>後バイアスピリン錠 100mg</u> Bayaspirin (バイエル) 100mg/T 【薬価】 5.70 円 / T	【効】 ①次記疾患における血栓・塞栓形成の抑制：狭心症（慢性安定狭心症，不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA），脳梗塞）. ②冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制. ③川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む） 【用】 (内) ①②100mgを1日1回. 1回300mgまで. ③急性期有熱期間は，1日30～50mg/kgを3回に分割. 解熱後の回復期から慢性期は，1日3～5mg/kgを1回
アンデキサネットアルファ（遺伝子組換え） <u>オンデキサ静注用 200mg</u> ㊦ Ondexxya (アストラゼネカ) 200mg/瓶 【薬価】 338,671.00 円 / 瓶	【効】 直接作用型第 Xa 因子阻害剤（アピキサバン，リバーロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物）投与中の患者における，生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和 【用】 (注) 直接作用型第 Xa 因子阻害剤の種類，最終投与時の1回投与量，最終投与からの経過時間に応じて，次記の A 法又は B 法の用法及び用量で静注. A 法：400mgを30mg/分の速度で静注し，続いて480mgを4mg/分の速度で2時間静注. B 法：800mgを30mg/分の速度で静注し，続いて960mgを8mg/分の速度で2時間静注
イコサベント酸エチル <u>エパデル S900</u> Epadel S (持田) 900mg/包 【薬価】 49.70 円 / 包	【効】 ①閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍，疼痛及び冷感の改善. ②高脂血症 【用】 (内) ①1回600mgを1日3回，毎食直後. ②1回900mgを1日2回又は1回600mgを1日3回，食直後. トリグリセリドの異常を呈する場合，その程度により，1回900mg，1日3回まで増量可
イダルズマブ（遺伝子組換え） <u>プリズバインド静注液 2.5g</u> ㊦ Prizbind (日本ベーリンガー) 2.5g/50mL 【薬価】 203,626.00 円 / 瓶	【効】 以下の状況におけるダビガトランの抗凝固作用の中和：生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時，重大な出血が予想される緊急を要する手術又は処置の施行時 【用】 (注) 1回5g（1バイアル2.5g/50mLを2バイアル）を点滴静注又は急速静注. 但し，点滴静注の場合は1バイアルにつき5～10分かける

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>クロピドグレル硫酸塩 プラビックス錠 25mg (院外) Plavix (サノフィ) 25mg/T 【薬価】29.90 円/T プラビックス錠 75mg (院外) Plavix (サノフィ) 75mg/T 【薬価】66.90 円/T ②クロピドグレル錠 25mg 「SAN- IKJ」 Clopidogrel (日医工) 25mg/T 【薬価】16.00 円/T 【先発品】プラビックス錠 25mg ②クロピドグレル錠 75mg 「SAN- IKJ」 Clopidogrel (日医工) 75mg/T 【薬価】35.50 円/T 【先発品】プラビックス錠 75mg</p>	<p>【効】①虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制. ②経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される次記の虚血性心疾患：急性冠症候群（不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞）、安定狭心症、陳旧性心筋梗塞. ③末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制 【用】(内) ① 75mg を 1 日 1 回. 年齢、体重、症状により 50mg を 1 日 1 回. ② 投与開始日に 300mg を 1 日 1 回、その後、維持量として 1 日 1 回 75mg. ③ 75mg を 1 日 1 回</p>
<p>サルボグレラート塩酸塩 アンプラーグ錠 100mg (院外) Anplag (田辺三菱) 100mg/T 【薬価】60.70 円/T ②サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「NP」 Sarpogrelate hydrochloride (ニプロ) 100mg/T 【薬価】30.90 円/T 【先発品】アンプラーグ錠 100mg</p>	<p>【効】慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善 【用】(内) 1 回 100mg を 1 日 3 回食後</p>
<p>シロスタゾール プレタール OD 錠 100mg Pletaal OD (大塚) 100mg/T 【薬価】34.40 円/T</p>	<p>【効】①慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善. ②脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制 【用】(内) 1 回 100mg を 1 日 2 回</p>
<p>チクロピジン塩酸塩 パナルジン錠 100mg (院外) Panaldine (サノフィ) 100mg/T 【薬価】12.10 円/T ②チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「YD」 Ticlopidine hydrochloride (共創未来) 100mg/T 【薬価】5.90 円/T 【先発品】パナルジン錠 100mg</p>	<p>【効】①血管手術及び血液体外循環に伴う血栓・塞栓の治療ならびに血流障害の改善. ②慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感などの阻血性諸症状の改善. ③虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）に伴う血栓・塞栓の治療. ④クモ膜下出血術後の脳血管攣縮に伴う血流障害の改善 【用】(内) ① 1 日 200 ～ 300mg を 2 ～ 3 回に分割し食後. ② 1 日 300 ～ 600mg を 2 ～ 3 回に分割し食後. ③ 1 日 200 ～ 300mg を 2 ～ 3 回に分割し食後. 1 日 200mg の場合 1 回に投与も可. ④ 1 日 300mg を 3 回に分割し食後</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フィルグラスチム(遺伝子組換え) ⑧ <u>フィルグラスチム BS 注 75μg</u> <u>シリンジ「F」</u> Filgrastim BS (富士製薬) 75 μ g 【薬価】 2,111.00 円 / 筒 ⑨ <u>フィルグラスチム BS 注 150μg</u> <u>シリンジ「F」</u> Filgrastim BS (富士製薬) 150 μ g 【薬価】 3,428.00 円 / 筒	<p>【効】 ①造血幹細胞の末梢血中への動員。(a) 同種及び自家末梢血幹細胞採取時の本剤単独投与による動員。(b) 自家末梢血幹細胞採取時のがん化学療法剤投与終了後の本剤投与による動員。②造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進。③がん化学療法による好中球減少症。(a) 急性白血病。(b) 悪性リンパ腫, 小細胞肺癌, 胚細胞腫瘍(睾丸腫瘍, 卵巣腫瘍など), 神経芽細胞腫, 小児がん。(c) その他のがん腫。④ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の治療に支障を来す好中球減少症。⑤骨髓異形成症候群に伴う好中球減少症。⑥再生不良性貧血に伴う好中球減少症。⑦先天性・特発性好中球減少症。⑧再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法</p> <p>【用】(注) ① (a) 400μg/m^2を1日1回又は2回に分割し, 5日間連日又は末梢血幹細胞採取終了時まで連日皮下投与。この場合, 末梢血幹細胞採取は投与開始後4~6日目に施行。但し, 末梢血幹細胞採取終了前に白血球数が50,000/mm^3以上に増加した場合は減量。減量後, 白血球数が75,000/mm^3に達した場合は投与を中止。小児も同様。(b) がん化学療法剤投与終了翌日又はがん化学療法により好中球数が最低値を経過後, 400μg/m^2を1日1回又は2回に分割し, 末梢血幹細胞採取終了時まで連日皮下投与。但し, 末梢血幹細胞採取終了前に白血球数が50,000/mm^3以上に増加した場合は減量。減量後, 白血球数が75,000/mm^3に達した場合は投与を中止。小児も同様。②造血幹細胞移植施行翌日ないし5日後から300μg/m^2を1日1回点滴静注。但し, 好中球数が5,000/mm^3以上に増加した場合は, 症状を観察しながら投与を中止。小児も同様。なお, 本剤投与の中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する。③ (a) がん化学療法剤投与終了後(翌日以降)で骨髓中の芽球が十分減少し末梢血液中に芽球が認められない時点から, 200μg/m^2を1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)。出血傾向等の問題がない場合は100μg/m^2を1日1回皮下投与。小児も同様。但し, 好中球数が最低値を示す時期を経過後5,000/mm^3に達した場合は投与を中止。なお, 本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する。(b) がん化学療法剤投与終了後(翌日以降)から, 50μg/m^2を1日1回皮下投与。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は100μg/m^2を1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)。小児も同様。但し, 好中球数が最低値を示す時期を経過後5,000/mm^3に達した場合は投与を中止。なお, 本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する。(c) がん化学療法により好中球数1,000/mm^3未満で発熱(原則として38$^{\circ}$C以上)あるいは好中球数500/mm^3未満が観察された時点から, 50μg/m^2を1日1回皮下投与。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は100μg/m^2を1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)。また, がん化学療法により好中球数1,000/mm^3未満で発熱(原則として38$^{\circ}$C以上)あるいは好中球数500/mm^3未満が観察され, 引き続き同一のがん化学療法を施行する症例に対しては, 次回以降のがん化学療法施行時には好中球数1,000/mm^3未満が観察された時点から, 50μg/m^2を1日1回皮下投与。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は100μg/m^2を1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)。小児も同様。但し, 好中球数が最低値を示す時期を経過後5,000/mm^3に達した場合は投与を中止。なお, 本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する。④好中球数が1,000/mm^3未満のとき, 200μg/m^2を1日1回点滴静注。小児も同様。但し, 投与期間は2週間を目安とするが, 好中球数が3,000/mm^3以上に増加した場合は, 症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止。⑤好中球数が1,000/mm^3未満のとき, 100μg/m^2を1日1回点滴静注。但し, 好中球数が5,000/mm^3以上に増加した場合は, 症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止。⑥好中球数が1,000/mm^3未満のとき, 400μg/m^2を1日1回点滴静注。小児も同様。但し, 好中球数が5,000/mm^3以上に増加した場合は, 症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止。⑦好中球数が1,000/mm^3未満のとき, 50μg/m^2を1日1回皮下投与。小児も同様。但し, 好中球数が5,000/mm^3以上に増加した場合は, 症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止。⑧1日1回300μg/m^2を, フルグラビン, シタラビン等の抗悪性腫瘍剤併用化学療法の開始前日から併用化学療法終了日まで(通常5~6日間)連日皮下又は静脈内投与(点滴静注を含む)</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プラスグレル塩酸塩 <u>エフィント錠 3.75mg</u> Efient (第一三共) 3.75mg/T 【薬価】 254.30 円 / T <u>エフィント OD錠 20mg</u> Efient OD (第一三共) 20mg/T 【薬価】 1,024.70 円 / T	【効】 ①経皮的冠動脈形成術 (PCI) が適用される下記の虚血性心疾患：急性冠症候群 (不安定狭心症, 非 ST 上昇心筋梗塞, ST 上昇心筋梗塞), 安定狭心症, 陳旧性心筋梗塞, ②虚血性脳血管障害 (大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う) の再発抑制 (脳梗塞発症リスクが高い場合に限る) 【用】(内) ①投与開始日に 20mg を 1 日 1 回, その後, 維持用量として 1 日 1 回 3.75mg, ② 3.75mg を 1 日 1 回
ペグフィルグラステム (遺伝子組換え) <u>ジーラスタ皮下注 3.6mg</u> G-lasta (協和キリン) 3.6mg0.36ml/筒 【薬価】 82,672.00 円 / 筒	【効】 ①がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制, ②造血幹細胞の末梢血中への動員 【用】(注) ①がん化学療法剤投与終了後の翌日以降, 3.6mg を化学療法 1 サイクルあたり 1 回皮下注, ② 7.2mg を 1 回皮下注
ペグフィルグラステム (遺伝子組換え) <u>ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーボッド</u> G-lasta (協和キリン) 0.36ml/筒 【薬価】 93,832.00 円 / キット	【効】 がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制 【用】(注) がん化学療法剤投与終了後の翌日以降, 3.6mg を化学療法 1 サイクルあたり 1 回皮下注
ベラプロストナトリウム <u>プロサイリン錠 20 (院外)</u> ㊟ Procylin (科研) 20 μ g/T 【薬価】 25.30 円 / T <u>後ベラプロスト Na錠 20μg 「サイワイ」</u> ㊟ Beraprost sodium (沢井) 20 μ g/T 【薬価】 21.20 円 / T 【先発品】 ドルナー錠 20 μ g, プロサイリン錠 20	【効】 ①慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍, 疼痛及び冷感の改善, ②原発性肺高血圧症 【用】(内) ① 1 日 120 μ g を 3 回に分割し食後, ② 1 日 60 μ g を 3 回に分割し食後から開始し, 漸次増量, 1 日 3 ~ 4 回とし, 1 日 180 μ g まで
リマプロストアルファデクス <u>オパルモン錠 5μg (院外)</u> Opalmon (小野) 5 μ g/T 【薬価】 22.40 円 / T <u>後リマプロストアルファデクス錠 5μg 「日医工」</u> Limaprost alfadex (日医工) 5 μ g/T 【薬価】 10.90 円 / T 【先発品】 オパルモン錠 5 μ g	【効】 ①閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍, 疼痛及び冷感などの虚血性諸症状の改善, ②後天性腰部脊柱管狭窄症 (SLR 試験正常で, 両側性の間欠跛行を呈する患者) に伴う自覚症状 (下肢疼痛, 下肢しびれ) 及び歩行能力の改善 【用】(内) ① 1 日 30 μ g を 3 回に分割, ② 1 日 15 μ g を 3 回に分割
ルストロンボパグ <u>ムルプレタ錠 3mg</u> Mulpleta (塩野義) 3mg/T 【薬価】 12,919.90 円 / T	【効】 待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善 【用】(内) 3mg を 1 日 1 回, 7 日間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>レノグラステム（遺伝子組換え） ノイトロジン注 100μg ㊦ Neutrogin (中外) 100μg/瓶（溶解液なし） 【薬価】 4,239.00円/瓶</p>	<p>【効】 ①造血幹細胞の末梢血中への動員 (a) がん化学療法終了後の動員. (b) 自家末梢血幹細胞移植を目的とした本剤単独による動員. (c) 末梢血幹細胞移植ドナーに対する本剤単独での動員. ②造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進. ③がん化学療法による好中球減少症 (a) 急性骨髄性白血病, 慢性リンパ性白血病, (b) 悪性リンパ腫, 小細胞肺癌, 胚細胞腫瘍 (睾丸腫瘍, 卵巣腫瘍など), 神経芽細胞腫, 小児がん. (c) その他のがん腫. ④骨髄異形成症候群に伴う好中球減少症. ⑤再生不良性貧血に伴う好中球減少症. ⑥先天性・特発性好中球減少症. ⑦ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 感染症の治療に支障を来す好中球減少症. ⑧免疫抑制療法 (腎移植) に伴う好中球減少症. ⑨再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法</p> <p>【用】 (注) ① (a) 成人, 小児ともに, がん化学療法剤投与終了後 (翌日以降) から, 1日量 5μg/kgを1日1回又は2回に分けてアフエレーシスが終了する時点まで皮下注. 十分な動員効果が期待できないと考えられる場合には1日量の上限を10μg/kgとする. 但し, アフエレーシス終了前に白血球数が 50,000/mm^3以上に増加した場合は減量し, 減量後, 白血球数が 75,000/mm^3に達した場合は投与を中止. (b) 成人, 小児ともに, 1日量 10μg/kgを1日1回又は2回に分けて4~6日間, アフエレーシスが終了する時点まで皮下注. 但し, アフエレーシス終了前に白血球数が 50,000/mm^3以上に増加した場合は減量し, 減量後, 白血球数が 75,000/mm^3に達した場合は投与を中止. (c) 1日量 10μg/kgを1日1回又は2回に分けて4~6日間, アフエレーシスが終了する時点まで皮下注. 但し, アフエレーシス終了前に白血球数が 50,000/mm^3以上に増加した場合は減量し, 減量後, 白血球数が 75,000/mm^3に達した場合は投与を中止. ②造血幹細胞移植施行翌日ないし5日後より 5μg/kgを1日1回点滴静注. 小児も同じ. 但し, 好中球数が 5,000/mm^3以上に増加した場合は症状を観察しながら投与を中止. なお, 本剤投与の中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する. ③ (a) 成人, 小児ともに, がん化学療法剤投与終了後 (翌日以降) で骨髄中の芽球が十分減少し末梢血液中に芽球が認められない時点から, 5μg/kgを1日1回静注 (点滴静注を含む). 出血傾向等の問題がない場合は, 2μg/kgを1日1回皮下注. 但し, 好中球数が最低値を示す時期を経過後 5,000/mm^3に達した場合は投与を中止. なお, 本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する. (b) 成人, 小児ともに, がん化学療法剤投与終了後 (翌日以降) から, 2μg/kgを1日1回皮下注. 出血傾向等により皮下注が困難な場合は, 5μg/kgを1日1回静注 (点滴静注を含む). 但し, 好中球数が最低値を示す時期を経過後 5,000/mm^3に達した場合は投与を中止. なお, 本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する. (c) 成人, 小児ともに, がん化学療法により好中球数 1,000/mm^3未満で発熱 (原則として 38$^{\circ}$C以上) あるいは好中球数 500/mm^3未満が観察された時点から, 2μg/kgを1日1回皮下注. 出血傾向等により皮下注が困難な場合は, 5μg/kgを1日1回静注 (点滴静注を含む). また, がん化学療法により好中球数 1,000/mm^3未満で発熱 (原則として 38$^{\circ}$C以上) あるいは好中球数 500/mm^3未満が観察され, 引き続き同一のがん化学療法を施行する症例に対しては, 次回以降のがん化学療法施行時には好中球数 1,000/mm^3未満が観察された時点から, 2μg/kgを1日1回皮下注. 出血傾向等により皮下注が困難な場合は, 5μg/kgを1日1回静注 (点滴静注を含む). 但し, 好中球数が最低値を示す時期を経過後 5,000/mm^3に達した場合は投与を中止. なお, 本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には, 白血球数の半数を好中球数として推定する. ④好中球数 1,000/mm^3未満の状態を示した時点より 5μg/kgを1日1回静注. 但し, 好中球数が 5,000/mm^3以上に増加した場合は症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止. ⑤好中球数 1,000/mm^3未満の状態を示した時点より 5μg/kgを1日1回静注. 小児には, 好中球数 1,000/mm^3未満の状態を示した時点より 5μg/kgを1日1回皮下注又は静注. 但し, 好中球数が 5,000/mm^3以上に増加した場合は症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止. ⑥好中球数 1,000/mm^3未満の状態を示した時点より 2μg/kgを1日1回皮下注又は静注. 小児も同じ. 但し, 好中球数が 5,000/mm^3以上に増加した場合は症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止. ⑦好中球数 1,000/mm^3未満の状態を示した時点より 5μg/kgを1日1回静注. 小児も同じ. 但し, 投与期間は2週間を目安とするが, 好中球数が 3,000/mm^3以上に増加した場合は症状を観察しながら減量, あるいは投与を中止. ⑧好中球数 1,500/mm^3 (白血球数 3,000/mm^3) 未満の状態を示した時点より 2μg/kgを1日1回皮下注. 小児も同じ. 但し, 好中球数が 5,000/mm^3以上に増加した場合</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
	は症状を観察しながら減量，あるいは投与を中止。⑨フルダラビン，シタラビン等の抗悪性腫瘍剤併用化学療法の開始前日から併用化学療法終了日まで（通常5～6日間）連日，皮下投与又は静脈内投与（点滴静注を含む）5 μ g/kg1日1回
アルスロマチック関節手術用灌流液 Arthromatic （バクスター・ジャパン） 3000mL/袋 【薬価】 1,070.20円/袋 1バッグ（3,000mL）中： 塩化ナトリウム 18.0g 塩化カリウム 0.9g 塩化カルシウム 0.6g 乳酸ナトリウム 9.3g	【効】 関節鏡視下検査・手術時又は関節切開による手術時の関節腔の拡張および灌流・洗浄 【用】 (外) 目的に応じて3～12L
⑩バファリン配合錠 A81 Bufferin (エーザイ) 81mg/T 【薬価】 5.70円/T 1錠中： アスピリン 81mg ダイアルミネート 33mg （ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート11mg，炭酸マグネシウム22mg）	【効】 ①次記疾患における血栓・塞栓形成の抑制：狭心症（慢性安定狭心症，不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA），脳梗塞），②冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制。③川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む） 【用】 (内) ①②1錠（アスピリンとして81mg）を1回量として，1日1回，1回4錠（アスピリンとして324mg）まで。③急性期有熱期間は，1日アスピリンとして30～50mg/kgを3回に分割。解熱後の回復期から慢性期は，1日アスピリンとして3～5mg/kgを1回

34. 人工透析用薬

341. 人工腎臓透析用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カーボスター透析剤・L (患者限定) Carbostar L (陽進堂) A 剤 6L, B 剤 7.6L 【薬価】 2,597.00 円 / 瓶 A 剤 (6L) 中： 塩化ナトリウム 1,289g 塩化カリウム 31g 塩化カルシウム水和物 46g 塩化マグネシウム 21g ブドウ糖 315g B 剤 (7.6L) 中： 炭酸水素ナトリウム 621g</p>	<p>【効】 慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として、次記の要因を持つものに用いる。：無糖の透析液では、血糖値管理の困難な場合、カリウム、マグネシウム濃度の高い透析液では、高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合、カルシウム濃度の高い透析液では、高カルシウム血症を起こすおそれのある場合 【用】(注) B 剤 1 容に対し水 26 容を加えて希釈し、この希釈液 34 容に対して A 剤 1 容を加えて希釈。灌流液として 150～300L</p>
<p>キンダリー透析剤 AF4 号 (院内) Kindaly AF4 (扶桑) A 液 6L, B 液 7.56L / 瓶 【薬価】 3,288.00 円 / 瓶 A 液 (9L) 中： 塩化ナトリウム 1960.2g 塩化カリウム 46.98g 塩化カルシウム水和物 63.63g 塩化マグネシウム 32.04g 無水酢酸ナトリウム 154.80g ブドウ糖 393.75g B 液 (11.34L) 中： 炭酸水素ナトリウム 727.65g</p>	<p>【効】 慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として用いる。(無糖の透析液では血糖値管理の困難な患者及び他の重炭酸型透析液では高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合、又は高カルシウム血症を起こすおそれのある場合に用いる。) 【用】(注) A 液：B 液：透析用希釈用水 = 1：1.26：32.74 の希釈・調整比率の重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流液として使用、用量は透析時間により異なるが、灌流液として 150～300L を用いる</p>
<p>サブラッド血液ろ過用補充液 BSG Sublood-BSG (扶桑) 2020mL / キット 【薬価】 942.00 円 / キット B 液 (大室) 1414mL 中： 塩化ナトリウム 11.30g 塩化カリウム 120mg 塩化カルシウム水和物 519.8mg 塩化マグネシウム 205.4mg 無水酢酸ナトリウム 82.8mg ブドウ糖 2.02g A 液 (小室) 606mL 中： 塩化ナトリウム 1.04g 塩化カリウム 180mg 炭酸水素ナトリウム 5.94g</p>	<p>【効】 透析型人工腎臓では治療の持続又は管理の困難な慢性腎不全例に対するろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時ならびに治療時間の短縮を目的とするろ過透析型人工腎臓使用時の補充液として用いる 【用】(注) 使用時 A 液及び B 液を混和し、濾過型又は濾過透析型人工腎臓使用時の体液量を保持する目的で点滴注入。投与は濾過液量と体液量とのバランスを保つように十分注意して行う。30～80ml / 分で症状、血液生化学異常、電解質・酸塩基平衡異常、体液バランス異常等が是正されるまで行う。1 回の濾過型人工腎臓治療では 15～20L を 4～7 時間で投与。透析型人工腎臓と併用する場合、5～10L を 3～5 時間で投与</p>

342. 腹膜透析用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>エクストラニール腹膜透析液 Extraneal (バクスター) 1.5L/袋 (排液用バッグ付)：UV ツインバッグ</p> <p>【薬価】 2,043.00 円 / 袋</p> <p>イコデキストリン 75g/L 塩化ナトリウム 5.35g/L 乳酸ナトリウム 4.48g/L 塩化カルシウム (2 水塩) 0.257g/L 塩化マグネシウム (6 水塩) 0.051g/L</p> <p>エクストラニール腹膜透析液 Extraneal (バクスター) 2L/袋 (排液用バッグ付)：ツイ ンバッグ</p> <p>【薬価】 1,448.00 円 / 袋</p> <p>イコデキストリン 75g/L 塩化ナトリウム 5.35g/L 乳酸ナトリウム 4.48g/L 塩化カルシウム (2 水塩) 0.257g/L 塩化マグネシウム (6 水塩) 0.051g/L</p>	<p>【効】 慢性腎不全患者における腹膜透析</p> <p>【用】 (注) 1 日 1 回のみ、1 日 3～5 回交換のうち 1 回の交換において 1.5～2L を腹腔内に注入し、8～12 時間滯液し、効果期待後に排液除去。本剤以外の交換にはブドウ糖含有腹膜透析液を用いる。注入・排液速度 300mL/分以下</p>
<p>レギュニール HCa1.5 腹膜透析液 Reguneal HCa (バクスター) 5L/袋</p> <p>【薬価】 2,060.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p> <p>レギュニール HCa2.5 腹膜透析液 Reguneal HCa (バクスター) 1.5L/袋 (排液用バッグ付)：UV ツインバッグ</p> <p>【薬価】 1,277.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p> <p>レギュニール HCa2.5 腹膜透析液 Reguneal HCa (バクスター) 2L/袋 (排液用バッグ付)：ツイ ンバッグ</p> <p>【薬価】 1,326.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p> <p>レギュニール HCa2.5 腹膜透析液 Reguneal HCa (バクスター) 5L/袋</p> <p>【薬価】 1,827.00 円 / 袋 組成：添付文書参照</p>	<p>【効】 慢性腎不全患者における腹膜透析(高マグネシウム血症の改善が不十分な場合)</p> <p>【用】 (注) 腹腔内に注入し、透析治療を目的とした液として使用する。1 回 1.5～2L を腹腔内に注入し、4～8 時間滯液し、効果期待後に排液除去する。以上の操作を 1 回とし、体液の過剰が 1kg/日以下の場合、通常 1 日あたりレギュニール HCa 1.5 腹膜透析液のみ 3～4 回の連続操作を継続して行う。体液の過剰が 1kg/日以上認められる場合、通常レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液を 1～4 回、又はレギュニール HCa 4.25 腹膜透析液を 1～2 回処方し、レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液と組み合わせて 1 日あたり 3～5 回の連続操作を継続して行う。なお、注入量、滯液時間、操作回数は症状、血液生化学値及び体液の平衡異常、年齢、体重などにより適宜増減する。注入及び排液速度は、通常 300mL/分以下</p>

39. その他の代謝性医薬品

391. 肝臓疾患用剤

3919. その他の肝臓疾患用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ネオファーゲン C 配合錠 Neophagen C (大鵬) 1錠 【薬価】 5.70 円 / T 1錠中： グリチルリチン酸一アンモニウム (グリチルリチン酸として) 25mg グリシン 25mg DL-メチオニン 25mg	【効】 ①慢性肝疾患における肝機能異常の改善. ②湿疹・皮膚炎, 小児ストロフルス, 円形脱毛症, 口内炎 【用】 (内) 1回2～3錠を1日3回食後, 小児:1錠を1日3回食後
⑧ネオファーゲン静注 20mL Neophagen (大塚) 20mL/管 【薬価】 57.00 円 / A 【先発品】 強力ネオミノファーゲンシー静注 20mL, 強力ネオミノファーゲンシー P 静注 20mL 1管 20mL 中： グリチルリチン酸一アンモニウム (グリチルリチン酸として) 40mg グリシン 400mg L-システイン (L-システイン塩酸塩相当量) 20mg	【効】 ①湿疹・皮膚炎, 蕁麻疹, 皮膚そう痒症, 薬疹・中毒疹, 口内炎, 小児ストロフルス, フリクテン. ②慢性肝疾患における肝機能異常の改善 【用】 (注) ①1日1回5～20mLを静注. ②1日1回40～60mLを静注又は点滴静注. 1日100mLまで
⑧ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL Hishiphagen (ニプロ) 20mL/筒 【薬価】 160.00 円 / 筒 【先発品】 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 20mL 1シリンジ中： グリチルリチン酸一アンモニウム 53mg (グリチルリチン酸として 40mg) グリシン 400mg L-システイン塩酸塩水和物 22mg (L-システイン塩酸塩として 20mg)	【効】 ①小児ストロフルス, 湿疹・皮膚炎, 蕁麻疹, 皮膚そう痒症, 口内炎, フリクテン, 薬疹・中毒疹. ②慢性肝疾患における肝機能異常の改善 【用】 (注) ①1日1回5～20mLを静注. ②1日1回40～60mLを静注又は点滴静注. 1日100mLまで

392. 解毒剤

3922. グルタチオン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グルタチオン タチオン錠 50mg Tathion (日本ジェネリック) 50mg/T 【薬価】 7.60 円 / T	【効】 薬物中毒, アセトン血性嘔吐症 (自家中毒, 周期性嘔吐症), 金属中毒, 妊娠悪阻, 妊娠高血圧症候群 【用】 (内) 1回50～100mgを1日1～3回

3925. チオ硫酸ナトリウム製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
チオ硫酸ナトリウム水和物 デトキソール静注液 2g Detoxol (日医工) 2g20mL/V 【薬価】412.00円/瓶	【効】①ヒ素剤による中毒. ②シアン及びシアン化合物による中毒 【用】(注) ①1日1~2gを静注. ②1回12.5~25gを静注

3929. その他の解毒剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
球形吸着炭 クレメジン速崩錠 500mg Kremezin (田辺三菱) 500mg/T 【薬価】26.60円/T	【効】慢性腎不全(進行性)における尿毒症症状の改善及び透析導入の遅延 【用】(内)1日6gを3回に分割
酢酸亜鉛水和物 ノベルジン錠 50mg Ⓢ Nobelzin (ノーベル) 50mg/T 【薬価】321.60円/T	【効】①ウィルソン病(肝レンズ核変性症). ②低亜鉛血症 【用】(内)①1回50mgを1日3回. 最大1日250mg(1回50mgを1日5回投与)まで. 6歳以上の小児には, 1回25mgを1日3回. 1歳以上6歳未満の小児には, 1回25mgを1日2回. いずれの場合も, 食前1時間以上又は食後2時間以上あけて投与. ②成人及び体重30kg以上の小児では, 1回25~50mgを開始用量とし1日2回. 体重30kg未満の小児では, 1回0.5~0.75mg/kgを開始用量とし1日2回. 患者の状態により1回25mgの1日1回経口投与から開始することもできる. 最大投与量は成人及び体重30kg以上の小児では1日150mg(1回50mgを1日3回), 体重10kg以上体重30kg未満の小児では75mg(1回25mgを1日3回), 体重10kg未満の小児では25mg(1回12.5mgを1日2回, 又は1回25mgを1日1回). いずれの場合も食後に投与
スガマデクスナトリウム ブリディオ静注 200mg Bridion (MSD) 200mg2mL/V 【薬価】9,000.00円/瓶	【効】ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復 【用】(注) 浅い筋弛緩状態(筋弛緩モニターにおいて四連(TOF)刺激による2回目の収縮反応(T2)の再出現を確認した後)では1回2mg/kgを, 深い筋弛緩状態(筋弛緩モニターにおいてポスト・テタニック・カウント(PTC)刺激による1~2回の単収縮反応(1-2PTC)の出現を確認した後)では1回4mg/kgを静注. ロクロニウム臭化物の挿管用量投与直後に緊急に筋弛緩状態からの回復を必要とする場合, ロクロニウム臭化物投与3分後を目安に1回16mg/kgを静注
炭酸水素ナトリウム メイロン静注 8.4% Meylon (大塚) 1.68g20mL/A 【薬価】138.00円/A メイロン静注 8.4% Meylon (大塚) 21g250mL/袋 【薬価】346.00円/袋	【効】①アシドーシス. ②薬物中毒の際の排泄促進(pHの上昇により尿中排泄の促進される薬物に限る). ③次記疾患又は状態に伴う悪心・嘔吐及びめまい: 動揺病, メニエール症候群, その他の内耳障害. ④急性蕁麻疹 【用】(注) ①通常用量を次式により算出し, 静注. 必要量(mL) = 不足塩基量(Base Deficit mEq/L) × 0.2 × 体重(kg). ②③④1回12~60mEq(1~5g: 本剤12~60mL)を静注
デフェラシロクス ジャドニュー顆粒分包 90mg (院外) Ⓢ Jadenu (ノバルティス) 90mg/包 【薬価】644.80円/包 ジャドニュー顆粒分包 360mg (院外) Ⓢ Jadenu (ノバルティス) 360mg/包 【薬価】2,537.20円/包	【効】輸血による慢性鉄過剰症(注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合) 【用】(内)12mg/kgを1日1回. 1日量は18mg/kgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プラリドキシムヨウ化物 パム静注 500mg Pam (大日本住友) 500mg/20mL/A 【薬価】 1,421.00 円/A	【効】 有機リン剤の中毒 【用】 (注) 1回 1g を徐々に静注
ホリナートカルシウム ユーゼル錠 25mg Uzel (大鵬) 25mg/T 【薬価】 836.60 円/T	【効】 ホリナート・テガフル・ウラシル療法：結腸・直腸癌に対するテガフル・ウラシルの抗腫瘍効果の増強 【用】 (内) 75mg を、1日 3回に分割し (約 8 時間ごとに)、テガフル・ウラシル配合剤と同時に投与。テガフル・ウラシル配合剤は、1日量として、テガフル 300～600mg 相当量 (300mg/m ² を基準) を 1日 3回に分割し (約 8 時間ごとに)、食事の前後 1 時間を避ける。以上を 28 日間連日、その後 7 日間休薬。これを 1クールとして繰り返す
ホリナートカルシウム ロイコボリン注 3mg Leucovorin (ファイザー) 3mg/V 【薬価】 290.00 円/A	【効】 葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 【用】 (注) ①メトトレキサート通常療法、CMF 療法、メトトレキサート関節リウマチ療法又は M-VAC 療法：メトトレキサートによると思われる副作用が発現した場合、1回 6～12mg を 6 時間間隔で 4 回筋注。メトトレキサートを過剰投与した場合、投与したメトトレキサートと同量を投与。②メトトレキサート・ロイコボリン救援療法：メトトレキサート投与終了 3 時間目より 1回 15mg を 3 時間間隔で 9 回静注、以後 6 時間間隔で 8 回静注又は筋注。メトトレキサートによると思われる重篤な副作用が現れた場合、用量を増加し、投与期間を延長。③メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法：メトトレキサート投与後 24 時間目より 1回 15mg を 6 時間間隔で 2～6 回 (メトトレキサート投与後 24, 30, 36, 42, 48, 54 時間目) 静注又は筋注。メトトレキサートによると思われる重篤な副作用が現れた場合、用量を増加し、投与期間を延長
メスナ ウロミテキサン注 100mg Uromitexan (塩野義) 100mg/A 【薬価】 295.00 円/A	【効】 ①イホスファミド投与又は②シクロホスファミド (造血幹細胞移植の前治療) 投与に伴う泌尿器系障害 (出血性膀胱炎、排尿障害等) の発現抑制 【用】 (注) ①イホスファミド 1 日量の 20% 相当量を 1 回量とし、1日 3回 (イホスファミド投与時、4 時間後、8 時間後) 静注、イホスファミド 1 日量の最大 100% 相当量まで投与可。②シクロホスファミド 1 日量の 40% 相当量を 1 回量とし、1日 3回 (シクロホスファミド投与時、4 時間後、8 時間後) 30 分かけて点滴静注
レボホリナートカルシウム レボホリナート点滴静注用 25mg 「NK」 Levofolinate (日本化薬) 25mg/V (レボホリナートとして) 【薬価】 456.00 円/瓶 レボホリナート点滴静注用 100mg 「NK」 Levofolinate (日本化薬) 100mg/V (レボホリナートとして) 【薬価】 1,537.00 円/瓶	【効】 ①レボホリナート・フルオロウラシル療法：胃癌 (手術不能又は再発) 及び結腸・直腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強。②レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法：結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強 【用】 (注) ① 1回 250mg/m ² を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注開始 1 時間後にフルオロウラシルとして 1回 600mg/m ² を 3 分以内で緩徐に静注。1 週間ごとに 6 回繰り返した後 2 週間休薬、これを 1クールとする。② [結腸・直腸癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法] (1) 1回 100mg/m ² を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注終了直後にフルオロウラシルとして 400mg/m ² を静注するとともにフルオロウラシルとして 600mg/m ² を 22 時間かけて持続静注。これを 2 日間連続、2 週間ごとに繰り返す。(2) 1回 250mg/m ² を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注終了直後にフルオロウラシルとして 2600mg/m ² を 24 時間かけて持続静注。1 週間ごとに 6 回繰り返した後、2 週間休薬。これを 1クールとする。(3) 1回 200mg/m ² を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注終了直後にフルオロウラシルとして 400mg/m ² を静注するとともに、フルオロウラシルとして 2400～3000mg/m ² を 46 時間かけて持続静注。これを 2 週間ごとに繰り返す。[小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法] 1回 200mg/m ² を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注終了直後にフルオロウラシルとして 400mg/m ² を静注するとともに、フルオロウラシルとして 2400mg/m ² を 46 時間かけて持続静注する。これを 2 週間ごとに繰り返す

394. 痛風治療剤

3941. コルヒチン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
コルヒチン <u>コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」</u> (株) Colchicine (高田) 0.5mg/T 【薬価】 9.60 円/T	【効】 ①痛風発作の緩解及び予防. ②家族性地中海熱 【用】 (内) ① 1日 3～4mgを 6～8回に分割. 発病予防には, 1日 0.5～1mg, 発作予感時には 1回 0.5mg. ②成人: 1日 0.5mgを 1回又は 2回に分けて投与. 1日最大投与量は 1.5mgまで. 小児: 1日 0.01～0.02mg/kgを 1回又は 2回に分けて投与. 1日最大投与量は 0.03mg/kgまでとし, かつ成人の 1日最大投与量を超えない

3942. プロベネシド製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロベネシド <u>ベネシッド錠 250mg</u> Benecid (科研) 250mg 【薬価】 18.70 円/T	【効】 ①痛風. ②ペニシリン, パラアミノサリチル酸の血中濃度維持 【用】 (内) ① 1日 0.5～2gを分割し, その後維持量として 1日 1～2gを 2～4回に分割. ② 1日 1～2gを 4回に分割

3943. アロプリノール製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アロプリノール <u>アロプリノール錠 100mg 「サワイ」</u> Allopurinol (沢井) 100mg/T 【薬価】 7.80 円/T 【先発品】 ザイロリック錠 100	【効】 次記の場合における高尿酸血症の是正: 痛風, 高尿酸血症を伴う高血圧症 【用】 (内) 1日量 200～300mgを, 2～3回に分割し食後

3949. その他の痛風治療剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ドチヌラド <u>ユリス錠 1mg</u> Ureca (持田) 1mg/T 【薬価】 50.50 円/T	【効】 痛風, 高尿酸血症 【用】 (内) 1日 0.5mgより開始し, 1日 1回. その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量. 維持量は通常 1日 1回 2mgで, 最大投与量は 1日 1回 4mg
トピロキソスタット <u>ウリアデック錠 40mg</u> Uriadec (三和化学) 40mg/T 【薬価】 29.10 円/T	【効】 痛風, 高尿酸血症 【用】 (内) 1回 20mgより開始し, 1日 2回朝夕に投与. その後は血中尿酸値を確認しながら徐々に増量. 維持量は 1回 60mgを 1日 2回とし, 1回 80mgを 1日 2回まで
フェブキソスタット <u>フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」</u> Febuxostat (第一三共) 10mg/T 【薬価】 5.90 円/T 【先発品】 フェブリク錠 10mg <u>フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」</u> Febuxostat (第一三共) 20mg/T 【薬価】 10.70 円/T 【先発品】 フェブリク錠 20mg	【効】 ①痛風, 高尿酸血症. ②がん化学療法に伴う高尿酸血症 【用】 (内) ① 1日 10mgより開始し, 1日 1回. その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量. 維持量は 1日 1回 40mg, 最大投与量は 1日 1回 60mg. ② 60mgを 1日 1回

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ベンズブロマロン ユリノーム錠 50mg Ⓢ Urinorm (鳥居) 50mg/T 【薬価】 11.80 円/T</p>	<p>【効】 次記の場合における高尿酸血症の改善：①痛風、②高尿酸血症を伴う高血圧症 【用】 (内) ① 1日1回 25mg又は50mg, その後維持量として1回 50mgを1日1～3回 (50～150mg). ② 1回 50mgを1日1～3回 (50～150mg)</p>
<p>ウラリット配合錠 Uralyt (日本ケミファ) 1錠 【薬価】 7.00 円/T 1錠中： クエン酸カリウム 231.5mg クエン酸ナトリウム水和物 195.0mg</p>	<p>【効】 ①痛風ならびに高尿酸血症における酸性尿の改善、②アシドーシスの改善 【用】 (内) ① 1回2錠を1日3回, 尿検査でpH6.2から6.8の範囲に入るよう投与量を調整、② 1日量12錠を3～4回に分割</p>

395. 酵素製剤

3954. ウロキナーゼ製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ウロキナーゼ ウロナーゼ静注用 6万単位 Ⓢ Uronase (持田) 60,000 単位/V 【薬価】 4,700.00 円/瓶</p>	<p>【効】 次の血栓・閉塞性疾患の治療：①脳血栓症 (発症後5日以内で、コンピューター断層撮影において出血の認められないもの)、②末梢動・静脈閉塞症 (発症後10日以内) 【用】 (注) 10mLの生理食塩液に用時溶解し、静注。なお、生理食塩液又はブドウ糖注射液に混じて点滴注射することが望ましい。① 1日1回6万単位約7日間点滴静注、②初期1日6万～24万単位、以後漸減し約7日間点滴静注</p>

3959. その他の酵素製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>モンテプララーゼ (遺伝子組換え) クリアクター静注用 80万 Ⓢ Cleactor (エーザイ) 80万 I.U./V 【薬価】 64,071.00 円/瓶</p>	<p>【効】 ①急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解 (発症後6時間以内)、②不安定な血行動態を伴う急性肺塞栓症における肺動脈血栓の溶解 【用】 (注) ① 27,500I.U./kgを静注、② 13,750～27,500I.U./kgを静注、1回最大投与量は27,500I.U./kgまで、8万 I.U./mLとなるように生理食塩液で溶解し、約80万 I.U. (10mL) /分の注入速度で、発症後できるだけ早期に行う</p>
<p>ラスブリカーゼ (遺伝子組換え) ラスリテック点滴静注用 7.5mg Ⓢ Rasuritek (サノフィ) 7.5mg/瓶 【薬価】 48,297.00 円/瓶</p>	<p>【効】 がん化学療法に伴う高尿酸血症 【用】 (注) 0.2mg/kgを1日1回30分以上かけて点滴静注、投与期間は最大7日間</p>

396. 糖尿病用剤

3961. スルフォニル尿素系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>グリクラジド グリミクロン錠 40mg (院外) Ⓢ Glimicron (大日本住友) 40mg/T 【薬価】 10.20 円/T</p>	<p>【効】 インスリン非依存型糖尿病 (成人型糖尿病) (但し、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限り) 【用】 (内) 1日40mgより開始し、1日1～2回 (朝又は朝夕) 食前又は食後、維持量は1日40～120mgであるが、160mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グリメピリド <u>アマリール 1mg錠 (院外)</u> (株) Amaryl (サノフィ) 1mg/T 【薬価】 11.00 円/T <u>後グリメピリド錠 1mg「サワイ」</u> (株) Glimepiride (沢井) 1mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アマリール 1mg錠	【効】 2型糖尿病 (但し、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る) 【用】 (内) 1日 0.5～1mgより開始し、1日 1～2回朝又は朝夕、食前又は食後。維持量は1日 1～4mg、1日 6mgまで

3962. ビグアナイド系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メトホルミン塩酸塩 <u>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」</u> (株) Metformin hydrochloride (大日本住友) 250mg/T 【薬価】 10.10 円/T <u>メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「TE」</u> (株) Metformin hydrochloride (トーアエイヨー) 500mg/T 【薬価】 10.10 円/T	【効】 ① 2型糖尿病。但し、次記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。(1) 食事療法・運動療法のみ、(2) 食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用。②多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激。ただし、肥満、耐糖能異常、又はインスリン抵抗性のいずれかを呈する患者のみ 【用】 (内) ① 1日 500mgより開始し、1日 2～3回に分割して食直前又は食後。維持量は1日 750～1,500mg、1日 2,250mgまで。10歳以上の小児：1日 500mgより開始し、1日 2～3回に分割して食直前又は食後。維持量は1日 500～1,500mg、1日 2,000mgまで。②多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発：他の排卵誘発薬との併用で、500mgの1日 1回より開始。忍容性を確認しながら増量し、1日投与量として1,500mgを超えない範囲で、1日 2～3回に分割。排卵までに中止。多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激：他の卵巣刺激薬との併用で、500mgの1日 1回経口投与より開始。忍容性を確認しながら増量し、1日投与量として1,500mgを超えない範囲で、1日 2～3回に分割。採卵までに中止

3969. その他の糖尿病用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アカルボース <u>後アカルボース錠 50mg「NIG」(院内)</u> Acarbose (武田) 50mg/T 【薬価】 8.00 円/T	【効】 糖尿病の食後過血糖の改善 (但し、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る) 【用】 (内) 1回 100mgを1日 3回、食直前。1回 50mgより投与を開始し、忍容性を確認したうえ1回 100mgへ増量も可
アナグリプチン <u>スイニー錠 100mg</u> Suiny (三和化学) 100mg/T 【薬価】 35.40 円/T	【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 1回 100mgを1日 2回朝夕。1回量を 200mgまで増量可
イブラグリフロジン L-プロリン <u>スーグラ錠 50mg</u> Suglat (アステラス) 50mg/T 【薬価】 170.40 円/T	【効】 ① 2型糖尿病。② 1型糖尿病 【用】 (内) ①イブラグリフロジンとして 50mgを1日 1回朝食前又は朝食後。効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら 100mg1日 1回まで増量可。②インスリン製剤との併用において、50mgを1日 1回朝食前又は朝食後に投与。効果不十分な場合には、100mg1日 1回まで増量可
イメグリミン塩酸塩 <u>ツイミーグ錠 500mg</u> Twymeeg (住友ファーマ) 500mg/T 【薬価】 34.10 円/T	【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 1回 1000mgを1日 2回朝、夕

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エンバグリフロジン ジャディアンス錠 10mg Jardiance (日本ベーリンガー) 10mg/T 【薬価】188.90円/T	【効】①2型糖尿病. ②慢性心不全. 慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る. ③慢性腎臓病. 末期腎不全又は透析施行中の患者を除く 【用】(内) ①10mgを1日1回朝食前又は朝食後. 効果不十分な場合, 25mg1日1回に増量可. ②③10mgを1日1回朝食前又は朝食後
オマリグリプチン マリゼブ錠 12.5mg Marizev (キッセイ) 12.5mg/T 【薬価】353.50円/T	【効】2型糖尿病 【用】(内) 25mgを1週間に1回
カナグリフロジン水和物 カナグル錠 100mg Canaglu (田辺三菱) 100mg/T 【薬価】158.50円/T	【効】①2型糖尿病. ②2型糖尿病を合併する慢性腎臓病. 末期腎不全又は透析施行中の患者を除く 【用】(内) 100mgを1日1回朝食前又は朝食後
シタグリプチンリン酸塩水和物 ジャヌビア錠 50mg Januvia (MSD) 50mg/T 【薬価】111.50円/T	【効】2型糖尿病 【用】(内) 50mgを1日1回. 100mg1日1回まで増量可
ダバグリフロジンプロピレングリコール フォシーガ錠 5mg (院外) Forxiga (小野) 5mg/T 【薬価】169.90円/T フォシーガ錠 10mg Forxiga (小野) 10mg/T 【薬価】250.70円/T	【効】①2型糖尿病. ②1型糖尿病. ③慢性心不全. ただし, 慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る. ④慢性腎臓病. ただし, 末期腎不全又は透析施行中の患者を除く 【用】(内) ①5mgを1日1回. 効果不十分な場合10mgを1日1回に増量可. ②インスリン製剤との併用において, 5mgを1日1回. 効果不十分な場合, 10mg1日1回に増量可. ③④10mgを1日1回
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 テネリア OD 錠 20mg Tenelia (第一三共) 20mg/T 【薬価】106.30円/T	【効】2型糖尿病 【用】(内) 20mgを1日1回. 40mg1日1回まで増量可
トホグリフロジン水和物 デベルザ錠 20mg Deberza (興和) 20mg/T 【薬価】164.10円/T	【効】2型糖尿病 【用】(内) 20mgを1日1回朝食前又は朝食後
ナテグリニド スターシス錠 90mg (院外) Starsis (アステラス) 90mg/T 【薬価】24.60円/T	【効】2型糖尿病における食後血糖推移の改善. 但し, 次のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る. ①食事療法・運動療法のみ. ②食事療法・運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用. ③食事療法・運動療法に加えてビッグアナイド系薬剤を使用. ④食事療法・運動療法に加えてチアゾリジン系薬剤を使用 【用】(内) 1回90mgを1日3回毎食直前. 1回量120mgまで
ピオグリタゾン塩酸塩 ピオグリタゾン錠 15mg 「サワイ」 Pioglitazone (沢井) 15mg/T 【薬価】12.70円/T 【先発品】アクトス錠 15	【効】2型糖尿病. 但し, 次のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る. ①(a) 食事療法, 運動療法のみ. (b) 食事療法, 運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用. (c) 食事療法, 運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用. (d) 食事療法, 運動療法に加えてビッグアナイド系薬剤を使用. ②食事療法, 運動療法に加えてインスリン製剤を使用 【用】(内) ①15~30mgを1日1回朝食前又は朝食後. 45mgまで. ②15mgを1日1回朝食前又は朝食後. 30mgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビルダグリプチン <u>エクア錠 50mg</u> Equa (大日本住友) 50mg/T 【薬価】 60.60 円 /T	【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 50mgを1日2回朝, 夕. 状態に応じて50mgを1日1回朝も可
ミグリトール <u>セイブル錠 50mg</u> Seibule (三和化学) 50mg/T 【薬価】 22.30 円 /T <u>⑨</u> <u>ミグリトール OD 錠 75mg 「サワイ」</u> Miglitol OD (沢井) 50mg/T 【薬価】 14.90 円 /T 【先発品】 セイブル OD 錠 75mg	【効】 糖尿病の食後過血糖の改善 (但し, 食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合, 又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤, ビグアナイド系薬剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る) 【用】 (内) 1回50mgを1日3回毎食直前. 1回量を75mgまで増量可
ミチグリニドカルシウム水和物 <u>グルファスト錠 10mg</u> Glufast (キッセイ) 10mg/T 【薬価】 23.60 円 /T	【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 1回10mgを1日3回毎食直前
リナグリプチン <u>トラゼンタ錠 5mg</u> Trazenta (日本ベーリンガー) 5mg/T 【薬価】 122.00 円 /T	【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 5mgを1日1回
レバグリニド <u>シュアポスト錠 0.5mg</u> Surepost (大日本住友) 0.5mg/T 【薬価】 31.60 円 /T	【効】 2型糖尿病 【用】 (内) 1回0.25mgより開始し, 1日3回毎食直前. 維持用量は1回0.25～0.5mg. 1回量を1mgまで増量可
<u>エクメット配合錠 HD</u> EquMet HD (大日本住友) 1錠 【薬価】 50.20 円 /T 1錠中: ビルダグリプチン 50mg メトホルミン塩酸塩 500mg	【効】 2型糖尿病. 但し, ビルダグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る 【用】 (内) 1回1錠 (ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩として50mg/250mg又は50mg/500mg)を1日2回朝, 夕
<u>カナリア配合錠</u> Canalia (田辺三菱) 錠 【薬価】 220.00 円 /T 1錠中: テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 31mg (テネリグリプチンとして20mg) カナグリフロジン水和物 102mg (カナグリフロジンとして100mg)	【効】 2型糖尿病. 但し, テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物及びカナグリフロジン水和物の併用による治療が適切と判断される場合に限る 【用】 (内) 1日1回1錠を朝食前又は朝食後

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ゾルトファイ配合注フレックス タッチ (株) Xultophy (ノボノルディスク) 1キット 【薬価】 4,531.00 円 / キット 1 筒中： インスリン デグルデク (遺伝子組換え) 300 単位 (1800nmol) リラグルチド (遺伝子組換え) 10.8mg</p>	<p>【効】 インスリン療法が適応となる 2 型糖尿病 【用】 (注) 初期は 1 日 1 回 10 ドーズ (インスリン デグルデク / リラグルチドとして 10 単位 / 0.36mg) を皮下注. 1 日 50 ドーズ (インスリン デグルデク / リラグルチドとして 50 単位 / 1.8mg) まで. 注射時刻は原則として毎日一定とする. 本剤の用量単位である 1 ドーズには, インスリン デグルデク 1 単位及びリラグルチド 0.036mg が含まれる</p>
<p>トラディアンス配合錠 AP Tradiance (日本ベーリンガー) T 【薬価】 241.50 円 / T 1 錠中： エンパグリフロジン 10mg リナグリプチン 5mg</p>	<p>【効】 2 型糖尿病. 但し, エンパグリフロジン及びリナグリプチンの併用による治療が適切と判断される場合に限る 【用】 (内) 1 日 1 回 1 錠 (エンパグリフロジン / リナグリプチンとして 10mg/5mg) を朝食前又は朝食後</p>
<p>メトアナ配合錠 HD (株) Metoana (三和化学) 1 錠 【薬価】 43.30 円 / T 1 錠中： アナグリプチン 100mg メトホルミン塩酸塩 500mg</p>	<p>【効】 2 型糖尿病. ただし, アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る 【用】 (内) 1 回 1 錠を 1 日 2 回朝夕</p>

399. 他に分類されない代謝性医薬品

3992. アデノシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホス-L コーワ注 40mg Adetphos-L (興和) 40mg2mL/A 【薬価】 70.00 円 / A</p>	<p>【効】 ①次記疾患に伴う諸症状の改善: 頭部外傷後遺症. ②心不全, 筋ジストロフィー症及びその類縁疾患, 急性灰白髄炎, 脳性小児麻痺 (弛緩型), 進行性脊髄性筋萎縮症及びその類似疾患, 調節性眼精疲労における調節機能の安定化, 耳鳴・難聴, 消化管機能低下のみられる慢性胃炎, 慢性肝疾患における肝機能の改善 【用】 (注) 静注の場合: 1 回 5 ~ 40mg を 1 日 1 ~ 2 回, 等張ないし高張ブドウ糖注射液に溶解して, 徐々に静注. 点滴静注の場合: 1 回 40 ~ 80mg を 1 日 1 回, 5% ブドウ糖注射液 200 ~ 500mL に溶解し, 30 ~ 60 分かけて点滴静注</p>
<p>アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホスコワ顆粒 10% Adetphos (興和) 10%1g/包 【薬価】 17.10 円 / g</p>	<p>【効】 ①次記疾患に伴う諸症状の改善: 頭部外傷後遺症. 心不全. 調節性眼精疲労における調節機能の安定化. 消化管機能低下のみられる慢性胃炎. ②メニエール病及び内耳障害に基づくめまい 【用】 (内) ① 1 回 40 ~ 60mg を 1 日 3 回. ② 1 回 100mg を 1 日 3 回</p>

3999. 他に分類されないその他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アザチオプリン <u>イムラン錠 50mg</u> Imuran (サンド) 50mg/T 【薬価】 78.80 円 / T	【効】 次記の臓器移植における拒絶反応の抑制：①腎移植，②肝移植，心移植，肺移植，③ステロイド依存性のクローン病の寛解導入及び寛解維持並びにステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の寛解維持。④治療抵抗性の次記リウマチ性疾患：全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，高安動脈炎等），全身性エリテマトーデス（SLE），多発性筋炎，皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組織病，及び難治性リウマチ性疾患。⑤自己免疫性肝炎 【用】 （内）次記量を1日量として投与（成人及び小児）：①初期量：2～3mg/kg，維持量：0.5～1mg/kg。②初期量：2～3mg/kg，維持量：1～2mg/kg。③⑤1～2mg/kg（成人には50～100mg）。④成人及び小児：1日量として1～2mg/kg，1日量として3mg/kgまで
アダリムマブ（遺伝子組換え） <u>ヒュミラ皮下注 40mgペン 0.4mL</u> ㉞ ㉟ Humira (エーザイ) 40mgペン 0.4mL 【薬価】 48,988.00 円 / キット	【効】 ①関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）。②化膿性汗腺炎。③壞疽性膿皮症。既存治療で効果不十分な次記疾患（④～⑧）：④尋常性乾癬，乾癬性関節炎，膿疱性乾癬，⑤強直性脊椎炎，⑥多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎，⑦腸管型ベーチェット病，⑧非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎。⑨中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）。⑩中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る） 【用】 （注）①40mgを2週に1回皮下注。効果不十分な場合，1回80mgまで。②初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注，初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注。③初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回，皮下注。④初回に80mgを皮下注，以後2週に1回，40mgを皮下注。効果不十分な場合，1回80mgまで。⑤40mgを2週に1回，皮下注。効果不十分な場合，1回80mgまで。⑥体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを，体重30kg以上の場合は40mgを2週に1回，皮下注。⑦初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注。⑧初回に80mgを，初回投与1週間後に40mgを皮下注。初回投与3週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注。⑨初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注。効果が減弱した場合には1回80mgまで。⑩初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注。初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注も可能。小児：体重40kg以上の場合は，初回に160mgを，初回投与1週間後及び2週間後に80mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注。体重25kg以上40kg未満の場合は，初回に80mgを，初回投与1週間後及び2週間後に40mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮下注。体重15kg以上25kg未満の場合は，初回に40mgを，初回投与1週間後及び2週間後に20mgを皮下注。初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注
アナモレリン塩酸塩 <u>エドルミズ錠 50mg</u> ㉞ Adlumiz (小野) 50mg 【薬価】 244.00 円 / T	【効】 次記の悪性腫瘍におけるがん悪液質：非小細胞肺癌，胃癌，膵癌，大腸癌 【用】 （内）100mgを1日1回，空腹時
アバタセプト（遺伝子組換え） <u>オレンシア点滴静注用 250mg</u> ㉞ ㉟ Orencia （ブリストル・マイヤーズ） 250mg/V（調製専用シリンジ付き） 【薬価】 54,444.00 円 / 瓶	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患：①関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）。②多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 【用】 （注）①次記の用量を1回の投与量とし点滴静注。初回投与後，2週，4週に投与し，以後4週間の間隔で投与。体重60kg未満：500mg。体重60kg以上100kg以下：750mg。体重100kgを超える：1g。②1回10mg/kg点滴静注。初回投与後，2週，4週に投与，以後4週間の間隔で投与。体重75kg以上100kg以下の場合1回750mg，体重100kgを超える場合は1回1g

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アバタセプト（遺伝子組換え） <u>オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター 1ml</u> (Ⓢ) 小野 Orenzia (小野) 1本 【薬価】 28,547.00円/キット	【効】 既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） 【用】 (注) 投与初日に負荷投与としてアバタセプト（遺伝子組換え）点滴静注用製剤の点滴静注を行った後、同日中に本剤125mgの皮下注を行い、その後、本剤125mgを週1回、皮下注。本剤125mgの週1回皮下注から開始することも可
アプレミラスト <u>オテズラ錠 10mg（院外）</u> (Ⓢ) アムジェン Otezla (アムジェン) 10mg/T 【薬価】 329.90円/T <u>オテズラ錠 20mg（院外）</u> (Ⓢ) アムジェン Otezla (アムジェン) 20mg/T 【薬価】 659.70円/T <u>オテズラ錠 30mg（院外）</u> (Ⓢ) アムジェン Otezla (アムジェン) 30mg/T 【薬価】 989.60円/T	【効】 局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、乾癬性関節炎、局所療法で効果不十分なベーチェット病による口腔潰瘍 【用】 (内) 1日目：朝10mg、2日目：朝夕10mg、3日目：朝10mg、夕20mg、4日目：朝夕20mg、5日目：朝20mg、夕30mg、6日目以降1回30mgを1日2回、朝夕
アレンドロン酸ナトリウム水和物 <u>ボナロン錠 5mg（院外）</u> (Ⓢ) 帝人 Bonalon (帝人) 5mg/T 【薬価】 43.10円/T	【効】 骨粗鬆症 【用】 (内) 5mgを1日1回、毎朝起床時に水約180mlとともに。服用後少なくとも30分は横にならず、飲食（水を除く）並びに他の薬剤の経口摂取も避ける
アレンドロン酸ナトリウム水和物 <u>ボナロン経口ゼリー 35mg</u> (Ⓢ) 帝人 Bonalon (帝人) 35mg/包 【薬価】 668.90円/包	【効】 骨粗鬆症 【用】 (内) 35mgを1週間に1回、朝起床時に水約180mlとともに。服用後少なくとも30分は横にならず、飲食（水を除く）並びに他の薬剤の経口摂取も避ける
アレンドロン酸ナトリウム水和物 <u>ボナロン点滴静注バッグ 900μg</u> (Ⓢ) 帝人 Bonalon (帝人) 900μg/100mL/袋 【薬価】 3,454.00円/袋 <u>後アレンドロン酸点滴静注バッグ 900μg「HK」</u> (Ⓢ) 光 Alendronate (光) 900μg/袋 【薬価】 1,182.00円/袋 【先発品】 ボナロン点滴静注バッグ900μg	【効】 骨粗鬆症 【用】 (注) 4週に1回900μgを30分以上かけて点滴静注
イキセキズマブ（遺伝子組換え） <u>トルツ皮下注 80mgオートインジェクター</u> (Ⓢ) 日本イーライリリー Taltz (日本イーライリリー) 80mg1mL/キット 【薬価】 148,952.00円/キット	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患：①尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症。②強直性脊椎炎、X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 【用】 (注) ①初回に160mg、2週後から12週後までは1回80mgを2週間隔、以降は1回80mgを4週間隔で皮下注。12週時点で効果不十分な場合には、1回80mgを2週間隔で皮下注できる。②1回80mgを4週間隔で皮下注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イグラチモド <u>ケアラム錠 25mg (院外)</u> (製) Careram (エーザイ) 25mg/T 【薬価】 101.30 円/T	【効】 関節リウマチ 【用】 (内) 1回 25mgを1日1回朝食後に4週間以上投与し、それ以降、1回 25mgを1日2回(朝食後、夕食後)に増量
イバンドロン酸ナトリウム水和物 <u>ボンビバ静注 1mgシリンジ</u> (製) Bonviva (中外) イバンドロン酸として1mg1mL/筒 【薬価】 3,476.00 円/筒	【効】 骨粗鬆症 【用】 (注) イバンドロン酸として1mgを1か月に1回、静注
ウステキヌマブ(遺伝子組換え) <u>ステラーラ点滴静注 130mg</u> (製) Stelara (田辺三菱) 130mg26mL/Vi 【薬価】 184,085.00 円/瓶	【効】 中等症から重症の活動期クローン病の導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) 【用】 (注) 導入療法の初回に、次記に示す用量を単回点滴静注。体重55kg以下: 260mg, 体重55kgを超える85kg以下: 390mg, 体重85kgを超える: 520mg
ウステキヌマブ(遺伝子組換え) <u>ステラーラ皮下注 45mgシリンジ</u> (製) Stelara (ヤンセン) 45mg0.5mL/筒 【薬価】 336,004.00 円/筒	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患: 尋常性乾癬、関節症性乾癬、中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) 【用】 (注) 尋常性乾癬及び関節症性乾癬: 1回45mgを皮下注。初回投与及びその4週後に投与し、以降12週間隔で投与。効果不十分な場合には1回90mgを投与可。クローン病・潰瘍性大腸炎: ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤を投与8週後、90mgを皮下注し、以降は12週間隔で90mgを投与。効果が減弱した場合、投与間隔を8週間に短縮できる
ウパダシチニブ水和物 <u>リンヴォック錠 15mg</u> (製) Rinvoq (アッヴィ) 15mg/T 【薬価】 4,325.80 円/T	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患: ①関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)。②乾癬性関節炎。③アトピー性皮膚炎。④強直性脊椎炎。⑤中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)。⑥X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎。⑦中等症から重症の活動期クローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) 【用】 (内) ①15mgを1日1回。患者の状態に応じて7.5mgを1日1回投与することができる。②④⑥15mgを1日1回。③15mgを1日1回。患者の状態に応じて30mgを1日1回投与することができる。12歳以上かつ体重30kg以上の小児には15mgを1日1回。⑤45mgを1日1回8週間投与。効果不十分な場合はさらに8週間投与することができる。維持療法では、15mgを1日1回。患者の状態に応じて30mgを1日1回投与することができる。⑦導入療法では、45mgを1日1回12週間経口投与。維持療法では、15mgを1日1回経口投与。患者の状態に応じて30mgを1日1回投与することができる
ウリナスタチン <u>ミラクリッド注射液 5万単位</u> (製) Miraclid (持田) 50,000 単位 1mL/A 【薬価】 858.00 円/A	【効】 ①急性膵炎(外傷性、術後及びERCP後の急性膵炎を含む)。慢性再発性膵炎の急性増悪期。②急性循環不全(出血性ショック、細菌性ショック、外傷性ショック、熱傷性ショック) 【用】 (注) ①初期1回2.5万~5万単位を500mLの輸液で希釈し、1回1~2時間かけて1日1~3回点滴静注。②1回10万単位を500mLの輸液で希釈し、1回1~2時間かけて1日1~3回点滴静注、又は1回10万単位を1日1~3回緩徐に静注
エタネルセプト(遺伝子組換え) <u>エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL (院外)</u> (製) Enbrel (ファイザー) 50mg1.0mL/筒 【薬価】 20,567.00 円/筒	【効】 既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む) 【用】 (注) 1日1回10~25mg、週2回皮下注又は1日1回25~50mg、週1回皮下注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エテルカルセチド塩酸塩 <u>パーサビブ静注透析用シリンジ</u> <u>2.5mg</u> (株) Parsabiv (小野) 2.5mg 2mL/筒 【薬価】 782.00 円 / 筒 <u>パーサビブ静注透析用シリンジ</u> <u>5mg</u> (株) Parsabiv (小野) 5mg 2mL/筒 【薬価】 1,127.00 円 / 筒	【効】 血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症 【用】 (注) 1回5mgを開始用量とし、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入。以後は、患者の副甲状腺ホルモン (PTH) 及び血清カルシウム濃度の十分な観察のもと、1回2.5～15mgの範囲内で適宜用量を調整し、週3回、透析終了時の返血時に投与
エポエチンアルファ (遺伝子組換え) <u>エスポー皮下用 24000 シリンジ</u> (株) (株) Espo (協和キリン) 24,000I.U.0.5mL/筒 【薬価】 12,489.00 円 / 筒	【効】 ①腎性貧血。②貯血量が800mL以上で1週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血 【用】 (注) ①投与初期は、1回6000I.U.を週1回皮下注。貧血改善効果が得られたら、維持量として、1回6000～12000I.U.を2週に1回皮下注。小児には1回100I.U./kgを週1回皮下注。貧血改善効果の目標値は、ヘモグロビン濃度で10g/dL (ヘマトクリット値で30%) 前後。②ヘモグロビン濃度が13g/dL未満の患者には初回採血1週間前から、ヘモグロビン濃度が13～14g/dLの患者には初回採血後より、1回24000I.U.を最終採血まで週1回皮下注。初回採血は、800mL貯血の場合は手術2週間前、1200mL貯血の場合は手術3週間前を目安
エポエチンベータペゴル (遺伝子組換え) <u>ミルセラ注シリンジ 25μg</u> (株) (株) Mircera (中外) 25μg0.3mL/筒 【薬価】 4,462.00 円 / 筒 <u>ミルセラ注シリンジ 100μg</u> (株) (株) Mircera (中外) 100μg0.3mL/筒 【薬価】 12,438.00 円 / 筒 <u>ミルセラ注シリンジ 150μg</u> (株) (株) Mircera (中外) 150μg0.3mL/筒 【薬価】 16,754.00 円 / 筒 <u>ミルセラ注シリンジ 250μg</u> (株) (株) Mircera (中外) 250μg0.3mL/筒 【薬価】 25,413.00 円 / 筒	【効】 腎性貧血 【用】 (注) <血液透析患者> (1) 初回用量：1回50μgを2週に1回静注。(2) エリスロポエチン (エポエチンアルファ (遺伝子組換え), エポエチン ベータ (遺伝子組換え) 等) 製剤からの切替え初回用量：1回100μg又は150μgを4週に1回静注。(3) 維持用量：貧血改善効果が得られたら、1回25～250μgを4週に1回静注。いずれの場合も1回250μgまで <腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病患者> (1) 初回用量：1回25μgを2週に1回皮下又は静注。(2) エリスロポエチン (エポエチンアルファ (遺伝子組換え), エポエチン ベータ (遺伝子組換え) 等) 製剤からの切替え初回用量：1回100μg又は150μgを4週に1回皮下又は静注。(3) 維持用量：貧血改善効果が得られたら、1回25～250μgを4週に1回皮下又は静注。いずれの場合も1回250μgまで
エボカルセト <u>オルケディア錠 1mg</u> (株) Orkedia (協和キリン) 1mg/T 【薬価】 271.90 円 / T	【効】 ①維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症。②次記疾患における高カルシウム血症：副甲状腺癌、副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症 【用】 (内) ①1回1mgを開始用量とし、1日1回。患者の状態に応じて開始用量として1日1回2mg可能。以後は、患者の副甲状腺ホルモン (PTH) 及び血清カルシウム濃度の十分な観察のもと、1日1回1～8mgの間で適宜用量を調整し、効果不十分な場合には適宜用量を調整し、1日1回12mgまで。②1回2mgを開始用量とし、1日1回。患者の血清カルシウム濃度に応じて開始用量として1回2mgを1日2回可能。以後は、患者の血清カルシウム濃度により投与量及び投与回数を適宜増減するが、投与量は1回6mgまで、投与回数は1日4回まで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エルカトニン <u>エルシトニン注 20S ディスبو</u> ㊞ Elcitonin (旭化成) 20 エルカトニン単位 1mL/筒 【薬価】 717.00 円 / 筒	【効】 骨粗鬆症における疼痛 【用】 (注) ① 1回 20 エルカトニン単位を週 1 回筋注
エルカトニン <u>エルシトニン注 40 単位</u> ㊞ Elcitonin (旭化成) 40 エルカトニン単位 1mL/A 【薬価】 426.00 円 / A	【効】 ①高カルシウム血症. ②骨ページェット病 【用】 (注) ① 1回 40 エルカトニン単位を 1日 2 回朝晩に筋注又は点滴静注. 点滴静注においては希釈後速やかに使用し, 1~2 時間かけて注入. ② 1回 40 エルカトニン単位を 1日 1 回筋注
エルトロンボパグオラミン <u>レボレード錠 12.5mg (院外)</u> ㊞ Revolade (ノバルティス) 12.5mg/T 【薬価】 2,211.40 円 / T	【効】 ①慢性特発性血小板減少性紫斑病. ②再生不良性貧血 【用】 (内) ① 初回投与量 12.5mg を 1日 1 回, 食事の前後 2 時間を避けて空腹時に, 1日 50mg まで. ②抗胸腺細胞免疫グロブリンで未治療の場合: 抗胸腺細胞免疫グロブリンとの併用において 75mg を 1日 1 回, 食事の前後 2 時間を避けて空腹時に, 既存治療で効果不十分な場合: 初回投与量 25mg を 1日 1 回, 食事の前後 2 時間を避けて空腹時に, 1日 100mg まで
オザグレルナトリウム <u>オザグレル Na 点滴静注液 80mg 「ケミファ」</u> Ozagrel sodium (日本ケミファ) 80mg 4mL/A 【薬価】 655.00 円 / A	【効】 ①クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善. ②脳血栓症 (急性期) に伴う運動障害の改善 【用】 (注) ① 1 日量 80mg を 適当量の電解質液又は糖液で希釈し, 24 時間かけて持続静注. クモ膜下出血術後早期に開始し, 2 週間持続投与することが望ましい. ② 1 回量 80mg を 適当量の電解質液又は糖液で希釈し, 2 時間かけて 1 日朝夕 2 回の持続静注を約 2 週間行う
ガベキサートメシル酸塩 <u>ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg 「タカタ」</u> ㊞ Gabexate mesilate (高田) 100mg/V 【薬価】 179.00 円 / 瓶	【効】 ①蛋白分解酵素 (トリプシン, カリクレイン, プラスミン等) 逸脱を伴う次記諸疾患: 急性膵炎, 慢性再発性膵炎の急性増悪期, 術後の急性膵炎. ②汎発性血管内血液凝固症 【用】 (注) ① 1 回 100mg を 5% ブドウ糖注射液又はリンゲル液を用いて溶かし, 全量 500mL とするか, もしくはあらかじめ注射用水 5mL を用いて溶かし, この溶液を 5% ブドウ糖注射液又はリンゲル液 500mL に混和して, 8mL/分以下で点滴静注. 初期投与量は 1 日量 100~300mg (溶解液 500~1500mL) とし, 以後は症状の消退に応じ減量するが, 症状によっては同日中に更に 100~300mg (溶解液 500~1500mL) を追加して, 点滴静注できる. ② 1 日量 20~39mg/kg の範囲内で 24 時間かけて持続静注
ガベキサートメシル酸塩 <u>ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg 「タカタ」</u> ㊞ Gabexate mesilate (高田) 500mg/V 【薬価】 486.00 円 / 瓶 【先発品】 注射用エフオーワイ 500	【効】 汎発性血管内血液凝固症 【用】 (注) 1 日量 20~39mg/kg の範囲内で 24 時間かけて持続静注
カモスタットメシル酸塩 <u>フォイパン錠 100mg (院外)</u> Foipan (小野) 100mg/T 【薬価】 11.30 円 / T <u>カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」</u> Camostat mesilate (日医工) 100mg/T 【薬価】 6.70 円 / T 【先発品】 フォイパン錠 100mg	【効】 ①慢性膵炎における急性症状の緩解. ②術後逆流性食道炎 【用】 (内) ① 1 日量 600mg を 3 回に分割. ② 1 日量 300mg を 3 回に分割し食後

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グセルマブ（遺伝子組換え） <u>トレムフィア皮下注 100mgシリンジ</u> (製)生 Tremfya (大鵬) 100mg/筒 【薬価】 325,040.00 円/筒	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患：尋常性乾癬，乾癬性関節炎，膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症，掌蹠膿疱症 【用】 (注) 1回 100mgを初回，4週後，以降8週間隔で皮下投与
ゴリムマブ（遺伝子組換え） <u>シンボニー皮下注 50mgオートインジェクター</u> (製)生 Simponi (田辺三菱) 50mg0.5mL/キット 【薬価】 106,324.00 円/キット	【効】 ①既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む），②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） 【用】 (注) ①メトトレキサートを併用する場合：50mgを4週に1回，皮下注，状態に応じて1回 100mgを使用可．メトトレキサートを併用しない場合：100mgを4週に1回，皮下注．②初回投与時に 200mg，初回投与2週後に 100mgを皮下注．初回投与6週目以降は 100mgを4週に1回，皮下注
コンドリアーゼ <u>ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位</u> Hernicore (科研) 1.25 単位1瓶 【薬価】 83,189.00 円/瓶	【効】 保存療法で十分な改善が得られない後縦靭帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア 【用】 (注) 1.25 単位を症状の原因である高位の椎間板内に単回投与
シクロスポリン <u>ネオオラル 10mgカプセル（院外）</u> (製)丸 Neoral (ノバルティス) 10mg/cap 【薬価】 42.20 円/cap <u>ネオオラル 25mgカプセル</u> (製)丸 Neoral (ノバルティス) 25mg/cap 【薬価】 96.30 円/cap <u>ネオオラル 50mgカプセル（院外）</u> (製)丸 Neoral (ノバルティス) 50mg/cap 【薬価】 159.20 円/cap	【効】 次記の臓器移植における拒絶反応の抑制：①腎移植，②肝移植，③心移植・肺移植・脾移植，④小腸移植，⑤骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制，⑥ベーチェット病(眼症状のある場合)，及びその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分であり，視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る)，⑦尋常性乾癬（皮疹が全身の30%以上に及ぶものあるいは難治性の場合），膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症，関節症性乾癬，⑧再生不良性貧血，赤芽球癆，⑨ネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイドに抵抗性を示す場合），⑩全身型重症筋無力症（胸腺摘出後の治療において，ステロイド剤の投与が効果不十分，又は副作用により困難な場合），⑪アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者），⑫細胞移植に伴う免疫反応の抑制 【用】 (内) ①移植1日前から1日量9～12mg/kgを1日2回に分割し，以後1日2mg/kgずつ減量，維持量は1日量4～6mg/kgを標準．②移植1日前から1日量14～16mg/kgを1日2回に分割．以後徐々に減量し，維持量は1日量5～10mg/kgを標準．③移植1日前から1日量10～15mg/kgを1日2回に分割．以後徐々に減量し，維持量は1日量2～6mg/kgを標準．④1日量14～16mg/kgを1日2回に分割．以後徐々に減量し，維持量は1日量5～10mg/kgを標準．移植1日前からシクロスポリン注射剤で投与を開始し，内服可能となった後はできるだけ速やかに経口投与に切り換える．⑤移植1日前から1日量6～12mg/kgを1日2回に分割し，3～6か月間継続し，その後徐々に減量し中止．⑥1日量5mg/kgを1日2回に分割開始し，以後1か月毎に1日1～2mg/kgずつ減量又は増量．維持量は1日量3～5mg/kgを標準．⑦1日量5mg/kgを2回に分割．効果がみられた場合は1か月毎に1日1mg/kgずつ減量し，維持量は1日量3mg/kgを標準．⑧1日量6mg/kgを1日2回に分割．⑨次記の用量を1日2回に分割．1) 頻回再発型の症例：1日量1.5mg/kg．小児の場合には1日量2.5mg/kg．2) ステロイドに抵抗性を示す症例：1日量3mg/kg．小児の場合には1日量5mg/kg．⑩1日量5mg/kgを1日2回に分割．効果がみられた場合は徐々に減量し，維持量は3mg/kgを標準．⑪1日量3mg/kgを1日2回に分割．1日量5mg/kgまで．⑫再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用
シベレスタットナトリウム水和物 <u>注射用エラスポール 100</u> Elaspol (小野) 100mg/V 【薬価】 3,333.00 円/瓶	【効】 全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害の改善 【用】 (注) 本剤を生食液に溶解した後，1日量4.8mg/kgを250～500mLの輸液で希釈し，24時間（0.2mg/kg/時）かけて持続静注．投与期間は14日以内

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>アルツディスポ関節注 25mg</u> Artz (科研) 25mg2.5mL/本 【薬価】 733.00円/筒	【効】 ①変形性膝関節症, 肩関節周囲炎. ②関節リウマチにおける膝関節痛(次記(1)～(4)の基準を全て満たす場合に限る)(1)抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節痛のある場合. (2)全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合. (3)膝関節の症状が軽症から中等症の場合. (4)膝関節のLarsen X線分類がGradeIからGradeIIIの場合 【用】(注) ①1回25mgを1週間ごとに連続5回膝関節腔内又は肩関節(肩関節腔, 肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭腱鞘)内に投与. ②1回25mgを1週間毎に連続5回膝関節腔内に投与. 関節内に投与するので, 厳重な無菌的操作のもとに行うこと
精製ヒアルロン酸ナトリウム <u>スベニールディスポ関節注 25mg</u> 【経過措置】 Suvenyl (中外) 25mg2.5mL/本 【薬価】 718.00円/筒	【効】 ①変形性膝関節症. ②肩関節周囲炎. ③関節リウマチにおける膝関節痛(次記1)～4)の基準を全て満たす場合に限る). 1)抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節痛のある場合. 2)全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合. 3)膝関節の症状が軽症から中等症の場合. 4)膝関節のLarsen X線分類がGradeIからGradeIIIの場合 【用】(注) ①1回25mgを1週間毎に連続5回膝関節腔内に投与. その後, 症状の維持を目的とする場合は, 2～4週間隔で. ②1回25mgを1週間毎に連続5回肩関節(肩関節腔, 肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭腱鞘)内に投与. ③1回25mgを1週間毎に連続5回膝関節腔内に投与
セクキヌマブ(遺伝子組換え) <u>コセンティクス皮下注 75mgシリンジ</u> (商) (生) Cosentyx (マルホ) 75mg/筒 【薬価】 40,144.00円/筒 <u>コセンティクス皮下注 150mgペン</u> (商) (生) Cosentyx (マルホ) 150mg 【薬価】 71,469.00円/キット	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患:①尋常性乾癬. ②関節症性乾癬. ③膿疱性乾癬. ④強直性脊椎炎. ⑤X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 【用】(注) ①②③1回300mgを, 初回, 1週後, 2週後, 3週後, 4週後に皮下投与し, 以降4週間の間隔で皮下投与. また, 体重により1回150mgを投与可. 6歳以上の小児には, 体重50kg未満には1回75mg, 体重50kg以上には1回150mg, 初回, 1週後, 2週後, 3週後, 4週後に皮下投与, 以降, 4週間の間隔で皮下投与. 体重50kg以上では, 状態に応じて1回300mgを投与できる. ④⑤1回150mgを, 初回, 1週後, 2週後, 3週後, 4週後に皮下投与し, 以降, 4週間の間隔で皮下投与
セルトリズマブベゴル(遺伝子組換え) <u>シムジア皮下注 200mgオートクリックス</u> (商) Cimzia (アステラス) 200mg/キット 【薬価】 55,625.00円/キット	【効】 ①関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む). ②既存治療で効果不十分な次記疾患:尋常性乾癬, 関節症性乾癬, 膿疱性乾癬, 乾癬性紅皮症 【用】(注) ①1回400mgを初回, 2週後, 4週後に皮下注, 以後1回200mgを2週間の間隔で皮下注. 症状安定後には, 1回400mgを4週間の間隔で皮下注可. ②1回400mgを2週間の間隔で皮下注. 症状安定後には, 1回200mgを2週間の間隔, 又は1回400mgを4週間の間隔で皮下注可
ゴレドロン酸水和物 (後) <u>ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」</u> (商) Zoledronic acid (サンド) 4mg/5mL 【薬価】 5,434.00円/瓶 【先発品】 ゴメタ点滴静注 4mg/5mL	【効】 ①悪性腫瘍による高カルシウム血症. ②多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 【用】(注) ①4mgを生食液又はブドウ糖注射液(5%)100mLに希釈し, 15分以上かけて点滴静注. 再投与が必要な場合, 初回投与による反応を確認するために少なくとも1週間の投与間隔をおく. ②4mgを生食液又はブドウ糖注射液(5%)100mLに希釈し, 15分以上かけて3～4週間間隔で点滴静注
ゴレドロン酸水和物 <u>リクラスト点滴静注 5mg</u> (商) Reclast (旭化成) 5mg/100mL/瓶 【薬価】 33,986.00円/瓶	【効】 骨粗鬆症 【用】(注) 1年に1回5mgを15分以上かけて点滴静注

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
タクロリムス水和物 <u>プログラフカプセル1mg</u> ㊞ Prograf (アステラス) 1mg/cap 【薬価】 390.00円/cap	【効】 次の臓器移植における拒絶反応の抑制：①腎移植. ②肝移植. ③心移植. ④肺移植. ⑤膵移植. ⑥小腸移植. ⑦骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制. ⑧重症筋無力症. ⑨関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）. ⑩ループス腎炎（ステロイド剤投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合）. ⑪難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等症～重症に限る）. ⑫多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎 【用】 (内) ①初期には1回0.15mg/kg1日2回、以後漸減、維持量1回0.06mg/kg1日2回. ②初期1回0.15mg/kg1日2回、以後漸減、維持量1日0.10mg/kg. ③初期1回0.03～0.15mg/kg1日2回. 拒絶反応発現後に投与開始する場合、1回0.075～0.15mg/kg1日2回. 以後漸減、有効最小量で維持. ④初期1回0.05～0.15mg/kg1日2回. 以後漸減、有効最小量で維持. ⑤⑥初期1回0.15mg/kg1日2回. 以後漸減、有効最小量で維持. ⑦移植1日前より1回0.06mg/kg1日2回、移植初期には1回0.06mg/kg1日2回、以後漸減. 移植片対宿主病発現後に投与開始する場合には1回0.15mg/kg1日2回. ⑧1日1回3mg夕食後. ⑨1回3mg、1日1回夕食後. 高齢者は1.5mg1日1回夕食後から開始し3mgまで. ⑩1日1回3mg夕食後. ⑪1回0.025mg/kg、1日2回朝食後. 以後2週間、目標血中トラフ値を10～15ng/mLとして調節. 2週以降は、目標トラフ値を5～10ng/mLとして調節. ⑫初期には1回0.0375mg/kgを1日2回朝食後及び夕食後. 以後、目標血中トラフ濃度を5～10ng/mLとし、血中トラフ濃度をモニタリングしながら投与量を調節
ダプロデュスタット <u>ダーブロック錠2mg</u> ㊞ Duvroq (協和キリン) 2mg/T 【薬価】 165.10円/T	【効】 腎性貧血 【用】 (内) 保存期慢性腎臓病患者：赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合、1回2mg又は4mgを開始用量とし、1日1回. 最高用量は1日1回24mgまで. 赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合、1回4mgを開始用量とし、1日1回. 最高用量は1日1回24mgまで. 透析患者：1回4mgを開始用量とし、1日1回. 最高用量は1日1回24mgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）</p> <p>⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 10μg0.5mL/筒 【薬価】867.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液10μg プラシリンジ</p> <p>⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 20μg0.5mL/筒 【薬価】1,523.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液20μg プラシリンジ</p> <p>⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 30μg0.5mL/筒 【薬価】2,201.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液30μg プラシリンジ</p> <p>⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 40μg0.5mL/筒 【薬価】2,651.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液40μg プラシリンジ</p> <p>⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 60μg0.5mL/筒 【薬価】3,860.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液60μg プラシリンジ</p> <p>⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 120μg0.5mL/筒 【薬価】6,969.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液120μg プラシリンジ</p> <p>⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿</p> <p>Darbepoetin alfa（協和キリン） 180μg0.5mL/筒 【薬価】9,309.00円/筒 【先発品】ネスブ注射液180μg プラシリンジ</p>	<p>【効】 腎性貧血</p> <p>【用】 （注） 〈血液透析患者〉初回用量：週1回20μgを静注。小児：週1回0.33μg/kg（最高20μg）を静注。</p> <p>エリスロポエチン〔エポエチン アルファ（遺伝子組換え）、エポエチン ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤からの切替え初回用量：週1回15～60μgを静注。</p> <p>維持用量：貧血改善効果が得られたら、週1回15～60μgを静注。週1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、2週に1回投与に変更し、2週に1回30～120μgを静注可。小児：貧血改善効果が得られたら、週1回5～60μgを静注。週1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、2週に1回投与に変更し、2週に1回10～120μgを静注可。いずれの場合も1回180μgまで。</p> <p>〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病患者〉初回用量：2週に1回30μgを皮下注又は静注。小児：2週に1回0.5μg/kg（最高30μg）を皮下注又は静注。</p> <p>エリスロポエチン〔エポエチン アルファ（遺伝子組換え）、エポエチン ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤からの切替え初回用量：2週に1回30～120μgを皮下注又は静注。小児：2週に1回10～60μgを皮下注又は静注。</p> <p>維持用量：貧血改善効果が得られたら、2週に1回30～120μgを皮下注又は静注。2週に1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、4週に1回投与に変更し、4週に1回60～180μgを皮下注又は静注可。小児：貧血改善効果が得られたら、2週に1回5～120μgを皮下注又は静注。2週に1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、4週に1回投与に変更し、4週に1回10～180μgを皮下注又は静注可。いずれの場合も1回180μgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） <u>ネスプ注射液 120μg プラシリンジ</u> ㊟ Nesp （協和キリン） 120μg0.5mL/筒 【薬価】 10,284.00 円 / 筒	【効】 ①腎性貧血。②骨髄異形成症候群に伴う貧血 【用】 (注) ①〈血液透析患者〉初回用量：週1回 20μg を静注。小児：週1回 0.33 μg/kg（最高 20μg）を静注。 エリスロポエチン〔エポエチン アルファ（遺伝子組換え）、エポエチン ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤からの切替え初回用量：週1回 15～60μg を静注。 維持用量：貧血改善効果が得られたら、週1回 15～60μg を静注。週1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、2週に1回投与に変更し、2週に1回 30～120μg を静注可。小児：貧血改善効果が得られたら、週1回 5～60μg を静注。週1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、2週に1回投与に変更し、2週に1回 10～120μg を静注可。1回 180μg まで。 〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病患者〉初回用量：2週に1回 30μg を皮下注又は静注。小児：2週に1回 0.5μg/kg（最高 30μg）を皮下注又は静注。 エリスロポエチン〔エポエチン アルファ（遺伝子組換え）、エポエチン ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤からの切替え初回用量：2週に1回 30～120μg を皮下注又は静注。小児：2週に1回 10～60μg を皮下注又は静注。 維持用量：貧血改善効果が得られたら、2週に1回 30～120μg を皮下注又は静注。2週に1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、4週に1回投与に変更し、4週に1回 60～180μg を皮下注又は静注可。小児：貧血改善効果が得られたら、2週に1回 5～120μg を皮下注又は静注。2週に1回投与で貧血改善が維持されている場合には、その時点での1回の投与量の2倍量を開始用量として、4週に1回投与に変更し、4週に1回 10～180μg を皮下注又は静注可。1回 180μg まで②週1回 240μg を皮下投与
デノスマブ（遺伝子組換え） <u>ブラリア皮下注 60mg シリンジ</u> ㊟ Pralia （第一三共） 60mg1mL/筒 【薬価】 24,939.00 円 / 筒	【効】 ①骨粗鬆症。②関節リウマチに伴う骨びらんの進行抑制 【用】 (注) ① 60mg を6か月に1回、皮下注。② 60mg を6か月に1回、皮下注。6か月に1回の投与においても、骨びらんの進行が認められる場合には、3か月に1回、皮下注
デノスマブ（遺伝子組換え） <u>ランマーク皮下注 120mg</u> ㊟ Ranmark （第一三共） 120mg1.7mL/V 【薬価】 45,580.00 円 / 瓶	【効】 ①多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変。②骨巨細胞腫 【用】 (注) ① 120mg を4週間に1回、皮下注。② 120mg を第1日、第8日、第15日、第29日、その後は4週間に1回、皮下注
デュークラバシチニブ <u>ソーティクツ錠 6mg</u> ㊟ Sotyktu （ブリストル・マイヤーズ） 6mg/T 【薬価】 2,770.90 円 / T	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患：尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 【用】 (内) 1回 6mg を1日1回
ナファモスタットメシル酸塩 <u>ナファモスタット注射用 10mg [SW]</u> ㊟ Nafamostat （沢井） 10mg/V 【薬価】 299.00 円 / 瓶	【効】 ①膵炎の急性症状（急性膵炎、慢性膵炎の急性増悪、術後の急性膵炎、膵管造影後の急性膵炎、外傷性膵炎）の改善。②汎発性血管内血液凝固症（DIC）。③出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析及びプラズマフェレーシス） 【用】 (注) ① 1回 10mg を5%ブドウ糖注射液 500mL に溶解し、約2時間前後かけて1日1～2回点滴静注。② 1日量を5%ブドウ糖注射液 1,000mL に溶解し、0.06～0.20mg/kg/時を24時間かけて静脈内に持続注入。③体外循環開始に先立ち、20mg を生理食塩液 500mL に溶解した液で血液回路内の洗浄・充填を行い、体外循環開始後は、20～50mg/時を5%ブドウ糖注射液に溶解し、抗凝固剤注入ラインより持続注入

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ナファモスタットメシル酸塩 <u>ナファモスタット注射用 50mg</u> <u>「SW」</u> ㉞ Nafamostat (沢井) 50mg/V 【薬価】 650.00 円 / 瓶	【効】 ①汎発性血管内血液凝固症 (DIC). ②出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止 (血液透析及びプラスマフェレシス) 【用】 (注) ① 1 日量を 5% ブドウ糖注射液 1,000mL に溶解し, 0.06 ~ 0.20mg/kg/時を 24 時間かけて静脈内に持続注入. ②体外循環開始に先立ち, 20mg を生理食塩液 500mL に溶解した液で血液回路内の洗浄・充填を行い, 体外循環開始後は, 20 ~ 50mg/時を 5% ブドウ糖注射液に溶解し, 抗凝固剤注入ラインより持続注入
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 <u>オフェカプセル 100mg</u> ㉞ Ofev (日本ベーリンガー) 100mg/cap 【薬価】 3,982.40 円 / cap <u>オフェカプセル 150mg</u> ㉞ Ofev (日本ベーリンガー) 150mg/cap 【薬価】 5,966.40 円 / cap	【効】 ①特発性肺線維症. ②全身性強皮症に伴う間質性肺疾患. ③進行性線維化を伴う間質性肺疾患 【用】 (内) 1 回 150mg を 1 日 2 回, 朝・夕食後. 患者の状態により 1 回 100mg の 1 日 2 回投与へ減量
バリシチニブ <u>オルミエント錠 2mg</u> ㉞ Olumiant (日本イーライリリー) 2mg/T 【薬価】 2,300.00 円 / T	【効】 ①既存治療で効果不十分な次記疾患: 関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む). ②アトピー性皮膚炎. 注) アトピー性皮膚炎については最適使用推進ガイドライン対象. ③多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎. ④ SARS-CoV-2 による肺炎 (ただし, 酸素吸入を要する患者に限る). ⑤円形脱毛症 (ただし, 脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る) 【用】 (内) ①② <成人> ⑤ 1 回 4mg を 1 日 1 回. 患者の状態に応じて 2mg に減量. ② <小児> ③ 2 歳以上の患者には体重に応じ次記の投与量を 1 日 1 回経口投与. 30kg 以上: 4mg, 患者の状態に応じて 2mg に減量. 30kg 未満: 2mg, 患者の状態に応じて 1mg に減量. ④レムデシビルとの併用において 4mg を 1 日 1 回. 総投与期間は 14 日間まで
ヒドロキシクロロキン硫酸塩 <u>プラケニル錠 200mg (患者限定)</u> ㉞ Plaqueni (旭化成) 200mg/T 【薬価】 402.40 円 / T	【効】 皮膚エリテマトーデス, 全身性エリテマトーデス 【用】 (内) 200mg 又は 400mg を 1 日 1 回食後. 但し, 1 日の投与量はブローカ式桂変法により求められる以下の理想体重に基づく用量とする. 女性患者の理想体重 (kg) = (身長 (cm) - 100) × 0.85, 男性患者の理想体重 (kg) = (身長 (cm) - 100) × 0.9. 理想体重が 31kg 以上 46kg 未満: 1 日 1 回 1 錠 (200mg), 46kg 以上 62kg 未満: 1 日 1 回 1 錠 (200mg) と 1 日 1 回 2 錠 (400mg) を 1 日おきに, 62kg 以上: 1 日 1 回 2 錠 (400mg)
ビメキズマブ (遺伝子組換え) <u>ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター (院外)</u> ㉞ Bimzelx (ユーシービー) 160mg/mL / キット 【薬価】 156,820.00 円 / キット	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患: ①尋常性乾癬, 膿疱性乾癬, 乾癬性紅皮症. ②乾癬性関節炎. ③強直性脊椎炎, X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 【用】 (注) ① 1 回 320mg を初回から 16 週までは 4 週間隔で皮下注, 以降は 8 週間隔で皮下注. 患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で皮下注可. ② 1 回 160mg を 4 週間隔で皮下注. ③ 1 回 160mg を 4 週間隔で皮下注
フィルゴチニブマレイン酸塩 <u>ジセレカ錠 200mg</u> ㉞ Jyseleca (エーザイ) 200mg/T 【薬価】 4,159.60 円 / T	【効】 ①既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む). ②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る) 【用】 (内) ① 200mg を 1 日 1 回. 患者の状態に応じて 100mg を 1 日 1 回投与できる. ② 200mg を 1 日 1 回. 維持療法では, 患者の状態に応じて 100mg を 1 日 1 回投与できる
フィンゴリモド塩酸塩 <u>イムセラカプセル 0.5mg</u> ㉞ Imusera (田辺三菱) 0.5mg/cap 【薬価】 7,778.20 円 / cap	【効】 多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制 【用】 (内) 1 日 1 回 0.5mg

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロダルマブ（遺伝子組換え） <u>ルミセフ皮下注 210mg シリンジ</u> (Ⓢ) Lumicef (協和キリン) 210mg1mL/筒 【薬価】 74,513.00 円 / 筒	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患：尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、強直性脊椎炎、X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎、掌蹠膿疱症 【用】 (注) 1回 210mgを、初回、1週後、2週後に皮下投与し、以降2週間の間隔で皮下投与
ミコフェノール酸モフェチル <u>ミコフェノール酸モフェチルカプセル 250mg 「VTRS」</u> (Ⓢ) Mycophenolate mofetil (ヴィアトリス) 250mg/cap 【薬価】 137.00 円 / cap	【効】 ①腎移植後の難治性拒絶反応の治療（既存の治療薬が無効又は副作用等のため投与できず、難治性拒絶反応と診断された場合）、次記の臓器移植における拒絶反応の抑制：②腎移植、③心移植、肝移植、肺移植、脾移植、④ループス腎炎、⑤造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制 【用】 (内) ① 1回 1,500mgを1日2回12時間毎に食後、②成人：1回 1,000mgを1日2回12時間毎に食後、1日 3,000mgまで、小児：1回 300～600mg/m ² を1日2回12時間毎に食後、1日 2,000mgまで、③ 1回 500～1,500mgを1日2回12時間毎に食後、本剤の耐薬量及び有効量は患者によって異なるので、最適の治療効果を得るために用量の注意深い増減が必要、④成人：1回 250～1,000mgを1日2回12時間毎に食後、1日 3,000mgまで、小児：1回 150～600mg/m ² を1日2回12時間毎に食後、1日 2,000mgまで、⑤成人：1回 250～1,500mgを1日2回12時間毎に食後、1日 3,000mgを上限とし、1日3回食後投与可、小児：1回 300～600mg/m ² を1日2回12時間毎に食後、1日 2,000mgまで
ミゾリピン <u>ブレディニン錠 50</u> Bredinin (旭化成) 50mg/T 【薬価】 99.10 円 / T	【効】 ①腎移植における拒否反応の抑制、②原発性糸球体疾患を原因とするネフローゼ症候群（副腎皮質ホルモン剤のみでは治療困難な場合に限る、また、頻回再発型のネフローゼ症候群を除く）、③ループス腎炎（持続性蛋白尿、ネフローゼ症候群又は腎機能低下が認められ、副腎皮質ホルモン剤のみでは治療困難な場合に限る）、④関節リウマチ（過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤更に他の抗リウマチ薬の少なくとも1剤により十分な効果の得られない場合に限る） 【用】 (内) ①初期量として2～3mg/kg相当量、維持量として1～3mg/kg相当量を1日量として、1日1～3回に分割、②③ 1回 50mgを1日3回、本剤の使用以前に副腎皮質ホルモン剤が維持投与されている場合、その維持用量に本剤を上乗せして用いる、症状により副腎皮質ホルモン剤の用量は適宜減量、④ 1回 50mgを1日3回
ミノドロン酸水和物 <u>ボノテオ錠 50mg (院外)</u> (Ⓢ) Bonoteo (アステラス) 50mg/T 【薬価】 1,557.70 円 / T	【効】 骨粗鬆症 【用】 (内) 50mgを4週に1回、起床時に十分量（約180mL）の水（又はぬるま湯）とともに投与、服用後少なくとも30分は横にならず、飲食（水を除く）並びに他の薬剤の経口摂取も避けること
メトトレキサート <u>メトジェクト皮下注 10mg シリンジ 0.20mL</u> (Ⓢ) Metoject (エーザイ) 10mg0.2mL/筒 【薬価】 2,124.00 円 / 筒	【効】 関節リウマチ 【用】 (注) 7.5mgを週に1回皮下注、患者の状態、忍容性等に応じて適宜増量、15mgを超えない
メトトレキサート <u>リウマトレックスカプセル 2mg</u> (Ⓢ) Rheumatrex (ファイザー) 2mg/cap 【薬価】 132.40 円 / cap	【効】 ①関節リウマチ、②関節症状を伴う若年性特発性関節炎、③局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、④乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 【用】 (内) ①③④ 1週間単位の投与量を6mgとし、1回又は2～3回に分割、分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与、1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休業、これを1週間ごとに繰り返す、1週間単位の投与量として16mgまで、② 1週間単位の投与量を4～10mg/m ² とし、1回又は2～3回に分割、分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与、1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休業する、これを1週間ごとに繰り返す

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ラクツロース モニラック・シロップ 65% (院外) Monilac (中外) 65%600mL/本 【薬価】6.50円/mL	【効】①高アンモニア血症に伴う次記症候の改善：精神神経障害，手指振戦，脳波異常，②産婦人科術後の排ガス・排便の促進，③小児における便秘の改善 【用】(内) ①1日量30～60mLを3回に分割，②1日量30～60mLを朝夕2回に分割，③1日0.5～2mL/kgを3回に分割
ラクツロース 後ラクツロースシロップ 65%「タカタ」 Lactulose (高田) 65%500mL/本 【薬価】4.90円/mL 【先発品】モニラック・シロップ 65%	【効】①高アンモニア血症に伴う次記症候の改善：精神神経障害，手指振戦，脳波異常，②産婦人科術後の排ガス・排便の促進，③小児における便秘の改善 【用】(内) ①1日量19.5～39g(本剤30～60mL)を3回に分割，②1日量19.5～39g(本剤30～60mL)を朝夕2回に分割，③1日0.325～1.3g/kg(本剤0.5～2mL/kg)を3回に分割
ラクツロース 後ラグノスNF 経口ゼリー分包 12g (院内) Lagnos (三和化学) 12g/包 【薬価】49.40円/包	【効】①慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)，②高アンモニア血症に伴う次記症候の改善：精神神経障害，手指振戦，脳波異常，③産婦人科術後の排ガス・排便の促進 【用】(内) ①24g(本剤2包)を1日2回，1日最高用量は72g(本剤6包)まで，②12～24g(本剤1～2包)を1日3回(1日量として本剤3～6包)，③12～36g(本剤1～3包)を1日2回(1日量として本剤3～6包)
ラロキシフェン塩酸塩 エビスタ錠 60mg Evista (日本イーライリリー) 60mg/T 【薬価】58.10円/T	【効】閉経後骨粗鬆症 【用】(内) 1日1回60mg
リサンキズマブ(遺伝子組換え) スキリジ皮下注 75mg シリンジ 0.83mL Ⓢ Skyrizi (アッヴィ) 75mg0.83mL/筒 【薬価】243,807.00円/筒	【効】既存治療で効果不十分な次記疾患：①尋常性乾癬，乾癬性関節炎，膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症，②掌蹠膿疱症 【用】(注) ①1回150mgを初回，4週後，以降12週間隔で皮下注，患者の状態に応じて1回75mgを投与することができる，②1回150mgを初回，4週後，以降12週間隔で皮下注
リセドロン酸ナトリウム水和物 アクトネル錠 17.5mg Ⓢ Actonel (エーザイ) 17.5mg/T 【薬価】258.10円/T	【効】①骨粗鬆症，②骨ページェット病 【用】(内) ①17.5mgを1週間に1回，起床時に十分量(約180mL)の水とともに，服用後少なくとも30分は横にならず，水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避ける，②17.5mgを1日1回，起床時に十分量(約180mL)の水とともに8週間連日経口投与，服用後少なくとも30分は横にならず，水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避ける
リセドロン酸ナトリウム水和物 アクトネル錠 75mg Ⓢ Actonel (エーザイ) 75mg/T 【薬価】1,338.80円/T	【効】骨粗鬆症 【用】(内) 75mgを月1回，起床時に十分量(約180mL)の水とともに，服用後少なくとも30分は横にならず，水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避ける
レフルノミド アラバ錠 10mg Ⓢ Arava (サノフィ) 10mg/T 【薬価】96.30円/T	【効】関節リウマチ 【用】(内) 1日1回100mg錠1錠の3日間投与から開始，維持量として1日1回20mg，1日1回20mgから開始することも可，維持量は，症状，体重により1日1回10mgに減量

39. その他の代謝性医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボカルニチン塩化物 <u>②レボカルニチン FF 錠 250mg</u> <u>「トーワ」</u> Levocarnitine FF (東和薬品) 250mg/T 【薬価】 88.70 円/T 【先発品】 エルカルチン FF 錠 250mg	【効】 カルニチン欠乏症 【用】 (内) 1日 1.5～3g を3回に分割. 小児: 1日 25～100mg/kgを3回に分割
ロミプロスチム (遺伝子組換え) <u>ロミプレート皮下注 250μg 調製</u> <u>用</u> Romiplate (協和キリン) 250μg/V 【薬価】 68,259.00 円 / 瓶	【効】 ①慢性特発性血小板減少性紫斑病. ②再生不良性貧血 【用】 (注) ①初回投与量 1μg/kgを皮下注. 週1回皮下注. 週1回 10μg/kgまで. ②初回投与量 10μg/kgを皮下注. 週1回皮下注. 週1回 20μg/kgまで
ロモンズマブ (遺伝子組換え) <u>イベニティ皮下注 105mgシリンジ</u> <u>Ⓢ</u> Evenity (アステラス) 105mg1.17mL/筒 【薬価】 25,061.00 円 / 筒	【効】 骨折の危険性の高い骨粗鬆症 【用】 (注) 210mgを1か月に1回, 12か月皮下注

4. 組織細胞機能用医薬品

42. 腫瘍用薬

421. アルキル化剤

4211. クロロエチルアミン系製剤



商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
シクロホスファミド水和物 エンドキサン錠 50mg ㊉ Endoxan (塩野義) 50mg/T 【薬価】 23.20 円/T	【効】 ①次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解:多発性骨髄腫, 悪性リンパ腫(ホジキン病, リンパ肉腫, 細網肉腫), 乳癌, 急性白血病, 真性多血症, 肺癌, 神経腫瘍(神経芽腫, 網膜芽腫), 骨腫瘍. 但し, 次記の疾患については, 他の抗腫瘍剤と併用することが必要である. 慢性リンパ性白血病, 慢性骨髄性白血病, 咽頭癌, 胃癌, 膝癌, 肝癌, 結腸癌, 子宮頸癌, 子宮体癌, 卵巣癌, 睾丸腫瘍, 絨毛性疾患(絨毛癌, 破壊胎状奇胎, 胎状奇胎), 横紋筋肉腫, 悪性黒色腫. ②細胞移植に伴う免疫反応の抑制. ③全身性ALアミロイドーシス. ④治療抵抗性の次記リウマチ性疾患: 全身性エリテマトーデス, 全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症, 結節性多発動脈炎, 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症, 高安動脈炎等), 多発性筋炎/皮膚筋炎, 強皮症, 混合性結合組織病, 及び血管炎を伴う難治性リウマチ性疾患. ⑤ネフローゼ症候群(副腎皮質ホルモン剤による適切な治療を行っても十分な効果がみられない場合に限る.) 【用】(内) ①(1) 単独で使用する場合: 1日 100 ~ 200mg. (2) 他の抗腫瘍剤と併用する場合: 単独で使用する場合に準じ適宜減量. ②再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用. ③他の薬剤との併用において, 週1回 300mg/m ² (体表面積). 上限は, 1回量として 500mg. ④ 1日 50 ~ 100mg. ⑤ 1日 50 ~ 100mgを 8 ~ 12 週間. 小児: 1日 2 ~ 3mg/kgを 8 ~ 12 週間. 1日 100mgまで. 総投与量は 300mg/kgまで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
シクロホスファミド水和物 注射用エンドキサン 100mg (株) Endoxan (塩野義) 100mg/V 【薬価】 304.00 円 / 瓶 注射用エンドキサン 500mg (株) Endoxan (塩野義) 500mg/V 【薬価】 1,154.00 円 / 瓶	<p>【効】 ①次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解：多発性骨髄腫，悪性リンパ腫，肺癌，乳癌，急性白血病，真性多血症，子宮頸癌，子宮体癌，卵巣癌，神経腫瘍（神経芽腫，網膜芽腫），骨腫瘍。但し，次記の疾患については，他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である。慢性リンパ性白血病，慢性骨髄性白血病，咽頭癌，胃癌，肝癌，肝癌，結腸癌，睾丸腫瘍，絨毛性疾患（絨毛癌，破壊胎状奇胎，胎状奇胎），横紋筋肉腫，悪性黒色腫。②次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術可能例における術前，あるいは術後化学療法）。③褐色細胞腫。④次記疾患における造血幹細胞移植の前治療：急性白血病，慢性骨髄性白血病，骨髄異形成症候群，重症再生不良性貧血，悪性リンパ腫，遺伝性疾患（免疫不全，先天性代謝障害及び先天性血液疾患：Fanconi 貧血，Wiskott-Aldrich 症候群，Hunter 病等）。⑤造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制。⑥腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置。⑦全身性 AL アミロイドーシス。⑧治療抵抗性の次記リウマチ性疾患：全身性エリテマトーデス，全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，高安動脈炎等），多発性筋炎 / 皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組織病，及び血管炎を伴う難治性リウマチ性疾患</p> <p>【用】 (注) ① (1) 単独で使用する場合は：1日1回100mgを連日静注し，患者が耐えられる場合は1日量を200mgに増量。総量3000～8000mgを投与するが，効果が認められたときは，できる限り長期間持続する。白血球数が減少してきた場合は，2～3日おきに投与し，正常の1/2以下に減少したときは，一時休業し，回復を待って再び継続投与。間欠的には，300～500mgを週1～2回静注。必要に応じて筋肉内，胸腔内，腹腔内又は腫瘍内に注射又は注入。また，病巣部を灌流する主幹動脈内に1日量200～1000mgを急速に，あるいは，持続的に点滴注入するか，体外循環を利用して1回1000～2000mgを局所灌流により投与してもよい。(2) 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は：単独で使用する場合に準じ，適宜減量する。悪性リンパ腫に用いる場合，シクロホスファミド（無水物換算）として1日1回750mg/m²を間欠的に静脈内投与する。② (1) ドキソルビン塩酸塩との併用において，1日1回600mg/m²を静注後，13日間又は20日間休業。これを1クールとし，4クール繰り返す。(2) エピルビン塩酸塩との併用において，1日1回600mg/m²を静注後，20日間休業。これを1クールとし，4～6クール繰り返す。(3) エピルビン塩酸塩，フルオロウラシルとの併用において，1日1回500mg/m²を静注後，20日間休業。これを1クールとし，4～6クール繰り返す。③ピンクリスチン硫酸塩，ダカルバジンとの併用において，1日1回750mg/m²を静注後，少なくとも20日間休業。これを1クールとし，繰り返す。④ (1) 急性白血病，慢性骨髄性白血病，骨髄異形成症候群の場合：1日1回60mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し，連日2日間投与。(2) 重症再生不良性貧血の場合：1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し，連日4日間投与。(3) 悪性リンパ腫の場合：1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し，連日4日間投与。(4) 遺伝性疾患（免疫不全，先天性代謝障害及び先天性血液疾患：Wiskott-Aldrich 症候群，Hunter 病等）の場合：1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し，連日4日間又は1日1回60mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し，連日2日間投与。Fanconi 貧血に投与する場合には，細胞の脆弱性により，移植関連毒性の程度が高くなるとの報告があるので，総投与量40mg/kg（5～10mg/kgを4日間）まで。⑤1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注，移植後3日目及び4日目，又は移植後3日目及び5日目の2日間投与。患者の状態により適宜減量。⑥再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用。⑦他の薬剤との併用において，週1回300mg/m²（体表面積）を静注。投与量の上限は，1回量として500mg。⑧1日1回500～1000mg/m²を静注。投与間隔を4週間とする。小児：1回500mg/m²静注。投与間隔を4週間とする</p>

4219. その他のアルキル化剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エストラムスチンリン酸エステル ナトリウム水和物 <u>エストラサイトカプセル 156.7mg</u> (院外) ㊉ Estracyt (日本新薬) 156.7mg (エストラムスチンリン 酸エステルとして 140mg) /cap 【薬価】 203.80 円 /cap	【効】 前立腺癌 【用】 (内) 1回 313.4mg (本剤2カプセル) を1日2回
ダカルバジン <u>ダカルバジン注用 100</u> ㊉ Dacarbazine (サンド) 100mg/V 【薬価】 2,723.00 円 / 瓶	【効】 ①悪性黒色腫. ②ホジキン病 (ホジキンリンパ腫). ③褐色細胞腫 【用】 (注) ① 1日量 100～200mgを5日間連日静注し, 以後約4週間休薬. これを1コースとし繰り返し投与. ②成人・小児ともに, 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1日1回 375mg/m ² を静注し, 13日間休薬. これを2回繰り返すことを1コースとし, 繰り返し投与. ③シクロホスファミド水和物とビンクリスチン硫酸塩との併用において, 1日1回 600mg/m ² を2日間連日静注, 少なくとも19日間休薬. これを1コースとし, 繰り返し投与
ベンダムスチン塩酸塩 <u>トレアキシシン点滴静注液 100mg</u> <u>/4mL (院内)</u> ㊉ Treakisym (シンバイオ) 100mg4mL1瓶 【薬価】 74,988.00 円 / 瓶	【効】 ①低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫. ②マントル細胞リンパ腫. ③再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫. ④慢性リンパ性白血病. ⑤腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置 【用】 (注) ①〈抗 CD20 抗体併用の場合〉 90mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 26日間休薬. これを1サイクルとして, 投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. 〈単独投与の場合 (再発又は難治性の場合に限る)〉 120mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 19日間休薬. これを1サイクルとして, 投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. ②〈未治療の場合〉リツキシマブ (遺伝子組換え) との併用において, 90mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 26日間休薬. これを1サイクルとして, 投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. 〈再発又は難治性の場合〉 120mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 19日間休薬. これを1サイクルとして, 投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. ③〈リツキシマブ (遺伝子組換え) 併用の場合〉 120mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 19日間休薬. これを1サイクルとして, 最大6サイクル投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. 〈リツキシマブ (遺伝子組換え) 及びボラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) 併用の場合〉 90mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 19日間休薬. これを1サイクルとして, 最大6サイクル投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. ④ 100mg/m ² (体表面積) を1日1回 10分又は1時間かけて点滴静注. 投与を2日間連日行い, 26日間休薬. これを1サイクルとして, 投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. ⑤再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ベンダムスチン塩酸塩 トレアキシン点滴静注用 25mg  Treakisym (エーザイ) 25mg/T 【薬価】 22,222.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫. ②再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫. ③慢性リンパ性白血病. ④腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置</p> <p>【用】(注) ① 1. 低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫:抗 CD20 抗体併用の場合: 90mg/m²を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注. 投与を 2 日間連日行い, 26 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 繰り返す. 単独投与の場合 (再発又は難治性の場合に限る): 120mg/m²を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注. 投与を 2 日間連日行い, 19 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 繰り返す. 2. マントル細胞リンパ腫: 未治療: リツキシマブ (遺伝子組換え) との併用において, 90mg/m²を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注. 投与を 2 日間連日行い, 26 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 繰り返す. 再発又は難治性:120mg/m²を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注. 投与を 2 日間連日行い, 19 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 繰り返す. ②リツキシマブ (遺伝子組換え) 併用: 120mg/m² (体表面積) を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注する. 投与を 2 日間連日行い, 19 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 最大 6 サイクル投与を繰り返す. リツキシマブ (遺伝子組換え) 及びボラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) 併用: 90mg/m² (体表面積) を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注する. 投与を 2 日間連日行い, 19 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 最大 6 サイクル投与を繰り返す. ③ 100mg/m²を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注. 投与を 2 日間連日行い, 26 日間休薬する. これを 1 サイクルとして, 繰り返す. ④再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用</p>
<p>メルファラン アルケラン錠 2mg  Alkeran (サンド) 2mg/T 【薬価】 124.90 円 / T</p>	<p>【効】 次記疾患の自覚的並びに他覚的症候の寛解: 多発性骨髄腫</p> <p>【用】(内) ① 1 日 1 回 2 ~ 4mg を連日. 又は② 1 日 1 回 6 ~ 10mg を 4 ~ 10 日間 (総量 40 ~ 60mg), 休薬して骨髄機能の回復を待ち (2 ~ 6 週間), 1 日 2mg の維持量を投与. 又は③ 1 日 1 回 6 ~ 12mg を 4 ~ 10 日間 (総量 40 ~ 60mg), 休薬して骨髄機能の回復を待ち (2 ~ 6 週間), 同様の投与法を反復. 投与中は頻回に血液検査を行い, 特に白血球数, 血小板数を指標として適宜用量を増減又は休薬</p>

422. 代謝拮抗剤

4222. メトトレキサート製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
メトトレキサート <u>注射用メトトレキサート 5mg</u> ㊞ Methotrexate (ファイザー) 5mg/V 【薬価】 617.00 円 / 瓶	【効】 ①〔メトトレキサート通常療法〕次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解：急性白血病，慢性リンパ性白血病，慢性骨髄性白血病，絨毛性疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇胎）。②〔CMF療法〕乳癌。③〔M-VAC療法〕尿路上皮癌 【用】 (注) ①本剤は静脈内，髄腔内又は筋肉内に注射する。必要に応じて動脈内又は腫瘍内に注射する。〔急性白血病・慢性リンパ性白血病・慢性骨髄性白血病〕次の量を1日量として，1週間に3～6回，幼児：1.25～2.5mg，小児：2.5～5mg，成人：5～10mg。白血病の髄膜浸潤による髄膜症状（髄膜白血病）には，1回0.2～0.4mg/kgとして，髄腔内に2～7日ごとに1回注射。〔絨毛性疾患〕1クールを5日間とし，1日10～30mg，休業期間は通常，7～12日間であるが，前回の投与によって副作用があらわれた場合は，副作用が消失するまで休業。〔注射液の調製法〕本剤に注射用蒸留水2mLを加えて溶解し，1mL中メトトレキサートとして2.5mgになるように調製。本剤は防腐剤を含有しないので，調製にあたっては細菌汚染に注意すること，調製後は速やかに使用すること。②シクロホスファミド及びフルオロウラシルとの併用において，メトトレキサートとして1回40mg/m ² を静注。前回の投与によって副作用があらわれた場合は，減量するか又は副作用が消失するまで休業。標準的な投与量及び投与方法は，シクロホスファミドを1日量として65mg/m ² を14日間連日経口投与，メトトレキサートを1日量として40mg/m ² を第1日目と第8日目に静注，及びフルオロウラシルを1日量として500mg/m ² を第1日目と第8日目に静注。これを1クールとして4週ごとに繰り返す。〔注射液の調製法〕本剤に注射用蒸留水2mLを加えて溶解し用いるか，あるいは生食液又は5%ブドウ糖液20mLを加え溶解して用いる。本剤は防腐剤を含有しないので，調製にあたっては細菌汚染に注意すること，調製後は速やかに使用すること。③ビンブラスチン硫酸塩，ドキソルビシン塩酸塩及びシスプラチンとの併用において，メトトレキサートとして1回30mg/m ² を静注。前回の投与によって副作用があらわれた場合は，減量するか又は副作用が消失するまで休業する。標準的な投与量及び投与方法は，治療1，15及び22日目にメトトレキサート30mg/m ² ，治療2，15及び22日目にビンブラスチン硫酸塩3mg/m ² ，治療2日目にドキソルビシン塩酸塩30mg/m ² 及びシスプラチン70mg/m ² を静注する。これを1クールとして4週ごとに繰り返す。〔注射液の調製法〕本剤に注射用蒸留水2mLを加えて溶解し用いるか，あるいは生食液又は5%ブドウ糖液20mLを加え溶解して用いる。本剤は防腐剤を含有しないので，調製にあたっては細菌汚染に注意すること，調製後は速やかに使用すること
メトトレキサート <u>メトトレキサート錠 2.5mg</u> ㊞ Methotrexate (ファイザー) 2.5mg/T 【薬価】 24.10 円 / T	【効】 次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解：①急性白血病，慢性リンパ性白血病，慢性骨髄性白血病。②絨毛性疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇胎） 【用】 (内) ①次の量を1日量として1週間に3～6日：5～10mg，小児2.5～5mg，幼児1.25～2.5mg。②1クールを5日間とし，1日10～30mg。休業期間は，7～12日間であるが，前回の投与によって副作用が現れた場合，副作用が消失するまで休業
メトトレキサート <u>メトトレキサート点滴静注液 200mg</u> ㊞ Methotrexate (ファイザー) 200mg/V 【薬価】 6,475.00 円 / 瓶	【効】 メトトレキサート・ロイコボリン救援療法：①肉腫（骨肉腫，軟部肉腫等）。②急性白血病の中樞神経系及び睾丸への浸潤に対する寛解。悪性リンパ腫の中樞神経系への浸潤に対する寛解 【用】 (注) ①メトトレキサートとして1週間に1回100～300mg/kgを約6時間で点滴静注。その後，ロイコボリンの投与を行う。メトトレキサートの投与間隔は，1～4週間とする。②メトトレキサートとして1週間に1回30～100mg/kg（有効なメトトレキサート脳脊髄液濃度を得るには，1回30mg/kg以上の静注が必要）を約6時間で点滴静注。その後，ロイコボリンの投与を行う。メトトレキサートの投与間隔は，1～4週間とする。注）ロイコボリンの投与は，メトトレキサート投与終了後，3時間後よりロイコボリンとして15mgを3時間ごとに9回静注，以後6時間ごとに8回静注又は筋注。メトトレキサートによると思われる重篤な副作用が現れた場合には，ロイコボリンの用量を増加し，投与期間を延長（注射液の調製法）希釈して用いる場合には，本剤を生食液又は5%ブドウ糖液等に加えて250～500mLとなるように調製。本剤は防腐剤を含有しないので，調製にあたっては細菌汚染に注意。調製後は速やかに使用すること

4223. フルオロウラシル系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カペシタビン ② 後カペシタビン錠 300mg「サワイ」 ③ Capecitabine (沢井) 300mg/T 【薬価】 60.80 円/T 【先発品】 ゼローダ錠 300	【効】 ①手術不能又は再発乳癌。②結腸・直腸癌における補助化学療法。③治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌。④胃癌 【用】(内) ① A 法又は B 法。ラパチニブトシル酸塩水和物と併用する場合には C 法。② B 法。オキサリプラチンと併用する場合には C 法。直腸癌における補助化学療法で放射線照射と併用する場合には D 法。③他の抗悪性腫瘍剤との併用で C 法又は E 法。④白金製剤との併用で C 法 A 法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、21 日間連日投与し、その後 7 日間休薬。これを 1 コースとして繰り返す。(体表面積 1.31㎡未満：1 回用量 900mg、体表面積 1.31㎡以上 1.64㎡未満：1 回用量 1200mg、体表面積 1.64㎡以上：1 回用量 1500mg)。 B 法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、14 日間連日投与し、その後 7 日間休薬。これを 1 コースとして繰り返す。患者の状態により適宜減量。(体表面積 1.33㎡未満：1 回用量 1500mg、体表面積 1.33㎡以上 1.57㎡未満：1 回用量 1800mg、体表面積 1.57㎡以上 1.81㎡未満：1 回用量 2100mg、体表面積 1.81㎡以上：1 回用量 2400mg) C 法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、14 日間連日投与し、その後 7 日間休薬。これを 1 コースとして繰り返す。患者の状態により適宜減量。(体表面積 1.36㎡未満：1 回用量 1200mg、体表面積 1.36㎡以上 1.66㎡未満：1 回用量 1500mg、体表面積 1.66㎡以上 1.96㎡未満：1 回用量 1800mg、体表面積 1.96㎡以上：1 回用量 2100mg) D 法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、5 日間連日投与し、その後 2 日間休薬。これを繰り返す。患者の状態により適宜減量。(体表面積 1.31㎡未満：1 回用量 900mg、体表面積 1.31㎡以上 1.64㎡未満：1 回用量 1200mg、体表面積 1.64㎡以上：1 回用量 1500mg) E 法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、14 日間連日経口投与し、その後 7 日間休薬。これを 1 コースとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。(体表面積 1.31㎡未満：1 回用量 900mg、体表面積 1.31㎡以上 1.69㎡未満：1 回用量 1200mg、体表面積 1.69㎡以上 2.07㎡未満：1 回用量 1500mg、体表面積 2.07㎡以上：1 回用量 1800mg)
フルオロウラシル 5-FU 注 250mg ③ 5-FU (協和キリン) 250mg5mL/V 【薬価】 243.00 円/瓶 5-FU 注 1000mg ③ 5-FU (協和キリン) 1000mg20mL/V 【薬価】 770.00 円/瓶	【効】 ①次記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解：胃癌、肝癌、結腸・直腸癌、乳癌、膀胱癌、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌。②次記の疾患については、他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用することが必要である：食道癌、肺癌、頭頸部腫瘍。③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：頭頸部癌、食道癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌。④レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法：結腸・直腸癌。⑤レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法：小腸癌、治癒切除不能な膀胱癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌 【用】(注) ① 1) 1 日 5～15mg/kg を最初の 5 日間連日 1 日 1 回静注又は点滴静注。以後 5～7.5mg/kg を隔日に 1 日 1 回静注又は点滴静注。2) 1 日 5～15mg/kg を隔日に 1 日 1 回静注又は点滴静注。3) 1 日 5mg/kg を 10～20 日間連日 1 日 1 回静注又は点滴静注。4) 1 日 10～20mg/kg を週 1 回静注又は点滴静注。5) 必要に応じて 1 日 5mg/kg を適宜動注。② 1 日 5～10mg/kg を他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併用し、単独で使用する場合に準じ、又は間歇的に週 1～2 回用いる。③他の抗悪性腫瘍剤との併用療法において、1 日 1,000mg/㎡までを、4～5 日間連日で持続点滴。投与を繰り返す場合には少なくとも 3 週間以上の間隔をあけて投与。本剤単独投与の場合には併用投与時に準じる。④ 1) レボホリナートとして 1 回 100mg/㎡を 2 時間かけて点滴静注し、直後にフルオロウラシルとして 400mg/㎡を静注、さらにフルオロウラシルとして 600mg/㎡を 22 時間かけて持続静注。これを 2 日間連続して行い、2 週間ごとに繰り返す。2) レボホリナートとして 1 回 250mg/㎡を 2 時間かけて点滴静注し、直後にフルオロウラシルとして 2,600mg/㎡を 24 時間持続静注。1 週間ごとに 6 回繰り返した後、2 週間休薬。これを 1クールとする。3) レボホリナートとして 1 回 200mg/㎡を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注終了直後にフルオロウラシルとして 400mg/㎡を静注、さらにフルオロウラシルとして 2,400～3,000mg/㎡を 46 時間持続静注。これを 2 週間ごとに繰り返す。⑤レボホリナートとして 1 回 200mg/㎡を 2 時間かけて点滴静注。レボホリナートの点滴静注終了直後にフルオロウラシルとして 400mg/㎡を静注、さらにフルオロウラシルとして 2,400mg/㎡を 46 時間持続静注。これを 2 週間ごとに繰り返す

4224. シトシン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ゲムシタピン塩酸塩 ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」 Ⓢ</p> <p>Gemcitabine (高田) 200mg/V 【薬価】955.00円/瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1g「ヤクルト」 Ⓢ</p> <p>Gemcitabine (高田) 1g/V 【薬価】4,494.00円/瓶</p>	<p>【効】①膵癌，胆道癌，尿路上皮癌，がん化学療法後に増悪した卵巣癌，再発又は難治性の悪性リンパ腫．②手術不能又は再発乳癌．③非小細胞肺癌</p> <p>【用】(注) ① 1回1000mg/m²を30分かけて点滴静注し，週1回投与を3週連続し，4週目は休薬．これを1コースとして繰り返す．患者の状態により適宜減量．② 1回1250mg/m²を30分かけて点滴静注し，週1回投与を2週連続し，3週目は休薬．これを1コースとして繰り返す．患者の状態により適宜減量．③ 1回1000mg/m²を30分かけて点滴静注し，週1回投与を3週連続し，4週目は休薬する．これを1コースとして投与を繰り返す．シスプラチンと併用する場合は，ゲムシタピンとして1回1250mg/m²を30分かけて点滴静注し，週1回投与を2週連続し，3週目は休薬を1コースとすることもできる．患者の状態により適宜減量． 本剤の200mgバイアルは5mL以上，1gバイアルは25mL以上の生理食塩液に溶解して用いる</p>
<p>シタラビン キロサイド注 20mg Ⓢ</p> <p>Cycloide (日本新薬) 20mg/A 【薬価】257.00円/A</p>	<p>【効】①急性白血病（赤白血病，慢性骨髄性白血病の急性転化例を含む）．②消化器癌（胃癌，膵癌，肝癌，結腸癌等），肺癌，乳癌，女性性器癌（子宮癌等）等．但し他の抗腫瘍剤（フルオロウラシル，マイトマイシンC，シクロホスファミド水和物，メトトレキサート，ビンクリスチン硫酸塩，ビンブラスチン硫酸塩等）と併用する場合に限る．③膀胱腫瘍</p> <p>【用】(注) ① 1) 寛解導入：1日0.8～1.6mg/kg，小児0.6～2.3mg/kgを250～500mLの5%ブドウ糖液あるいは生食液に混合し，点滴静注するか，又は20mLの20%ブドウ糖液あるいは生食液に混合し，ワンショットで静注．2～3週間連続投与を行う．2) 維持療法：寛解が得られた場合，維持療法として前記用量を1週1回そのまま皮下注，筋注するか，あるいは前記用法に従い静注．3) シタラビン少量療法：次記の用量を10～14日間皮下又は静注，1回10～20mgを1日2回か1回20mg/m²を1日1回．4) シタラビン標準量療法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1日100～200mg/m²を5～7日間点滴静注．5) 髄腔内化学療法：1回25～40mgを1週間に1～2回髄腔内に投与．1歳：15～20mg，2歳：20～30mg，3歳以上：25～40mg．併用する他の抗腫瘍剤及び患者の状態により投与間隔は適宜延長する．髄液に異常所見を認める場合は，正常化するまで投与を継続する．② 1) 静注：他の抗腫瘍剤（フルオロウラシル，マイトマイシンC，シクロホスファミド水和物，メトトレキサート，ビンクリスチン硫酸塩等）と併用するときは，1回0.2～0.8mg/kgを1週間に1～2回点滴静注するか，又はワンショットで静脈内投与．2) 局所動脈内注射：1日0.2～0.4mg/kgを他の抗腫瘍剤（フルオロウラシル，シクロホスファミド水和物，ビンクリスチン硫酸塩，ビンブラスチン硫酸塩等）と併用して持続注入ポンプで投与．③ 単独膀胱内注入を行う場合，200～400mgを，また，他の抗腫瘍剤と併用し，膀胱内注入を行う場合は，100～300mgを10～40mLの生食液又は注射用蒸留水に混合して1日1回又は週2～3回膀胱内に注入．併用する薬剤の組合せ，併用量等は医師の判断による</p>
<p>シタラビン シタラビン点滴静注液 400mg 「NIG」 Ⓢ</p> <p>Cytarabine (武田) 400mg/瓶 【薬価】1,558.00円/瓶</p>	<p>【効】シタラビン大量療法：急性白血病（①急性骨髄性白血病，②急性リンパ性白血病）における次記療法．再発又は難治例に対する寛解導入法（サルベージ療法）．地固め療法．③再発又は難治性の悪性リンパ腫．但し，②③については他の抗腫瘍剤と併用する場合に限る．④腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置</p> <p>【用】(注) ①再発又は難治例に対する寛解導入療法（サルベージ療法）：1回2g/m²を5%ブドウ糖液あるいは生食液に混合し300～500mLとし，12時間毎に3時間かけて最大6日間連日点滴静注．小児：1回3g/m²を12時間毎に3時間かけて3日間連日点滴静注．地固め療法：1回2g/m²を5%ブドウ糖液あるいは生理食塩液に混合して300～500mLとし，12時間毎に3時間かけて最大6日間点滴静注，又は1回3g/m²を12時間毎に3時間かけて3日間点滴静注．小児に投与する場合には，1回1～2g/m²を12時間毎に3時間かけて点滴で3～5日間静注，又は1回3g/m²を12時間毎に3時間かけて3日間点滴静注．②他の抗腫瘍剤と併用し，1回2g/m²を5%ブドウ糖液あるいは生食液に混合し300～500mLとし，12時間毎に3時間かけて最大6日間連日点滴静注．小児：他の抗腫瘍剤と併用し，1回2g/m²を12時間毎に3時間かけて3日間連日点滴静注．③他の抗腫瘍剤と併用し，1回2g/m²を5%ブドウ糖液あるいは生食液に混合し300～500mLとし，1日1～2回3時間かけて1～2日間（最大2回）連日点滴静注．小児：他の抗腫瘍剤と併用し，1回2g/m²を12時間毎に3時間かけて3日間連日点滴静注．④再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用する</p>

4229. その他の代謝拮抗剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヒドロキシカルバミド ハイドレアカプセル 500mg ㊞ Hydrea(プリストル・マイヤーズ) 500mg/cap 【薬価】 184.60 円 /cap	【効】 慢性骨髄性白血病, 本態性血小板血症, 真性多血症 【用】 (内) 1日 500mg～2000mgを1～3回に分割. 寛解後の維持には1日 500mg～1000mgを1～2回に分割
ペメトレキセドナトリウム水和物 アリムタ注射用 100mg ㊞ Alimta (日本イーライリリー) 100mg/V 【薬価】 24,619.00 円 / 瓶 アリムタ注射用 500mg ㊞ Alimta (日本イーライリリー) 500mg/V 【薬価】 97,951.00 円 / 瓶	【効】 ①悪性胸膜中皮腫. ②切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 【用】 (注) ①シスプラチンとの併用において, ペメトレキセドとして1日1回 500mg/m ² を10分間かけて点滴静注し, 少なくとも20日間休薬. これを1コースとし, 投与を繰り返す. 適宜減量. ②1日1回 500mg/m ² を10分間かけて点滴静注し, 少なくとも20日間休薬. これを1コースとし, 投与を繰り返す. 適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ティーエスワン配合 OD 錠 T20</p> <p>Ⓢ</p> <p>TS-1 OD (大鵬) 20mg/T (テガフル相当量)</p> <p>【薬価】 327.00 円/T</p> <p>1 錠中： テガフル 20mg ギメラシル 5.8mg オテラシルカリウム 19.6mg</p>	<p>【効】 ①胃癌，結腸・直腸癌，頭頸部癌，非小細胞肺癌，手術不能又は再発乳癌，膀胱癌，胆道癌。②ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法</p> <p>【用】(内) ①胃癌には A 法，B 法又は C 法，結腸・直腸癌には A 法，C 法又は D 法，頭頸部癌には A 法，非小細胞肺癌には A 法，B 法又は C 法，手術不能又は再発乳癌には A 法，膀胱癌には A 法又は C 法，胆道癌には A 法，E 法又は F 法を使用。 A 法：成人には初回投与量（1 回量）を体表面積に合わせて次記の基準量とし，朝食後及び夕食後の 1 日 2 回，28 日間連日経口投与し，その後 14 日間休薬。これを 1 コースとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜増減。増量は本剤の投与によると判断される臨床検査値異常（血液検査，肝・腎機能検査）及び消化器症状が発現せず，安全性に問題がなく，増量できると判断される場合に初回基準量から一段階までとし，75mg/回を限度。B 法：成人には初回投与量（1 回量）を体表面積に合わせて次記の基準量とし，朝食後及び夕食後の 1 日 2 回，21 日間連日経口投与し，その後 14 日間休薬。これを 1 コースとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。C 法：成人には初回投与量（1 回量）を体表面積に合わせて次記の基準量とし，朝食後及び夕食後の 1 日 2 回，14 日間連日経口投与し，その後 7 日間休薬。これを 1 コースとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。D 法：成人には初回投与量（1 回量）を体表面積に合わせて次記の基準量とし，朝食後及び夕食後の 1 日 2 回，14 日間連日経口投与し，その後 14 日間休薬。これを 1 コースとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。E 法：成人には初回投与量（1 回量）を体表面積に合わせて次記の基準量とし，朝食後及び夕食後の 1 日 2 回，7 日間連日経口投与し，その後 7 日間休薬。これを 1 コースとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。A 法～E 法における初回投与量（1 回量）：体表面積 1.25㎡未満：初回基準量（テガフル相当量）40mg/回。1.25㎡以上～1.5㎡未満：50mg/回。1.5㎡以上：60mg/回。F 法における初回投与量（1 回量）：体表面積 1.25㎡未満：初回基準量（テガフル相当量）朝 40mg/回，夕 20mg/回。1.25㎡以上～1.5㎡未満：40mg/回。1.5㎡以上：50mg/回。②内分泌療法剤との併用において，次記投与量を朝食後及び夕食後の 1 日 2 回，14 日間連日経口投与し，その後 7 日間休薬。これを 1 クールとして最長 1 年間，投与を繰り返す。患者の状態により適宜増減。初回基準量を超える増量は行わない。体表面積 1.25㎡未満：初回基準量（テガフル相当量）40mg/回。1.25㎡以上～1.5㎡未満：50mg/回。1.5㎡以上：60mg/回</p>
<p>ティーエスワン配合 OD 錠 T25</p> <p>Ⓢ</p> <p>TS-1 OD (大鵬) 25mg/T (テガフル相当量)</p> <p>【薬価】 407.40 円/T</p> <p>1 錠中： テガフル 25mg ギメラシル 7.25mg オテラシルカリウム 24.5mg</p>	
<p>② エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20</p> <p>Ⓢ</p> <p>S-1TAIHO OD (岡山大鵬) 20mg/T (テガフル相当量)</p> <p>【薬価】 130.80 円/T</p> <p>【先発品】 ティーエスワン配合 OD 錠 T20</p> <p>1 錠中： テガフル 20mg ギメラシル 5.8mg オテラシルカリウム 19.6mg</p>	
<p>② エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25</p> <p>Ⓢ</p> <p>S-1TAIHO OD (岡山大鵬) 25mg/T (テガフル相当量)</p> <p>【薬価】 197.00 円/T</p> <p>【先発品】 ティーエスワン配合 OD 錠 T25</p> <p>1 錠中： テガフル 25mg ギメラシル 7.25mg オテラシルカリウム 24.5mg</p>	

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ユーエフティ E 配合顆粒 T100(院外) (株) UFT E (大鵬) 100mg1包 (テガフル相当量) 【薬価】 154.80 円 / 包 0.5g 中： テガフル 100mg ウラシル 224mg	【効】 ①テガフル・ウラシル通常療法:次の疾患の自覚的並びに他覚的症狀の寛解:頭頸部癌, 胃癌, 結腸・直腸癌, 肝臓癌, 胆嚢・胆管癌, 膵臓癌, 肺癌, 乳癌, 膀胱癌, 前立腺癌, 子宮頸癌. ②ホリナート・テガフル・ウラシル療法:結腸・直腸癌 【用】(内) ①1日量として, テガフル 300~600mg相当量を1日2~3回に分割. 子宮頸癌については, 1日量として, テガフル 600mg相当量を1日2~3回に分割. 他の抗悪性腫瘍剤との併用の場合は前記に準じて投与. ②結腸・直腸癌に対して, 1日量として, テガフル 300~600mg相当量 (300mg/m ² を基準) を1日3回に分割し (約8時間ごと), 食事の前後1時間を避けて, ホリナートの投与量は, 75mgを1日3回に分割し (約8時間ごと), テガフル・ウラシル配合剤と同時に経口投与. 以上を28日間連日, その後7日間休薬, これを1クールとして投与を繰り返す
ユーエフティ E 配合顆粒 T150(院外) (株) UFT E (大鵬) 150mg1包 (テガフル相当量) 【薬価】 234.50 円 / 包 0.75g 中： テガフル 150mg ウラシル 336mg	

423. 抗腫瘍性抗生物質製剤

4231. マイトマイシン C 製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
マイトマイシン C マイトマイシン注用 2mg (株) Mitomycin (協和キリン) 2mg/V 【薬価】 480.00 円 / 瓶	【効】 次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解:慢性リンパ性白血病, 慢性骨髄性白血病, 胃癌, 結腸・直腸癌, 肺癌, 膵癌, 肝癌, 子宮頸癌, 子宮体癌, 乳癌, 頭頸部腫瘍 【用】(注) ①間歇投与法:1日4~6mgを週1~2回静注. ②連日投与法:1日2mgを連日静注. ③大量間歇投与法:1日10~30mgを1~3週間以上の間隔で静注. ④他の抗悪性腫瘍剤との併用:1日2~4mgを週1~2回他の抗悪性腫瘍剤と併用して静注. 注射液の調製法:2mg当り, 5mlの割合に生理食塩液を加えて溶解

4234. ブレオマイシン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ブレオマイシン塩酸塩 ブレオ注射用 15mg (株) Bleo (日本化薬) 15mg/V 【薬価】 3,943.00 円 / 瓶	【効】 皮膚癌, 頭頸部癌 (上顎癌, 舌癌, 口唇癌, 咽頭癌, 喉頭癌, 口腔癌等), 肺癌 (特に原発性及び転移性扁平上皮癌), 食道癌, 悪性リンパ腫, 子宮頸癌, 神経腫瘍, 甲状腺癌, 胚細胞腫瘍 (精巣腫瘍, 卵巣腫瘍, 性腺外腫瘍) 【用】(注) ①静注:15mg~30mgを生理食塩液又は, ブドウ糖液等の適当な静脈用注射液約5~20mlに溶解し, 緩徐に, 発熱の著しい場合は1回量を5mg又はそれ以下とする. ②筋注・皮下注:15mg~30mgを生理食塩液等の適当な溶解液約5mlに溶解. 患部の周辺に皮下注する場合は1mg/1ml以下の濃度. ③動注:5mg~15mgを生理食塩液又はブドウ糖液等の適当な注射液に溶解し, シングルショット又は連続的に. ④注射の頻度:1週2回を原則とし, 症状に応じて1日1回 (連日) ないし1週間1回に適宜増減. ⑤総投与量:総投与量は腫瘍の消失を目標とし, 300mg以下. 胚細胞腫瘍に対し, 確立された標準的な他の抗癌剤との併用療法にあっては360mg以下. ⑥小児への投与:小児の胚細胞腫瘍, 悪性リンパ腫に対しては, 次記の用法・用量で投与;1回10mg~20mg/m ² を1~4週間ごとに静脈内投与. 1回量として成人の最大用量 (30mg) まで

4235. アントラサイクリン系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アクラルピシン塩酸塩 アクラシノン注射用 20mg (株) Aclacinon (マイクロバイオ) 20mg/V 【薬価】 2,316.00 円 / 瓶	【効】 次の疾患の自覚的並びに他覚的症狀の寛解及び改善:①胃癌, 肺癌, 乳癌, 卵巣癌, 悪性リンパ腫. ②急性白血病 【用】(注) 1バイアルを生食液又は5%ブドウ糖液10mlに溶解して, ①1)1日40~50mg (0.8~1.0mg/kg) を1週間に2回. 1,2日連日又は1,4日静脈内ヘワンショット又は点滴投与する. 2)1日20mg (0.4mg/kg) を7日間連日静脈内ヘワンショット投与又は点滴投与後, 7日間休薬しこれを反復. ②1日20mg (0.4mg/kg) を10~15日間連日静脈内ヘワンショット又は点滴投与する

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アムルピシン塩酸塩 <u>カルセド注射用 20mg</u>  Calsed (日本化薬) 20mg/V 【薬価】 4,739.00 円 / 瓶 <u>カルセド注射用 50mg</u>  Calsed (日本化薬) 50mg/V 【薬価】 11,035.00 円 / 瓶	【効】 非小細胞肺癌, 小細胞肺癌 【用】 (注) 45mg/m ² を約 20mL の生理食塩液あるいは 5% ブドウ糖注射液に溶解し, 1 日 1 回 3 日間連日静脈内に投与し, 3～4 週間休業. これを 1 クールとし, 繰り返す
イダルピシン塩酸塩 <u>イダマイシン静注用 5mg</u>  Idamycin (ファイザー) 5mg/V 【薬価】 9,543.00 円 / 瓶	【効】 急性骨髄性白血病 (慢性骨髄性白血病の急性転化を含む) 【用】 (注) 1 バイアル 5mg に 5mL の注射用水を加え溶解する. 12mg/m ² を 1 日 1 回, 3 日間連日静脈内投与. 骨髄機能が回復するまで休業し, 繰り返す
エピルピシン塩酸塩 <u>後エピルピシン塩酸塩注射液</u> <u>10mg/5mL 「NK」</u>  Epirubicin hydrochloride (日本化薬) 10mg5mL/V 【薬価】 2,257.00 円 / 瓶 <u>後エピルピシン塩酸塩注射液</u> <u>50mg/25mL 「NK」</u>  Epirubicin hydrochloride (日本化薬) 50mg25mL/V 【薬価】 7,040.00 円 / 瓶	【効】 次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解: ①急性性白血病. ②悪性リンパ腫. ③乳癌, 卵巣癌, 胃癌, 尿路上皮癌 (膀胱癌, 腎盂・尿管腫瘍). ④肝癌. ⑤膀胱癌 (表在性膀胱癌に限る). ⑥次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 乳癌 (手術可能例における術前, あるいは術後化学療法) 【用】 (注) ① 15mg/m ² を 1 日 1 回, 5～7 日間連日静注, 3 週間休業, これを 1 クールとし, 2～3 クール反復. ② 40～60mg/m ² を 1 日 1 回静注, 3～4 週休業, これを 1 クールとし, 3～4 クール反復. ③ 60mg/m ² を 1 日 1 回静注, 3～4 週休業, これを 1 クールとし, 3～4 クール反復. ④ 60mg/m ² を肝動脈内に挿入されたカテーテルより, 1 日 1 回肝動脈内に投与し 3～4 週休業, これを 1 クールとし, 3～4 クール反復. ⑤ 60mg を 1 日 1 回, 3 日間連日膀胱内注入, 4 日間休業, これを 1 クールとし, 2～4 クール反復. 注入に際しては, ネラトンカテーテルで導尿し十分に膀胱腔内を空にした後, 同カテーテルより注入し, 1～2 時間膀胱腔内に把持する. ⑥ 1) シクロホスファミド水和物との併用: 100mg/m ² を 1 日 1 回静注, 20 日間休業, これを 1 クールとし, 4～6 クール反復. 2) シクロホスファミド水和物, フルオロウラシルとの併用: 100mg/m ² を 1 日 1 回静注, 20 日間休業. これを 1 クールとし, 4～6 クール反復
エピルピシン塩酸塩 <u>後エピルピシン塩酸塩注射液</u> <u>10mg 「NK」</u>  Epirubicin hydrochloride (日本化薬) 10mg/V 【薬価】 1,473.00 円 / 瓶	【効】 次記疾患の自覚的並びに他覚的症狀の緩解: ①急性性白血病. ②悪性リンパ腫. ③乳癌, 卵巣癌, 胃癌, 尿路上皮癌 (膀胱癌, 腎盂・尿管腫瘍). ④肝癌. ⑤膀胱癌 (表在性膀胱癌に限る). ⑥次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 乳癌 (手術可能例における術前, あるいは術後化学療法). ⑦肝癌に対する肝動脈化学塞栓療法 (TACE) 【用】 (注) ① 15mg/m ² を約 20mL の注射用水に溶解し, 1 日 1 回 5～7 日間連日静注, 3 週間休業, これを 1 クールとし, 必要に応じて 2～3 クール反復. ② 40～60mg/m ² を約 20mL の注射用水に溶解し, 1 日 1 回静注, 3～4 週休業, これを 1 クールとし, 3～4 クール反復. ③ 60mg/m ² を約 20mL の注射用水に溶解し, 1 日 1 回静注, 3～4 週休業, これを 1 クールとし, 3～4 クール反復. ④ 60mg/m ² を約 20mL の注射用水に溶解し, 肝動脈内に挿入されたカテーテルより, 1 日 1 回肝動脈内に投与し 3～4 週休業, これを 1 クールとし, 3～4 クール反復. ⑤ 60mg を 30mL の生理食塩液に溶解し, 1 日 1 回 3 日間連日膀胱内注入, 4 日間休業, これを 1 クールとし, 2～4 クール反復. 注入に際しては, ネラトンカテーテルで導尿し十分に膀胱腔内を空にした後, 同カテーテルよりエピルピシン塩酸塩溶液を注入し, 1～2 時間膀胱腔内に把持する. ⑥ 1) シクロホスファミド水和物との併用: 100mg/m ² を約 20mL の注射用水に溶解し, 1 日 1 回静注, 20 日間休業, これを 1 クールとし, 4～6 クール反復. 2) シクロホスファミド水和物, フルオロウラシル併用: 100mg/m ² を約 20mL の注射用水に溶解し, 1 日 1 回静注, 20 日間休業. これを 1 クールとし, 4～6 クール反復. ⑦ 10mg に対し, ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステルを 0.5～2mL の割合で加え, 肝動脈内に挿入されたカテーテルより肝動脈内に投与. 1 日 60mg/m ² とするが, 腫瘍血管に乳濁液が充満した時点で終了

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ダウノルピシン塩酸塩 <u>ダウノマイシン静注用 20mg</u> ㊉ Daunomycin (Meiji Seika) 20mg/V 【薬価】 2,034.00 円 / 瓶	【効】 急性白血病（慢性骨髄性白血病の急性転化を含む） 【用】 (注) 1 日量 0.4 ～ 1.0mg/kg を，小児は 1 日量 1.0mg/kg を連日あるいは隔日に 3 ～ 5 回静注又は点滴静注．他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1 日 25 ～ 60mg (力価) / m ² (体表面積) を 2 ～ 5 回，小児は 1 日 25 ～ 45mg (力価) / m ² (体表面積) を 2 ～ 4 回，連日あるいは 1 ～ 6 日間をあけて静脈内投与，骨髄機能が回復するまで休業．この方法を 1 コースとし，投与を繰り返す．患者の状態により適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ドキソルピシン塩酸塩 <u>アドリアシン注用 10</u> (商標) Adriacin (サンド) 10mg/V 【薬価】 1,989.00 円 / 瓶	<p>【効】 ◇ドキソルピシン塩酸塩通常療法 次の諸症の自覚的及び他覚的症狀の緩解:①悪性リンパ腫, 肺癌, 消化器癌(胃癌, 胆嚢・胆管癌, 膵臓癌, 肝癌, 結腸癌, 直腸癌等), 乳癌, 骨肉腫, ⑧膀胱腫瘍。 次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法:②乳癌(手術可能例における術前,あるいは術後化学療法),③子宮体癌(術後化学療法,転移・再発時化学療法),④悪性骨・軟部腫瘍,⑤悪性骨腫瘍,⑥多発性骨髄腫,⑦小児悪性固形腫瘍(ユースング肉腫ファミリー腫瘍,横紋筋肉腫,神経芽腫,網膜芽腫,肝芽腫,腎芽腫等)。 ◇M-VAC療法:⑨尿路上皮癌</p> <p>【用】(注)①(1)1日量10mg(0.2mg/kg)を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回4～6日間連日静脈内ワンショット投与後,7～10日間休薬。この方法を1クールとし,2～3クール繰り返す。(2)1日量20mg(0.4mg/kg)を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回2～3日間静脈内にワンショット投与後,7～10日間休薬。この方法を1クールとし,2～3クール繰り返す。(3)1日量20～30mg(0.4～0.6mg/kg)を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回3日間連日静脈内にワンショット投与後,18日間休薬。この方法を1クールとし,2～3クール繰り返す。(4)総投与量は500mg/m²以下とする。悪性リンパ腫の場合:(5)上記(1)～(3)に従う。(6)他の抗悪性腫瘍剤との併用において,標準的な投与量及び投与方法は,以下のとおりとする。1)1日1回25～50mg/m²を静脈内投与し,繰り返す場合には少なくとも2週間以上の間隔をあける。2)1日目は40mg/m²,8日目は30mg/m²を静脈内投与し,その後20日間休薬する。この方法を1クールとし繰り返す。投与に際しては,注射用水又は生理食塩液に溶解し,必要に応じて輸液により希釈する。総投与量は500mg/m²以下とする。②シクロホスファミド水和物との併用において,1日量60mg/m²を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回静注後,13日間又は20日間休薬。この方法を1クールとし,4クール繰り返す。総投与量は500mg/m²以下とする。③シスプラチンとの併用において,1日量60mg/m²を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回静注し,その後休薬し3週ごと繰り返す。総投与量は500mg/m²以下とする。④イホスファミドとの併用において,1日量20～30mg/m²を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回3日間連続で静注し,その後休薬し3～4週ごと繰り返す。総投与量は500mg/m²以下とする。本剤単剤では①(3),(4)に従う。⑤シスプラチンとの併用において,1日量20mg/m²を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1日1回3日間連続で静注又は点滴静注し,その後3週間休薬。これを1クールとし,投与を繰り返す。総投与量は500mg/m²以下とする。⑥ビンクリスチン硫酸塩,デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムとの併用において,1日量9mg/m²を注射用水又は生理食塩液に溶解し,必要に応じて輸液に希釈して24時間持続静注。これを4日間連続で行う。その後休薬し,3～4週ごと繰り返す方法を1クールとする。総投与量は500mg/m²以下とする。⑦他の抗悪性腫瘍剤との併用において,次のとおりとする。(1)1日20～40mg/m²を24時間持続点滴:1コース20～80mg/m²を24～96時間かけて投与し,繰り返す場合には少なくとも3週間以上の間隔をあけて投与。1日投与量は最大40mg/m²とする。(2)1日1回20～40mg/m²を静注又は点滴静注:1コース20～80mg/m²を投与し,繰り返す場合には少なくとも3週間以上の間隔をあけて投与。1日投与量は最大40mg/m²とする。投与に際しては,注射用水又は生理食塩液に溶解し,必要に応じて輸液により希釈する。総投与量は500mg/m²以下とする。⑧1日量30～60mgを20～40mLの生理食塩液に1～2mg/mLになるように溶解し,1日1回連日又は週2～3回膀胱腔内に注入。〔膀胱腔内注入法〕ネラトンカテーテルで導尿し,十分に膀胱腔内を空にしたのち同カテーテルより,30～60mgを20～40mLの生理食塩液に1～2mg/mLになるように溶解して膀胱腔内に注入し,1～2時間膀胱把持。⑨メトトレキサート,ビンブラスチン硫酸塩及びシスプラチンとの併用において,本剤を注射用水又は生理食塩液に溶解し,1回30mg/m²を静注。標準的な投与量及び投与方法は,メトトレキサート30mg/m²を1日目に投与した後,2日目にビンブラスチン硫酸塩3mg/m²,本剤30mg/m²及びシスプラチン70mg/m²を静注。15日目及び22日目に,メトトレキサート30mg/m²及びビンブラスチン硫酸塩3mg/m²を静注。これを1クールとして4週ごとに繰り返すが,本剤の総投与量は500mg/m²以下とする</p>

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ピラルビシン塩酸塩 テラルビシン注射用 10mg (株) Therarubicin (Meiji Seika) 10mg/V 【薬価】 3,925.00 円 / 瓶 テラルビシン注射用 20mg (株) Therarubicin (Meiji Seika) 20mg/V 【薬価】 8,227.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 次記疾患の自覚的・他覚的症状の寛解並びに改善：頭頸部癌，乳癌，胃癌，尿路上皮癌（膀胱癌，腎盂・尿管腫瘍），卵巣癌，子宮癌，急性白血病，悪性リンパ腫</p> <p>【用】（注） 1. 注射液の調製：本剤のバイアルに 5% ブドウ糖注射液，注射用水又は生理食塩液 10mL を加えて溶解。</p> <p>2. 投与方法 (1) 静注の場合：頭頸部癌は III 法又は IV 法を，乳癌及び胃癌は I 法又は III 法を，卵巣癌及び子宮癌は I 法を，尿路上皮癌は I 法又は II 法を，急性白血病は V 法を，悪性リンパ腫は I 法又は IV 法を標準的用法・用量として選択。</p> <p>I 法（3～4 週 1 回法）〔乳癌，胃癌，卵巣癌，子宮癌，尿路上皮癌，悪性リンパ腫〕：1 日 1 回，40～60mg（25～40mg/m²），3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。</p> <p>II 法（3～4 週 2 回法）〔尿路上皮癌〕：1 日 1 回，30～40mg（20～25mg/m²）を 2 日間連日投与し，3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，投与を繰り返す。</p> <p>III 法（週 1 回法）〔頭頸部癌，乳癌，胃癌〕：1 日 1 回，20～40mg（14～25mg/m²）を 1 週間間隔で 2～3 回投与し，3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。</p> <p>IV 法（連日法）〔頭頸部癌，悪性リンパ腫〕：1 日 1 回，10～20mg（7～14mg/m²）を 3～5 日間連日投与し，3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。</p> <p>V 法（連日法）〔急性白血病〕：1 日 1 回，10～30mg（7～20mg/m²）を 5 日間連日投与。骨髓機能が回復するまで休薬し，繰り返す。</p> <p>(2) 動脈内注射による頭頸部癌，膀胱癌の場合：1 日 1 回，10～20mg（7～14mg/m²）を連日又は隔日に 5～10 回投与。</p> <p>(3) 膀胱内注入による膀胱癌：カテーテルを用いて導尿した後，1 日 1 回，15～30mg を 500～1000μg/mL の溶液として週 3 回，各 1～2 時間膀胱内把持する。これを 1 クールとし，2～3 クール繰り返す</p>

424. 抗腫瘍性植物成分製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>イリノテカン塩酸塩水和物 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「サワイ」 (株) Irinotecan hydrochloride (沢井) 100mg5mL/V 【薬価】 2,460.00 円 / 瓶 【先発品】 カンプト点滴静注 100mg，トポテシン点滴静注 100mg</p>	<p>【効】 ①小細胞肺癌，非小細胞肺癌。②子宮頸癌，卵巣癌，胃癌（手術不能又は再発），結腸・直腸癌（手術不能又は再発）。③乳癌（手術不能又は再発），有棘細胞癌。④悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）。⑤小児悪性固形腫瘍。⑥治癒切除不能な膀胱癌</p> <p>【用】（注） ①③は A 法を，②は A 法又は B 法を，④は C 法を，⑤は D 法を，⑥は E 法を 1 クールとして繰り返す。A 法：1 日 1 回，100mg/m² を 1 週間間隔で 3～4 回点滴静注し，少なくとも 2 週間休薬。B 法：1 日 1 回，150mg/m² を 2 週間間隔で 2～3 回点滴静注し，少なくとも 3 週間休薬。C 法：1 日 1 回，40mg/m² を 3 日間連日点滴静注。これを 1 週毎に 2～3 回繰り返す，少なくとも 2 週間休薬。D 法：1 日 1 回，20mg/m² を 5 日間連日点滴静注。これを 1 週毎に 2 回繰り返す，少なくとも 1 週間休薬。E 法：1 日 1 回，180mg/m² を点滴静注し，少なくとも 2 週間休薬。A 法，B 法及び E 法では，投与量に応じて 500mL 以上の生理食塩液，ブドウ糖液又は電解質維持液に混和し，90 分以上かけて点滴静注。C 法では，投与量に応じて 250mL 以上の生理食塩液，ブドウ糖液又は電解質維持液に混和し，60 分以上かけて点滴静注。D 法では，投与量に応じて 100mL 以上の生理食塩液，ブドウ糖液又は電解質維持液に混和し，60 分以上かけて点滴静注</p>
<p>エトポシド エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」 (株) Etoposide (サンド) 100mg5mL/V 【薬価】 1,462.00 円 / 瓶 【先発品】 ラステット注 100mg / 5mL，ベブシド注 100mg</p>	<p>【効】 ①肺小細胞癌，悪性リンパ腫，急性白血病，睾丸腫瘍，膀胱癌，絨毛性疾患。②胚細胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外腫瘍）。③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（ユーイング肉腫ファミリー腫瘍，横紋筋肉腫，神経芽腫，網膜芽腫，肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍，腎芽腫その他腎原発悪性腫瘍等）。④腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置</p> <p>【用】（注） ① 1 日量 60～100mg/m² を 5 日間連続点滴静注し，3 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。② 確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法を行い，1 日量 100mg/m² を 5 日間連続点滴静注し，16 日間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。③他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1 日量 100～150mg/m² を 3～5 日間連続点滴静注し，3 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。④再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
カバジタキセルアセトン <u>ジェブタナ点滴静注 60mg</u>  Jevtana (サノフィ) 60mg1.5mL/V 【薬価】 470,502.00 円 / 瓶	【効】 前立腺癌 【用】 (注) プレドニゾロンとの併用において、1日1回カバジタキセルとして25mg/m ² (体表面積) を1時間かけて3週間間隔で点滴静注。患者の状態により適宜減量
ドセタキセル水和物 <u>後ドセタキセル点滴静注 20mg</u> <u>/1mL「ニプロ」</u>  Docetaxel (ニプロ) 20mg1mL/V 【薬価】 2,865.00 円 / 瓶 【先発品】 ワンタキソテール点滴静注 20mg/1mL <u>後ドセタキセル点滴静注 80mg</u> <u>/4mL「ニプロ」</u>  Docetaxel (ニプロ) 80mg4mL/V 【薬価】 9,954.00 円 / 瓶 【先発品】 ワンタキソテール点滴静注 80mg/4mL	【効】 ①乳癌，非小細胞肺癌，胃癌，頭頸部癌。②卵巣癌。③食道癌，子宮体癌。④前立腺癌 【用】 (注) ①1日1回，60mg/m ² を1時間以上かけて3～4週間間隔で点滴静注。1回75mg/m ² まで。②1日1回，70mg/m ² を1時間以上かけて3～4週間間隔で点滴静注。1回75mg/m ² まで。③1日1回，70mg/m ² を1時間以上かけて3～4週間間隔で点滴静注。④1日1回，75mg/m ² を1時間以上かけて3週間間隔で点滴静注
ノゲタカン塩酸塩 <u>ハイカムチン注射用 1.1mg</u>  Hycamtin (日本化薬) 1.1mg/V 【薬価】 6,325.00 円 / 瓶	【効】 ①小細胞肺癌。②がん化学療法後に増悪した卵巣癌。③小児悪性固形腫瘍。④進行又は再発の子宮頸癌 【用】 (注) ①1日1回，1.0mg/m ² を5日間連日点滴静注し，少なくとも16日間休業。これを1コースとして，繰り返す。②1日1回，1.5mg/m ² を5日間連日点滴静注し，少なくとも16日間休業。これを1コースとして，繰り返す。③他の抗悪性腫瘍剤との併用で，1日1回，0.75mg/m ² を5日間連日点滴静注し，少なくとも16日間休業。これを1コースとして，繰り返す。 投与時，100mLの生理食塩液に混和し，30分かけて点滴静注。④シスプラチンとの併用で，成人に1日1回，0.75mg/m ² を3日間連日点滴静注し，少なくとも18日間休業。これを1コースとして，投与を繰り返す
パクリタキセル <u>アブラキサ点静注用 100mg</u>  Abraxane (大鵬) 100mg/V 【薬価】 48,198.00 円 / 瓶	【効】 ①乳癌，胃癌。②非小細胞肺癌。③治癒切除不能な膀胱癌 【用】 (注) ①乳癌にはA法又はE法，胃癌にはA法又はD法を使用し，②にはB法を使用，③にはC法 ①A法：1日1回260mg/m ² を30分かけて点滴静注し，少なくとも20日間休業。これを1コースとして，繰り返す。D法：1日1回100mg/m ² を30分かけて点滴静注し，少なくとも6日間休業。週1回投与を3週間連続し，4週目は休業。これを1コースとして，繰り返す。E法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1日1回100mg/m ² (体表面積) を30分かけて点滴静注し，少なくとも6日間休業。週1回投与を3週間連続し，4週目は休業。これを1コースとして，投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。②B法：1日1回100mg/m ² を30分かけて点滴静注し，少なくとも6日間休業。週1回投与を3週間連続し，これを1コースとして，繰り返す。患者の状態により適宜減量。③C法：ゲムシタピンとの併用において，1日1回125mg/m ² (体表面積) を30分かけて点滴静注し，少なくとも6日間休業。週1回投与を3週間連続し，4週目は休業する。これを1コースとして，繰り返す。患者の状態により適宜減量

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
パクリタキセル <u>パクリタキセル注射液 30mg「サワイ」</u> ● Paclitaxel (沢井) 30mg5mL/瓶 【薬価】 1,652.00 円 / 瓶 <u>パクリタキセル注射液 100mg「サワイ」</u> ● Paclitaxel (沢井) 100mg16.7mL/瓶 【薬価】 5,241.00 円 / 瓶	【効】 卵巣癌, 非小細胞肺癌, 乳癌, 胃癌, 子宮体癌, 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌, 再発又は遠隔転移を有する食道癌, 血管肉腫, 進行又は再発の子宮頸癌, 再発又は難治性の胚細胞腫瘍 (精巣腫瘍, 卵巣腫瘍, 性腺外腫瘍) 【用】 (注) 非小細胞肺癌及び子宮体癌には A 法又は B 法を, 卵巣癌には A 法又はカルボプラチンとの併用で C 法を, 胃癌には A 法又は E 法を, 再発又は難治性の胚細胞腫瘍には他の抗悪性腫瘍剤との併用で A 法を, 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌, 再発又は遠隔転移を有する食道癌, 血管肉腫には B 法を, 進行又は再発の子宮頸癌にはシスプラチンとの併用において, D 法を使用。 A 法: 1 日 1 回 210mg/m ² を 3 時間かけて点滴静注し, 少なくとも 3 週間休薬, これを 1 クールとして繰り返す。 B 法: 1 日 1 回 100mg/m ² を 1 時間かけて点滴静注し, 週 1 回投与を 6 週連続し, 少なくとも 2 週間休薬, これを 1 クールとして繰り返す。 C 法: 1 日 1 回 80mg/m ² を 1 時間かけて点滴静注し, 週 1 回投与を 3 週連続する, これを 1 クールとして繰り返す。 D 法: 1 日 1 回 135mg/m ² を 24 時間かけて点滴静注し, 少なくとも 3 週間休薬, これを 1 クールとして繰り返す。 E 法: 1 日 1 回 80mg/m ² を 1 時間かけて点滴静注し, 週 1 回投与を 3 週連続し, 少なくとも 2 週間休薬, これを 1 クールとして繰り返す
ビノレルピン酒石酸塩 <u>ロゼウス静注液 10mg</u> ● Rozeus (日本化薬) 10mg1mL/V 【薬価】 2,268.00 円 / 瓶 <u>ロゼウス静注液 40mg</u> ● Rozeus (日本化薬) 40mg4mL/V 【薬価】 8,014.00 円 / 瓶	【効】 ①非小細胞肺癌. ②手術不能又は再発乳癌 【用】 (注) ① 1 回 20 ~ 25mg/m ² を 1 週間間隔で緩徐に静注. 1 回 25mg/m ² まで. ② 1 回 25mg/m ² を 1 週間間隔で 2 週連続投与し, 3 週目は休薬, 年齢, 症状により適宜減量
ビンクリスチン硫酸塩 <u>オンコビン注射用 1mg</u> ● Oncovin (日本化薬) 1mg/V 【薬価】 1,988.00 円 / 瓶	【効】 ①白血病 (急性白血病, 慢性白血病の急性転化時を含む), 悪性リンパ腫 (細網肉腫, リンパ肉腫, ホジキン病), 小児腫瘍 (神経芽腫, ウイルムス腫瘍, 横紋筋肉腫, 睾丸胎児性癌, 血管肉腫等). 次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: ②多発性骨髄腫. ③悪性星細胞腫, 乏突起膠腫成分を有する神経膠腫. ④褐色細胞腫 【用】 (注) ① 0.02 ~ 0.05mg/kg, 小児 0.05 ~ 0.1mg/kg を週 1 回静注. 副作用を避けるため, 1 回量 2mg まで. ②ドキシソルピシン塩酸塩, デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムとの併用において, 1 日量 0.4mg を 24 時間持続静注. これを 4 日間連続で行い, その後 17 ~ 24 日間休薬. これを 1 クールとし, 繰り返す. ③ 1.4mg/m ² を, 2 回静注. 1 回目の投与の 3 週間後に 2 回目の投与を行い, 6 ~ 8 週を 1 クールとし, 繰り返す. 副作用を避けるため, 1 回量 2mg まで. ④シクロホスファミド水和物, ダカルバジンとの併用において, 1 日 1 回 1.4mg/m ² を静注し, 少なくとも 20 日間休薬. これを 1 クールとし, 繰り返す. 但し, 副作用を避けるため, 1 回量 2mg まで
ビンデシン硫酸塩 <u>注射用フィルデシン 1mg</u> ● Fildesin (日医工) 1mg/V 【薬価】 3,880.00 円 / 瓶	【効】 次記疾患の自覚的並びに他覚的症状の寛解: ①急性白血病 (慢性骨髄性白血病の急性転化を含む), 悪性リンパ腫. ②肺癌, 食道癌 【用】 (注) ① 1 回 3mg (0.06mg/kg), 小児: 1 回 0.07 ~ 0.1mg/kg, を 1 週間間隔で静注. ② 1 回 3 ~ 4.5mg (0.06 ~ 0.09mg/kg) を 1 週間間隔で静注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ビンブラスチン硫酸塩 <u>エクザール注射用 10mg</u> Ⓢ Exal (日本化薬) 10mg/V 【薬価】 2,214.00 円 / 瓶	【効】 ◇ビンブラスチン硫酸塩通常療法:次記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解: ①悪性リンパ腫, 絨毛性疾患 (絨毛癌, 破壊胞状奇胎, 胞状奇胎). ②再発又は難治性の胚細胞腫瘍 (精巣腫瘍, 卵巣腫瘍, 性腺外腫瘍). ③ランゲルハンス細胞組織球症. ◇M-VAC療法:④尿路上皮癌 【用】 (注)①白血球数を指標とし, 初め週1回0.1mg/kgを静注. 次いで0.05mg/kgずつ増量して, 週1回0.3mg/kgを静注. ②確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法を行い, 1日量0.11mg/kgを1日1回2日間静注し, 19~26日間休薬. これを1コースとし, 繰り返す. ③1回6mg/m ² を, 導入療法においては週1回, 維持療法においては2~3週に1回, 静注. ④メトトレキサート, ドキソルピシン塩酸塩及びシスプラチンとの併用において, 1回3mg/m ² を静注. 前回の投与によって副作用が現れた場合, 減量するか又は副作用が消失するまで休薬. 標準的な投与量及び投与方法は, メトトレキサート30mg/m ² を1日目に投与した後, 2日目にビンブラスチン硫酸塩3mg/m ² , ドキソルピシン塩酸塩30mg/m ² 及びシスプラチン70mg/m ² を静注. 15日目及び22日目に, メトトレキサート30mg/m ² 及びビンブラスチン硫酸塩3mg/m ² を静注. これを1コースとし4週ごとに繰り返す

429. その他の腫瘍用薬

4291. その他の抗悪性腫瘍用剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アキシチニブ <u>インライタ錠 1mg</u> Ⓢ Inlyta (ファイザー) 1mg/T 【薬価】 1,525.40 円 / T <u>インライタ錠 5mg</u> Ⓢ Inlyta (ファイザー) 5mg/T 【薬価】 6,910.00 円 / T	【効】 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 【用】 (内) 1回5mgを1日2回. 1回10mg1日2回まで増量可
アザシチジン <u>ビダーザ注射用 100mg</u> Ⓢ Vidaza (日本新薬) 100mg/瓶 【薬価】 24,103.00 円 / 瓶	【効】 骨髄異形成症候群. 急性骨髄性白血病 【用】 (注) 75mg/m ² を1日1回7日間皮下注又は10分かけて点滴静注し, 3週間休薬. これを1サイクルとし, 繰り返す
アシミニブ塩酸塩 <u>セムブリックス錠 20mg</u> Ⓢ Scemblix (ノバルティス) 20mg/T 【薬価】 5,564.50 円 / T <u>セムブリックス錠 40mg</u> Ⓢ Scemblix (ノバルティス) 40mg/T 【薬価】 10,618.30 円 / T	【効】 前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病 【用】 (内) 1回40mgを1日2回, 空腹時. 患者の状態により適宜減量

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アテゾリズマブ（遺伝子組換え） テセントリク点滴静注 1200mg Ⓜ(生)</p> <p>Tecentriq (中外) 1200mg/Vi 【薬価】563,917.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】①切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ② PD-L1 陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法. ③進展型小細胞肺癌. ④切除不能な肝細胞癌</p> <p>【用】(注) ①化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。化学療法未治療のPD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌：1回 1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間で短縮可。化学療法既治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌：1回 1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。②1回 1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注する。投与期間は12か月間までとする。なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。③カルボプラチン及びエトポシドとの併用において、1回 1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。④ペバシズマブ（遺伝子組換え）との併用において、1回 1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可</p>
<p>アナストロゾール アリミデックス錠 1mg Ⓜ</p> <p>Arimidex (アストラゼネカ) 1mg/T 【薬価】166.80 円 / T</p>	<p>【効】閉経後乳癌 【用】(内) 1mgを1日1回</p>
<p>アパルタミド アーリーダ錠 60mg Ⓜ</p> <p>Erlveda (ヤンセン) 60mg/T 【薬価】2,036.00 円 / T</p>	<p>【効】①遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌. ②遠隔転移を有する前立腺癌 【用】(内) 1日1回 240mg. 患者の状態により適宜減量</p>
<p>アピラテロン酢酸エステル ザイティガ錠 250mg Ⓜ</p> <p>Zytiga (ヤンセン) 250mg/T 【薬価】3,759.30 円 / T</p>	<p>【効】去勢抵抗性前立腺癌, 内分泌療法未治療のハイリスクの予後因子を有する前立腺癌 【用】(内) プレドニゾンとの併用において、1日1回 1,000mgを空腹時に</p>
<p>アファチニブマレイン酸塩 ジオトリフ錠 40mg Ⓜ</p> <p>Giotrif (日本ベーリンガー) 40mg/T 【薬価】8,629.20 円 / T</p>	<p>【効】EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌 【用】(内) アファチニブとして1日1回 40mgを空腹時. 1日1回 50mgまで増量可</p>
<p>アフリベルセプトベータ（遺伝子組換え） ザルトラップ点滴静注 100mg Ⓜ(生)</p> <p>Zaltrap (サノフィ) 4mL/Vi 【薬価】65,650.00 円 / 瓶 ザルトラップ点滴静注 200mg Ⓜ(生)</p> <p>Zaltrap (サノフィ) 8mL/Vi 【薬価】127,409.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 【用】(注) イリノテカン塩酸塩水和物, レボホリナート及びフルオロウラシルとの併用において、2週間に1回、アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）として1回 4mg/kg（体重）を60分かけて点滴静注。患者の状態により適宜減量</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アベマシクリブ ページニオ錠 50mg Ⓢ Verzenio (日本イーライリリー) 50mg/T 【薬価】3,049.70 円/T ページニオ錠 100mg Ⓢ Verzenio (日本イーライリリー) 100mg/T 【薬価】5,567.70 円/T ページニオ錠 150mg Ⓢ Verzenio (日本イーライリリー) 150mg/T 【薬価】7,917.50 円/T</p>	<p>【効】 ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌. ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 【用】(内) 内分泌療法剤との併用において, 1回 150mgを1日2回. 術後薬物療法の場合には, 投与期間は24か月間まで. 患者の状態により適宜減量</p>
<p>アベルマブ (遺伝子組換え) バベンチオ点滴静注 200mg Ⓢ Bavencio (メルクバイオ) 200mg 10mL/Vi 【薬価】166,397.00 円/瓶</p>	<p>【効】 ①根治切除不能なメルケル細胞癌. ②根治切除不能又は転移性の腎細胞癌. ③根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法 【用】(注) ①③1回 10mg/kg (体重)を2週間間隔で1時間以上かけて点滴静注. ②アキシチニブとの併用において, 1回 10mg/kg (体重)を2週間間隔で1時間以上かけて点滴静注</p>
<p>アレクチニブ塩酸塩 アレセンサカプセル 150mg Ⓢ Alecensa (中外) 150mg/cap 【薬価】6,737.10 円/cap</p>	<p>【効】 ① ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ②再発又は難治性の ALK 融合遺伝子陽性の未分化大細胞リンパ腫 【用】(内) ①1回 300mgを1日2回. ②1回 300mgを1日2回経口投与する. 体重35kg未満の場合の1回投与量は150mg</p>
<p>イクサゾミブクエン酸エステル ニンラーロカプセル 3mg Ⓢ Ninlaro (武田) 3mg/cap 【薬価】125,640.00 円/cap ニンラーロカプセル 4mg Ⓢ Ninlaro (武田) 4mg/cap 【薬価】163,865.40 円/cap</p>	<p>【効】 ①再発又は難治性の多発性骨髄腫. ②多発性骨髄腫における維持療法 【用】(内) ①レナリドミド及びデキサメタゾンとの併用において, 1日1回4mgを空腹時に週1回, 3週間(1, 8及び15日目)投与した後, 13日間休業(16～28日目). この4週間を1サイクルとし, 投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量. ②成人には1日1回, 空腹時に週1回, 3週間(1, 8及び15日目)投与した後, 13日間休業(16～28日目). この4週間を1サイクルとし, 投与を繰り返す. 4サイクルまでは3mg, 5サイクル以降は4mgとする. 患者の状態により適宜減量</p>
<p>イサツキシマブ (遺伝子組換え) サークリサ点滴静注 100mg Ⓢ Sarclisa (サノフィ) 100mg5mL/V 【薬価】64,699.00 円/瓶 サークリサ点滴静注 500mg Ⓢ Sarclisa (サノフィ) 500mg25mL/V 【薬価】285,944.00 円/瓶</p>	<p>【効】 再発又は難治性の多発性骨髄腫 【用】(注) ボマリドミド及びデキサメタゾン併用投与又はカルフィルゾミブ及びデキサメタゾン併用投与: 1回 10mg/kgを点滴静注. 28日間を1サイクルとし, 最初のサイクルは1週間間隔で4回(1, 8, 15, 22日目), 2サイクル以降は2週間間隔で2回(1, 15日目)点滴静注. デキサメタゾン併用投与又は単独投与: 1回 20mg/kgを点滴静注. 28日間を1サイクルとし, 最初のサイクルは1週間間隔で4回(1, 8, 15, 22日目), 2サイクル以降は2週間間隔で2回(1, 15日目)点滴静注</p>

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イビリムマブ（遺伝子組換え） <u>ヤーボイ点滴静注液 20mg</u> ㉞ ㉟ Yervoy（プリストル・マイヤーズ） 20mg 4mL/瓶 【薬価】 170,598.00 円 / 瓶 <u>ヤーボイ点滴静注液 50mg</u> ㉞ ㉟ Yervoy（プリストル・マイヤーズ） 50mg/10mL/V 【薬価】 419,578.00 円 / 瓶	【効】 ①根治切除不能な悪性黒色腫。②根治切除不能又は転移性の腎細胞癌。③がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌。④切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌。⑤切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫。⑥根治切除不能な進行・再発の食道癌 【用】（注） ① 1日1回 3mg/kg（体重）を3週間間隔で4回点滴静注。他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、ニボルマブ（遺伝子組換え）と併用。②③ニボルマブ（遺伝子組換え）との併用において、1回 1mg/kg（体重）を3週間間隔で4回点滴静注。④他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 1mg/kg（体重）を6週間間隔で点滴静注。⑤⑥ニボルマブ（遺伝子組換え）との併用において、1回 1mg/kg（体重）を6週間間隔で点滴静注
イブルチニブ <u>イムブルピカカプセル 140mg</u> ㉞ Imbruvica（ヤンセン） 140mg/T/cap 【薬価】 8,848.10 円 / cap	【効】 ①慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）。②原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫。③マントル細胞リンパ腫。④造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合） 【用】（内） ①② 420mgを1日1回。患者の状態により適宜減量。③未治療の場合：ベンダムスチン塩酸塩及びリツキシマブ（遺伝子組換え）との併用において、560mgを1日1回経口投与。患者の状態により適宜減量。再発又は難治性：560mgを1日1回。患者の状態により適宜減量。④成人及び12歳以上の小児に420mgを1日1回。患者の状態により適宜減量
イマチニブメシル酸塩 <u>グリベック錠 100mg</u> ㉞ Glivec（ノバルティス） 100mg/T 【薬価】 1,644.50 円 / T	【効】 ①慢性骨髄性白血病。②フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病。③KIT（CD117）陽性消化管間質腫瘍。④FIP1L1-PDGFR α 陽性の次期疾患：好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病 【用】（内） ① 1) 慢性期：1日1回 400mgを食後。1日1回 600mgまで増量可。2) 移行期又は急性期：1日1回 600mgを食後。1日 800mg（400mgを1日2回）まで増量可。② 1日1回 600mgを食後。適宜減量。③ 1日1回 400mgを食後。適宜減量。④ 1日1回 100mgを食後。1日1回 400mgまで増量可
エキセメスタン <u>アロマシン錠 25mg</u> Aromasin（ファイザー） 25mg/T 【薬価】 182.70 円 / T <u>㊦エキセメスタン錠 25mg〔VTRS〕</u> Exemestane（ヴィアトリス） 25mg/T 【薬価】 126.30 円 / T 【先発品】 アロマシン錠 25mg	【効】 閉経後乳癌 【用】（内） 1日1回 25mgを食後
エベロリムス <u>アフィニトール錠 5mg</u> ㉞ Afinitor（ノバルティス） 5mg/T 【薬価】 9,560.60 円 / T	【効】 ①根治切除不能又は転移性の腎細胞癌。②神経内分泌腫瘍。③手術不能又は再発乳癌。④結節性硬化症 【用】（内） ①② 1日1回 10mg。③内分泌療法剤との併用において、1日1回 10mg。患者の状態により適宜減量。④成人の結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫：1日1回 10mg。前記以外：3.0mg/m ² を1日1回
L-アスパラギナーゼ <u>ロイナーゼ注用 5000</u> ㉞ Leunase（協和キリン） 5,000K 単位 1 瓶 【薬価】 4,850.00 円 / 瓶	【効】 ①急性白血病（慢性白血病の急性転化例を含む）。②悪性リンパ腫 【用】（注） （静脈内投与）1日 50～200K.U./kgを連日又は隔日に点滴静注。（筋肉内投与）1日1回 10000K.U./m ² を週3回、又は1日1回 25000K.U./m ² を週1回、筋注
エルロチニブ塩酸塩 <u>タルセバ錠 150mg</u> ㉞ Tarceva（中外） 150mg/T 【薬価】 5,368.50 円 / T	【効】 ①切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌。②EGFR 遺伝子変異陽性の切除不能な再発・進行性で、がん化学療法未治療の非小細胞肺癌 【用】（内） 150mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日1回。適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エロツズマブ（遺伝子組換え） <u>エムプリシティ点滴静注用 300mg</u> ㊟ ㊟ Empliciti （ブリストル・マイヤーズ） 300mg/V 【薬価】 162,608.00 円 / 瓶 <u>エムプリシティ点滴静注用 400mg</u> ㊟ ㊟ Empliciti （ブリストル・マイヤーズ） 400mg/V 【薬価】 212,305.00 円 / 瓶	【効】 再発又は難治性の多発性骨髄腫 【用】 (注) <レナリドミド及びデキサメタゾンとの併用> 1回 10mg/kgを点滴静注. 28日間を1サイクルとし, 最初の2サイクルは1週間間隔で4回(1, 8, 15, 22日目), 3サイクル以降は2週間間隔で2回(1, 15日目)点滴静注. <ボマリドミド及びデキサメタゾン併用> 28日間を1サイクルとし, 最初の2サイクルは1回 10mg/kgを1週間間隔で4回(1, 8, 15, 22日目), 3サイクル以降は1回 20mg/kgを4週間間隔(1日目)で点滴静注
エンザルタミド <u>イクスタンジ錠 80mg</u> ㊟ Xtandi (アステラス) 80mg/T 【薬価】 4,101.80 円 / T	【効】 ①去勢抵抗性前立腺癌, ②遠隔転移を有する前立腺癌 【用】 (内) 160mgを1日1回
エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え） <u>パドセブ点滴静注用 30mg</u> ㊟ ㊟ Padcev (アステラス) 30mg/瓶 【薬価】 91,444.00 円 / 瓶	【効】 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌 【用】 (注) 1回 1.25mg/kg (体重)を30分以上かけて点滴静注し, 週1回投与を3週連続し, 4週目は休薬. これを1サイクルとして投与を繰り返す. 1回量として125mgを超えないこと. 患者の状態により適宜減量
オキサリプラチン <u>エルプラット点滴静注液 50mg</u> ㊟ Elplat (高田) 50mg10mL/V 【薬価】 12,419.00 円 / 瓶 <u>エルプラット点滴静注液 100mg</u> ㊟ Elplat (高田) 100mg20mL/V 【薬価】 21,988.00 円 / 瓶	【効】 ①治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌, ②結腸癌における術後補助療法, ③治癒切除不能な膵癌, ④胃癌, ⑤小腸癌 【用】 (注) ①②にはA法又はB法を, ③⑤にはA法を, ④にはB法を使用. A法: 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 85mg/m ² を1日1回2時間で点滴静注し, 少なくとも13日間休薬. これを1サイクルとして繰り返す. B法: 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 130mg/m ² を1日1回2時間で点滴静注し, 少なくとも20日間休薬. これを1サイクルとして繰り返す
オシメルチニブメシル酸塩 <u>タグリッソ錠 40mg</u> ㊟ Tagrisso (アストラゼネカ) 40mg/T 【薬価】 9,670.00 円 / T <u>タグリッソ錠 80mg</u> ㊟ Tagrisso (アストラゼネカ) 80mg/T 【薬価】 18,540.20 円 / T	【効】 EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌, EGFR 遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法 【用】 (内) 80mgを1日1回. 術後補助療法の場合は, 投与期間は36か月間まで. 患者の状態により適宜減量

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>オビヌツズマブ（遺伝子組換え） ガザイバ点滴静注 1000mg Ⓢ Gazyva (中外) 1,000mg/40mL1 瓶 【薬価】 458,799.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ① CD20 陽性の濾胞性リンパ腫. ② CD20 陽性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） 【用】（注） ① 1 日 1 回 1000mg を点滴静注. 導入療法は, 次記のサイクル期間及び投与サイクル数とし, 1 サイクル目は 1, 8, 15 日目, 2 サイクル目以降は 1 日目に投与. 維持療法では, 単独投与により 2 か月に 1 回, 最長 2 年間, 投与を繰り返す. シクロホスファミド水和物, ドキソルビシン塩酸塩, ビンクリスチン硫酸塩及びブレドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用の場合: 3 週間を 1 サイクルとし, 8 サイクル. シクロホスファミド水和物, ビンクリスチン硫酸塩及びブレドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用の場合: 3 週間を 1 サイクルとし, 8 サイクル. ベンダムスチン塩酸塩併用の場合: 4 週間を 1 サイクルとし, 6 サイクル. ② アカラブルチニブとの併用において, アカラブルチニブとの併用での 1 サイクル目の 1 日目に 100mg, 2 日目に 900mg, 8 日目及び 15 日目に 1000mg, 2 サイクル目以降は 1 日目に 1000mg を点滴静注. 28 日間を 1 サイクルとし, 最大で 6 サイクル投与を繰り返す</p>
<p>オラパリブ リムパーザ錠 150mg (院外) Ⓢ Lynparza (アストラゼネカ) 150mg/T 【薬価】 4,788.00 円 / T</p>	<p>【効】 ① 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法. ② BRCA 遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法. ③ 相同組換え修復欠損を有する卵巣癌におけるベバシズマブ（遺伝子組換え）を含む初回化学療法後の維持療法. ④ がん化学療法歴のある BRCA 遺伝子変異陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌. ⑤ BRCA 遺伝子変異陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法. ⑥ BRCA 遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌. ⑦ BRCA 遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵癌における白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法 【用】（内） ①②⑦ 1 回 300mg を 1 日 2 回. 患者の状態により適宜減量. ③ ベバシズマブ（遺伝子組換え）との併用において, 1 回 300mg を 1 日 2 回. 患者の状態により適宜減量. ④⑤ 1 回 300mg を 1 日 2 回, 術後薬物療法の場合, 投与期間は 1 年間まで. 患者の状態により適宜減量. ⑥ 1 回 300mg を 1 日 2 回. 他の薬剤と併用する場合は, アビラテロン酢酸エステル及びブレドニゾロンと併用. 患者の状態により適宜減量</p>
<p>カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 10mg (院内) Ⓢ Kyprolis (小野) 10mg/ 瓶 【薬価】 24,426.00 円 / 瓶 カイプロリス点滴静注用 40mg (院内) Ⓢ Kyprolis (小野) 40mg/ 瓶 【薬価】 84,315.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 再発又は難治性の多発性骨髄腫 【用】（注） レナリドミド及びデキサメタゾンとの併用の場合: 1 日 1 回, 本剤を 1, 2, 8, 9, 15 及び 16 日目に点滴静注し, 12 日間休薬. この 28 日間を 1 サイクルとし, 12 サイクルまで投与を繰り返す. 13 サイクル以降は, 1 日 1 回, 1, 2, 15 及び 16 日目に本剤を点滴静注し, 12 日間休薬する. 本剤の投与量は, 1 サイクル目の 1 及び 2 日目のみ 20mg/m² (体表面積), それ以降は 27mg/m² (体表面積) とし, 10 分かけて点滴静注. なお, 患者の状態により適宜減量. デキサメタゾン併用の場合: 〈週 2 回投与の場合〉 1 日 1 回, 本剤を 1, 2, 8, 9, 15 及び 16 日目に点滴静注し, 12 日間休薬. この 28 日間を 1 サイクルとし, 投与を繰り返す. 本剤の投与量は, 1 サイクル目の 1 及び 2 日目のみ 20mg/m² (体表面積), それ以降は 56mg/m² (体表面積) とし, 30 分かけて点滴静注. なお, 患者の状態により適宜減量. 〈週 1 回投与の場合〉 1 日 1 回, 本剤を 1, 8 及び 15 日目に点滴静注し, 13 日間休薬. この 28 日間を 1 サイクルとし, 投与を繰り返す. 本剤の投与量は, 1 サイクル目の 1 日目のみ 20mg/m² (体表面積), それ以降は 70mg/m² (体表面積) とし, 30 分かけて点滴静注. なお, 患者の状態により適宜減量</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カルボプラチン カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」  Carboplatin (日本化薬) 50mg5mL/V 【薬価】 1,474.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①頭頸部癌，肺小細胞癌，睾丸腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌，悪性リンパ腫，非小細胞肺癌。②乳癌。③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（神経芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍，再発又は難治性ユースティング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）。④次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（網膜芽腫）</p> <p>【用】（注） 投与量に応じて 250mL 以上のブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和し，30 分以上かけて点滴静注。① 1 日 1 回 300～400mg/m²を投与し，少なくとも 4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。② (1) トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用において，1 日 1 回 300～400mg/m²を投与し，少なくとも 3 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。(2) PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌に対するペムプロリズマブ（遺伝子組換え）及びゲムシタピン塩酸塩との併用において，1 日 1 回 AUC2mg・min/mL 相当量を投与する。週 1 回投与を 2 週連続し，3 週目は休薬する。これを 1 クールとし，投与を繰り返す。投与量は，患者の状態により適宜減ずる。(3) ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌に対する術前薬物療法として，ペムプロリズマブ（遺伝子組換え）及びパクリタキセルとの併用において，次記のいずれかの用法・用量で投与。なお，投与量は，患者の状態により適宜減ずる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1 日 1 回 AUC5mg・min/mL 相当量を投与し，少なくとも 3 週間休薬。これを 1 クールとし，4 クールまで投与 ・1 日 1 回 AUC1.5mg・min/mL 相当量を投与し，少なくとも 6 日間休薬。週 1 回投与を 3 週連続し，これを 1 クールとし，4 クールまで投与。 <p>③イホスファミドとエトポシドとの併用療法において，635mg/m²を 1 日間点滴静注又は 400mg/m²を 2 日間点滴静注し，少なくとも 3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる。1 歳未満もしくは体重 10kg 未満の小児に対して，投与量には十分配慮。④ビンクリスチン硫酸塩とエトポシドとの併用療法において，560mg/m²を 1 日間点滴静注し，少なくとも 3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。36 か月齢以下の患児には 18.6mg/kg とする。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる</p>
<p>カルボプラチン カルボプラチン点滴静注液 50mg 「サンド」  Carboplatin (サンド) 50mg5mL/V 【薬価】 1,474.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①頭頸部癌，肺小細胞癌，睾丸腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌，悪性リンパ腫，非小細胞肺癌。②乳癌。③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（神経芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍，再発又は難治性ユースティング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）。④次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（網膜芽腫）</p> <p>【用】（注） 投与量に応じて 250mL 以上のブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和し，30 分以上かけて点滴静注。① 1 日 1 回 300～400mg/m²を投与し，少なくとも 4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。②トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用において，1 日 1 回 300～400mg/m²を投与し，少なくとも 3 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。③イホスファミドとエトポシドとの併用療法において，635mg/m²を 1 日間点滴静注又は 400mg/m²を 2 日間点滴静注し，少なくとも 3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる。1 歳未満もしくは体重 10kg 未満の小児に対して，投与量には十分配慮。④ビンクリスチン硫酸塩とエトポシドとの併用療法において，560mg/m²を 1 日間点滴静注し，少なくとも 3～4 週間休薬。これを 1 クールとし，繰り返す。36 か月齢以下の患児には 18.6mg/kg とする。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる</p>

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カルボプラチン カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」  Carboplatin (日本化薬) 150mg15mL/V 【薬価】 3,417.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①頭頸部癌，肺小細胞癌，睾丸腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌，悪性リンパ腫，非小細胞肺癌。②乳癌。③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（神経芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍，再発又は難治性ユースティング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）。④次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（網膜芽腫）</p> <p>【用】（注） 投与量に応じて250mL以上のブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和し，30分以上かけて点滴静注。①1日1回300～400mg/m²を投与し，少なくとも4週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。②(1)トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用において，1日1回300～400mg/m²を投与し，少なくとも3週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。(2)PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌に対するペムプロリズマブ（遺伝子組換え）及びゲムシタピン塩酸塩との併用において，1日1回AUC2mg・min/mL相当量を投与する。週1回投与を2週連続し，3週目は休薬する。これを1クールとし，投与を繰り返す。投与量は，患者の状態により適宜減ずる。(3)ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌に対する術前薬物療法として，ペムプロリズマブ（遺伝子組換え）及びパクリタキセルとの併用において，次記のいずれかの用法・用量で投与。なお，投与量は，患者の状態により適宜減ずる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1日1回AUC5mg・min/mL相当量を投与し，少なくとも3週間休薬。これを1クールとし，4クールまで投与 ・1日1回AUC1.5mg・min/mL相当量を投与し，少なくとも6日間休薬。週1回投与を3週連続し，これを1クールとし，4クールまで投与。 <p>③イホスファミドとエトポシドとの併用療法において，635mg/m²を1日間点滴静注又は400mg/m²を2日間点滴静注し，少なくとも3～4週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる。1歳未満もしくは体重10kg未満の小児に対して，投与量には十分配慮。④ビンクリスチン硫酸塩とエトポシドとの併用療法において，560mg/m²を1日間点滴静注し，少なくとも3～4週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。36か月齢以下の患児には18.6mg/kgとする。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる</p>
<p>カルボプラチン ④カルボプラチン点滴静注液 150mg「サンド」  Carboplatin (サンド) 150mg15mL/V 【薬価】 2,277.00 円 / 瓶 【先発品】 パラプラチン注射液 150mg，カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」，カルボプラチン注射液 150mg「日医工」，カルボプラチン点滴静注液 150mg「SW」</p>	<p>【効】 ①頭頸部癌，肺小細胞癌，睾丸腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌，悪性リンパ腫，非小細胞肺癌。②乳癌。③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（神経芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍，再発又は難治性ユースティング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）。④次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：小児悪性固形腫瘍（網膜芽腫）</p> <p>【用】（注） 投与量に応じて250mL以上のブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和し，30分以上かけて点滴静注。①1日1回300～400mg/m²を投与し，少なくとも4週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。②トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用において，1日1回300～400mg/m²を投与し，少なくとも3週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。③イホスファミドとエトポシドとの併用療法において，635mg/m²を1日間点滴静注又は400mg/m²を2日間点滴静注し，少なくとも3～4週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる。1歳未満もしくは体重10kg未満の小児に対して，投与量には十分配慮。④ビンクリスチン硫酸塩とエトポシドとの併用療法において，560mg/m²を1日間点滴静注し，少なくとも3～4週間休薬。これを1クールとし，繰り返す。36か月齢以下の患児には18.6mg/kgとする。投与量及び投与日数は疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カルボプラチン カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」</p> <p>Ⓢ Carboplatin (日本化薬) 450mg/45mL/V 【薬価】 8,097.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①頭頸部癌, 肺小細胞癌, 睾丸腫瘍, 卵巣癌, 子宮頸癌, 悪性リンパ腫, 非小細胞肺癌. ②乳癌. ③次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 小児悪性固形腫瘍 (神経芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍, 再発又は難治性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫). ④次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 小児悪性固形腫瘍 (網膜芽腫)</p> <p>【用】 (注) 投与量に応じて 250mL 以上のブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和し, 30 分以上かけて点滴静注. ① 1 日 1 回 300 ~ 400mg/m² を投与し, 少なくとも 4 週間休業. これを 1 クールとし, 繰り返す. ② (1) トラスツズマブ (遺伝子組換え) 及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用において, 1 日 1 回 300 ~ 400mg/m² を投与し, 少なくとも 3 週間休業. これを 1 クールとし, 繰り返す. (2) PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌に対するペムプロリズマブ (遺伝子組換え) 及びゲムシタピン塩酸塩との併用において, 1 日 1 回 AUC2mg・min/mL 相当量を投与する. 週 1 回投与を 2 週連続し, 3 週目は休業する. これを 1 クールとし, 投与を繰り返す. 投与量は, 患者の状態により適宜減ずる. (3) ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌に対する術前薬物療法として, ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) 及びパクリタキセルとの併用において, 次記のいずれかの用法・用量で投与. なお, 投与量は, 患者の状態により適宜減ずる.</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1 日 1 回 AUC5mg・min/mL 相当量を投与し, 少なくとも 3 週間休業. これを 1 クールとし, 4 クールまで投与 ・1 日 1 回 AUC1.5mg・min/mL 相当量を投与し, 少なくとも 6 日間休業. 週 1 回投与を 3 週連続し, これを 1 クールとし, 4 クールまで投与. ③イホスファミドとエトポシドとの併用療法において, 635mg/m² を 1 日間点滴静注又は 400mg/m² を 2 日間点滴静注し, 少なくとも 3 ~ 4 週間休業. これを 1 クールとし, 繰り返す. 投与量及び投与日数は疾患, 症状, 併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる. 1 歳未満もしくは体重 10kg 未満の小児に対して, 投与量には十分配慮. ④ビンクリスチン硫酸塩とエトポシドとの併用療法において, 560mg/m² を 1 日間点滴静注し, 少なくとも 3 ~ 4 週間休業. これを 1 クールとし, 繰り返す. 36 か月齢以下の患児には 18.6mg/kg とする. 投与量及び投与日数は疾患, 症状, 併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる
<p>クラドリン ロイスタチン注 8mg</p> <p>Ⓢ Leustatin (ヤンセン) 8mg / 瓶 【薬価】 68,692.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①ヘアリーセル白血病. ②再発・再燃又は治療抵抗性の次の疾患: 低悪性度又はろ胞性 B 細胞性非ホジキンリンパ腫, マントル細胞リンパ腫</p> <p>【用】 (注) ① 1 日量 0.09mg/kg の 7 日間持続点滴静注を 1 コースとする. ② (1) 7 日間持続点滴静注: 1 日量 0.09mg/kg を 7 日間持続点滴静注, 3 ~ 5 週間休業, これを 1 コースとして繰り返す. (2) 2 時間点滴静注・5 日間連日投与: 1 日量 0.12mg/kg を 1 日 1 回 2 時間かけて点滴静注. これを 5 日間連日行い, 少なくとも 23 日間休業. これを 1 コースとし, 繰り返す</p>
<p>クリゾチニブ ザーコリカプセル 250mg</p> <p>Ⓢ Xalkori (ファイザー) 250mg/cap 【薬価】 11,054.00 円 / cap</p>	<p>【効】 ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ROS1 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌</p> <p>【用】 (内) 1 回 250mg を 1 日 2 回. 適宜減量</p>
<p>ゲフィチニブ ⑧ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(院内)</p> <p>Ⓢ Gefitinib (第一三共エスファ) 250mg/T 【薬価】 1,360.30 円 / T 【先発品】 イレッサ錠 250</p>	<p>【効】 EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌</p> <p>【用】 (内) 250mg を 1 日 1 回</p>
<p>三酸化ヒ素 トリセノックス点滴静注 12mg</p> <p>Ⓢ Trisenox (日本新薬) 12mg / 瓶 【薬価】 27,423.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 再発又は難治性の急性前骨髄球性白血病</p> <p>【用】 (注) 0.15mg/kg を 5% ブドウ糖液あるいは生理食塩液に混合して 100 ~ 250mL とし, 1 ~ 2 時間かけて投与. (1) 寛解導入療法: 骨髄寛解が得られるまで 1 日 1 回静脈内投与. 合計の投与回数は 60 回まで. (2) 寛解後療法: 寛解が得られた場合には, 寛解導入終了後 3 ~ 6 週間後に開始. 5 週間の間に 1 日 1 回, 計 25 回静脈内投与</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
シスプラチン <u>シスプラチン点滴静注 10mg「マ ルコ」</u> Ⓢ Cisplatin (日医工) 10mg/瓶 【薬価】 1,016.00 円 / 瓶 <u>シスプラチン点滴静注 50mg「マ ルコ」</u>	【効】 ①シスプラチン通常療法 1) 睾丸腫瘍, 膀胱癌, 腎盂・尿管腫瘍, 前立腺癌, 卵巣癌, 頭頸部癌, 非小細胞肺癌, 食道癌, 子宮頸癌, 神経芽細胞腫, 胃癌, 小細胞肺癌, 骨肉腫, 胚細胞腫瘍 (精巣腫瘍, 卵巣腫瘍, 性腺外腫瘍), 悪性胸膜中皮腫, 胆道癌. 2) 次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 悪性骨腫瘍, 子宮体癌 (術後化学療法, 転移・再発時化学療法), 再発・難治性悪性リンパ腫, 小児悪性固形腫瘍 (横紋筋肉腫, 神経芽腫, 肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍, 髓芽腫等) ② M-VAC 療法 尿路上皮癌
Ⓢ Cisplatin (日医工) 50mg/瓶 【薬価】 3,363.00 円 / 瓶	【用】(注) ①シスプラチン通常療法 1) 次の標準的用法・用量による療法を行い, 患者の状態により()内の療法を選択し1クール内容を繰り返す. 睾丸腫瘍, 膀胱癌, 腎盂・尿管腫瘍, 前立腺癌には A 法 (C 法), 卵巣癌には B 法 (A 法, C 法), 頭頸部癌には D 法 (B 法), 非小細胞肺癌には E 法 (F 法), 食道癌には B 法 (A 法), 子宮頸癌には A 法 (E 法), 神経芽細胞腫, 胃癌, 小細胞肺癌には E 法, 骨肉腫には G 法, 胚細胞腫瘍には確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法として F 法, 悪性胸膜中皮腫にはペメトレキセドとの併用療法として H 法, 胆道癌にはゲムシタピン塩酸塩との併用療法として I 法を選択する. A 法: 1日1回 15~20mg/m ² 投与, 5日間連続し, 少なくとも2週間休薬. B 法: 1日1回 50~70mg/m ² 投与し, 少なくとも3週間休薬. C 法: 1日1回 25~35mg/m ² 投与し, 少なくとも1週間休薬. D 法: 1日1回 10~20mg/m ² 投与, 5日間連続し, 少なくとも2週間休薬. E 法: 1日1回 70~90mg/m ² 投与し, 少なくとも3週間休薬. F 法: 1日1回 20mg/m ² 投与, 5日間連続し, 少なくとも2週間休薬. G 法: 1日1回 100mg/m ² 投与し, 少なくとも3週間休薬. H 法: 1日1回 75mg/m ² 投与し, 少なくとも20日間休薬. I 法: 25mg/m ² を60分かけて点滴静注し, 週1回投与を2週間連続し, 3週目は休薬.
	2) 次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の場合:(ア) 悪性骨腫瘍: ドキソルピシン塩酸塩との併用において, 1日1回 100mg/m ² 投与し, 少なくとも3週間休薬. これを1クールとし, 投与を繰り返す. 本剤単剤では, G 法を選択. (イ) 子宮体癌: ドキソルピシン塩酸塩との併用において, 1日1回 50mg/m ² 投与し, 少なくとも3週間休薬. これを1クールとし, 投与を繰り返す. (ウ) 再発・難治性悪性リンパ腫: 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1日量 100mg/m ² を1日間持続静注し, 少なくとも20日間休薬し, これを1クールとして投与を繰り返す. 又は1日量 25mg/m ² を4日間連続持続静注し, 少なくとも17日間休薬し, これを1クールとして投与を繰り返す. (エ) 小児悪性固形腫瘍 (横紋筋肉腫, 神経芽腫, 肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍, 髓芽腫等) に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1日1回 60~100mg/m ² 投与し, 少なくとも3週間休薬. これを1クールとし, 投与を繰り返す. もしくは, 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1日1回 20mg/m ² 投与, 5日間連続し, 少なくとも2週間休薬. これを1クールとし, 投与を繰り返す
	3) 本剤の投与時には腎毒性を軽減するために次の処置を行う. (ア) 投与前 1,000~2,000mL (小児 300~900mL/m ²) の適当な輸液を4時間以上 (小児2時間以上) かけて投与する. (イ) 投与時, 投与量に応じて 500~1,000mL (小児 300~900mL/m ²) の生理食塩液又はブドウ糖-食塩液に混和し, 2時間以上かけて点滴静注する. なお, 点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与する. (ウ) 投与終了後, 1,000~2,000mL (小児 600mL/m ² 以上) の適当な輸液を4時間以上 (小児3時間以上) かけて投与する. (エ) 投与中は, 尿量確保に注意し, 必要に応じてマニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する
	② M-VAC 療法 1) メトトレキサート, ビンブラスチン硫酸塩及びドキソルピシン塩酸塩との併用において, シスプラチンとして1回 70mg/m ² を静注. 標準的な投与量及び投与方法: メトトレキサート 30mg/m ² を1日目に投与した後, 2日目にビンブラスチン硫酸塩 3mg/m ² , ドキソルピシン塩酸塩 30mg/m ² 及びシスプラチン 70mg/m ² を静注. 15日目及び22日目にメトトレキサート 30mg/m ² 及びビンブラスチン硫酸塩 3mg/m ² を静注. これを1コースとし, 4週ごとに繰り返す. 2) シスプラチンの投与時には腎毒性を軽減するために, 用法の①のシスプラチン通常療法の3) に準じた処置を行う

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スニチニブリンゴ酸塩 <u>スーテントカプセル 12.5mg</u> Ⓢ Sutent (ファイザー) 12.5mg/cap 【薬価】 4,259.20 円 /cap	【効】 ①イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍, 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌, ②腓神経内分泌腫瘍 【用】(内) ① 1日1回 50mgを4週間連日, その後2週間休薬. これを1コースとして繰り返す. 適宜減量. ② 1日1回 37.5mg, 1日1回 50mgまで
セツキシマブ (遺伝子組換え) <u>アービタックス注射液 100mg</u> Ⓢ Erbitux (メルクセローノ) 100mg20mL/V 【薬価】 20,968.00 円 / 瓶	【効】 RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌, 頭頸部癌 【用】(注) 1週間間隔投与の場合: 初回は 400mg/m ² を2時間かけて, 2回目以降は 250mg/m ² を1時間かけて1週間間で点滴静注. 患者の状態により適宜減量. 2週間間隔投与の場合: 500mg/m ² を2時間かけて2週間間隔で点滴静注. 患者の状態により適宜減量
セリチニブ <u>ジカディア錠 150mg</u> Ⓢ Zykadia (ノバルティス) 150mg/T 【薬価】 6,413.60 円 /T	【効】 ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 【用】(内) 450mgを1日1回, 食後. 患者の状態により適宜減量
ソトラシブ <u>ルマケラス錠 120mg</u> Ⓢ Lumakras (アムジェン) 120mg/T 【薬価】 4,204.30 円 /T	【効】 がん化学療法後に増悪した KRAS G12C 変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 【用】(内) 960mgを1日1回. 患者の状態により適宜減量
ソラフェニブトシル酸塩 <u>ネクサバル錠 200mg</u> Ⓢ Nexavar (バイエル) 200mg/T 【薬価】 3,270.30 円 /T	【効】 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌, 切除不能な肝細胞癌, 根治切除不能な甲状腺癌 【用】(内) 1回 400mgを1日2回
ダサチニブ <u>スプリセル錠 20mg (院外)</u> Ⓢ Sprycel(ブリストル・マイヤーズ) 20mg/T 【薬価】 2,668.50 円 /T <u>スプリセル錠 50mg</u> Ⓢ Sprycel(ブリストル・マイヤーズ) 50mg/T 【薬価】 5,857.70 円 /T	【効】 ①慢性骨髄性白血病, ②再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 【用】(内) ① (1) 慢性期: 1日1回 100mg, 1日1回 140mgまで. (2) 移行期又は急性期: 1回 70mgを1日2回, 1回 90mgを1日2回まで. ② 1回 70mgを1日2回, 1回 90mgを1日2回まで
タモキシフェンクエン酸塩 <u>ノルバデックス錠 20mg</u> Nolvadex (アストラゼネカ) 20mg/T 【薬価】 79.10 円 /T	【効】 乳癌 【用】(内) 20mgを1日1回, 1日 40mgまで
グロルタミド <u>ニューベクオ錠 300mg (院外)</u> Ⓢ Nubeqa (バイエル) 300mg/T 【薬価】 2,053.90 円 /T	【効】 ①遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌, ②遠隔転移を有する前立腺癌 【用】(内) ① 1回 600mgを1日2回, 食後. 患者の状態により適宜減量. ②ドセタキセルとの併用において, 1回 600mgを1日2回, 食後. 患者の状態により適宜減量

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テラブルチニブ塩酸塩 ベレキシブル錠 80mg (院外) (株) Velexbru (小野) 80mg/T 【薬価】 4,307.30 円/T	【効】 再発又は難治性の中枢神経系原発リンパ腫, 原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 【用】 (内) 1日1回480mgを空腹時, 患者の状態により適宜減量
テムシロリムス トーリセル点滴静注液 25mg (株) Torisel (ファイザー) 25mg1mL/V (希釈液付) 【薬価】 133,439.00 円/瓶	【効】 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 【用】 (注) 25mgを1週間に1回, 30～60分間かけて点滴静注
デュルバルマブ (遺伝子組換え) イミフィンジ点滴静注 120mg (株) Imfinzi injection (アストラゼネカ) 120mg/C 【薬価】 76,355.00 円/瓶 イミフィンジ点滴静注 500mg (株) Imfinzi injection (アストラゼネカ) 500mg/C 【薬価】 310,154.00 円/瓶	【効】 ①切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的放射線療法後の維持療法. ②切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ③進展型小細胞肺癌. ④切除不能な肝細胞癌. ⑤治癒切除不能な胆道癌 【用】 (注) ①1回1500mgを4週間間隔で60分間以上かけて点滴静注. 投与期間は12か月間まで. 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg (体重). ②トレメリムマブ (遺伝子組換え) 及び白金系抗悪性腫瘍剤を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1回1500mgを3週間間隔で4回, 60分間以上かけて点滴静注. その後1回1500mgを4週間間隔で60分間以上かけて点滴静注. 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg (体重). ③白金系抗悪性腫瘍剤及びエトポシドとの併用において, 1回1500mgを3週間間隔で4回, 60分間以上かけて点滴静注. その後, 1回1500mgを4週間間隔で60分間以上かけて点滴静注. 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg (体重). ④1回1500mgを4週間間隔で60分間以上かけて点滴静注. 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg (体重). ⑤ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンとの併用において, 3週間間隔で, 1回1500mgを60分間以上かけて点滴静注する. 3週間間隔での繰り返し投与後, 1回1500mgを4週間間隔で60分間以上かけて点滴静注. 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg (体重)
トラスツマブ (遺伝子組換え) ハーセプチン注射用 60 (株) Herceptin (中外) 60mg/V 【薬価】 12,055.00 円/瓶 ハーセプチン注射用 150 (株) Herceptin (中外) 150mg/V 【薬価】 27,495.00 円/瓶	【効】 ①HER2 過剰発現が確認された乳癌. ②HER2 過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌. ③HER2 陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌. ④がん化学療法後に増悪したHER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 【用】 (注) ①A法又はB法を使用. ②他の抗悪性腫瘍剤との併用でB法を使用. ③ドセタキセル製剤との併用でB法. ④ベルツマブ (遺伝子組換え) との併用でB法を使用. A法: 1日1回, 初回投与時には4mg/kgを, 2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注. B法: 1日1回, 初回投与時には8mg/kgを, 2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間間隔で点滴静注. 初回投与の忍容性が良好であれば, 2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる
トラスツマブエムタンシン (遺伝子組換え) カドサイラ点滴静注用 100mg (株) Kadcylla (中外) 100mg/瓶 【薬価】 235,820.00 円/瓶 カドサイラ点滴静注用 160mg (株) Kadcylla (中外) 160mg/瓶 【薬価】 375,077.00 円/瓶	【効】 HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌, HER2 陽性の乳癌における術後薬物療法 【用】 (注) 1回3.6mg/kg (体重) を3週間間隔で点滴静注. 術後薬物療法の場合には, 投与回数は14回まで

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
トラスツズマブデルクステカン (遺伝子組換え) <u>エンハーツ点滴静注用 100mg</u> ㊞ ㊟ Enhertu (第一三共) 100mg/V 【薬価】 160,543.00 円 / 瓶	【効】 ①化学療法歴のある HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌. ②化学療法歴のある HER2 低発現の手術不能又は再発乳癌. ③がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌. ④がん化学療法後に増悪した HER2 (ERBB2) 遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 【用】(注) ①②④ 1回 5.4mg/kg (体重) を 90 分かけて 3 週間間隔で点滴静注. 初回投与の忍容性が良好であれば 2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる. ③ 1回 6.4mg/kg (体重) を 90 分かけて 3 週間間隔で点滴静注. 初回投与の忍容性が良好であれば 2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる
トレチノイン <u>ベサノイドカプセル 10mg</u> ㊞ Vesanoid (富士製薬) 10mg/cap 【薬価】 610.70 円 / cap	【効】 急性前骨髄球性白血病 【用】(内) 寛解導入療法: 1日 60 ~ 80mg (45mg/m ²) を 3 回に分割し食後
トレメリムマブ (遺伝子組換え) <u>イジユド点滴静注 25mg</u> ㊞ ㊟ Imjudo (アストラゼネカ) 25mg 1.25mL/ 瓶 【薬価】 213,831.00 円 / 瓶	【効】 ①切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ②切除不能な肝細胞癌 【用】(注) ①デュルバルマブ (遺伝子組換え) 及び白金系抗悪性腫瘍剤を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1回 75mg を 3 週間間隔で 4 回, 60 分間以上かけて点滴静注. その後, 7 週間の間隔を空けて, 75mg を 1回 60 分間以上かけて点滴静注. ②デュルバルマブ (遺伝子組換え) との併用において, 300mg を 60 分間以上かけて単回点滴静注. ただし, 体重 30kg 以下の場合の投与量は 4mg/kg (体重)
トレメリムマブ (遺伝子組換え) <u>イジユド点滴静注 300mg</u> ㊞ ㊟ Imjudo (アストラゼネカ) 300mg 15mL/ 瓶 【薬価】 2,310,355.00 円 / 瓶	【効】 切除不能な肝細胞癌 【用】(注) デュルバルマブ (遺伝子組換え) との併用において, 300mg を 60 分間以上かけて単回点滴静注. ただし, 体重 30kg 以下の場合の投与量は 4mg/kg (体重)

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ニボルマブ（遺伝子組換え） <u>オプジーボ点滴静注 120mg</u> ㉞㉟ Opdivo (小野) 120mg/12mL 【薬価】 157,660.00 円 / 瓶 <u>オプジーボ点滴静注 240mg</u> ㉞㉟ Opdivo (小野) 240mg/V 【薬価】 311,444.00 円 / 瓶	【効】 ①悪性黒色腫. ②切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ③非小細胞肺癌における術前補助療法. ④根治切除不能又は転移性の腎細胞癌. ⑤再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫. ⑥再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌. ⑦治癒切除不能な進行・再発の胃癌. ⑧切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫. ⑨悪性中皮腫（悪性胸膜中皮腫を除く）. ⑩がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌. ⑪根治切除不能な進行・再発の食道癌. ⑫食道癌における術後補助療法. ⑬原発不明癌. ⑭尿路上皮癌における術後補助療法. ⑮根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍 【用】 （注）① 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. 悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12か月間まで. 根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブと併用する場合は、1回 80mgを3週間間隔で4回点滴静注. その後、1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. ②⑦ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、1回 240mgを2週間間隔又は1回 360mgを3週間間隔で点滴静注. ③他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 360mgを3週間間隔で点滴静注. 投与回数は3回まで. ④ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. カボザンチニブと併用する場合は、1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. 化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブと併用する場合は、1回 240mgを3週間間隔で4回点滴静注. その後、1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. ⑤ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. 小児：1回 3mg/kgを2週間間隔で点滴静注. 40kg以上の小児には、1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注もできる. ⑥⑨⑬⑮ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. ⑧ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. イピリムマブと併用する場合は、1回 240mgを2週間間隔又は1回 360mgを3週間間隔で点滴静注. ⑩ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. イピリムマブと併用する場合は、1回 240mgを3週間間隔で4回点滴静注. その後、1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. ⑪⑫ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. ⑬ 1回 240mgを2週間間隔、1回 360mgを3週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. ⑭ 1回 240mgを2週間間隔又は1回 480mgを4週間間隔で点滴静注. 投与期間は12か月間まで
ニロチニブ塩酸塩水和物 <u>タシグナカプセル 150mg</u> ㉞ Tasigna (ノバルティス) 150mg/C 【薬価】 2,329.20 円 / cap	【効】 慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病 【用】 （内）成人：1回 400mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日2回、12時間毎を目安に. 初発の慢性期の慢性骨髄性白血病の場合には、1回投与量は300mgとする. 小児：体表面積に合わせて1回約230mg/m ² を食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日2回、12時間毎を目安に経口投与. 体表面積：0.32m ² 以下 1回投与量：50mg. 体表面積：0.33～0.54m ² 1回投与量：100mg. 体表面積：0.55～0.76m ² 1回投与量：150mg. 体表面積：0.77～0.97m ² 1回投与量：200mg. 体表面積：0.98～1.19m ² 1回投与量：250mg. 体表面積：1.20～1.41m ² 1回投与量：300mg. 体表面積：1.42～1.63m ² 1回投与量：350mg. 体表面積：1.64m ² 以上 1回投与量：400mg
ネシツムマブ（遺伝子組換え） <u>ポートラーザ点滴静注液 800mg</u> ㉞㉟ Portrazza (日本化薬) 800mg/瓶 【薬価】 228,328.00 円 / 瓶	【効】 切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌 【用】 （注）ゲムシタピン及びシスプラチンとの併用において、1回 800mgをおよそ60分かけて点滴静注し、週1回投与を2週連続し、3週目は休薬. これを1コースとして投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量
パゾパニブ塩酸塩 <u>ヴォトリエント錠 200mg</u> ㉞ Votrient (ノバルティス) 200mg/T 【薬価】 3,967.80 円 / T	【効】 ①悪性軟部腫瘍. ②根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 【用】 （内）1日1回 800mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に投与. 患者の状態により適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
パニツムマブ（遺伝子組換え） <u>ベクティビックス点滴静注 100mg</u> (株) (生) Vectibix (武田) 100mg5mL/V 【薬価】 79,749.00 円 / 瓶 <u>ベクティビックス点滴静注 400mg</u> (株) (生) Vectibix (武田) 400mg20mL/V 【薬価】 316,550.00 円 / 瓶	【効】 KRAS 遺伝子野生型の治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 【用】 (注) 2 週間に 1 回, 1 回 6mg/kg を 60 分以上かけて点滴静注
パルボシクリブ <u>イブランス錠 25mg</u> (株) Ibrance (ファイザー) 25mg/T 【薬価】 5,076.80 円 / T <u>イブランス錠 125mg</u> (株) Ibrance (ファイザー) 125mg/T 【薬価】 20,538.90 円 / T	【効】 ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌 【用】 (内) 内分泌療法剤との併用において, 1 日 1 回 125mg を 3 週間連続して投与し, その後 1 週間休薬, これを 1 サイクルとして投与を繰り返す. 患者の状態により適宜減量
ビカルタミド <u>カソデックス OD 錠 80mg (院外)</u> (株) Casodex (アストラゼネカ) 80mg/T 【薬価】 180.70 円 / T <u>後ビカルタミド錠 80mg 「NP」</u> (株) Bicalutamide (ニプロ) 80mg/T 【薬価】 122.90 円 / T 【先発品】 カソデックス錠 80mg, ビカルタミド錠 80mg 「ケミファ」	【効】 前立腺癌 【用】 (内) 1 日 1 回 80mg
フォロデシン塩酸塩 <u>ムンデシンカプセル 100mg (院外)</u> (株) Mundesine (ムンディ) 100mg/C 【薬価】 2,666.10 円 / cap	【効】 再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫 【用】 (内) 1 回 300mg を 1 日 2 回, 状態により適宜減量
ブリグチニブ <u>アルンブリグ錠 30mg</u> (株) Alunbrig (武田) 1%0.6mL/筒 【薬価】 4,176.10 円 / T	【効】 ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 【用】 (内) 1 日 1 回 90mg を 7 日間. その後, 1 日 1 回 180mg. 患者の状態により適宜減量
フルタミド <u>オダイン錠 125mg</u> (株) Odyne (日本化薬) 125mg/T 【薬価】 115.90 円 / T	【効】 前立腺癌 【用】 (内) 1 回 125mg を 1 日 3 回, 食後

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フルベストラント <u>フェソロデックス筋注 250mg</u> Ⓢ Faslodex (アストラゼネカ) 250mg5mL/筒 【薬価】 38,401.00 円 / 筒	【効】 乳癌 【用】 (注) 500mg (本剤 2 筒) を, 初回, 2 週後, 4 週後, その後 4 週ごとに 1 回, 左右の臀部に 250mg (本剤 1 筒) ずつ筋注. 閉経前乳癌に対しては, LH-RH アゴニスト投与下で他の抗悪性腫瘍剤と併用する
プレンツキシマブベドチン (遺伝子組換え) <u>アドセトリス点滴静注用 50mg</u> Ⓢ Adcetris (武田) 50mg/V 【薬価】 388,958.00 円 / 瓶	【効】 CD30 陽性の次期疾患: ホジキンリンパ腫, 末梢性 T 細胞リンパ腫, 再発又は難治性の皮膚 T 細胞リンパ腫 【用】 (注) 未治療の CD30 陽性のホジキンリンパ腫: ドキソルピシン塩酸塩, ビンブラスチン硫酸塩及びダカルバジンとの併用において, 2 週間に 1 回成人には 1.2mg/kg (体重), 小児には 1 回 48mg/m ² (体表面積) を最大 12 回点滴静注. 患者の状態に応じて適宜減量. 未治療の CD30 陽性の末梢性 T 細胞リンパ腫: シクロホスファミド水和物, ドキソルピシン塩酸塩及びプレドニゾロンとの併用において, 3 週間に 1 回 1.8mg/kg (体重) を最大 8 回点滴静注. 患者の状態に応じて適宜減量. 再発又は難治性の CD30 陽性のホジキンリンパ腫及び末梢性 T 細胞リンパ腫: 3 週間に 1 回 1.8mg/kg (体重) を点滴静注. 患者の状態に応じて適宜減量. 再発又は難治性の CD30 陽性のホジキンリンパ腫及び末梢性 T 細胞リンパ腫: 3 週間に 1 回 1.8mg/kg (体重) を点滴静注. 患者の状態に応じて適宜減量
プロカルバジン塩酸塩 <u>塩酸プロカルバジンカプセル 50mg 「TYP」</u> Ⓢ Procarbazine hydrochloride (太陽ファルマ) 50mg/cap 【薬価】 622.20 円 / cap	【効】 ①悪性リンパ腫 (ホジキン病, 細網肉腫, リンパ肉腫). ②次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法: 悪性星細胞腫, 乏突起膠腫成分を有する神経膠腫 【用】 (内) ① 1 日 50 ~ 100mg を 1 ~ 2 回に分割, 開始, その後約 1 週間以内に漸増, 1 日 150 ~ 300mg を 3 回に分割, 臨床効果が明らかとなるまで連日. 悪性リンパ腫の寛解導入までに要する総投与量は通常 5 ~ 7g. ② 1 日量 60 ~ 75mg/m ² を 14 日間投与, 6 ~ 8 週毎に繰り返す. 体表面積より算出された 1 日量が 75mg 未満は 50mg, 75mg 以上 125mg 未満は 100mg, 125mg 以上 175mg 未満は 150mg を 1 ~ 3 回に分割
ベネトクラクス <u>ベネクレスタ錠 10mg</u> Ⓢ Venclexta (アッヴィ) 10mg/T 【薬価】 872.80 円 / T <u>ベネクレスタ錠 100mg</u> Ⓢ Venclexta (アッヴィ) 100mg/T 【薬価】 7,585.90 円 / T	【効】 ①再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む). ②急性骨髄性白血病 【用】 (内) ①用量漸増期は第 1 週目に 20mg, 第 2 週目に 50mg, 第 3 週目に 100mg, 第 4 週目に 200mg, 第 5 週目に 400mg をそれぞれ 1 日 1 回, 7 日間食後. その後の維持投与期は, 400mg を 1 日 1 回, 食後. 患者の状態により適宜減量. ②アザシチジン併用: 用量漸増期は 1 日目に 100mg, 2 日目に 200mg, 3 日目に 400mg をそれぞれ 1 日 1 回, 食後. その後の維持投与期は, 400mg を 1 日 1 回, 食後. 患者の状態により適宜減量. シトラピン少量療法併用: 用量漸増期は 1 日目に 100mg, 2 日目に 200mg, 3 日目に 400mg, 4 日目に 600mg をそれぞれ 1 日 1 回, 食後. その後の維持投与期は, 600mg を 1 日 1 回, 食後. 患者の状態により適宜減量
ベバシズマブ (遺伝子組換え) <u>アバスチン点滴静注用 100mg/4mL</u> Ⓢ Avastin (中外) 100mg4mL/V 【薬価】 28,710.00 円 / 瓶 <u>アバスチン点滴静注用 400mg/16mL</u> Ⓢ Avastin (中外) 400mg16mL/瓶 【薬価】 107,607.00 円 / 瓶	【効】 ①治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌. ②扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌. ③卵巣癌. ④進行又は再発の子宮頸癌. ⑤手術不能又は再発乳癌. ⑥悪性神経膠腫. ⑦切除不能な肝細胞癌 【用】 (注) ① (1) 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1 回 5mg/kg 又は 10mg/kg を点滴静注, 投与間隔は 2 週間以上. (2) 他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1 回 7.5mg/kg を点滴静注, 投与間隔は 3 週間以上. ②④他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1 回 15mg/kg を点滴静注, 投与間隔は 3 週間以上. ③他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1 回 10mg/kg を 2 週間間隔又は 1 回 15mg/kg を 3 週間間隔で点滴静注. 患者の状態により投与間隔は適宜延長. ⑤パクリタキセルとの併用において, 1 回 10mg/kg を点滴静注. 投与間隔は 2 週間以上. ⑥ 1 回 10mg/kg を 2 週間間隔又は 1 回 15mg/kg を 3 週間間隔で点滴静注. ⑦アテゾリズマブ (遺伝子組換え) との併用において, 1 回 15mg/kg (体重) を点滴静注. 投与間隔は 3 週間以上

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベバシズマブ（遺伝子組換え） <u>後ベバシズマブ BS 点滴静注</u> <u>100mg「第一三共」</u> (株) 生 Bevacizumab (第一三共) 100mg/瓶 【薬価】 8,975.00 円 / 瓶 <u>後ベバシズマブ BS 点滴静注</u> <u>400mg「第一三共」</u> (株) 生 Bevacizumab (第一三共) 400mg/瓶 【薬価】 33,867.00 円 / 瓶	【効】 ①治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌。②扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌。③手術不能又は再発乳癌。④悪性神経膠腫。⑤卵巣癌 【用】(注) ①他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 5mg/kg又は10mg/kgを点滴静注。投与間隔は2週間以上。他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 7.5mg/kgを点滴静注。投与間隔は3週間以上。②他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 15mg/kgを点滴静注。投与間隔は3週間以上。③パクリタキセルとの併用において、1回 10mg/kgを点滴静注。投与間隔は2週間以上。④1回 10mg/kgを2週間間隔又は1回 15mg/kgを3週間間隔で点滴静注。患者の状態により投与間隔は適宜延長。⑤他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 10mg/kgを2週間間隔又は1回 15mg/kgを3週間間隔で点滴静注。患者の状態により投与間隔は適宜延長
ペムプロリズマブ(遺伝子組換え) <u>キイトルーダ点滴静注 100mg</u> (株) 生 Keytruda (MSD) 100mg/瓶 【薬価】 214,498.00 円 / 瓶	【効】 ①悪性黒色腫。②切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌。③再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫。④がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌。⑤がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)。⑥根治切除不能又は転移性の腎細胞癌。⑦腎細胞癌における術後補助療法。⑧再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌。⑨根治切除不能な進行・再発の食道癌。⑩治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌。⑪PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌。⑫ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法。⑬がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌。⑭がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)。⑮進行又は再発の子宮頸癌。⑯再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫。⑰治癒切除不能な進行・再発の胃癌。⑱治癒切除不能な胆道癌 【用】(注) ①1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。術後補助療法の場合は、投与期間は12か月間まで。②③④⑤⑧⑩⑪⑬⑯①1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。⑦1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。投与期間は12か月間まで。⑨フルオロウラシル及びシスプラチンとの併用において、1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌に対しては、単独投与可。⑥⑩⑮⑰他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。⑫1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。投与回数は、3週間間隔投与の場合、術前薬物療法は8回まで、術後薬物療法は9回まで、6週間間隔投与の場合、術前薬物療法は4回まで、術後薬物療法は5回まで。⑬レンパチニブメシル酸塩との併用において、1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注。⑱ゲムシタピン塩酸塩及びシスプラチンとの併用において、1回 200mgを3週間間隔又は1回 400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注
ペルツズマブ（遺伝子組換え） <u>パージェタ点滴静注 420mg/14mL</u> (株) 生 Perjeta (中外) 420mg 14mL/Vi 【薬価】 206,472.00 円 / 瓶	【効】 ①HER2陽性の乳癌。②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 【用】(注) ①他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1日1回、初回投与時には840mgを、2回目以降は420mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。術前・術後薬物療法の場合、投与期間は12か月間まで。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。②トラスツズマブ（遺伝子組換え）との併用において、成人に対して1日1回、初回投与時には840mgを、2回目以降は420mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ボスチニブ水和物 ボシュリブ錠 100mg  Bosulif (ファイザー) 100mg/T 【薬価】 3,861.20 円/T	【効】 慢性骨髄性白血病 【用】(内) 1日1回 500mgを食後、ただし、初発の慢性期の慢性骨髄性白血病の場合、1回投与量は 400mg、1日1回 600mgまで増量可
ポマリドミド ボマリストカプセル 1mg  Pomalyst (セルジーン) 1mg/C 【薬価】 36,902.00 円 /cap ボマリストカプセル 2mg  Pomalyst (セルジーン) 2mg/C 【薬価】 43,981.40 円 /cap ボマリストカプセル 4mg  Pomalyst (ブリストル・マイヤーズ) 2mg/C 【薬価】 52,418.90 円 /cap ボマリストカプセル 3mg  Pomalyst (セルジーン) 3mg/C 【薬価】 48,736.50 円 /cap	【効】 再発又は難治性の多発性骨髄腫 【用】(内) デキサメタゾン併用の場合：1日1回 4mgを 21日間連日投与後、7日間休薬、これを1サイクルとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用の場合：1日1回 4mgを 14日間連日投与後、7日間休薬、これを1サイクルとして投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量
ボルテゾミブ ベルケイド注射用 3mg  Velcade (ヤンセン) 3mg/V 【薬価】 77,417.00 円 / 瓶	【効】 ①多発性骨髄腫、②マントル細胞リンパ腫、③原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫、④全身性 AL アミロイドーシス 【用】(注) ① 1日1回、1.3mg/m ² (体表面積) を次記の A 法又は B 法で静注又は皮下注。最低 72 時間空けて投与すること。A 法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、週 2 回、2 週間 (1, 4, 8, 11 日目) 投与後、10 日間休薬 (12～21 日目)。この 3 週間を 1 サイクルとし、2 又は 8 サイクルまで投与を繰り返す。3 又は 9 サイクル以降は、週 1 回、2 週間 (1, 8 日目) 投与し、13 日間休薬 (9～21 日目)。この 3 週間を 1 サイクルとし、18 サイクルまで投与を繰り返す。週 1 回投与への移行時期は併用する抗悪性腫瘍剤を考慮して選択する。B 法 (再発又は難治性の場合に限る)：週 2 回、2 週間 (1, 4, 8, 11 日目) 投与後、10 日間休薬 (12～21 日目)。この 3 週間を 1 サイクルとし、投与を繰り返す。8 サイクルを超えて継続投与する場合には前記の用法・用量で投与を継続するか、又は維持療法として週 1 回、4 週間 (1, 8, 15, 22 日目) 投与後、13 日間休薬 (23～35 日目)。この 5 週間を 1 サイクルとし、投与を繰り返す。②他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1日1回、1.3mg/m ² を 1, 4, 8, 11 日目に静注後、10 日間休薬 (12～21 日目)。この 3 週間を 1 サイクルとし、6 サイクルまで (6 サイクル目に初めて奏効が認められた場合は 8 サイクルまで) 繰り返す。最低 72 時間空けて投与すること。静注が困難な場合には、皮下注もできる。③ 1日1回、1.3mg/m ² を 1, 4, 8, 11 日目に静注又は皮下注後、10 日間休薬 (12～21 日目)。この 3 週間を 1 サイクルとし、投与を繰り返す。最低 72 時間空けて投与。④他の薬剤との併用において、1日1回、1.3mg/m ² (体表面積) を 1, 8, 15, 22 日目に皮下投与。28 日間を 1 サイクルとし、6 サイクルまで投与を繰り返す。注射部位反応が発現した場合には、静注投与もできる
ミトキサントロン塩酸塩 ノバントロン注 10mg  Novantron (あすか) 10mg/5mL/V 【薬価】 17,265.00 円 / 瓶	【効】 ①急性白血病 (慢性骨髄性白血病の急性転化を含む)、②悪性リンパ腫、乳癌、③肝細胞癌 【用】(注) ① 1日1回 2～5mg/m ² (本剤として 1～2.5mL/m ²) を 5日間連日、3～4 週間隔で静脈内にゆっくり投与。② 1日1回 2～4mg/m ² (本剤として 1～2mL/m ²) を 5日間連日あるいは 1回 8～14mg/m ² (本剤として 4～7mL/m ²) を、3～4 週間隔で静脈内にゆっくり投与。③ 1日1回 6～12mg/m ² (本剤として 3～6mL/m ²) を、3～4 週間隔で静脈内にゆっくり投与

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ミリプラチン水和物 <u>ミリプラ動注用 70mg</u> Ⓢ Miripla (大日本住友) 70mg/V 【薬価】 39,756.00 円 / 瓶	【効】 肝細胞癌におけるリピオドリゼーション 【用】(注) 70mgを本剤懸濁液 3.5mLに懸濁し、1日1回肝動脈内に挿入されたカテーテルより投与。本剤の投与は、腫瘍血管に懸濁液が充満した時点で終了すること。上限を1回120mg(6mL)とする。繰り返し投与する場合には、4週間以上の観察期間をおくこと
無水エタノール <u>無水エタノール注「フソー」</u> Anhydrous ethanol (扶桑) 5mL/A	【効】 肝細胞癌における経皮的エタノール注入療法 【用】(注) 腫瘍病変ごとに対して、総注入量は腫瘍体積により決定。患者当たり1日注入量は最大10mL以内を原則。総注入量が1日最大注入量を超える場合、数日に分けて治療を行うが、週2回の注入手技を限度とする
ラバチニブチル酸塩水和物 <u>タイケルブ錠 250mg (院外)</u> Ⓢ Tykerb (ノバルティス) 250mg/T 【薬価】 1,599.70 円 / T	【効】 HER2 過剰発現が確認された手術不能又は再発乳癌 【用】(内) 次記の用量を1日1回、食事の1時間以上前又は食後1時間以降。カベシタピンとの併用：1250mg。アロマターゼ阻害剤との併用：1500mg
ラムシルマブ(遺伝子組換え) <u>サイラムザ点滴静注液 100mg</u> Ⓢ Cyramza (日本イーライリリー) 100mg10mL/V 【薬価】 76,659.00 円 / 瓶 <u>サイラムザ点滴静注液 500mg</u> Ⓢ Cyramza (日本イーライリリー) 500mg50mL/V 【薬価】 362,032.00 円 / 瓶	【効】 ①治癒切除不能な進行・再発の胃癌。②治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌。③切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌。④がん化学療法後に増悪した血清 AFP 値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌 【用】(注) ①④2週間に1回8mg/kg(体重)をおよそ60分かけて点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。患者の状態により適宜減量。②イリノテカン塩酸塩水和物、レボホリナート及びフルオロウラシルとの併用において、2週間に1回、1回8mg/kg(体重)をおよそ60分かけて点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。患者の状態により適宜減量。③化学療法既治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者の場合：ドセタキセルとの併用において3週間に1回10mg/kg(体重)をおよそ60分かけて点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。患者の状態により適宜減量。EGFR 遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者の場合：エロロチニブ塩酸塩又はゲフィチニブとの併用において、2週間に1回、1回10mg/kg(体重)をおよそ60分かけて点滴静注。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。患者の状態により適宜減量
リツキシマブ(遺伝子組換え) <u>リツキサン点滴静注 100mg</u> Ⓢ Rituxan (中外) 100mg/V 【薬価】 19,109.00 円 / 瓶 <u>リツキサン点滴静注 500mg</u> Ⓢ Rituxan (中外) 500mg/V 【薬価】 94,007.00 円 / 瓶	【効】 ①CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫。②CD20 陽性の慢性リンパ性白血病。③免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患。④多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎。⑤難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)。⑥次記の臓器移植時の抗体関連型拒絶反応の抑制及び治療。腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植。⑦インジウム(111In)イブリットモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液及びイットリウム(90Y)イブリットモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液投与前投与。⑧慢性特発性血小板減少性紫斑病。⑨後天性血栓性血小板減少性紫斑病。⑩全身性強皮症。⑪難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡。⑫視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防。⑬既存治療で効果不十分なループス腎炎 【用】(注) 生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液にて1~4mg/mLに希釈調製。①1回量375mg/m ² を1週間間隔で点滴静注。最大投与回数は8回。他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、併用する抗悪性腫瘍剤の投与間隔に合わせて、1サイクルあたり1回投与。維持療法に用いる場合は、1回量375mg/m ² を点滴静注。投与間隔は8週間を目安とし、最大投与回数は12回。②他の抗悪性腫瘍剤との併用において、初回到1回量375mg/m ² 、2回目以降は1回量500mg/m ² 、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルに合わせて、1サイクルあたり1回点滴静注。最大投与回数は6回。③1回量375mg/m ² を1週間間隔で点滴静注。最大投与回数は8回。④⑧⑨⑩⑬1回量375mg/m ² を1週間間隔で4回点滴静注。⑤1回量375mg/m ² を1週間間隔で4回点滴静注。1回あたり500mgまで。⑥1回量375mg/m ² を点滴静注。⑦250mg/m ² を1回点滴静注。⑧⑩1回量1,000mg/bodyを2週間間隔で2回点滴静注。⑨1回量375mg/m ² を1週間間隔で4回点滴静注。その後、初回投与から6か月毎に1回量1,000mg/body(固定用量)を2週間間隔で2回点滴静注

42. 腫瘍用薬


商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ルキソリチニブリン酸塩 <u>ジャカビ錠 5mg</u> ㊞ Jakavi (ノバルティス) 5mg/T 【薬価】 4,074.20 円/T	【効】 ①骨髓線維症。②真性多血症(既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る)。③造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(ステロイド剤の投与で効果不十分な場合) 【用】(内) ① 1日2回, 12時間毎に1回5mg~25mgの範囲とし適宜増減。② 1回10mgを開始用量とし, 1日2回, 12時間毎を目安に投与。1回25mg1日2回を超えない。③成人及び12歳以上の小児には1回10mgを1日2回, 12時間毎を目安に投与。患者の状態により適宜減量
レゴラフェニブ水和物 <u>スチバーガ錠 40mg</u> ㊞ Stivarga (バイエル) 40mg/T 【薬価】 5,682.60 円/T	【効】 ①治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌。②がん化学療法後に増悪した消化管間質腫瘍。③がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌 【用】(内) 1日1回160mgを食後に3週間連日投与し, その後1週間休薬。これを1サイクルとして繰り返す
レトロゾール <u>フェマール錠 2.5mg</u> ㊞ Femara (ノバルティス) 2.5mg/T 【薬価】 217.70 円/T	【効】 ①閉経後乳癌。②生殖補助医療における調節卵巣刺激。③多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発。④原因不明不妊における排卵誘発 【用】(内) ① 1日1回2.5mg。②③④ 1日1回2.5mgを月経周期3日目から5日間経口投与。十分な効果が得られない場合は, 次周期以降の1回投与量を5mgに増量可
レナリドミド水和物 <u>レブラミドカプセル 2.5mg (院内)</u> ㊞ Revlimid (ブリストル・マイヤーズ) 2.5mg/cap 【薬価】 6,762.40 円/cap <u>レブラミドカプセル 5mg (院内)</u> ㊞ Revlimid (ブリストル・マイヤーズ) 5mg/cap 【薬価】 8,070.80 円/cap	【効】 ①多発性骨髄腫。②5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群。③再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫。④再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 【用】(内) ①デキサメタゾンとの併用において, 1日1回25mgを21日間連日投与した後, 7日間休薬。これを1サイクルとして繰り返す。患者の状態により適宜減量。② 1日1回10mgを21日間連日投与した後, 7日間休薬する。これを1サイクルとして繰り返す。患者の状態により適宜減量。③ 1日1回25mgを連日経口投与。患者の状態により適宜減量。④リツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において, 1日1回20mgを21日間連日経口投与した後, 7日間休薬。これを1サイクルとして最大12サイクルまで投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量
レンバチニブメシル酸塩 <u>レンビマカプセル 4mg</u> ㊞ Lenvima (エーザイ) 4mg/C 【薬価】 3,421.70 円/cap	【効】 ①根治切除不能な甲状腺癌。②切除不能な肝細胞癌。③切除不能な胸腺癌。④がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌。⑤根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 【用】(内) ①③ 1日1回24mg。患者の状態により適宜減量。②体重60kg以上: 12mgを1日1回, 体重60kg未満: 8mgを1日1回。患者の状態により適宜減量。④⑤ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)との併用において, 1日1回20mg。患者の状態により適宜減量
レンバチニブメシル酸塩 <u>レンビマカプセル 10mg</u> ㊞ Lenvima (エーザイ) 10mg/C 【薬価】 8,090.00 円/cap	【効】 ①根治切除不能な甲状腺癌。②切除不能な胸腺癌。③がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌。④根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 【用】(内) ①② 1日1回24mg。患者の状態により適宜減量。③④ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)との併用において, 1日1回20mg。患者の状態により適宜減量

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ロベグインターフェロンアルファ - 2b (遺伝子組換え) ベスレミ皮下注 250μg シリンジ Ⓢ</p> <p>Besremi (ファーマエッセンシア ジャパン) 250μg0.5mL/筒 【薬価】297,259.00円/筒 ベスレミ皮下注 500μg シリンジ Ⓢ</p> <p>Besremi (ファーマエッセンシア ジャパン) 500μg1mL/筒 【薬価】565,154.00円/筒</p>	<p>【効】真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る） 【用】(注) 1回100μg（他の細胞減少療法薬を投与中の場合は50μg）を開始用量とし、2週に1回皮下注。増量は50μgずつ行い、1回500μgを超えない</p>
<p>ロミデプシン イストダックス点滴静注用 10mg Ⓢ</p> <p>Istodax (セルジーン) 10mg/V 【薬価】111,785.00円/瓶</p>	<p>【効】再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫 【用】(注) 14mg/m²（体表面積）を1, 8, 15日目に4時間かけて点滴静注後、休薬（16～28日目）。この28日間を1サイクルとして投与を繰り返す</p>
<p>ロルラチニブ ローブレナ錠 25mg Ⓢ</p> <p>Lorbrena (ファイザー) 25mg/T 【薬価】7,350.00円/T ローブレナ錠 100mg Ⓢ</p> <p>Lorbrena (ファイザー) 100mg/T 【薬価】26,441.80円/T</p>	<p>【効】ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 【用】(内) 1日1回100mg。患者の状態により適宜減量</p>
<p>ダラキューロ配合皮下注 Ⓢ Ⓢ</p> <p>Darzquro (ヤンセン) 15mL/Vi 【薬価】445,064.00円/瓶 1バイアル中： ダラツムマブ（遺伝子組換え） 1800mg ボルヒアルロニダーゼ アル ファ（遺伝子組換え） 30000単位</p>	<p>【効】①多発性骨髄腫。②全身性ALアミロイドーシス 【用】(注) ①他の抗悪性腫瘍剤との併用において、本剤1回15mL（ダラツムマブ（遺伝子組換え）として1,800mg及びボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）として30,000単位（2,000単位/mL））を、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、次記のA法又はB法の投与間隔で皮下注。A法：1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与。B法：1週間間隔、3週間間隔及び4週間間隔の順で投与。②他の薬剤との併用において、1回15mL（ダラツムマブ（遺伝子組換え）として1,800mg及びボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）として30,000単位（2,000単位/mL））を皮下注。投与間隔は、1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与</p>

42. 腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>フェスゴ配合皮下注 MA   Phesgo (中外) 10mL/ 瓶 【薬価】 257,938.00 円 / 瓶 1 バイアル (10mL) 中： ペルツズマブ (遺伝子組換え) 600mg トラスツズマブ (遺伝子組換え) 600mg ボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え) 20000U</p> <p>フェスゴ配合皮下注 IN   Phesgo (中外) 15mL/ 瓶 【薬価】 452,686.00 円 / 瓶 1 バイアル (15mL) 中： ペルツズマブ (遺伝子組換え) 1200mg トラスツズマブ (遺伝子組換え) 600mg ボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え) 30000U</p>	<p>【効】 ① HER2 陽性の乳癌. ②がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌</p> <p>【用】(注) ①他の抗悪性腫瘍剤との併用において, 1日1回, ペルツズマブ (遺伝子組換え), トラスツズマブ (遺伝子組換え) 及びボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え) として初回投与時にはそれぞれ 1200mg, 600mg及び 30000U を, 2回目以降はそれぞれ 600mg, 600mg及び 20000U を, 初回投与時には 8分以上, 2回目以降は 5分以上かけて 3週間間隔で皮下注. 術前・術後薬物療法の場合には, 投与期間は 12 か月まで. ②1日1回, ペルツズマブ (遺伝子組換え), トラスツズマブ (遺伝子組換え) 及びボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え) として初回投与時にはそれぞれ 1200mg, 600mg及び 30000U を, 2回目以降はそれぞれ 600mg, 600mg及び 20000U を, 初回投与時には 8分以上, 2回目以降は 5分以上かけて 3週間間隔で皮下注</p>
<p>ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) ポライビー点滴静注用 30mg   Polivy (中外) 30mg/T 【薬価】 254,001.00 円 / 瓶 ポライビー点滴静注用 140mg   Polivy (中外) 140mg/T 【薬価】 1,159,681.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫</p> <p>【用】(注) リツキシマブ (遺伝子組換え), シクロホスファミド水和物, ドキソルピシン塩酸塩及びプレドニゾロン又はメチルプレドニゾロンとの併用, ベンダムスチン塩酸塩製剤及びリツキシマブ (遺伝子組換え) との併用において, 1回 1.8mg/kg (体重) を 3週間間隔で 6回点滴静注. 初回投与時は 90分かけて投与し, 忍容性が良好であれば 2回目以降の投与時間は 30分間まで短縮できる. 患者の状態に応じて適宜減量</p>

4299. 他に分類されない腫瘍用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アナグレリド塩酸塩水和物 アグリリンカプセル 0.5mg (院外)  Agrylin (シャイアー) 0.5mg/Cap 【薬価】 788.70 円 / cap</p>	<p>【効】 本態性血小板血症</p> <p>【用】(内) 1回 0.5mgを 1日 2回より開始. 患者の状態により適宜増減, 増量は 1週間以上の間隔をあけて 1日用量として 0.5mgずつ行い, 1日 4回を超えない範囲で分割投与. 1回用量として 2.5mgかつ 1日用量として 10mgまで</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ストレプトコックス・ピオゲネス (A群3型) Su株ペニシリン処 理凍結乾燥粉末 <u>ピシバニール注射用 5KE</u> Ⓢ Picibanil (中外) 5KE/瓶 (溶解液なし) 【薬価】 12,337.00 円 / 瓶	【効】 ①胃癌 (手術例) 患者及び原発性肺癌患者における化学療法との併用による生存期間の延長. ②消化器癌患者及び肺癌患者における癌性胸・腹水の減少. ③他剤無効の, 頭頸部癌 (上顎癌, 喉頭癌, 咽頭癌, 舌癌) 及び甲状腺癌. ④リンパ管腫 【用】 (注) ①化学療法に併用し, 各投与量 (KE) を生理食塩液で懸濁溶解して, 筋注, 皮下又は皮内注. 初回 0.2 ~ 0.5KE より開始し, 患者の状態を観察しつつ, 連日又は隔日 1 回の投与で 2 ~ 3 週間かけて 2 ~ 5KE まで漸増. 維持量は 1 回 2 ~ 5KE, 週 1 ~ 2 回とする. 同日内に同一患者に対し, 2 経路による投与は行わない. ② 1 回 5 ~ 10KE を生理食塩液で懸濁溶解して, 週に 1 ~ 2 回漿膜腔内投与. 同日内に同一患者に対し, 2 経路による投与は行わない. ③ 1 回 5 ~ 10KE を生理食塩液で懸濁溶解して, 毎日又は数日に 1 回, 腫瘍内又は腫瘍辺縁部に注入. 同日内に同一患者に対し, 2 経路による投与は行わない. ④生理食塩液で懸濁溶解して, 0.05 ~ 0.1KE/mL 濃度の懸濁溶解液を調製. 吸引リンパ管腫液量と同量の懸濁溶解液を局所に注入. 1 回総投与量 2KE を上限
タルク <u>ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g</u> Unitalc (ノーベル) 4g/V 【薬価】 7,236.00 円 / 瓶	【効】 悪性胸水の再貯留抑制. 外科手術による治療が困難な続発性難治性気胸 【用】 (注) 4g/V を生理食塩液 50mL で懸濁して, 胸膜腔内に注入
<u>ロンサーフ配合錠 T15</u> Ⓢ Lonsurf (大鵬) 1 錠 【薬価】 2,511.00 円 / T 1 錠中 トリフルリジン 15mg チピラシル塩酸塩 7.065mg <u>ロンサーフ配合錠 T20</u> Ⓢ Lonsurf (大鵬) 1 錠 【薬価】 3,369.20 円 / T 1 錠中 トリフルリジン 20mg チピラシル塩酸塩 9.42mg	【効】 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌, がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌 【用】 (内) 初回投与量 (1 回量) を体表面積に合わせて次の基準量とし (トリフルリジンとして約 35mg/m ² /回), 朝食後及び夕食後の 1 日 2 回, 5 日間連続経口投与したのち 2 日間休薬する. これを 2 回繰り返したのち 14 日間休薬する. これを 1 コースとして投与を繰り返す. 初回基準量 (トリフルリジン相当量) 体表面積 (m ²) 1.07 未満: 35mg/回 (70mg/日), 体表面積 (m ²) 1.07 以上 ~ 1.23 未満: 40mg/回 (80mg/日), 体表面積 (m ²) 1.23 以上 ~ 1.38 未満: 45mg/回 (90mg/日), 体表面積 (m ²) 1.38 以上 ~ 1.53 未満: 50mg/回 (100mg/日), 体表面積 (m ²) 1.53 以上 ~ 1.69 未満: 55mg/回 (110mg/日), 体表面積 (m ²) 1.69 以上 ~ 1.84 未満: 60mg/回 (120mg/日), 体表面積 (m ²) 1.84 以上 ~ 1.99 未満: 65mg/回 (130mg/日), 体表面積 (m ²) 1.99 以上 ~ 2.15 未満: 70mg/回 (140mg/日), 体表面積 (m ²) 2.15 以上: 75mg/回 (150mg/日)

44. アレルギー用薬

441. 抗ヒスタミン剤

4411. ジフェンヒドラミン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ジフェンヒドラミン塩酸塩 <u>レスタミンコーワ錠 10mg</u> Restamin (興和) 10mg/T 【薬価】5.90円/T	【効】 蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹，皮膚炎），春季カタルに伴うそう痒，枯草熱，急性鼻炎，アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎 【用】（内）1回30～50mgを1日2～3回

4413. フェノチアジン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
プロメタジン塩酸塩 <u>ピレチア錠 (25mg)</u> Pyrethia (高田) 25mg/T 【薬価】5.70円/T	【効】 ①振戦麻痺，パーキンソニスム，②麻酔前投薬，人工（薬物）冬眠，③感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽，④アレルギー性鼻炎，枯草熱，血管運動性浮腫，⑤皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹，中毒疹），蕁麻疹，⑥動揺病 【用】（内）①1日25～200mgを適宜分割投与，②～⑥1回5～25mgを1日1～3回
プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 <u>ピレチア細粒 10% (院外)</u> Ⓢ Pyrethia (高田) 100mg/g 【薬価】9.50円/g	【効】 ①振戦麻痺，パーキンソニスム，②麻酔前投薬，人工（薬物）冬眠，③感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽，④アレルギー性鼻炎，枯草熱，血管運動性浮腫，⑤皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹，中毒疹），蕁麻疹，⑥動揺病 【用】（内）①1日25～200mgを適宜分割投与，②～⑥1回5～25mgを1日1～3回

4419. その他の抗ヒスタミン剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クロルフェニラミンマレイン酸塩 <u>ポララミン注 5mg</u> Polaramine (高田) 5mg1mL/A 【薬価】69.00円/A	【効】 蕁麻疹，枯草熱，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹，咬刺症），アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎 【用】（注）1回5mgを1日1回皮下注，筋注又は静注
シプロヘプタジン塩酸塩水和物 <u>ペリアクチン散 1% (院外)</u> Ⓢ Periactin (日医工) 10mg/g 【薬価】6.50円/g <u>ペリアクチン錠 4mg (院外)</u> Periactin (日医工) 4mg/T 【薬価】5.80円/T	【効】 皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹），蕁麻疹，血管運動性浮腫，枯草熱，アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎，感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽 【用】（内）1回4mgを1日1～3回
シプロヘプタジン塩酸塩水和物 <u>ペリアクチンシロップ 0.04%</u> Periactin (日医工) 0.4mg/mL 【薬価】1.55円/mL	【効】 皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹），蕁麻疹，血管運動性浮腫，枯草熱，アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎，感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽 【用】（内）1回4mg（本剤として10mL）を1日1～3回。（参考）Augsberger式による小児の1回投与量例：次記用量を1日1～3回，2～3歳：1.2mg（本剤として3mL），4～6歳：1.6mg（本剤として4mL），7～9歳：2.0mg（本剤として5mL），10～12歳：2.6mg（本剤として6.5mL）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 ポララミン散 1% (院外) Polaramine (高田) 10mg/g 【薬価】 12.70 円/g ポララミン錠 2mg Polaramine (高田) 2mg/T 【薬価】 5.70 円/T	【効】 蕁麻疹, 血管運動性浮腫, 枯草熱, 皮膚疾患に伴うそう痒 (湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症, 薬疹), アレルギー性鼻炎, 血管運動性鼻炎, 感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽 【用】 (内) 1回 2mgを1日 1～4回

442. 刺激療法剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ブシラミン リマチル錠 50mg Ⓢ Rimatil (あゆみ) 50mg/T 【薬価】 23.50 円/T	【効】 関節リウマチ 【用】 (内) 本剤は消炎鎮痛剤などで十分な効果が得られない場合に使用. 1回 100mgを1日 3回食後, 効果の得られた後には1日量 100～300mg. 1日 300mgまで

449. その他のアレルギー用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イブジラスト ケタスカプセル 10mg Ketas (杏林) 10mg/cap 【薬価】 14.00 円/cap	【効】 ①気管支喘息, ②脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害によるめまいの改善 【用】 (内) ① 1回 10mgを1日 2回, ② 1回 10mgを1日 3回
エバステチン エバステル OD 錠 5mg (院外) Ebastel OD (大日本住友) 5mg/T 【薬価】 38.00 円/T エバステル OD 錠 10mg (院外) Ebastel OD (大日本住友) 10mg/T 【薬価】 48.70 円/T Ⓢエバステチン OD 錠 10mg 「YD」 Ebastine OD (陽進堂) 10mg/T 【薬価】 23.20 円/T 【先発品】 エバステル OD 錠 10mg	【効】 蕁麻疹, 湿疹・皮膚炎, 痒疹, 皮膚そう痒症, アレルギー性鼻炎 【用】 (内) 1回 5～10mgを1日 1回
エピナスチン塩酸塩 アレジオン錠 20 (院外) Alesion (日本ベーリンガー) 20mg/T 【薬価】 27.30 円/T Ⓢエピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サイワイ」 Epinastine hydrochloride (沢井) 20mg/T 【薬価】 19.30 円/T 【先発品】 アレジオン錠 20	【効】 ①気管支喘息, 蕁麻疹, 湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症, 痒疹, そう痒を伴う尋常性乾癬, ②アレルギー性鼻炎 【用】 (内) ① 1回 20mgを1日 1回, ② 1回 10～20mgを1日 1回

44. アレルギー用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エピナスチン塩酸塩 <u>アレジオンドライシロップ1%【経 過措置】(院外)</u> Alesion (日本ベーリンガー) 10mg/g 【薬価】 32.30 円/g	【効】 ①アレルギー性鼻炎, ②蕁麻疹, 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症)に伴うそう痒 【用】(内) ①小児: 1日1回0.25～0.5mg(本剤として0.025～0.05g)/kgを用時溶解して, 1日量は20mg(本剤として2g)まで, 年齢別の標準投与量は, 次記の用量を1日量とし, 1日1回用時溶解. 3歳以上7歳未満(標準体重14kg以上24kg未満): 5～10mg(本剤として0.5～1g), 7歳以上(標準体重24kg以上): 10～20mg(本剤として1～2g). ②小児: 1日1回0.5mg(本剤として0.05g)/kgを用時溶解, 1日量は20mg(本剤として2g)まで, 年齢別の標準投与量は, 次記の用量を1日量とし, 1日1回用時溶解. 3歳以上7歳未満(標準体重14kg以上24kg未満): 10mg(本剤として1g), 7歳以上(標準体重24kg以上): 20mg(本剤として2g)
エメダスチンフマル酸塩 <u>レミカットカプセル2mg(院外)</u> Remicut (興和) 2mg/cap 【薬価】 24.80 円/cap	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症, 痒疹 【用】(内) 1回1～2mg 1日2回朝食後・就寝前
オロパタジン塩酸塩 <u>アレロック顆粒0.5%(院外)</u> Allelock (協和キリン) 2.5mg0.5g/包 【薬価】 33.10 円/g	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎, 痒疹, 皮膚そう痒症, 尋常性乾癬, 多形滲出性紅斑), 小児: アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症)に伴うそう痒 【用】(内) 1回5mg(本剤として1g)を朝及び就寝前の1日2回, 小児: 7歳以上の小児には1回5mg(本剤として1g)を朝及び就寝前の1日2回, 2歳以上7歳未満の小児には1回2.5mg(本剤として0.5g)を朝及び就寝前の1日2回
オロパタジン塩酸塩 <u>アレロック OD錠5(院外)</u> Allelock OD (協和キリン) 5mg/T 【薬価】 24.30 円/T <u>※オロパタジン塩酸塩 OD錠5mg 「ケミファ」(院外)</u> Olopatadine hydrochloride OD (日本ケミファ) 5mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アレロック OD錠5	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎, 痒疹, 皮膚そう痒症, 尋常性乾癬, 多形滲出性紅斑), 小児: アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症)に伴うそう痒 【用】(内) 1回5mgを朝及び就寝前の1日2回, 小児: 7歳以上の小児には1回5mgを朝及び就寝前の1日2回
ケトチフェンフマル酸塩 <u>ザジテンカプセル1mg(院外)</u> Zaditen (サンファーマ) 1mg/cap 【薬価】 9.20 円/cap	【効】 ①気管支喘息, ②アレルギー性鼻炎, ③蕁麻疹, 湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症 【用】(内) 1回1mgを1日2回, 朝食後及び就寝前
ケトチフェンフマル酸塩 <u>ザジテンシロップ0.02%</u> Zaditen (サンファーマ) 0.2mg/mL 【薬価】 12.50 円/mL	【効】 ①気管支喘息, ②アレルギー性鼻炎, ③湿疹・皮膚炎, 蕁麻疹, 皮膚そう痒症 【用】(内) 小児: 1日量0.06mg(本剤として0.3mL)/kgを2回, 朝食後及び就寝前に分割, 年齢別の標準投与量は, 次記の用量を1日量とし, 1日2回, 朝食後及び就寝前に分割. 6か月以上3歳未満: 0.8mg(本剤として4mL), 3歳以上7歳未満: 1.2mg(本剤として6mL), 7歳以上: 2.0mg(本剤として10mL). 1歳未満の乳児に使用する場合には体重, 症状などを考慮して適宜投与量を定める
ケトチフェンフマル酸塩 <u>ザジテンドライシロップ0.1%(院外)</u> Zaditen (サンファーマ) 1mg/g 【薬価】 11.10 円/g	【効】 ①気管支喘息, ②アレルギー性鼻炎, ③湿疹・皮膚炎, 蕁麻疹, 皮膚そう痒症 【用】(内) 小児: 1日量0.06mg(本剤として0.06g)/kgを2回, 朝食後及び就寝前に分割, 用時溶解, 年齢別の標準投与量は, 次記の用量を1日量とし, 1日2回, 朝食後及び就寝前に分割. 6か月以上3歳未満: 0.8mg(本剤として0.8g), 3歳以上7歳未満: 1.2mg(本剤として1.2g), 7歳以上: 2.0mg(本剤として2.0g). 1歳未満の乳児に使用する場合には体重, 症状などを考慮して適宜投与量を定める

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スギ花粉エキス <u>シダキュアスギ花粉舌下錠</u> <u>2,000JAU</u> Cedar cure (鳥居) 2000JAU/T 【薬価】 58.50 円/T <u>シダキュアスギ花粉舌下錠</u> <u>5,000JAU</u> Cedar cure (鳥居) 5000JAU/T 【薬価】 146.10 円/T	【効】 スギ花粉症 (減感作療法) 【用】 (内) 投与開始後 1 週間は、シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU を 1 日 1 回 1 錠、投与 2 週目以降は、シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU を 1 日 1 回 1 錠、舌下にて 1 分間保持した後、飲み込む。その後 5 分間は、うがいや飲食を控える
スプラタストトシル酸塩 <u>アイピーディカプセル 100</u> IPD (大鵬) 100mg/cap 【薬価】 16.90 円/cap	【効】 気管支喘息, アトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎 【用】 (内) 1 回 100mg を 1 日 3 回毎食後
スプラタストトシル酸塩 <u>アイピーディドライシロップ 5%</u> <u>(院外)</u> IPD (大鵬) 50mg/g 【薬価】 28.90 円/g	【効】 気管支喘息 【用】 (内) 小児: 用時溶解し, 1 回 3mg (本剤として 60mg) /kg 1 日 2 回朝・夕食後, 1 日 300mg (本剤として 6g) まで。年齢別の標準投与量は, 次記の用量を 1 回量とし, 1 日 2 回朝食後及び夕食後に, 用時溶解: 3 歳以上 5 歳未満 37.5mg (本剤として 0.75g), 5 歳以上 11 歳未満 75mg (本剤として 1.5g), 11 歳以上 100mg (本剤として 2.0g)
デスロラタジン <u>デザレックス錠 5mg</u> Desalex (杏林) 5mg/T 【薬価】 42.60 円/T	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症) に伴うそう痒 【用】 (内) 1 回 5mg を 1 日 1 回
デュピルマブ (遺伝子組換え) <u>デュピクセント皮下注 300mgベン</u> <u>®(生)</u> Dupixent (サノフィ) 300mg2mL/ キット 【薬価】 61,714.00 円/ キット	【効】 ①既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎, ②既存治療で効果不十分な結節性痒疹, ③既存治療で効果不十分な特発性の慢性蕁麻疹, ④気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る), ⑤鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎 (既存治療で効果不十分な患者に限る) 【用】 (注) ①初回に 600mg を皮下注, その後は 1 回 300mg を 2 週間隔で皮下注。生後 6 か月以上の小児には体重に応じて次記を皮下注, 5kg 以上 15kg 未満: 1 回 200mg を 4 週間隔, 15kg 以上 30kg 未満: 1 回 300mg を 4 週間隔, 30kg 以上 60kg 未満: 初回に 400mg, その後は 1 回 200mg を 2 週間隔, 60kg 以上: 初回に 600mg, その後は 1 回 300mg を 2 週間隔, ②初回に 600mg を皮下注, その後は 1 回 300mg を 2 週間隔で皮下注, ③初回に 600mg を皮下注, その後は 1 回 300mg を 2 週間隔で皮下注, 12 歳以上の小児には体重に応じて次記を皮下注, 30kg 以上 60kg 未満: 初回に 400mg, その後は 1 回 200mg を 2 週間隔, 60kg 以上: 初回に 600mg, その後は 1 回 300mg を 2 週間隔, ④成人及び 12 歳以上の小児には初回に 600mg を皮下注, その後は 1 回 300mg を 2 週間隔で皮下注, ⑤ 1 回 300mg を 2 週間隔で皮下注, 症状安定後には, 1 回 300mg を 4 週間隔で皮下注可
トラニラスト <u>リザベンカプセル 100mg</u> Rizaben (キッセイ) 100mg/cap 【薬価】 10.60 円/cap	【効】 気管支喘息, アレルギー性鼻炎, アトピー性皮膚炎, ケロイド・肥厚性瘢痕 【用】 (内) 1 回 100mg を 1 日 3 回
ピラスチン <u>ピラノア錠 20mg</u> Bilanoa (大鵬) 20mg/T 【薬価】 53.20 円/T <u>ピラノア OD 錠 20mg</u> Bilanoa (大鵬) 20mg/T 【薬価】 53.20 円/T	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症) に伴うそう痒 【用】 (内) 1 回 20mg を 1 日 1 回空腹時

44. アレルギー用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェキソフェナジン塩酸塩 <u>アレグラ錠 30mg (院外)</u> Allegra (サノフィ) 30mg/T 【薬価】 24.30 円/T <u>アレグラ錠 60mg (院外)</u> Allegra (サノフィ) 60mg/T 【薬価】 31.00 円/T <u>②フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」(水江)</u> Fexofenadine hydrochloride (日医工) 60mg1錠 【薬価】 28.70 円/T 【先発品】 アレグラ錠 60mg <u>②フェキソフェナジン塩酸塩 OD錠 30mg「サワイ」(院外)</u> Fexofenadine hydrochloride OD (沢井) 30mg/T 【薬価】 10.10 円/T 【先発品】 アレグラ錠 30mg <u>②フェキソフェナジン塩酸塩 OD錠 60mg「サワイ」</u> Fexofenadine hydrochloride OD (沢井) 60mg/T 【薬価】 11.50 円/T 【先発品】 アレグラ OD錠 60mg	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症, アトピー性皮膚炎) に伴うそう痒 【用】 (内) 1回 60mgを 1日 2回, 7歳以上12歳未満の小児: 1回 30mgを 1日 2回, 12歳以上の小児: 1回 60mgを 1日 2回
プランルカスト水和物 <u>オノンドライシロップ10%(院外)</u> Onon (小野) 100mg/g 【薬価】 38.90 円/g	【効】 気管支喘息, アレルギー性鼻炎 【用】 (内) 小児: 1日量 7mg (本剤として 70mg) /kgを朝食後及び夕食後の 2回に分割し, 用時懸濁して, 1日 10mg (本剤として 100mg) /kgまで, 成人の通常の用量である 450mg (本剤として 4.5g) /日まで, 体重別の標準投与量は, 次記の用量を 1回量とし, 1日 2回, 朝食後及び夕食後, 体重 12kg以上 18kg未満: 50mg (本剤として 0.5g), 体重 18kg以上 25kg未満: 70mg (本剤として 0.7g), 体重 25kg以上 35kg未満: 100mg (本剤として 1.0g), 体重 35kg以上 45kg未満: 140mg (本剤として 1.4g)
プランルカスト水和物 <u>②プランルカスト錠 112.5mg「CEO」</u> Pramlukast (武田) 112.5mg/T 【薬価】 14.50 円/T <u>②プランルカスト錠 225mg「CEO」</u> Pramlukast (武田) 225mg/T 【薬価】 26.50 円/T	【効】 気管支喘息, アレルギー性鼻炎 【用】 (内) 1日量 450mgを朝食後及び夕食後の 2回に分割
プランルカスト水和物 <u>②プランルカスト DS10%「トローワ」(院内)</u> Pramlukast (東和薬品) 100mg/g 【薬価】 23.50 円/g 【先発品】 オノンドライシロップ 10%	【効】 気管支喘息, アレルギー性鼻炎 【用】 (内) 小児: 1日量 7mg (本剤として 70mg) /kgを朝食後及び夕食後の 2回に分割し, 用時懸濁して, 1日 10mg (本剤として 100mg) /kgまで, 成人の通常の用量である 450mg (本剤として 4.5g) /日まで, 体重別の標準投与量は, 次記の用量を 1回量とし, 1日 2回, 朝食後及び夕食後, 体重 12kg以上 18kg未満: 50mg (本剤として 0.5g), 体重 18kg以上 25kg未満: 70mg (本剤として 0.7g), 体重 25kg以上 35kg未満: 100mg (本剤として 1.0g), 体重 35kg以上 45kg未満: 140mg (本剤として 1.4g)

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベボタスチンベシル酸塩 <u>タリオン錠 10mg</u> Talion (田辺三菱) 10mg/T 【薬価】 23.60 円/T	【効】 ①アレルギー性鼻炎. ②蕁麻疹, 皮膚疾患に伴うそう痒 (湿疹・皮膚炎, 痒疹, 皮膚そう痒症) 【用】 (内) <成人> 1回 10mgを1日 2回. <小児> 7歳以上の小児に1回 10mgを1日 2回
モンテルカストナトリウム <u>シングレア細粒 4mg (院外)</u> Singulair (MSD) 4mg/包 【薬価】 89.20 円/包 <u>②モンテルカスト細粒 4mg「明治」(院外)</u> Montelukast (Me) 4mg/包 【薬価】 33.70 円/包 【先発品】 キプレス細粒 4mg, シングレア細粒 4mg	【効】 気管支喘息 【用】 (内) 1歳以上 6歳未満の小児: 4mg (本剤 1包) を1日 1回就寝前
モンテルカストナトリウム <u>シングレアチュアブル錠 5mg</u> Singulair (MSD) 5mg/T 【薬価】 84.80 円/T <u>②モンテルカストチュアブル錠 5mg「タカタ」</u> Montelukast (高田) 5mg/T 【薬価】 19.60 円/T 【先発品】 キプレスチュアブル錠 5mg, シングレアチュアブル錠 5mg	【効】 気管支喘息 【用】 (内) 6歳以上の小児: 5mgを1日 1回就寝前
モンテルカストナトリウム <u>②モンテルカスト錠 10mg「KMJ」</u> Montelukast (キョーリンリメディオ) 10mg/T 【薬価】 40.50 円/T 【先発品】 キプレス錠 10mg, シングレア錠 10mg	【効】 ①気管支喘息. ②アレルギー性鼻炎 【用】 (内) ① 10mgを1日 1回就寝前. ② 5～10mgを1日 1回就寝前
ルパジンフマル酸塩 <u>ルパフィン錠 10mg</u> Rupafin (田辺三菱) 10mg1錠 【薬価】 46.40 円/T	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症)に伴うそう痒 【用】 (内) 1回 10mgを1日 1回, 1回 20mgに増量可
レボセチリジン塩酸塩 <u>②レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」</u> Levocetirizine hydrochloride (武田テバ) 5mg/T 【薬価】 16.40 円/T 【先発品】 ザイザル錠 5mg	【効】 アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 湿疹・皮膚炎, 痒疹, 皮膚そう痒症. 小児: アレルギー性鼻炎, 蕁麻疹, 皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎, 皮膚そう痒症)に伴うそう痒 【用】 (内) 1回 5mgを1日 1回, 就寝前. 最高投与量は1日 10mg. 小児 (7歳以上 15歳未満): 1回 2.5mgを1日 2回, 朝食後及び就寝前

44. アレルギー用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボセチリジン塩酸塩 <u>④レボセチリジン塩酸塩シロップ</u> <u>0.05%「ニプロ」</u> Levocetirizine hydrochloride (ニプロ) 0.05% 200mL/本 【薬価】 6.70 円 /mL 【先発品】 ザイザルシロップ 0.05%	【効】 アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症。小児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒 【用】（内） 1回 5mgを1日1回，就寝前。最高投与量は1日10mg。小児：6か月以上1歳未満は1回1.25mgを1日1回，1歳以上7歳未満は1回1.25mgを1日2回，朝食後及び就寝前。7歳以上15歳未満は2.5mgを1日2回，朝食後及び就寝前
ロラタジン <u>クラリチンレディタブ錠 10mg</u> Claritin (バイエル) 10mg/T 【薬価】 37.50 円 /T	【効】 アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒 【用】（内） 成人・7歳以上の小児：1日1回10mg食後
<u>ディレグラ配合錠</u> Dellegra (LTL) 1錠 【薬価】 30.70 円 /T 1錠中： フェキソフェナジン塩酸塩 30mg 塩酸プロソイドエフェドリン 60mg	【効】 アレルギー性鼻炎 【用】（内） 成人及び12歳以上の小児：1回2錠を1日2回，朝及び夕の空腹時
<u>ミティキュアダニ舌下錠</u> <u>3,300JAU（院外）</u> Miticure (鳥居) 1錠 【薬価】 65.60 円 /T 1錠中：コナヒョウヒダニ抽出エキス 1DU (1,650JAU) ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 1DU (1,650JAU) <u>ミティキュアダニ舌下錠</u> <u>10,000JAU（院外）</u> Miticure (鳥居) 1錠 【薬価】 197.80 円 /T 1錠中：コナヒョウヒダニ抽出エキス 3DU (5,000JAU) ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 3DU (5,000JAU)	【効】 ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法 【用】（内） 投与開始後1週間はミティキュアダニ舌下錠3,300JAUを1日1回1錠，投与2週目以降はミティキュアダニ舌下錠10,000JAUを1日1回1錠，舌下にて1分間保持した後，飲み込む。その後5分間はうがいや飲食を控える

5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

52. 漢方製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
葛根湯 <u>ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-1)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 13.40 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 3.75g: カッコン4 タイソウ3 マオウ3 カンゾウ2 ケイヒ2 シャクヤク2 ショウキョウ2	【効】 自然発汗がなく頭痛, 発熱, 悪寒, 肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症: 感冒, 鼻かぜ, 熱性疾患の初期, 炎症性疾患 (結膜炎, 角膜炎, 中耳炎, 扁桃腺炎, 乳腺炎, リンパ腺炎), 肩こり, 上半身の神経痛, 蕁麻疹 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
十味敗毒湯 <u>ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-6)</u> (院外) (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 14.10 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 3.5g: キキョウ3 サイコ3 センキョウ3 ブクリョウ3 ボクソク3 ドクカツ1.5 ボウフウ1.5 カンゾウ1 ケイガイ1 ショウキョウ1	【効】 化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期, 蕁麻疹, 急性湿疹, 水虫 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
八味地黄丸 <u>ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-7)</u> (院外) (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 9.80 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.0g: ジオウ6 サンシュユ3 サンヤク3 タクシャ3 ブクリョウ3 ボタンピ2.5 ケイヒ1 ブシ末0.5	【効】 疲労, 倦怠感著しく, 尿利減少又は頻数, 口渇し, 手足に交互的に冷感と熱感のあるものの次の諸症: 腎炎, 糖尿病, 陰萎, 坐骨神経痛, 腰痛, 脚気, 膀胱カタル, 前立腺肥大, 高血圧 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
小柴胡湯 <u>ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-9)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 29.40 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.5g: サイコ7 ハンゲ5 オウゴン3 タイソウ3 ニンジン3 カンゾウ2 ショウキョウ1	【効】 ①体力中等度で上腹部がはって苦しく, 舌苔を生じ, 口中不快, 食欲不振, 時により微熱, 悪心などのあるものの次の諸症: 諸種の急性熱性病, 肺炎, 気管支炎, 気管支喘息, 感冒, リンパ腺炎, 慢性胃腸障害, 産後回復不全. ②慢性肝炎における肝機能障害の改善 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>柴胡桂枝湯 <u>ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）</u>（TJ－10）（院外） （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 24.20 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 4.0g： サイコ 5 ハンゲ 4 オウゴン 2 カンゾウ 2 ケイヒ 2 シャクヤク 2 タイソウ 2 ニンジン 2 ショウキョウ 1</p>	<p>【効】 発熱汗出て，悪寒し，身体痛み，頭痛，はきけのあるものの次の諸症：感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患，胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆嚢炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎などの心下部緊張疼痛 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>柴胡桂枝乾姜湯 <u>ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）</u>（TJ－11）（院外） （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 28.40 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 3.5g： サイコ 6 オウゴン 3 カロコン 3 ケイヒ 3 ボレイ 3 カンキョウ 2 カンゾウ 2</p>	<p>【効】 体力が弱く，冷え症，貧血気味で，動悸，息切れがあり，神経過敏のもの次の諸症：更年期障害，血の道症，神経症，不眠症 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>柴胡加竜骨牡蛎湯 <u>ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）</u>（TJ－12） （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 20.30 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 4.5g： サイコ 5 ハンゲ 4 ケイヒ 3 ブクリョウ 3 オウゴン 2.5 タイソウ 2.5 ニンジン 2.5 ボレイ 2.5 リュウコツ 2.5 ショウキョウ 1</p>	<p>【効】 比較的体力があり，心悸亢進，不眠，いらだち等の精神症状のあるもの次の諸症：高血圧症，動脈硬化症，慢性腎臓病，神経衰弱症，神経性心悸亢進症，てんかん，ヒステリー，小児夜啼症，陰萎 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>半夏瀉心湯 <u>ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）</u>（TJ－14） （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 22.30 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 4.5g： ハンゲ 5 オウゴン 2.5 カンキョウ 2.5 カンゾウ 2.5 タイソウ 2.5 ニンジン 2.5 オウレン 1</p>	<p>【効】 みぞおちがつかえ，ときに悪心，嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるもの次の諸症：急・慢性胃腸カタル，はっ酵性下痢，消化不良，胃下垂，神経性胃炎，胃弱，二日酔，げっぷ，胸やけ，口内炎，神経症 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>黄連解毒湯 <u>ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（TJ－15）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 14.10 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 1.5g： オウゴン3 オウレン2 サンシシ2 オウバク 1.5</p>	<p>【効】 比較的体力があり，のぼせみで顔色赤く，いらいらする傾向のある次の諸症：鼻出血，高血圧，不眠症，ノイローゼ，胃炎，二日酔，血の道症，めまい，動悸，湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>半夏厚朴湯 <u>ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ－16）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 14.60 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 2.5g： ハンゲ6 ブクリョウ5 コウボク3 ソヨウ2 ショウキョウ1</p>	<p>【効】 気分がふさいで，咽喉・食道部に異物感があり，ときに動悸，めまい，嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症，神経性胃炎，つわり，咳，しわがれ声，神経性食道狭窄症，不眠症 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>五苓散 <u>ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）（TJ－17）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 13.60 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 2.0g： タクシャ4 ソウジュツ3 チョレイ3 ブクリョウ3 ケイヒ1.5</p>	<p>【効】 口渴，尿量減少するものの次の諸症：浮腫，ネフローゼ，二日酔，急性胃腸カタル，下痢，悪心，嘔吐，めまい，胃内停水，頭痛，尿毒症，暑気あたり，糖尿病 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>小青竜湯 <u>ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（TJ－19）（院外）</u> （ツムラ） 3.0g/包 【薬価】 12.80 円/g 9.0g 中，次記割合の乾燥エキス 5.0g： ハンゲ6 カンキョウ3 カンゾウ3 ケイヒ3 ゴミシ3 サイシン3 シャクヤク3 マオウ3</p>	<p>【効】 次記疾患における水様の痰，水様鼻汁，鼻閉，くしゃみ，喘鳴，咳嗽，流涙：気管支炎，気管支喘息，鼻炎，アレルギー性鼻炎，アレルギー性結膜炎，感冒 【用】（内） 1日 9.0g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>防己黄耆湯 <u>ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）（TJ－20）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 9.60 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 3.75g： オウギ5 ボウイ5 ソウジュツ3 タイソウ3 カンゾウ1.5 ショウキョウ1</p>	<p>【効】 色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく，汗が多く，小便不利で下肢に浮腫をきたし，膝関節の腫痛するものの次の諸症：腎炎，ネフローゼ，妊娠腎，陰嚢水腫，肥満症，関節炎，癱，せつ，筋炎，浮腫，皮膚病，多汗症，月経不順 【用】（内） 1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>当帰芍薬散 <u>ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（TJ－23）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 14.90 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 4.0g： シャクヤク 4 ソウジュツ 4 タクシャ 4 ブクリョウ 4 センキュウ 3 トウキ 3</p>	<p>【効】 筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく，腰脚の冷えやすいものの次の諸症：貧血，倦怠感，更年期障害（頭重，頭痛，めまい，肩こり等），月経不順，月経困難，不妊症，動悸，慢性腎炎，妊娠中の諸病（浮腫，習慣性流産，痔，腹痛），脚気，半身不随，心臓弁膜症 【用】（内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>加味逍遙散 <u>ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（TJ－24）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 15.90 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 4.0g： サイコ 3 シャクヤク 3 ソウジュツ 3 トウキ 3 ブクリョウ 3 サンシン 2 ボタンピ 2 カンゾウ 1.5 ショウキョウ 1 ハッカ 1</p>	<p>【効】 体質虚弱な婦人で肩がこり，疲れやすく，精神不安などの精神神経症状，ときに便秘の傾向のある次の諸症：冷え症，虚弱体質，月経不順，月経困難，更年期障害，血の道症 【用】（内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>桂枝茯苓丸 <u>ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（TJ－25）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 14.10 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 1.75g： ケイヒ 3 シャクヤク 3 トウニン 3 ブクリョウ 3 ボタンピ 3</p>	<p>【効】 体格はしっかりしていて赤ら顔が多く，腹部は大体充実，下腹部に抵抗のあるものの次の諸症：子宮並びにその付属器の炎症，子宮内膜炎，月経不順，月経困難，帯下，更年期障害（頭痛，めまい，のぼせ，肩こり等），冷え症，腹膜炎，打撲症，痔疾患，卵巣炎 【用】（内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>麻黄湯 <u>ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（TJ－27）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 11.40 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 1.75g： キョウニン 5 マオウ 5 ケイヒ 4 カンゾウ 1.5</p>	<p>【効】 悪寒，発熱，頭痛，腰痛，自然に汗の出ないものの次の諸症：感冒，インフルエンザ（初期のもの），関節リウマチ，喘息，乳児の鼻閉塞，哺乳困難 【用】（内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>
<p>麦門冬湯 <u>ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（TJ－29）</u> （ツムラ） 3.0g/包 【薬価】 16.50 円/g 9.0g 中，次記割合の乾燥エキス 6.0g： バクモンドウ 10 コウベイ 5 ハンゲ 5 タイソウ 3 カンゾウ 2 ニンジン 2</p>	<p>【効】 痰の切れにくい咳，気管支炎，気管支喘息 【用】（内）1日 9.0g を 2～3 回に分割し，食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
呉茱萸湯 <u>ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）（TJ－31）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 15.30 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 2.25g： タイソウ 4 ゴシュユ 3 ニンジン 2 ショウキョウ 1.5	【効】 手足の冷えやすい中等度以下の体力のもの次の諸症：習慣性偏頭痛，習慣性頭痛，嘔吐，脚気衝心 【用】 （内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間
人參湯 <u>ツムラ人參湯エキス顆粒（医療用）（TJ－32）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 13.90 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 2.5g： カンキョウ 3 カンゾウ 3 ソウジュツ 3 ニンジン 3	【効】 体質虚弱の人，あるいは虚弱により体力低下した人の次の諸症：急性・慢性胃腸カタル，胃アトニー症，胃拡張，悪阻（つわり），萎縮腎 【用】 （内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間
大黃牡丹皮湯 <u>ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）（TJ－33）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 13.10 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 3.5g： トウガシ 6 トウニン 4 ボタンピ 4 ダイオウ 2 無水ポウショウ 1.8	【効】 比較的体力があり，下腹部痛があって，便秘しがちなもの次の諸症：月経不順，月経困難，便秘，痔疾 【用】 （内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間
半夏白朮天麻湯 <u>ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）（TJ－37）（院外）</u> （ツムラ） 2.5g/包 【薬価】 23.20 円/g 7.5g 中，次記割合の乾燥エキス 4.0g： チンピ 3 ハンゲ 3 ビャクジュツ 3 ブクリョウ 3 テンマ 2 オウギ 1.5 タクシャ 1.5 ニンジン 1.5 オウバク 1 カンキョウ 1 ショウキョウ 0.5 バクガ 2	【効】 胃腸虚弱で下肢が冷え，めまい，頭痛などがある者 【用】 （内）1日 7.5g を 2～3 回に分割し，食前又は食間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>当帰四逆加呉茱萸生姜湯 <u>ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)[TJ-38]</u> <u>(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 16.60 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.0g: タイソウ 5 ケイヒ 3 シャクヤク 3 トウキ 3 モクツウ 3 カンゾウ 2 ゴシュユ 2 サイシン 2 ショウキョウ 1</p>	<p>【効】 手足の冷えを感じ, 下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症: しもやけ, 頭痛, 下腹部痛, 腰痛 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>苓桂朮甘湯 <u>ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)[TJ-39]</u> <u>(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 6.70 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 1.5g: ブクリョウ 6 ケイヒ 4 ソウジュツ 3 カンゾウ 2</p>	<p>【効】 めまい, ふらつきがあり, 又は動悸があり尿量が減少するものの次の諸症: 神経質, ノイローゼ, めまい, 動悸, 息切れ, 頭痛 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>猪苓湯 <u>ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)[TJ-40]</u> <u>(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 13.70 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 2.5g: カッセキ 3 タクシャ 3 チョレイ 3 ブクリョウ 3 アキョウ 3</p>	<p>【効】 尿量減少, 小便難, 口渴を訴えるものの次の諸症: 尿道炎, 腎臓炎, 腎石症, 淋炎, 排尿痛, 血尿, 腰以下の浮腫, 残尿感, 下痢 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>補中益気湯 <u>ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)[TJ-41]</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 22.50 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 5.0g: オウギ 4 ソウジュツ 4 ニンジン 4 トウキ 3 サイコ 2 タイソウ 2 チンピ 2 カンゾウ 1.5 ショウマ 1 ショウキョウ 0.5</p>	<p>【効】 消化機能が衰え, 四肢倦怠感著しい虚弱体質者の次の諸症: 夏やせ, 病後の体力増強, 結核症, 食欲不振, 胃下垂, 感冒, 痔, 脱肛, 子宮下垂, 陰萎, 半身不随, 多汗症 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>六君子湯 <u>ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(TJ-43)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】18.00円/g 7.5g中、次記割合の乾燥エキス4.0g: ソウジュツ4 ニンジン4 ハンゲ4 ブクリョウ4 タイソウ2 チンピ2 カンゾウ1 ショウキョウ0.5</p>	<p>【効】胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐 【用】(内)1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間</p>
<p>釣藤散 <u>ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(TJ-47)(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】34.70円/g 7.5g中、次記割合の乾燥エキス4.5g: セッコウ5 チョウトウコウ3 チンピ3 バクモンドウ3 ハンゲ3 ブクリョウ3 キクカ2 ニンジン2 ボウフウ2 カンゾウ1 ショウキョウ1</p>	<p>【効】慢性に続く頭痛で中年以降、又は高血圧の傾向のあるもの 【用】(内)1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間</p>
<p>十全大補湯 <u>ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(TJ-48)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】18.40円/g 7.5g中、次記割合の乾燥エキス5.0g: オウギ3 ケイヒ3 ジオウ3 シャクヤク3 センキュウ3 ソウジュツ3 トウキ3 ニンジン3 ブクリョウ3 カンゾウ1.5</p>	<p>【効】病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血 【用】(内)1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間</p>
<p>けい芥連翹湯 <u>ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(TJ-50)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】18.60円/g 7.5g中、次記割合の乾燥エキス4.5g: オウゴン1.5 オウバク1.5 オウレン1.5 キキョウ1.5 キジツ1.5 ケイガイ1.5 サイコ1.5 サンシシ1.5 ジオウ1.5 シャクヤク1.5 センキュウ1.5 トウキ1.5 ハッカ1.5 ビャクシ1.5 ボウフウ1.5 レンギョウ1.5 カンゾウ1</p>	<p>【効】蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび 【用】(内)1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
潤腸湯 <u>ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>〔TJ－51〕</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 15.20 円/g 7.5g 中、次記割合の乾燥エキス 5.0g： ジオウ 6 トウキ 3 オウゴン 2 キジツ 2 キョウニン 2 コウボク 2 ダイオウ 2 トウニン 2 マシニン 2 カンゾウ 1.5	【効】 便秘 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
よく苡仁湯 <u>ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>〔TJ－52〕(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 15.80 円/g 7.5g 中、次記割合の乾燥エキス 5.0g： ヨクイニン 8 ソウジュツ 4 トウキ 4 マオウ 4 ケイヒ 3 シャクヤク 3 カンゾウ 2	【効】 関節痛，筋肉痛 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
疎経活血湯 <u>ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>〔TJ－53〕(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 16.20 円/g 7.5g 中、次記割合の乾燥エキス 5.0g： シャクヤク 2.5 ジオウ 2 センキュウ 2 ソウジュツ 2 トウキ 2 トウニン 2 ブクリョウ 2 イレイセン 1.5 キョウカツ 1.5 ゴシツ 1.5 チンピ 1.5 ボウイ 1.5 ボウフウ 1.5 リュウタン 1.5 カンゾウ 1 ビャクシ 1 ショウキョウ 0.5	【効】 関節痛，神経痛，腰痛，筋肉痛 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
抑肝散 <u>ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)</u> <u>〔TJ－54〕</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 16.10 円/g 7.5g 中、次記割合の乾燥エキス 3.25g： ソウジュツ 4 ブクリョウ 4 センキュウ 3 チョウトウコウ 3 トウキ 3 サイコ 2 カンゾウ 1.5	【効】 虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：神経症，不眠症，小児夜なき，小児疳症 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
温清飲 <u>ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)</u> <u>〔TJ-57〕(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 15.20 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 3.75g: ジオウ 3 シャクヤク 3 センキウ 3 トウキ 3 オウゴン 1.5 オウバク 1.5 オウレン 1.5 サンシシ 1.5	【効】 皮膚の色つやが悪く, のぼせるものに用いる。 月経不順, 月経困難, 血の道症, 更年期障害, 神経症 【用】(内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
桃核承気湯 <u>ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-61〕(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 12.80 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 3.0g: トウニン 5 ケイヒ 4 ダイオウ 3 カンゾウ 1.5 無水ボウショウ 0.9	【効】 比較的体力があり, のぼせて便秘しがちなものの次の諸症: 月経不順, 月経困難症, 月経時や産後の精神不安, 腰痛, 便秘, 高血圧の随伴症状(頭痛, めまい, 肩こり) 【用】(内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
防風通聖散 <u>ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔TJ-62〕(院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 13.80 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.5g: カッセキ 3 オウゴン 2 カンゾウ 2 キキョウ 2 セッコウ 2 ビャクジュツ 2 ダイオウ 1.5 ケイガイ 1.2 サンシシ 1.2 シャクヤク 1.2 センキウ 1.2 トウキ 1.2 ハッカ 1.2 ボウフウ 1.2 マオウ 1.2 レンギョウ 1.2 ショウキョウ 0.3 無水ボウショウ 0.7	【効】 腹部に皮下脂肪が多く, 便秘しがちなものの次の諸症: 高血圧の随伴症状(どろろき, 肩こり, のぼせ), 肥満症, むくみ, 便秘 【用】(内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
芍薬甘草湯 <u>ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-68〕</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 10.40 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 2.5g: カンゾウ 6 シャクヤク 6	【効】 急激におこる筋肉の痙攣を伴う疼痛, 筋肉・関節痛, 胃痛, 腹痛 【用】(内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>抑肝散加陳皮半夏 <u>クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス</u> <u>細粒〔KB－83〕(院外)</u> (クラシエ)</p> <p>3.75g/包 【薬価】 16.70 円/g 7.5g 中, 次記割合のエキス粉 末 5.0g: ハンゲ 5 ビャクジュツ 4 ブ クリョウ 4 センキュウ 3 チ ンピ 3 トウキ 3 サイコ 2 カンゾウ 1.5 チョウトウコウ 3</p> <p><u>ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆</u> <u>粒(医療用)〔TJ－83〕</u> (ツムラ)</p> <p>2.5g/包 【薬価】 14.40 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキ ス 4.5g: ハンゲ 5 ソウジュツ 4 ブク リョウ 4 センキュウ 3 チョ ウトウコウ 3 チンピ 3 トウ キ 3 サイコ 2 カンゾウ 1.5</p>	<p>【効】 虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症: 神経症, 不眠症, 小児夜なき, 小児疳症</p> <p>【用】(内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>当帰飲子 <u>ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療</u> <u>用)〔TJ－86〕(院外)</u> (ツムラ)</p> <p>2.5g/包 【薬価】 21.00 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキ ス 5.0g: トウキ 5 ジオウ 4 シツリシ 3 ジャクヤク 3 センキュウ 3 ボウフウ 3 カシユウ 2 オウ ギ 1.5 ケイガイ 1.5 カンゾ ウ 1</p>	<p>【効】 冷え症のものの次の諸症: 慢性湿疹(分泌物の少ないもの), かゆみ</p> <p>【用】(内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>六味丸 <u>ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)</u> <u>〔TJ－87〕(院外)</u> (ツムラ)</p> <p>2.5g/包 【薬価】 13.80 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキ ス 3.75g: ジオウ 5 サンシュユ 3 サン ヤク 3 タクシャ 3 ブクリョ ウ 3 ボタンピ 3</p>	<p>【効】 疲れやすくて尿量減少又は多尿で, 時に口渴があるものの次の諸症: 排尿困難, 頻尿, むくみ, かゆみ</p> <p>【用】(内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し, 食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
二朮湯 <u>ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-88) (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 11.50 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 5.0g: ハンゲ 4 ソウジュツ 3 イレ イセン 2.5 オウゴン 2.5 コ ウブシ 2.5 チンピ 2.5 ビャ クジュツ 2.5 ブクリョウ 2.5 カンゾウ 1 ショウキョウ 1 テンナンショウ 2.5 ワキョウ カツ 2.5	【効】 五十肩 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し, 食前又は食間
清肺湯 <u>ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-90) (院外)</u> (ツムラ) 3.0g/包 【薬価】 17.10 円/g 9.0g 中, 次記割合の乾燥エキス 6.0g: トウキ 3 バクモンドウ 3 ブ クリョウ 3 オウゴン 2 キ キョウ 2 キョウニン 2 サン シシ 2 ソウハクヒ 2 タイソ ウ 2 チンピ 2 テンモンドウ 2 バイモ 2 カンゾウ 1 ゴミ シ 1 ショウキョウ 1 チク ジョ 2	【効】 痰の多く出る咳 【用】 (内) 1日 9.0g を 2～3 回に分割し, 食前又は食間
竹じょ温胆湯 <u>ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒</u> <u>(医療用) (TJ-91) (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 28.70 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 5.5g: ハンゲ 5 サイコ 3 バクモン ドウ 3 ブクリョウ 3 キキョ ウ 2 キジツ 2 コウブシ 2 チンピ 2 オウレン 1 カンゾ ウ 1 ショウキョウ 1 ニンジ ン 1 チクジョ 3	【効】 インフルエンザ, 風邪, 肺炎などの回復期に熱が長びいたり, また平熱になっ ても, 気分がさっぱりせず, せきや痰が多くて安眠が出来ないもの 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し, 食前又は食間

52. 漢方製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
柴朴湯 <u>ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-96)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 34.00 円/g 7.5g 中、次記割合の乾燥エキス 5.0g: サイコ7 ハンゲ5 ブクリョウ5 オウゴン3 コウボク3 タイソウ3 ニンジン3 カンゾウ2 ソヨウ2 ショウキョウ1	【効】 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：小児喘息、気管支喘息、気管支炎、咳、不安神経症 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
黄耆建中湯 <u>ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-98) (院外)</u> (ツムラ) 3.0g/包 【薬価】 8.10 円/g 18.0g 中、次記割合の乾燥エキス 4.75g と粉末あめ 10.0g: シャクヤク6 オウギ4 ケイヒ4 タイソウ4 カンゾウ2 ショウキョウ1	【効】 身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ 【用】 (内) 1日 18.0g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
小建中湯 <u>ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-99) (院外)</u> (ツムラ) g 【薬価】 6.90 円/g 15.0g 中、次記割合の乾燥エキス 3.75g とコウイ 10.0g: シャクヤク6 ケイヒ4 タイソウ4 カンゾウ2 ショウキョウ1	【効】 体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症：小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき 【用】 (内) 1日 15.0g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
大建中湯 <u>ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-100)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 13.70 円/g 15.0g 中、次記割合の乾燥エキス 1.25g とコウイ 10.0g: カンキョウ5 ニンジン3 サンショウ2	【効】 腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの 【用】 (内) 1日 15.0g を 2～3 回に分割し、食前又は食間
酸棗仁湯 <u>ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)</u> <u>(TJ-103) (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 18.00 円/g 7.5g 中、次記割合の乾燥エキス 3.25g: サンソウニン10 ブクリョウ5 センキュウ3 チモ3 カンゾウ1	【効】 心身がつかれ弱って眠れないもの 【用】 (内) 1日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
辛夷清肺湯 <u>ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) [TJ-104] (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 15.50 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.5g: セッコウ 5 バクモンドウ 5 オウゴン 3 サンシシ 3 チモ 3 ビャクゴウ 3 シンイ 2 ビワヨウ 2 ショウマ 1	【効】 鼻づまり, 慢性鼻炎, 蓄膿症 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
温経湯 <u>ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) [TJ-106] (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 37.20 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 5.0g: バクモンドウ 4 ハンゲ 4 トウキ 3 カンゾウ 2 ケイヒ 2 シャクヤク 2 センキュウ 2 ニンジン 2 ボタンピ 2 ゴシユ 1 ショウキョウ 1 アキョウ 2	【効】 手足がほてり, 唇がかわくものの次の諸症: 月経不順, 月経困難, こしけ, 更年期障害, 不眠, 神経症, 湿疹, 足腰の冷え, しもやけ 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
牛車腎気丸 <u>ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) [TJ-107]</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 17.70 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.5g: ジオウ 5 ゴシツ 3 サンシユ 3 サンヤク 3 シャゼンシ 3 タクシャ 3 ブクリョウ 3 ボタンピ 3 ケイヒ 1 ブシ末 1	【効】 疲れやすくて, 四肢が冷えやすく尿量減少又は多尿で時に口渇がある次の諸症: 下肢痛, 腰痛, しびれ, 老人のかすみ目, かゆみ, 排尿困難, 頻尿, むくみ 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
人參養榮湯 <u>ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用) [TJ-108]</u> (ツムラ) 3g/包 【薬価】 20.10 円/g 9.0g 中, 次記割合の乾燥エキス 6.0g: ジオウ 4 トウキ 4 ビャクジュツ 4 ブクリョウ 4 ニンジン 3 ケイヒ 2.5 オンジ 2 シャクヤク 2 チンピ 2 オウギ 1.5 カンゾウ 1 ゴミシ 1	【効】 病後の体力低下, 疲労倦怠, 食欲不振, ねあせ, 手足の冷え, 貧血 【用】 (内) 1日 9.0g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>小柴胡湯加桔梗石膏 <u>ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) [TJ-109]</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 37.20 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 5.0g: セッコウ 10 サイコ 7 ハンゲ 5 オウゴン 3 キキョウ 3 タイソウ 3 ニンジン 3 カンゾウ 2 ショウキョウ 1</p>	<p>【効】 咽喉がはれて痛む次の諸症: 扁桃炎, 扁桃周囲炎 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>立効散 <u>ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) [TJ-110]</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 10.30 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 1.5g: サイシン 2 ショウマ 2 ポウフウ 2 カンゾウ 1.5 リュウタン 1</p>	<p>【効】 抜歯後の疼痛, 歯痛 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>柴苓湯 <u>ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) [TJ-114]</u> (ツムラ) 3g/包 【薬価】 45.00 円/g 9.0g 中, 次記割合の乾燥エキス 6.0g: サイコ 7 タクシャ 5 ハンゲ 5 オウゴン 3 ソウジュツ 3 タイソウ 3 チョレイ 3 ニンジン 3 ブクリョウ 3 カンゾウ 2 ケイヒ 2 ショウキョウ 1</p>	<p>【効】 吐き気, 食欲不振, のどのかわき, 排尿が少ないなどの次の諸症: 水瀉性下痢, 急性胃腸炎, 暑気あたり, むくみ 【用】 (内) 1日 9.0g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>
<p>苓甘姜味辛夏仁湯 <u>ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用) [TJ-119] (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 30.20 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 4.0g: キョウニン 4 ハンゲ 4 ブクリョウ 4 ゴミシ 3 カンキョウ 2 カンゾウ 2 サイシン 2</p>	<p>【効】 貧血, 冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの, 気管支炎, 気管支喘息, 心臓衰弱, 腎臓病 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
麻黄附子細辛湯 <u>ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒</u> <u>(医療用) (TJ - 127) (院外)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 18.40 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 1.5g: マオウ 4 サイシン 3 ブシ末 1	【効】 悪寒, 微熱, 全身倦怠, 低血圧で頭痛, めまいあり, 四肢にとう痛冷感あるものの次の諸症: 感冒, 気管支炎 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間
加味帰脾湯 <u>ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (TJ - 137)</u> (ツムラ) 2.5g/包 【薬価】 26.00 円/g 7.5g 中, 次記割合の乾燥エキス 5.0g: オウギ 3 サイコ 3 サンソウニン 3 ソウジュツ 3 ニンジン 3 ブクリョウ 3 リュウガンニク 3 オンジ 2 サンシシ 2 タイソウ 2 トウキ 2 カンゾウ 1 ショウキョウ 1 モッコウ 1	【効】 虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症: 貧血, 不眠症, 精神不安, 神経症 【用】 (内) 1日 7.5g を 2~3 回に分割し, 食前又は食間

59. その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヨクイニン <u>ヨクイニンエキス錠「コタロー」</u> <u>(院外)</u> Yokuinin (小太郎漢方) 1錠 【薬価】 6.50円/T 18錠中： ヨクイニン乾燥エキス 2.0g	【効】 青年性扁平疣贅，尋常性疣贅 【用】 (内) 1日1.0～2.0g(本剤として9～18錠)を3回に分割

6. 病原生物に対する医薬品

61. 抗生物質製剤

611. 主としてグラム陽性菌に作用するもの

6111. ペニシリン系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベンジルペニシリンカリウム 注射用ペニシリンGカリウム 100万単位 Penicillin G potassium (Meiji Seika) 100万単位/V 【薬価】 485.00円/瓶	【効】 敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、淋菌感染症、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、炭疽、ジフテリア（抗毒素併用）、鼠咬症、破傷風（抗毒素併用）、ガス壊疽（抗毒素併用）、放線菌症、回帰熱、ウイルス病、梅毒。〈適応菌種〉ベンジルペニシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、髄膜炎菌、ジフテリア菌、炭疽菌、放線菌、破傷風菌、ガス壊疽菌群、回帰熱ボレリア、ウイルス病レプトスピラ、鼠咬症スピリルム、梅毒トレポネーマ 【用】（注） ①化膿性髄膜炎・感染性心内膜炎・梅毒を除く感染症：1回30～60万単位を1日2～4回筋注。②化膿性髄膜炎：1回400万単位を1日6回、点滴静注。③感染性心内膜炎：1回400万単位を1日6回、点滴静注。1回500万単位、1日3000万単位まで。④梅毒：1回300～400万単位を1日6回、点滴静注

6112. リンコマイシン系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クリンダマイシン塩酸塩 ダラシンカプセル 150mg Dalacin (ファイザー) 150mg/cap 【薬価】 23.80円/cap	【効】 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、涙嚢炎、麦粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎。〈適応菌種〉クリンダマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌 【用】（内） 1回150mgを6時間ごと、重症感染症には1回300mgを8時間ごと、小児：1日量15mg/kgを3～4回に分割、重症感染症には1日量20mg/kgを3～4回に分割
クリンダマイシンリン酸エステル クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」 Clindamycin phosphate (ニプロ) 600mg4mL/A 【薬価】 588.00円/A	【効】 敗血症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎。〈適応菌種〉クリンダマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、マイコプラズマ属 【用】（注） ①点滴静注：1日600～1200mgを2～4回に分割。小児：1日15～25mg/kgを3～4回に分割。難治性又は重症感染症には症状に応じて、1日2400mgまで増量し、2～4回に分割。小児：1日40mg/kgまで増量し、3～4回に分割。点滴静注に際しては、本剤300～600mgあたり100～250mLの5%ブドウ糖注射液、生理食塩液又はアミノ酸製剤等の補液に溶解し、30分～1時間かけて。②筋注：1日600～1200mgを2～4回に分割

6113. バンコマイシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」 Vancomycin hydrochloride (Meiji Seika) 0.5g/V 【薬価】 909.60円/瓶	【効】 ①感染性腸炎（偽膜性大腸炎を含む）。〈適応菌種〉バンコマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、クロストリジウム・ディフィシル。②骨髄移植時の消化管内殺菌 【用】（内） ①用時溶解し、1回0.125～0.5gを1日4回。②用時溶解し、1回0.5gを非吸収性の抗菌剤及び抗真菌剤と併用して1日4～6回

61. 抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
バンコマイシン塩酸塩 <u>バンコマイシン塩酸塩点滴静注用</u> <u>0.5g「明治」</u> Vancomycin hydrochloride (Meiji Seika) 0.5g/V 【薬価】 754.00 円 / 瓶	【効】 ①敗血症, 感染性心内膜炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 骨髄炎, 関節炎, 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 腹膜炎, 化膿性髄膜炎. <適応菌種> バンコマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA). ②敗血症, 感染性心内膜炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 骨髄炎, 関節炎, 腹膜炎, 化膿性髄膜炎. <適応菌種> バンコマイシンに感性のメチシリン耐性コアグラエゼ陰性ブドウ球菌 (MRCNS). ③敗血症, 肺炎, 化膿性髄膜炎. <適応菌種> バンコマイシンに感性のペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP). ④ MRSA 又は MRCNS 感染が疑われる発熱性好中球減少症 【用】 (注) 1日 2g を 1回 0.5g6時間ごと又は 1回 1g12時間ごとに分割して, それぞれ 60分以上かけて点滴静注. 高齢者: 1回 0.5g12時間ごと又は 1回 1g24時間ごとに, それぞれ 60分以上かけて点滴静注. 小児・乳児: 1日 40mg/kgを 2~4回に分割して, それぞれ 60分以上かけて点滴静注. 新生児: 1回投与量を 10~15mg/kgとし, 生後1週までの新生児に対しては 12時間ごと, 生後1か月までの新生児に対しては 8時間ごとに, それぞれ 60分以上かけて点滴静注

6119. その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アルベカシン硫酸塩 <u>アルベカシン硫酸塩注射液 200mg</u> <u>「ケミファ」</u> (株) Arbekacin sulfate (日本ケミファ) 200mg4mL/A 【薬価】 5,830.00 円 / A	【効】 敗血症, 肺炎. <適応菌種> アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 【用】 (注) 1日 1回 150~200mgを 30分~2時間かけて点滴静注. 1日 150~200mgを 2回に分割し点滴静注も可. 静脈内投与が困難な場合, 1日 150~200mgを 1回又は 2回に分割し筋注も可. 小児: 1日 1回 4~6mg/kgを 30分かけて点滴静注. 1日 4~6mg/kgを 2回に分割し点滴静注も可
ダプトマイシン <u>キュビシン静注用 350mg</u> Cubicin (MSD) 350mg/V (調製時の損失を考慮に入れ, 1バイアル中 367.5mgを含む.) 【薬価】 9,015.00 円 / 瓶	【効】 ①敗血症, 感染性心内膜炎, ②深在性皮膚感染症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, びらん・潰瘍の二次感染. <適応菌種> ダプトマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 【用】 (注) <成人> ① 1日 1回 6mg/kgを 24時間ごとに 30分かけて点滴静注又は緩徐に静注. ② 1日 1回 4mg/kgを 24時間ごとに 30分かけて点滴静注又は緩徐に静注. <小児> ①敗血症のみ. 12歳以上 18歳未満: 1日 1回 7mg/kgを 24時間ごとに 30分かけて点滴静注. 7歳以上 12歳未満: 1日 1回 9mg/kgを 24時間ごとに 30分かけて点滴静注. 1歳以上 7歳未満: 1日 1回 12mg/kgを 24時間ごとに 60分かけて点滴静注. ② 12歳以上 18歳未満: 1日 1回 5mg/kgを 24時間ごとに 30分かけて点滴静注. 7歳以上 12歳未満: 1日 1回 7mg/kgを 24時間ごとに 30分かけて点滴静注. 2歳以上 7歳未満: 1日 1回 9mg/kgを 24時間ごとに 60分かけて点滴静注. 1歳以上 2歳未満: 1日 1回 10mg/kgを 24時間ごとに 60分かけて点滴静注
テイコプラニン <u>② テイコプラニン点滴静注用</u> <u>200mg「日医工」</u> (株) Teicoplanin (日医工) 200mg/V 【薬価】 1,445.00 円 / 瓶 【先発品】 注射用タゴシッド 200mg	【効】 敗血症, 深在性皮膚感染症, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 肺炎, 膿胸, 慢性呼吸器病変の二次感染. <適応菌種> 本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 【用】 (注) 初日 400mg又は 800mgを 2回に分割し, 以後 1日 1回 200mg又は 400mgを 30分以上かけて点滴静注. 敗血症には, 初日 800mgを 2回に分割し, 以後 1日 1回 400mgを 30分以上かけて点滴静注. 乳児・幼児・小児: 10mg/kgを 12時間間隔で 3回, 以後 6~10mg/kg (敗血症などの重症感染症では 10mg/kg) を 24時間ごとに 30分以上かけて点滴静注. 新生児 (低出生体重児を含む): 初回のみ 16mg/kgを, 以後 8mg/kgを 24時間ごとに 30分以上かけて点滴静注
フィダキソマイシン <u>ダフクリア錠 200mg</u> Dafclir (アステラス) 200mg/T 【薬価】 4,012.80 円 / T	【効】 感染性腸炎 (偽膜性大腸炎を含む). <適応菌種> 本剤に感性のクロストリジウム・ディフィシル 【用】 (内) 1回 200mgを 1日 2回

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ムピロシンカルシウム水和物 バクトロバン鼻腔用軟膏 2% Bactroban (グラクソ・スミスクライン) 2%3g/本 【薬価】524.40円/g	【効】 次の患者及び個人の保菌する鼻腔内のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の除菌：①MRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者(易感染患者)。②易感染患者から隔離することが困難な入院患者。③易感染患者に接する医療従事者。〈適応菌種〉ムピロシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) 【用】(外)適量を1日3回鼻腔内に塗布

612. 主としてグラム陰性菌に作用するもの

6123. アミノ糖系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミカシン硫酸塩 アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」 Amikacin sulfate (沢井) 200mg2mL/A 【薬価】357.00円/A	【効】 敗血症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎。〈適応菌種〉アミカシンに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、緑膿菌 【用】(注)①筋注：1回100～200mgを1日1～2回。小児：1日4～8mg/kgとし、1日1～2回。②点滴静注：1回100～200mgを、1日2回。小児：1日4～8mg/kgとし、1日2回。新生児(未熟児を含む)：1回6mg/kgを、1日2回。100～500mLの補液中に100～200mgの割合で溶解し、30分～1時間かけて
イセパマイシン硫酸塩 エクサシン注射液 200 Exacin (旭化成) 200mg2mL/A 【薬価】515.00円/A	【効】 敗血症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎。〈適応菌種〉イセパマイシンに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、緑膿菌 【用】(注)1日400mgを1～2回に分割し筋注又は点滴静注。点滴静注は1日1回1時間かけて、又は1日2回30分～1時間かけて
カナマイシン硫酸塩 カナマイシンカプセル 250mg「明治」(患者限定) Kanamycin (Meiji Seika) 250mg/cap 【薬価】40.00円/cap	【効】 感染性腸炎。〈適応菌種〉カナマイシンに感性の大腸菌、赤痢菌、腸炎ビブリオ 【用】(内)1日2～4gを4回に分割。小児：1日50～100mg/kgを4回に分割

613. 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6131. ペニシリン系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>アモキシシリン水和物 <u>アモキシシリンカプセル 250mg</u> 「トーワ」 Amoxicillin (東和薬品) 250mg/C 【薬価】 10.10 円 /cap</p>	<p>【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺炎，骨髓炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 MALT リンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡の治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎。〈適応菌種〉本剤に感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，大腸菌，プロテウス・ミラビリス，インフルエンザ菌，ヘリコバクター・ピロリ，梅毒トレポネーマ</p> <p>【用】 (内) ①ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症：アモキシシリン水和物として1回 250mgを1日3～4回，小児：1日20～40mg/kgを3～4回に分割，1日量として90mg/kgまで。②ヘリコバクター・ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎：1) アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン及びプロトンポンプインヒビター併用の場合：アモキシシリン水和物として1回 750mg，クラリスロマイシンとして1回 200mg及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回，7日間，クラリスロマイシンは1回 400mg1日2回を上限。2)アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン及びプロトンポンプインヒビター併用によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合：アモキシシリン水和物として1回 750mg，メトロニダゾールとして1回 250mg及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回，7日間 (プロトンポンプインヒビターはランソプラゾールとして1回 30mg，オメプラゾールとして1回 20mg，ラベプラゾールナトリウムとして1回 10mg又はエソメプラゾールとして1回 20mgのいずれか1剤を選択)</p>
<p>アモキシシリン水和物 <u>後ワイドシリン細粒 20%</u> Widecillin (Meiji Seika) 200mg/g 【薬価】 11.80 円 /g</p>	<p>【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺炎，骨髓炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症。〈適応菌種〉本剤に感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，大腸菌，プロテウス・ミラビリス，インフルエンザ菌，ヘリコバクター・ピロリ，梅毒トレポネーマ</p> <p>【用】 (内) ① [ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症] 1回 250mgを1日3～4回，小児：1日20～40mg/kgを3～4回に分割，1日量として最大90mg/kgまで。② [胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症] (1) アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン及びランソプラゾール併用の場合：アモキシシリン水和物として1回 750mg，クラリスロマイシンとして1回 200mg及びランソプラゾールとして1回 30mgの3剤を同時に1日2回，7日間，クラリスロマイシンは，必要に応じて適宜増量できる。1回 400mg1日2回を上限。(2) アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン及びラベプラゾールナトリウム併用の場合：アモキシシリン水和物として1回 750mg，クラリスロマイシンとして1回 200mg及びラベプラゾールナトリウムとして1回 10mgの3剤を同時に1日2回，7日間，クラリスロマイシンは，必要に応じて適宜増量できる。1回 400mg1日2回を上限</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アンピシリンナトリウム <u>ビクシリン注射用 1g</u> Viccillin (Meiji Seika) 1g/V 【薬価】 481.00 円 / 瓶 <u>ビクシリン注射用 2g</u> Viccillin (Meiji Seika) 2g/V 【薬価】 818.00 円 / 瓶	【効】 敗血症，感染性心内膜炎，表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，腹膜炎，肝膿瘍，感染性腸炎，子宮内感染，化膿性髄膜炎，眼瞼膿瘍，角膜炎（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎，抜歯創・口腔手術創の二次感染，猩紅熱，炭疽，放線菌症。〈適応菌種〉アンピシリンに感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，髄膜炎菌，炭疽菌，放線菌，大腸菌，赤痢菌，プロテウス・ミラピリス，インフルエンザ菌，リステリア・モノサイトゲネス 【用】 (注)〔筋注〕1回 250～1000mgを1日2～4回。敗血症，感染性心内膜炎，化膿性髄膜炎については，通常用量より大量を使用。〔静注〕1日量1～2gを1～2回に分割し生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し静注し，点滴静注による場合は，1日量1～4gを1～2回に分割し輸液100～500mLに溶解し1～2時間かけて，敗血症，感染性心内膜炎，化膿性髄膜炎については，通常用量より大量を使用 小児：1日 100～200mg/kgを3～4回に分割し生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し静注し，点滴静注による場合は，輸液に溶解して用いる。1日 400mg/kgまで 新生児：1日 50～200mg/kgを2～4回に分割し生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し静注し，点滴静注による場合は，輸液に溶解して用いる
ピペラシリンナトリウム <u>ピペラシリンNa注用 1g「トーフ」</u> Piperacillin sodium (東和薬品) 1g/V 【薬価】 332.00 円 / 瓶 <u>ピペラシリンNa注用 2g「トーフ」</u> Piperacillin sodium (東和薬品) 2g/V 【薬価】 579.00 円 / 瓶	【効】 ①敗血症。②急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染。③膀胱炎，腎盂腎炎。④胆嚢炎，胆管炎。⑤バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎。⑥化膿性髄膜炎。〈適応菌種〉ピペラシリンに感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，大腸菌，シトロバクター属，肺炎桿菌，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，緑膿菌，バクテロイデス属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く） 【用】 (注) 1日2～4gを2～4回に分割し静注，筋注もできる。小児：1日 50～125mg/kgを2～4回に分割し静注。難治性又は重症感染症：症状に応じて，1回 4gを1日4回まで増量静注。小児：1日 300mg/kgまで増量して3回に分けて静注。1回投与量の上限は成人における1回 4gを超えない。その際，静注は注射用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し緩徐に。点滴静注に際しては，本剤1～4gを100～500mLの補液に溶解。筋注に際しては，本剤1gをリドカイン注射液（0.5w/v%）3mLに溶解し注射。点滴静注時の溶解にあたっての注意：注射用水を使用しない（溶液が等張にならないため）

6132. セフェム系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セファクロル <u>ケフラルカプセル 250mg (水江)</u> Kefral (塩野義) 250mg/cap 【薬価】 54.70 円 / cap <u>セファクロルカプセル 250mg 「トーフ」</u> Cefaclor (東和薬品) 250mg/C 【薬価】 54.70 円 / cap	【効】 ①表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症。②外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎。③咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染。④膀胱炎，腎盂腎炎。⑤麦粒腫。⑥中耳炎。⑦歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。⑧猩紅熱。〈適応菌種〉本剤に感性的のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス・ミラピリス，インフルエンザ菌 【用】 (内) 成人及び体重 20kg以上の小児：1日 750mgを3回に分割。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例：1日 1500mgを3回に分割

61. 抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セファゾリンナトリウム水和物 <u>セファゾリン Na 注射用 1g「NP」</u> Cefazolin sodium (ニプロ) 1g/V 【薬価】 346.00 円 / 瓶	【効】 敗血症，感染性心内膜炎，表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺炎，骨髓炎，関節炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎，眼内炎（全眼球炎を含む），中耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎。〈適応菌種〉セファゾリンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，大腸菌，肺炎桿菌，プロテウス・ミラビリス，プロビデンシア属 【用】 （注）1日量 1g，小児：20～40mg/kgを2回に分割して緩徐に静注するが，筋注もできる。症状及び感染菌の感受性から効果不十分と判断される場合，1日量 1.5～3gを，小児：50mg/kgを3回に分割。症状が特に重篤な場合，1日量 5g，小児：100mg/kgまでを分割投与できる。輸液に加え，点滴静注もできる
セフェピム塩酸塩水和物 <u>セフェピム塩酸塩静注用 1g「サンド」</u> Cefepime dihydrochloride (サンド) 1g/V 【薬価】 522.00 円 / 瓶	【効】 ①一般感染症：敗血症，深在性皮膚感染症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肛門周囲膿瘍，扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む），肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎，子宮内感染，子宮旁結合織炎，中耳炎，副鼻腔炎。〈適応菌種〉セフェピムに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，シュードモナス属，緑膿菌，パークホルデリア・セパシア，ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア，アシネトバクター属，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）。②発熱性好中球減少症 【用】 （注）投与開始後3日を目安とし継続投与が必要か判定し，投与中止又は適切な他剤に切り替えるか検討。投与期間は，原則14日以内。①1日1～2gを2回に分割し静注又は点滴静注。難治性・重症感染症は，1日量を4gまで増量し分割投与。②1日4gを2回に分割し，静注又は点滴静注。静注：注射用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し，緩徐に。点滴静注：糖液，電解質液又はアミノ酸製剤などの補液に加えて30分～1時間かけて
セフォチアム塩酸塩 <u>セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」</u> Cefotiam hydrochloride (ニプロ) 1g/V 【薬価】 729.00 円 / 瓶	【効】 ①敗血症。②深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染。③骨髓炎，関節炎。④扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染。⑤膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症）。⑥腹膜炎。⑦胆嚢炎，胆管炎。⑧バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎。⑨化膿性髄膜炎。⑩中耳炎，副鼻腔炎。〈適応菌種〉セフォチアムに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア・レットゲリ，インフルエンザ菌 【用】 （注）1日0.5～2gを2～4回に分割し静注，小児：1日40～80mg/kgを3～4回に分割し静注。敗血症には1日4gまで，小児の敗血症，化膿性髄膜炎等の重症・難治性感染症には1日160mg/kgまで。静注に際しては，注射用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解して用いる。1回用量0.25～2gを糖液，電解質液又はアミノ酸製剤等の補液に加えて，30分～2時間で点滴静注もできる。小児の場合は前記投与量を考慮し，補液に加えて，30分～1時間で点滴静注もできる。〈点滴静注時の注意〉点滴静注を行う場合，注射用水を用いると溶液が等張にならないため用いないこと

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セフジトレン ピボキシル <u>セフジトレンピボキシル小児用細粒 10%「SW」</u> Cefditoren pivoxil (沢井) 100mg/g 【薬価】 128.50 円/g	【効】 ①小児：表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，顎炎，猩紅熱，百日咳。〈適応菌種〉セフジトレンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，百日咳菌，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属，アクネ菌。②成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合）：表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。〈適応菌種〉セフジトレンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属，アクネ菌 【用】 (内) ①小児：〈肺炎，中耳炎，副鼻腔炎の場合〉1回 3mg/kgを1日3回食後，1回 6mg/kgまで。1回 200mg1日3回（1日 600mg）まで。〈前記以外の疾患の場合〉1回 3mg/kgを1日3回食後。1回 200mg1日3回（1日 600mg）まで。②成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合）：1回 100mgを1日3回食後，重症又は効果不十分と思われる場合は，1回 200mgを1日3回食後
セフジトレン ピボキシル <u>セフジトレンピボキシル錠 100mg「SW」</u> Cefditoren pivoxil (沢井) 100mg/T 【薬価】 56.60 円/T	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。〈適応菌種〉セフジトレンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属，アクネ菌 【用】 (内) 1回 100mgを1日3回食後。重症又は効果不十分と思われる場合は，1回 200mgを1日3回食後
セフジニル <u>セフジニル細粒小児用 10%「SW」(院外)</u> Cefdinir (沢井) 100mg/g 【薬価】 45.00 円/g 【先発品】 セフゾン細粒小児用 10%	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，中耳炎，副鼻腔炎，猩紅熱。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス・ミラビリス，インフルエンザ菌 【用】 (内) 小児：1日量 9～18mg/kgを3回に分割
セフジニル <u>セフジニル錠 100mg「サワイ」</u> Cefdinir (沢井) 100mg/T 【薬価】 44.90 円/T	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，尿道炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，麦粒腫，瞼板腺炎，外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，淋菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス・ミラビリス，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ペプトストレプトコッカス属，アクネ菌 【用】 (内) 1回 100mgを1日3回

61. 抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セフトジジム水和物 <u>セフトジジム静注用1g「VTRS」</u> (院内) Cefprozime (ヴィアトリス) 1g/瓶 【薬価】 686.00円/瓶	【効】 敗血症, 感染性心内膜炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎 (扁桃周囲炎, 扁桃周囲膿瘍を含む), 急性気管支炎, 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 前立腺炎 (急性症, 慢性症), 腹膜炎, 胆嚢炎, 胆管炎, 肝膿瘍, バルトリン腺炎, 子宮内感染, 子宮付属器炎, 子宮旁結合織炎, 化膿性髄膜炎, 中耳炎, 副鼻腔炎. <適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, シトロバクター属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, セラチア属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属, インフルエンザ菌, シュードモナス属, 緑膿菌, バークホルデリア・セパシア, ステノトロホモナス (ザントモナス)・マルトフィリア, アシネトバクター属, ペプトストレプトコッカス属, バクテロイデス属, プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く) 【用】 (注) 1日1～2gを2回に分割し静注. 難治性・重症感染症は1日量を4gまで増量し, 2～4回に分割. 小児: 1日40～100mg/kgを2～4回に分割し静注. 難治性・重症感染症は1日量を150mg/kgまで増量し, 2～4回に分割. 未熟児・新生児の生後0～3日齢は1回20mg/kgを1日2～3回, 生後4日齢以降は1回20mg/kgを1日3～4回静注. 難治性・重症感染症は, 1日量を150mg/kgまで増量し, 2～4回に分割. 静注は, 注射用水, 生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し, 緩徐に. 糖液, 電解質液又はアミノ酸製剤などの補液に加えて30分～2時間かけて点滴静注も可
セフトリアキソンナトリウム水和物 <u>セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」</u> Ceftriaxone sodium (日医工) 1g/V 【薬価】 422.00円/瓶	【効】 敗血症, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 精巣上体炎 (副睾丸炎), 尿道炎, 子宮頸管炎, 骨盤内炎症性疾患, 直腸炎, 腹膜炎, 腹腔内膿瘍, 胆嚢炎, 胆管炎, バルトリン腺炎, 子宮内感染, 子宮付属器炎, 子宮旁結合織炎, 化膿性髄膜炎, 角膜炎 (角膜潰瘍を含む), 中耳炎, 副鼻腔炎, 顎骨周辺の蜂巣炎, 顎炎. <適応菌種> セフトリアキソンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 淋菌, 大腸菌, シトロバクター属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, セラチア属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属, インフルエンザ菌, ペプトストレプトコッカス属, バクテロイデス属, プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く) 【用】 (注) 1日1～2gを1回又は2回に分割し静注又は点滴静注. 難治性又は重症感染症には1日量を4gまで増量し, 2回に分割し静注又は点滴静注. 淋菌感染症については, 次記の通り. (1) 咽頭・喉頭炎, 尿道炎, 子宮頸管炎, 直腸炎: 1gを単回静注又は単回点滴静注. (2) 精巣上体炎 (副睾丸炎), 骨盤内炎症性疾患: 1日1回1gを静注又は点滴静注. 小児: 1日20～60mg/kgを1回又は2回に分割し静注又は点滴静注. 難治性又は重症感染症には1日量を120mg/kgまで, 2回に分割し静注又は点滴静注. 未熟児・新生児の生後0～3日齢には1回20mg/kgを1日1回, 生後4日齢以降には1回20mg/kgを1日2回静注又は点滴静注. 難治性又は重症感染症には1回量を40mg/kgまで増量し, 1日2回静注又は点滴静注. 生後2週間以内の未熟児・新生児には1日50mg/kgまで. 静注に際しては, 注射用水, 生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し, 緩徐に. 点滴静注に際しては補液に溶解して用いる. 注) 点滴静注を行う場合, 注射用水を用いない (溶液が等張にならないため). 点滴静注は30分以上かけて
セフポドキシムプロキセチル <u>セフポドキシムプロキセチル DS小児用5%「サワイ」(院外)</u> Cefpodoxime proxetil (沢井) 50mg/g 【薬価】 23.40円/g 【先発品】 バナンドライシロップ5%	【効】 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎 (扁桃周囲炎, 扁桃周囲膿瘍を含む), 急性気管支炎, 肺炎, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 猩紅熱. <適応菌種> セフポドキシムに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス, 大腸菌, シトロバクター属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, プロテウス属, プロビデンシア属, インフルエンザ菌 【用】 (内) 小児: 1回3mg/kgを1日2～3回, 用時懸濁して. 重症又は効果不十分と思われる症例: 1回4.5mg/kgを1日3回

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
セフメタゾールナトリウム セフメタゾール Na 静注用 1g 「NP」 Cefmetazole sodium (ニプロ) 1g/V 【薬価】486.00 円 / 瓶	【効】敗血症，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮傍結合織炎，顎骨周辺の蜂巣炎，顎炎，〈適応菌種〉セフメタゾールに感性の黄色ブドウ球菌，大腸菌，肺炎桿菌，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く） 【用】（注）1日1～2gを2回に分割し静注又は点滴静注．小児：1日25～100mg/kgを2～4回に分割し静注又は点滴静注．難治性・重症感染症は1日4g，小児：150mg/kgまで増量し2～4回分割．1gを注射用水，生食液又はブドウ糖液10mLに溶解して緩徐に静注，補液（注射用水不可）に加えて点滴静注も可
【般】セフボドキシムプロキセチ ル錠 100mg（院外） 100mg/T	

6134. アミノ糖系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg「日医工」 Ⓜ Gentamicin sulfate (日医工) 40mg1mL/A 【薬価】291.00 円 / A	【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，中耳炎．〈適応菌種〉ゲンタマイシンに感性のブドウ球菌属，大腸菌，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，緑膿菌 【用】（注）1日3mg/kgを3回に分割して筋注又は点滴静注．増量する場合は，1日5mg/kgを限度とし，3～4回に分割．小児：1回2.0～2.5mg/kgを1日2～3回筋注又は点滴静注．点滴静注においては30分～2時間かけて注入．年齢，症状により適宜減量

6135. ホスホマイシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ホスホマイシンナトリウム ホスミン S 静注用 2g Fosmicin S (Meiji Seika) 2g1 瓶 【薬価】863.00 円 / 瓶	【効】敗血症，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮傍結合織炎．〈適応菌種〉ホスホマイシンに感性のブドウ球菌属，大腸菌，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア・レットゲリ，緑膿菌 【用】（注）①点滴静注：1日2～4g，小児：1日100～200mg/kgを2回に分割し，補液100～500mLに溶解して，1～2時間かけて点滴静注．②静注：1日2～4g，小児：1日100～200mg/kgを2～4回に分割し，5分以上かけてゆっくり静注．溶解には，注射用水又はブドウ糖注射液を用い，本剤1～2gを20mLに溶解
ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミン錠 500 Fosmicin (Meiji Seika) 500mg/T 【薬価】64.10 円 / T	【効】深在性皮膚感染症，膀胱炎，腎盂腎炎，感染性腸炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉ホスホマイシンに感性のブドウ球菌属，大腸菌，赤痢菌，サルモネラ属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア・レットゲリ，緑膿菌，カンピロバクター属 【用】（内）1日量2～3gを3～4回に分割．小児：1日量40～120mg/kgを3～4回に分割
ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミンシロップ 400 Fosmicin (Meiji Seika) 400mg/g 【薬価】86.20 円 / g	【効】深在性皮膚感染症，膀胱炎，腎盂腎炎，感染性腸炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉ホスホマイシンに感性のブドウ球菌属，大腸菌，赤痢菌，サルモネラ属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア・レットゲリ，緑膿菌，カンピロバクター属 【用】（内）小児：1日量40～120mg/kgを3～4回に分割

6139. その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テビペネムピボキシル オラペネム小児用細粒 10% (院外) Orapenem (Meiji Seika) 100mg/g 【薬価】596.20 円 / g	【効】肺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉テビペネムに感性の黄色ブドウ球菌，レンサ球菌属，肺炎球菌（ペニシリン耐性肺炎球菌及びマクロライド耐性肺炎球菌を含む），モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，インフルエンザ菌（アンピシリン耐性インフルエンザ菌を含む） 【用】（内）小児：1回4mg/kgを1日2回食後，1回6mg/kgまで

61. 抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ファロペネムナトリウム水和物 <u>ファロム錠 200mg</u> Farom (マルホ) 200mg/T 【薬価】 144.40 円 / T	【効】 ①表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, ざ瘡 (化膿性炎症を伴うもの), 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 乳腺炎, 肛門周囲膿瘍, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 膀胱炎 (単純性に限る), バルトリン腺炎, 子宮内感染, 子宮付属器炎, 涙囊炎, 麦粒腫, 睑板腺炎, 角膜炎 (角膜潰瘍を含む), 外耳炎, 歯周組織炎, 歯冠周囲炎, 顎炎. ②肺炎, 肺膿瘍, 膀胱炎 (単純性を除く), 腎盂腎炎, 前立腺炎 (急性症, 慢性症), 精巣上体炎 (副睾丸炎), 中耳炎, 副鼻腔炎. <適応菌種> ファロペネムに感性的のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス, 大腸菌, シトロバクター属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, プロテウス・ミラビリス, インフルエンザ菌, ペプトストレプトコッカス属, バクテロイデス属, プレボテラ属, アクネ菌 【用】 (内) ① 1回 150mg～200mgを 1日 3回. ② 1回 200mg～300mgを 1日 3回
メロペネム水和物 <u>メロペネム点滴静注用 0.25g「明治」</u> Meropenem (Meiji Seika) 250mg/V 【薬価】 560.00 円 / 瓶 <u>メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」</u> Meropenem (Meiji Seika) 500mg/V 【薬価】 656.00 円 / 瓶	【効】 ①一般感染症: 敗血症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 肛門周囲膿瘍, 骨髄炎, 関節炎, 扁桃炎 (扁桃周囲膿瘍を含む), 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 慢性呼吸器病変の二次感染, 複雑性膀胱炎, 腎盂腎炎, 腹膜炎, 胆嚢炎, 胆管炎, 肝膿瘍, 子宮内感染, 子宮付属器炎, 子宮旁結合織炎, 化膿性髄膜炎, 眼内炎 (全眼球炎を含む), 中耳炎, 副鼻腔炎, 顎骨周辺の蜂巣炎, 顎炎. <適応菌種> メロペネムに感性的のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, 髄膜炎菌, モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス, 大腸菌, シトロバクター属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, セラチア属, プロテウス属, プロピデンシア属, インフルエンザ菌, シュードモナス属, 緑膿菌, パークホルデリア・セパシア, バクテロイデス属, プレボテラ属. ②発熱性好中球減少症 【用】 (注) 本剤の使用に際しては, 投与開始後 3日を目安としてさらに継続投与が必要か判定し, 投与中止又はより適切な他剤に切り替えるべきか検討を行うこと. ① <化膿性髄膜炎以外の一般感染症> 1日 0.5～1gを 2～3回に分割し, 30分以上かけて点滴静注. 重症・難治性感染症には, 1回 1gを上限として, 1日 3gまで増量可. 小児: 1日 30～60mg/kgを 3回に分割し, 30分以上かけて点滴静注. 重症・難治性感染症には, 1日 120mg/kgまで増量可. 1日最大用量 3gまで. <化膿性髄膜炎> 1日 6gを 3回に分割し, 30分以上かけて点滴静注. 小児: 1日 120mg/kgを 3回に分割し, 30分以上かけて点滴静注. 1日用量 6gまで. ② 1日 3gを 3回に分割し, 30分以上かけて点滴静注. 小児: 1日 120mg/kgを 3回に分割し, 30分以上かけて点滴静注. 1日用量 3gまで
<u>オーグメンチン配合錠 250RS</u> Augmentin (グラクソ・スミスクライン) 1錠 【薬価】 45.70 円 / T 1錠中: クラブラン酸カリウム 125mg アモキシシリン水和物 250mg	【効】 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 淋菌感染症, 子宮内感染, 子宮付属器炎, 中耳炎. <適応菌種> 本剤に感性的のブドウ球菌属, 淋菌, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス属, インフルエンザ菌, バクテロイデス属, プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く) 【用】 (内) 1回 1錠, 1日 3～4回を 6～8時間毎
<u>クラバモックス小児用配合ドライシロップ (院外)</u> Clavamox (グラクソ・スミスクライン) 0.505g/包 【薬価】 114.30 円 / g 1.01g 中 (懸濁液 5mL に相当する.): クラブラン酸カリウム 42.9mg アモキシシリン水和物 600mg	【効】 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 中耳炎, 副鼻腔炎. <適応菌種> 本剤に感性的の肺炎球菌 (ペニシリン G に対する MIC ≤ 2μg/mL), モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス, インフルエンザ菌, ブドウ球菌属, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス属, バクテロイデス属, プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く) 【用】 (内) 小児: 1日量 96.4mg/kg (クラブラン酸カリウムとして 6.4mg/kg, アモキシシリン水和物として 90mg/kg) を 2回に分割し 12時間ごとに食直前

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ザバクサ配合点滴静注用 Zerbaxa (ハイオジェン) 30μg0.5mL/筒 【薬価】5,967.00円/瓶 1バイアル中： タゾバクタムナトリウム 537mg (タゾバクタムとして500mg) セフトロザン硫酸塩 1,147mg (セフトロザンとして1,000mg)</p>	<p>【効】敗血症，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝膿瘍。〈適応菌種〉本剤に感性のレンサ球菌属，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，インフルエンザ菌，緑膿菌 【用】(注)〈膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝膿瘍〉1回1.5g(タゾバクタムとして0.5g/セフトロザンとして1g)を1日3回60分かけて点滴静注。腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝膿瘍に対しては，メトロニダゾール注射液と併用。〈敗血症，肺炎〉1回3g(タゾバクタムとして1g/セフトロザンとして2g)を1日3回60分かけて点滴静注</p>
<p>スルバシリン静注用 1.5g Sulbacillin (Meiji Seika) 1.5g/V 【薬価】597.00円/瓶 1バイアル中： スルバクタムナトリウム 0.5g アンピシリンナトリウム 1g スルバシリン静注用 3g Sulbacillin (Meiji Seika) 3g/V 【薬価】778.00円/瓶 1バイアル中： スルバクタムナトリウム 1g アンピシリンナトリウム 2g</p>	<p>【効】①肺炎，肺膿瘍，腹膜炎。②膀胱炎。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス，大腸菌，プロテウス属，インフルエンザ菌 【用】(注)①1日6gを2回に分割し静注又は点滴静注。重症感染症の場合の適宜増量は，1回3g1日4回(1日量として12g)を上限。②1日3gを2回に分割し静注又は点滴静注。小児：1日60～150mg/kgを3～4回に分割し静注又は点滴静注。静注に際しては，注射用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し，緩徐に，点滴静注に際しては，補液に溶解</p>
<p>後タゾピベ配合静注用 4.5「明治」 Tazopipe (Meiji Seika) 4.5g/V 【薬価】892.00円/瓶 【先発品】ゾシン静注用 4.5 1バイアル中： タゾバクタム 0.5g ピペラシリン水和物 4.0g</p>	<p>【効】①敗血症，肺炎。②腎盂腎炎，複雑性膀胱炎，③腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎。④深在性皮膚感染症，びらん・潰瘍の二次感染。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，緑膿菌，アシネトバクター属，ペプトストレプトコッカス属，クロストリジウム属(クロストリジウム・ディフィシルを除く)，バクテロイデス属，プレボテラ属。⑤発熱性好中球減少症 【用】(注)①③1回4.5gを1日3回点滴静注。肺炎の場合1日4回に増量可。小児：1回112.5mg/kgを1日3回点滴静注。適宜減量可。1回投与量は4.5gまで。②1回4.5gを1日2回点滴静注。1日3回に増量可。小児：1回112.5mg/kgを1日2回点滴静注。適宜減量可。1日3回に増量可。1回投与量は4.5gまで。④1回4.5gを1日3回点滴静注。⑤1回4.5gを1日4回点滴静注。小児：1回90mg/kgを1日4回点滴静注。1回投与量は4.5gまで</p>
<p>ワイスタール配合静注用 1g Wystal (ニプロ) 1g/V 【薬価】313.00円/瓶 1バイアル中： スルバクタムナトリウム 0.5g セフォペラゾンナトリウム 0.5g</p>	<p>【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍，バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，プロビデンシア・レットゲリ，モルガネラ・モルガニー，インフルエンザ菌，緑膿菌，アシネトバクター属，バクテロイデス属，プレボテラ属 【用】(注)1日1～2gを2回に分割し静注，小児：1日40～80mg/kgを2～4回に分割し静注。難治性・重症感染症は1日4gまで増量し2回に分割，小児：1日160mg/kgまで増量し2～4回に分割。注射用水，生食液又はブドウ糖液に溶解して緩徐に静注又は補液(注射用水不可)に溶解して点滴静注</p>

61. 抗生物質製剤

614. 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

6141. エリスロマイシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エリスロマイシンエチルコハク酸 エステル <u>エリスロシンドライシロップ</u> <u>W20%</u> Erythrocin (ヴィアトリス) 200mg/g 【薬価】 32.00 円/g	【効】 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、梅毒、子宮内感染、中耳炎、猩紅熱、ジフテリア、百日咳。〈適応菌種〉エリスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、髄膜炎菌、ジフテリア菌、百日咳菌、梅毒トレポネーマ、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、マイコプラズマ属 【用】 (内) 1日 800～1200mgを4～6回に分割。小児：1日 25～50mg/kgを4～6回に分割。小児用量は成人量を上限。懸濁液調製法：本剤 10gに12mLの水を加え、よくふりまぜると20mLの懸濁液になる。この懸濁液 1mLはエリスロマイシン 100mgに相当する
エリスロマイシンステアリン酸塩 <u>エリスロシン錠 100mg</u> Erythrocin (ヴィアトリス) 100mg/T 【薬価】 5.90 円/T	【効】 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、骨髄炎、扁桃炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、梅毒、子宮内感染、中耳炎、歯冠周囲炎、猩紅熱、ジフテリア、百日咳、破傷風。〈適応菌種〉エリスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、髄膜炎菌、ジフテリア菌、軟性下疳菌、百日咳菌、破傷風菌、梅毒トレポネーマ、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、マイコプラズマ属 【用】 (内) 1日 800～1200mgを4～6回に分割。小児：1日 25～50mg/kgを4～6回に分割。小児用量は成人量を上限

6149. その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アジスロマイシン水和物 <u>ジスロマック細粒小児用 10% (錠外)</u> Zithromac (ファイザー) 100mg/g 【薬価】 155.60 円/g	【効】 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、中耳炎。〈適応菌種〉アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、マイコプラズマ属 【用】 (内) 小児：10mg/kgを1日1回、3日間。1日量は成人の最大投与量 500mgまで。分包製品の場合体重換算による服用量の概算は、次のとおり。体重 15～25kgの場合：1日あたり 200mg。体重 26～35kgの場合：1日あたり 300mg。体重 36～45kgの場合：1日あたり 400mg。体重 46kg～の場合：1日あたり 500mg
アジスロマイシン水和物 <u>ジスロマック錠 250mg</u> Zithromac (ファイザー) 250mg/T 【薬価】 158.90 円/T	【効】 ①深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。②尿道炎、子宮頸管炎。③骨盤内炎症性疾患。〈適応菌種〉アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、ペプトストレプトコッカス属、プレボテラ属、クラミジア属、マイコプラズマ属 【用】 (内) ① 500mgを1日1回、3日間合計 1.5g。② 1000mgを1回。③アジスロマイシン注射剤による治療を行った後、250mgを1日1回
アジスロマイシン水和物 <u>ジスロマック点滴静注用 500mg</u> Zithromac (ファイザー) 500mg/V 【薬価】 1,954.00 円/瓶	【効】 肺炎、骨盤内炎症性疾患。〈適応菌種〉アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、ペプトストレプトコッカス属、プレボテラ属、クラミジア属、マイコプラズマ属 【用】 (注) 500mgを1日1回、2時間かけて点滴静注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クラリスロマイシン <u>クラリスロマイシン錠 200mg「大正」</u> Clarithromycin (大正製薬) 200mg/T 【薬価】 25.30 円/T	【効】 ①一般感染症：表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，尿道炎，子宮頸管炎，感染性腸炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，インフルエンザ菌，レジオネラ属，カンピロバクター属，ペプトストレプトコッカス属，クラミジア属，マイコプラズマ属。②非結核性抗酸菌症：マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症を含む非結核性抗酸菌症。〈適応菌種〉本剤に感性のマイコバクテリウム属。③ヘリコバクター・ピロリ感染症：胃潰瘍・十二指腸潰瘍，胃 MALT リンパ腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎。〈適応菌種〉本剤に感性のヘリコバクター・ピロリ 【用】 (内) ① 1日 400mgを2回に分割，② 1日 800mgを2回に分割，③クラリスロマイシンとして1回 200mg，アモキシシリン水和物として1回 750mg及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回，7日間，クラリスロマイシンは1回 400mg1日2回を上限
クラリスロマイシン <u>クラリスロマイシン DS 小児用 10%「タカタ」</u> Clarithromycin (高田) 100mg/g 【薬価】 57.90 円/g	【効】 ①一般感染症：表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，感染性腸炎，中耳炎，副鼻腔炎，猩紅熱，百日咳。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，インフルエンザ菌，レジオネラ属，百日咳菌，カンピロバクター属，クラミジア属，マイコプラズマ属。②後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症。〈適応菌種〉本剤に感性のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC） 【用】 (内) ①用時懸濁し，小児：1日 10～15mg/kgを2～3回に分割，レジオネラ肺炎に対しては，1日 15mg/kgを2～3回に分割，②用時懸濁し，小児：1日 15mg/kgを2回に分割

615. 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

6152. テトラサイクリン系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ドキシサイクリン塩酸塩水和物 <u>ビブラマイシン錠 100mg</u> Vibramycin (ファイザー) 100mg/T 【薬価】 22.00 円/T	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），尿道炎，淋菌感染症，感染性腸炎，コレラ，子宮内感染，子宮付属器炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒腫，角膜炎（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔炎，歯冠周囲炎，化膿性唾液腺炎，猩紅熱，炭疽，ブルセラ症，ペスト，Q熱，オウム病。〈適応菌種〉ドキシサイクリンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，淋菌，炭疽菌，大腸菌，赤痢菌，肺炎桿菌，ペスト菌，コレラ菌，ブルセラ属，Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ），クラミジア属 【用】 (内) 初日1日量 200mgを1回又は2回に分割，2日目より1日量 100mgを1回
ミノサイクリン塩酸塩 <u>ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」</u> Minocycline hydrochloride (沢井) 20mg/g 【薬価】 30.00 円/g	【効】 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎，歯周組織炎，感染性口内炎，猩紅熱，炭疽，つつが虫病，オウム病。〈適応菌種〉ミノサイクリンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，炭疽菌，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，リケッチア属（オリエンチア・ツツガムシ），クラミジア属，肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】 (内) 小児：2～4mg（本剤0.1～0.2g）/kgを1日量として，12あるいは24時間ごとに粉末のまま，用時水を加えてシロップ状にして用いることも可

61. 抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」 Minocycline (日医工) 100mg/V 【薬価】 219.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 敗血症, 深在性皮膚感染症, 慢性膿皮症, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 腹膜炎, 炭疽, つつが虫病, オウム病. <適応菌種> ミノサイクリンに感性的黄色ブドウ球菌, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, モラクセラ・ラクナータ (モラー・アクセンフェルト菌), 炭疽菌, 大腸菌, クレブシエラ属, エンテロバクター属, インフルエンザ菌, シュードモナス・フルオレッセンス, 緑膿菌, パークホルデリア・セパシア, ステノトロホモナス (ザントモナス)・マルトフィリア, アシネトバクター属, フラボバクテリウム属, レジオネラ・ニューモフィラ, リケッチア属 (オリエンチア・ツツガムシ), クラミジア属, 肺炎マイコプラズマ (マイコプラズマ・ニューモニエ) 【用】 (注) 点滴静注は, 経口投与不能の患者及び救急の場合に行い, 経口投与が可能になれば経口用剤に切り替える. 初回 100 ~ 200mg, 以後 12 時間ないし 24 時間ごとに 100mg を補液に溶かし, 30 分 ~ 2 時間かけて点滴静注. [注射液調製法] 本剤 100mg 及び 200mg 当たり 100 ~ 500mL の糖液, 電解質液又はアミノ酸製剤などに溶解. 注射用水は等張とならないので使用しないこと</p>
<p>ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン錠 50mg (水江) Minomycin (ファイザー) 50mg/T 【薬価】 13.80 円 / T ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「サワイ」 Minocycline hydrochloride (沢井) 50mg/T 【薬価】 14.30 円 / T ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」 Minocycline hydrochloride (沢井) 100mg/T 【薬価】 28.00 円 / T</p>	<p>【効】 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 乳腺炎, 骨髄炎, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎 (扁桃周囲炎を含む), 急性気管支炎, 肺炎, 肺膿瘍, 慢性呼吸器病変の二次感染, 膀胱炎, 腎盂腎炎, 前立腺炎 (急性症, 慢性症), 精巣上体炎 (副睾丸炎), 尿道炎, 淋菌感染症, 梅毒, 腹膜炎, 感染性腸炎, 外陰炎, 細菌性膣炎, 子宮内感染, 涙嚢炎, 麦粒腫, 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎, 化膿性唾液腺炎, 歯周組織炎, 歯冠周囲炎, 上顎洞炎, 顎炎, 炭疽, つつが虫病, オウム病. <適応菌種> ミノサイクリンに感性的ブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, 淋菌, 炭疽菌, 大腸菌, 赤痢菌, シトロバクター属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア属, 緑膿菌, 梅毒トレポネーマ, リケッチア属 (オリエンチア・ツツガムシ), クラミジア属, 肺炎マイコプラズマ (マイコプラズマ・ニューモニエ) 【用】 (内) 初回量を 100 ~ 200mg とし, 以後 12 時間ごとあるいは 24 時間ごとに 100mg</p>

616. 主として抗酸菌に作用するもの

6161. ストレプトマイシン系抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ストレプトマイシン硫酸塩 硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」【経過措置】 Streptomycin sulfate (Meiji Seika) 1g/V 【薬価】 396.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ①肺結核及びその他の結核症. ②マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症. ③感染性心内膜炎 (ベンジルペニシリン又はアンピシリンと併用の場合に限る), ペスト, 野兔病, ワイル病. <適応菌種> ストレプトマイシンに感性的マイコバクテリウム属, ペスト菌, 野兔病菌, ワイル病レプトスピラ 【用】 (注) ① 1 日 1g を筋注. 週 2 ~ 3 日, あるいははじめの 1 ~ 3 か月は毎日, その後週 2 日. 必要に応じて局所に投与. 高齢者 (60 歳以上) には 1 回 0.5 ~ 0.75g とし, 小児あるいは体重の著しく少ないものにあつては, 適宜減量. 他の抗結核薬と併用. ② 1 日 0.75 ~ 1g を週 2 回又は週 3 回筋注. 適宜減量. ③ 1 日 1 ~ 2g を 1 ~ 2 回に分割し筋注</p>

6164. リファンピシン製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>リファンピシン リファンピシンカプセル 150mg「サンド」 Rifampicin (サンド) 150mg/cap 【薬価】 16.90 円 / cap</p>	<p>【効】 ①肺結核及びその他の結核症. ②マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症. ③ハンセン病. <適応菌種> 本剤に感性的マイコバクテリウム属 【用】 (内) ① 1 回 450mg を 1 日 1 回毎日. 感性併用剤のある場合は週 2 日投与でもよい. 朝食前空腹時. 他の抗結核剤との併用が望ましい. ② 1 回 450mg を 1 日 1 回毎日. 朝食前空腹時. 1 日 600mg まで. ③ 1 回 600mg を 1 か月に 1 ~ 2 回又は 1 回 450mg を 1 日 1 回毎日. 朝食前空腹時. 他の抗ハンセン病剤と併用すること</p>

6169. その他の主として抗酸菌に作用するもの

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミカシン硫酸塩 <u>アリケイス吸入液 590mg</u> Arikayce (インスメッド) 590mg8.4mL/瓶 【薬価】 38,437.90 円 / 瓶	【効】 マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) による肺非結核性抗酸菌症。〈適応菌種〉アミカシンに感性のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 【用】 (内) 590mgを1日1回ネブライザを用いて吸入
リファブチン <u>ミコブティンカプセル 150mg</u> Mycobutin (ファイザー) 150mg/cap 【薬価】 486.60 円 / cap	【効】 ①結核症。②マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症。③ HIV 感染患者における播種性 MAC 症の発症抑制。〈適応菌種〉本剤に感性のマイコバクテリウム属 【用】 (内) ① 150mg～300mgを1日1回。多剤耐性結核症には300mg～450mgを1日1回。②③ 300mgを1日1回

617. 主としてカビに作用するもの

6173. アムホテリシン B 製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アムホテリシン B <u>アムビゾーム点滴静注用 50mg</u> Ⓢ Ambisome (大日本住友) 50mg/V 【薬価】 11,471.00 円 / 瓶	【効】 ①真菌感染症：アスペルギルス属、カンジダ属、クリプトコッカス属、ムーコル属、アブジシア属、リゾプス属、リゾムーコル属、クラドスポリウム属、クラドヒアロホーラ属、ホンセカエア属、ヒアロホーラ属、エクソフィアラ属、コクシジオイデス属、ヒストプラズマ属及びプラストミセス属による次記感染症：真菌血症、呼吸器真菌症、真菌髄膜炎、播種性真菌症。②真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症。③リーシュマニア症 【用】 (注) ① 2.5mg/kgを1日1回、1～2時間以上かけて点滴静注。1日総投与量は5mg/kgまで。クリプトコッカス髄膜炎では、1日総投与量は6mg/kgまで。② 2.5mg/kgを1日1回、1～2時間以上かけて点滴静注。③免疫能の正常な患者：投与1～5日目の連日、14日目及び21日目にそれぞれ2.5mg/kgを1日1回、1～2時間以上かけて点滴静注。免疫不全状態の患者：投与1～5日目の連日、10日目、17日目、24日目、31日目及び38日目に4.0mg/kgを1日1回、1～2時間以上かけて点滴静注
アムホテリシン B <u>ファンギゾンシロップ 100mg/mL</u> Ⓢ Fungizone (クリニジェン) 100mg/mL 【薬価】 54.60 円 / mL	【効】 消化管におけるカンジダ異常増殖 【用】 (内) 小児：1回50～100mg (本剤として0.5～1mL) を1日2～4回食後

6179. その他の主としてカビに作用するもの

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ボリコナゾール <u>ブイフェンド錠 50mg</u> Ⓢ Vfend (ファイザー) 50mg/T 【薬価】 368.20 円 / T <u>ブイフェンド錠 200mg</u> Ⓢ Vfend (ファイザー) 200mg/T 【薬価】 1,238.60 円 / T	【効】 ①次記の重症又は難治性真菌感染症：侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症、カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症、クリプトコッカス髄膜炎、肺クリプトコッカス症、フサリウム症、スケドスポリウム症。②造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 【用】 (内) 成人体重40kg以上：初日は1回300mgを1日2回、2日目以降は1回150mg又は1回200mgを1日2回食間。初日投与量の上限は1回400mg1日2回、2日目以降投与量の上限は1回300mg1日2回まで。成人体重40kg未満：初日は1回150mgを1日2回、2日目以降は1回100mgを1日2回食間。2日目以降の投与量を1回150mg1日2回まで増量可。小児 (2歳以上12歳未満及び12歳以上で体重50kg未満)：ボリコナゾール注射剤による投与後、1回9mg/kgを1日2回食間に経口投与。患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には1mg/kgずつ増量し、忍容性が不十分の場合には1mg/kgずつ減量する (最大投与量として350mgを用いた場合は50mgずつ減量する)。1回350mg1日2回を上限。小児 (12歳以上で体重50kg以上)：ボリコナゾール注射剤による投与後、1回200mgを1日2回食間に経口投与。患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には1回300mg1日2回まで増量可

61. 抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ボリコナゾール ブイフェンド 200mg 静注用 (株) Vfend (ファイザー) 200mg/V 【薬価】 6,010.00 円 / 瓶	【効】 ①次記の重症又は難治性真菌感染症：侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症、カンジダ血症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症、クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症、フサリウム症、スクエドスポリウム症。②造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 【用】(注) 初日は1回6mg/kgを1日2回、2日目以降は1回3mg/kg又は1回4mg/kgを1日2回点滴静注。〈点滴静注溶液の調製法〉注射用水19mLに溶解し、必要量の溶解液を配合変化がないことが確認されている輸液に加えて希釈して用いる。小児(2歳以上12歳未満及び12歳以上で体重50kg未満)：初日は1回9mg/kgを1日2回、2日目以降は1回8mg/kgを1日2回点滴静注。効果不十分の場合1mg/kgずつ増量、忍容性が不十分の場合1mg/kgずつ減量。小児(12歳以上で体重50kg以上)：初日は1回6mg/kgを1日2回、2日目以降は1回4mg/kgを1日2回点滴静注
ミカファンギンナトリウム ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg 「サワイ」 (株) Micafungin Na (沢井) 50mg 【薬価】 1,535.00 円 / 瓶 【先発品】 ファンガード点滴用 50mg	【効】 ①アスペルギルス属及びカンジダ属による次記感染症：真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症。②造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防 【用】(注) ①アスペルギルス症：50～150mgを1日1回点滴静注。重症又は難治性アスペルギルス症には、1日300mgまで。小児：1～3mg/kgを1日1回点滴静注。重症又は難治性アスペルギルス症には、1日6mg/kgまで。カンジダ症：50mgを1日1回点滴静注。重症又は難治性カンジダ症には、1日300mgまで。小児：1mg/kgを1日1回点滴静注。重症又は難治性カンジダ症には、1日6mg/kgまで。②50mgを1日1回点滴静注。小児：1mg/kgを1日1回点滴静注。 点滴静注に際しては、生理食塩液、ブドウ糖注射液又は補液に溶解。溶解にあたっては、注射用水を使用しないこと。(溶液が等張とならないため。)成人：75mg以下では30分以上、75mgを超えて投与する場合は1時間以上かけて。小児：1時間以上かけて

619. その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む。)

6199. 他に分類されない抗生物質製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リファキシミン リフキシマ錠 200mg Rifxima (あすか) 200mg/T 【薬価】 204.40 円 / T	【効】 肝性脳症における高アンモニア血症の改善 【用】(内) 1回400mgを1日3回食後
ボノサップパック 400 (院外) Vonosap (武田) 1シート 【薬価】 492.40 円 / シート 1シート(1日分)中： タケキャブ錠 20mg 2錠 アモリンカプセル 250 6カプセル クラリス錠 200 2錠	【効】 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 MALT リンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎。(適応菌種)アモキシシリン、クラリスロマイシンに感性のヘリコバクター・ピロリ 【用】(内) ボノプラザンとして1回20mg、アモキシシリン水和物として1回750mg及びクラリスロマイシンとして1回200mgの3剤を同時に1日2回、7日間投与。クラリスロマイシンは適宜増量可。1回400mg、1日2回まで

62. 化学療法剤

621. サルファ剤

6219. その他のサルファ剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
サラゾスルファピリジン アザルフィジン EN錠 500mg Azulfidine EN (あゆみ) 500mg/T 【薬価】29.70円/T	【効】関節リウマチ 【用】(内) 消炎鎮痛剤などで十分な効果が得られない場合に使用。1日投与量1gを朝食及び夕食後の2回に分割
サラゾスルファピリジン サラゾピリン錠 500mg Salazopyrin (ファイザー) 500mg/T 【薬価】9.30円/T	【効】潰瘍性大腸炎, 限局性腸炎, 非特異性大腸炎 【用】(内) 1日2～4gを4～6回に分割。初回毎日8gを用いても差しつかえない。この場合3週間を過ぎれば次第に減量し, 1日1.5～2gを用いる。ステロイド療法を長期間継続した症例については, サラゾピリン2gを併用しながら, 徐々にステロイドを減量することが必要

622. 抗結核剤

6222. イソニアジド系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イソニアジド イスコチン錠 100mg Iscotin (アルフレッサ) 100mg/T 【薬価】9.80円/T	【効】肺結核及びその他の結核症。〈適応菌種〉本剤に感性的結核菌 【用】(内) 1日量200～500mg(4～10mg/kg)を1～3回に分割し, 毎日又は週2日, 1日量1gまで, 13歳未満は20mg/kgまで増量可。他の抗結核薬と併用することが望ましい
イソニアジド イスコチン注 100mg Iscotin (第一三共) 100mg2mL/A 【薬価】94.00円/A	【効】肺結核及びその他の結核症。〈適応菌種〉本剤に感性的結核菌 【用】(注) 1日量200～500mg(4～10mg/kg)を筋注又は静注。髄腔内, 胸腔内注入又は局所分注の場合には1回50～200mg。他の抗結核薬と併用することが望ましい

6223. ピラジナミド製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ピラジナミド ピラマイド原末 Pyramide (アルフレッサ) 末 【薬価】26.60円/g	【効】肺結核及びその他の結核症。〈適応菌種〉本剤に感性的結核菌 【用】(内) 1日量1.5～2.0gを1～3回に分割。他の抗結核薬と併用

6225. エタンブトール製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エタンブトール塩酸塩 エサンブトール錠 250mg Ⓜ Eсанbutol (サンド) 250mg/T 【薬価】11.90円/T エブトール 250mg錠 Ⓜ Ebutol (科研) 250mg/T 【薬価】32.20円/T	【効】①肺結核及びその他の結核症。②マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む非結核性抗酸菌症。〈適応菌種〉本剤に感性的マイコバクテリウム属 【用】(内) ①1日量0.75～1gを1～2回に分割。他の抗結核薬と併用することが望ましい。②0.5～0.75gを1日1回。1日量として1gまで

624. 合成抗菌剤

6241. ピリドンカルボン酸系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
シタフロキサシン水和物 グレースビット錠 50mg (院外) Gracevit (第一三共) 50mg/T 【薬価】98.30 円/T ④シタフロキサシン錠 50mg「サワイ」 Sitafloxacin (沢井) 50mg/T 【薬価】92.60 円/T 【先発品】グレースビット錠 50mg	【効】①咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染。②膀胱炎，腎盂腎炎，尿道炎。③子宮頸管炎。④中耳炎，副鼻腔炎。⑤歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，インフルエンザ菌，緑膿菌，レジオネラ・ニューモフィラ，ペプトストレプトコッカス属，プレボテラ属，ボルフィロモナス属，フソバクテリウム属，トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス），肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ），肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】（内）1回 50mgを1日2回又は1回 100mgを1日1回。1回 100mgを1日2回まで
シプロフロキサシン ④シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」 Ciprofloxacin (ニプロ) 400mg/200mL/袋 【薬価】1,199.00 円/袋 【先発品】シプロキサシン注 400mg	【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肺炎，腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，炭疽。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，腸球菌属，炭疽菌，大腸菌，クレブシエラ属，エンテロバクター属，緑膿菌，レジオネラ属。小児：①一般感染症：複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，炭疽。〈適応菌種〉本剤に感性の炭疽菌，大腸菌，緑膿菌。②嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染に伴う症状の改善 【用】（注）1回 400mgを1日2回，1時間かけて点滴静注。1日3回に増量できる。小児：①複雑性膀胱炎，腎盂腎炎：1回 6～10mg/kgを1日3回，1時間かけて点滴静注。成人における1回量 400mgを超えない。炭疽：1回 10mg/kgを1日2回，1時間かけて点滴静注。成人における1回量 400mgを超えない。②1回 10mg/kgを1日3回，1時間かけて点滴静注。成人における1回量 400mgを超えない
トスフロキサシントシル酸塩水和物 オゼックス細粒小児用 15% (院外) Ozex (大正富山) 150mg（トスフロキサシンとして 102mg）/g 【薬価】314.30 円/g	【効】肺炎，コレラ，中耳炎，炭疽。〈適応菌種〉トスフロキサシンに感性の肺炎球菌（ペニシリン耐性肺炎球菌を含む），モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，炭疽菌，コレラ菌，インフルエンザ菌（β-ラクタム耐性インフルエンザ菌を含む），肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】（内）小児：1回 6mg/kg（トスフロキサシンとして 4.1mg/kg）を1日2回。1回 180mg，1日 360mg（トスフロキサシンとして1回 122.4mg，1日 244.8mg）まで
ラスフロキサシン塩酸塩 ラスビック錠 75mg Lasvic (杏林) 75mg 【薬価】296.30 円/T	【効】咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，中耳炎，副鼻腔炎。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，クレブシエラ属，エンテロバクター属，インフルエンザ菌，レジオネラ・ニューモフィラ，プレボテラ属，肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】（内）1回 75mgを1日1回
ラスフロキサシン塩酸塩 ラスビック点滴静注キット 150mg Lasvic (杏林) 150mg/キット 【薬価】3,962.00 円/キット	【効】肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，クレブシエラ属，エンテロバクター属，インフルエンザ菌，レジオネラ・ニューモフィラ，ペプトストレプトコッカス属，ペイヨネラ属，バクテロイデス属，プレボテラ属，ボルフィロモナス属，フソバクテリウム属，肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】（注）投与初日に 300mgを，投与2日目以降は 150mgを1日1回点滴静注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レボフロキサシン水和物 ④レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」 Levofloxacin (第一三共) 500mg/T 【薬価】 69.90 円/T 【先発品】 クラビット錠 500mg	【効】 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、肺結核及びその他の結核症、Q熱。〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、結核菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兔病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】 （内）1回 500mg 1日 1回。肺結核及びその他の結核症は、原則として他の抗結核薬と併用。腸チフス、パラチフス：1回 500mg 1日 1回、14日間
レボフロキサシン水和物 ④レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL 「DSEP」 Levofloxacin (第一三共) 500mg/100mL 【薬価】 1,151.00 円/キット 【先発品】 クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	【効】 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾炎）、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、腸チフス、パラチフス、子宮内感染、子宮付属器炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、Q熱。〈適応菌種〉レボフロキサシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兔病菌、ペプトストレプトコッカス属、プレボテラ属、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） 【用】 （注）1回 500mgを1日1回、約60分間かけて点滴静注

6249. その他の合成抗菌剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
リネゾリド ④リネゾリド錠 600mg 「サワイ」 （院内） Linezolid (沢井) 600mg/T 【薬価】 4,506.80 円/T 【先発品】 ザイボックス錠 600mg	【効】 ①敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎。〈適応菌種〉本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）。②各種感染症。〈適応菌種〉本剤に感性のバンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム 【用】 （内）成人及び12歳以上の小児：1日 1200mgを2回に分割し、1回 600mgを12時間ごと。12歳未満の小児：1回 10mg/kgを8時間ごと。1回 600mgまで
リネゾリド ④リネゾリド点滴静注液 600mg 「日医工」 Linezolid (日医工) 600mg/300mL/袋 【薬価】 6,408.00 円/袋 【先発品】 ザイボックス注射液 600mg	【効】 ①敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎。〈適応菌種〉本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）。②各種感染症。〈適応菌種〉本剤に感性のバンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム 【用】 （注）成人及び12歳以上の小児：1日 1200mgを2回に分割し、1回 600mgを12時間ごとに、それぞれ30分～2時間かけて点滴静注。12歳未満の小児：1回 10mg/kgを8時間ごとに、それぞれ30分～2時間かけて点滴静注。1回 600mgまで

625. 抗ウイルス剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アシクロビル <u>アシクロビル錠 200mg 「サワイ」</u> Aciclovir (沢井) 200mg/T 【薬価】 19.30 円 /T	【効】 [成人] ①単純疱疹. ②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症 (単純疱疹) の発症抑制. ③带状疱疹 [小児] ①単純疱疹. ②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症 (単純疱疹) の発症抑制. ③带状疱疹. ④性器ヘルペスの再発抑制, 体重 40kg 以上に限り投与 【用】 (内) [成人] ①1回 200mg を 1日 5回. ②1回 200mg を 1日 5回. 造血幹細胞移植施行 7日前より施行後 35日まで. ③1回 800mg を 1日 5回 [小児] ①1回 20mg/kg を 1日 4回. 1回 200mg まで. ②1回 20mg/kg を 1日 4回. 造血幹細胞移植施行 7日前より施行後 35日まで. 1回 200mg まで. ③1回 20mg/kg を 1日 4回. 1回 800mg まで. ④1回 20mg/kg を 1日 4回. 1回 200mg まで
アシクロビル <u>アシクロビル点滴静注液 250mg 「トーフ」</u> Aciclovir (東和薬品) 250mg/10mL/ 本 【薬価】 378.00 円 /A	【効】 ①単純ヘルペスウイルス及び水痘・带状疱疹ウイルスに起因する次記感染症: 免疫機能の低下した患者 (悪性腫瘍・自己免疫疾患など) に発症した単純疱疹・水痘・带状疱疹. 脳炎・髄膜炎. ②新生児単純ヘルペスウイルス感染症 【用】 (注) ①1回 5mg/kg を 1日 3回, 8時間毎に 1時間以上かけて, 7日間点滴静注. 脳炎・髄膜炎においては, 投与期間の延長もしくは増量可. 1回 10mg/kg まで. 小児: 1回 5mg/kg を 1日 3回, 8時間毎に 1時間以上かけて, 7日間点滴静注. 1回 20mg/kg まで. 脳炎・髄膜炎においては, 投与期間の延長も可. ②新生児: 1回 10mg/kg を 1日 3回, 8時間毎に 1時間以上かけて, 10日間点滴静注. 投与期間の延長もしくは増量可. 1回 20mg/kg まで
アシクロビル <u>後アシクロビル DS80% 「NK」</u> Aciclovir (日本化薬) 800mg/g 【薬価】 129.90 円 /g	【効】 [成人] ①単純疱疹. ②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症 (単純疱疹) の発症抑制. ③带状疱疹 [小児] ①単純疱疹. ②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症 (単純疱疹) の発症抑制. ③带状疱疹. ④水痘. ⑤性器ヘルペスの再発抑制, 体重 40kg 以上に限り投与 【用】 (内) [成人] ①1回 200mg (本剤として 0.25g) を 1日 5回. ②1回 200mg (本剤として 0.25g) を 1日 5回 造血幹細胞移植施行 7日前より施行後 35日まで. ③1回 800mg (本剤として 1g) を 1日 5回 [小児] ①1回 20mg/kg (本剤として 0.025g/kg) を 1日 4回. 1回最高用量は 200mg (本剤として 0.25g). ②1回 20mg/kg (本剤として 0.025g/kg) を 1日 4回 造血幹細胞移植施行 7日前より施行後 35日まで. 1回最高用量は 200mg (本剤として 0.25g). ③④1回 20mg/kg (本剤として 0.025g/kg) を 1日 4回. 1回最高用量は 800mg (本剤として 1g). ⑤1回 20mg/kg (本剤として 0.025g/kg) を 1日 4回. 1回最高用量は 200mg (本剤として 0.25g) いずれも用時懸濁
アメナメビル <u>アメナリーブ錠 200mg</u> Amenalief (マルホ) 200mg/T 【薬価】 1,177.50 円 /T	【効】 ①带状疱疹. ②再発性の単純疱疹 【用】 (内) ①1回 400mg を 1日 1回食後. ②1200mg を食後に単回
エンテカビル水和物 <u>バラクルード錠 0.5mg</u> Ⓢ Baraclade (ブリストル・マイヤーズ) 0.5mg/T 【薬価】 461.90 円 /T <u>後エンテカビル OD 錠 0.5mg 「サワイ」</u> Ⓢ Entecavir OD (沢井) 0.5mg/T 【薬価】 76.80 円 /T 【先発品】 バラクルード錠 0.5mg	【効】 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された B型慢性肝疾患における B型肝炎ウイルスの増殖抑制 【用】 (内) 空腹時 (食後 2時間以降かつ次の食事の 2時間以上前) に 0.5mg を 1日 1回. ラミブジン不応 (ラミブジン投与中に B型肝炎ウイルス血症が認められる又はラミブジン耐性変異ウイルスを有するなど) 患者には 1mg を 1日 1回

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オセルタミビルリン酸塩 <u>⑧オセルタミビルカプセル 75mg</u> <u>「サワイ」</u> Oseltamivir (沢井) 75mg/C 【薬価】 111.60 円 /cap 【先発品】 タミフルカプセル 75	【効】 A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症及びその予防 【用】 (内) ①治療に用いる場合：成人及び体重 37.5kg 以上の小児には 1 回 75mg を 1 日 2 回，5 日間。②予防に用いる場合：(1) 成人：1 回 75mg を 1 日 1 回，7～10 日間。(2) 体重 37.5kg 以上の小児：1 回 75mg を 1 日 1 回，10 日間
オセルタミビルリン酸塩 <u>⑧オセルタミビル DS3%「サワイ」</u> Oseltamivir (沢井) 3%30g 【薬価】 82.40 円 /g 【先発品】 タミフルドライシロップ 3%	【効】 A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症及びその予防 【用】 (内) ①治療に用いる場合：(1) 成人：1 回 75mg を 1 日 2 回，5 日間，用時懸濁して。(2) 幼小児：1 回 2mg/kg (ドライシロップ剤として 66.7mg/kg) を 1 日 2 回，5 日間，用時懸濁して，1 回 75mg まで。新生児，乳児：1 回 3mg/kg (ドライシロップ剤として 100mg/kg) を 1 日 2 回，5 日間，用時懸濁して，1 回 75mg まで。②予防に用いる場合：(1) 成人：1 回 75mg を 1 日 1 回，7～10 日間，用時懸濁して。(2) 幼小児：1 回 2mg/kg (ドライシロップ剤として 66.7mg/kg) を 1 日 1 回，10 日間，用時懸濁して，1 回 75mg まで
ガンシクロビル <u>⑧デノシン点滴静注用 500mg</u> Denosine (田辺三菱) 500mg/V 【薬価】 10,503.00 円 / 瓶	【効】 次記におけるサイトメガロウイルス感染症：①後天性免疫不全症候群。②臓器移植（造血幹細胞移植も含む）。③悪性腫瘍 【用】 (注) 初期治療は，1 回 5mg/kg を 1 日 2 回，12 時間毎に 1 時間以上かけて点滴静注。維持治療は，後天性免疫不全症候群の患者又は免疫抑制剤投与中の患者で，再発の可能性が高い場合は必要に応じ維持治療に移行することとし，1 日 6mg/kg を週に 5 日又は 1 日 5mg を週に 7 日，1 時間以上かけて点滴静注。維持治療中又は投与終了後，サイトメガロウイルス感染症の再発が認められる患者においては再投与として初期治療の用法・用量にて投与可。腎機能障害のある患者に対しては，腎機能障害の程度に応じて減量。 〈注射液の調製法〉1 バイアル（ガンシクロビル 500mg を含有）を注射用水 10mL に溶解し，投与量に相当する量を 1 バイアル当たり 100mL の補液で希釈。希釈後の補液のガンシクロビル濃度は 10mg/mL を超えない
ザナミビル水和物 <u>⑧リレンザ</u> Relenza (グラクソ・スミスクライン) 5mg/ プリスター 【薬価】 120.60 円 / プリスター	【効】 A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症の治療及びその予防 【用】 (外) ①治療に用いる場合：成人及び小児には，1 回 10mg (5mg プリスターを 2 プリスター) を 1 日 2 回，5 日間，専用の吸入器を用いて吸入。②予防に用いる場合：成人及び小児には，1 回 10mg (5mg プリスターを 2 プリスター) を 1 日 1 回，10 日間，専用の吸入器を用いて吸入
テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 <u>⑧ベムリディ錠 25mg</u> Vemlidy (ギリアド) 25mg/T 【薬価】 923.90 円 /T	【効】 B 型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された B 型慢性肝疾患における B 型肝炎ウイルスの増殖抑制 【用】 (内) 1 回 25mg を 1 日 1 回
テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩 <u>⑧テノゼット錠 300mg</u> Tenozet (グラクソ・スミスクライン) 300mg/T 【薬価】 584.90 円 /T	【効】 B 型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された B 型慢性肝疾患における B 型肝炎ウイルスの増殖抑制 【用】 (内) 1 回 300mg を 1 日 1 回
バラシクロビル塩酸塩 <u>⑧バルトレックス錠 500</u> Valtrex (グラクソ・スミスクライン) 500mg/T 【薬価】 170.20 円 /T	【効】 ①単純疱疹。②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制。③帯状疱疹。④水痘。⑤性器ヘルペスの再発抑制 【用】 (内) 成人又は体重 40kg 以上の小児：① 1 回 500mg を 1 日 2 回。② 1 回 500mg を 1 日 2 回造血幹細胞移植施行 7 日前より施行後 35 日まで。③④ 1 回 1000mg を 1 日 3 回。⑤ 1 回 500mg を 1 日 1 回。HIV 感染症の患者 (CD4 リンパ球数 100/ mm ³ 以上) には 1 回 500mg を 1 日 2 回

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
パリビズマブ（遺伝子組換え） <u>シナジス筋注液 50mg</u> Ⓢ Synagis（アッヴィ） 50mg 0.5mL/Vi 【薬価】 51,725.00 円 / 瓶 <u>シナジス筋注液 100mg</u> Ⓢ Synagis（アッヴィ） 100mg 1mL/Vi 【薬価】 102,099.00 円 / 瓶	【効】 次記の新生児、乳児及び幼児におけるRSウイルス（Respiratory Syncytial Virus）感染による重篤な下気道疾患の発症抑制。RSウイルス感染流行初期において、①在胎期間28週以下の早産で、12か月齢以下の新生児及び乳児。②在胎期間29週～35週の早産で、6か月齢以下の新生児及び乳児。③過去6か月以内に気管支肺炎形成症（BPD）の治療を受けた24か月齢以下の新生児、乳児及び幼児。④24か月齢以下の血行動態に異常のある先天性心疾患（CHD）の新生児、乳児及び幼児。⑤24か月齢以下の免疫不全を伴う新生児、乳児および幼児。⑥24か月齢以下のダウン症候群の新生児、乳児および幼児。⑦24か月齢以下の肺低形成を伴う新生児、乳児および幼児。⑧24か月齢以下の気道狭窄を伴う新生児、乳児および幼児。⑨24か月齢以下の先天性食道閉鎖症の新生児、乳児および幼児。⑩24か月齢以下の先天代謝異常症の新生児、乳児および幼児。⑪24か月齢以下の神経筋疾患の新生児、乳児および幼児 【用】 （注）15mg/kgをRSウイルス流行期を通して月1回筋注。注射量が1mLを超える場合分割して投与
バルガンシクロビル塩酸塩 <u>バリキサ錠 450mg（院外、患者限定）</u> Ⓢ Valixa（田辺三菱） 450mg/T 【薬価】 2,223.90 円 / T	【効】 ①次記におけるサイトメガロウイルス感染症：後天性免疫不全症候群、臓器移植（造血幹細胞移植も含む）、悪性腫瘍。②臓器移植（造血幹細胞移植を除く）におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制 【用】 （内）①初期治療：1回900mg1日2回、食後。維持療法：1回900mg1日1回、食後。②成人：1回900mg1日1回、食後。小児：次式により算出した投与量を1日1回、食後。1日用量として900mgを超えない。推定糸球体ろ過量が150より高値の場合は150を用いること。投与量（mg）＝7×体表面積（m ² ）×推定糸球体ろ過量（mL/min/1.73m ² ）
パロキサビルマルボキシル <u>ゾフルーザ錠 20mg（院外）</u> Xofluza（塩野義） 20mg/T 【薬価】 2,438.80 円 / T	【効】 ①A型又はB型インフルエンザウイルス感染症。②A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の予防 【用】 （内）①成人及び12歳以上の小児には、20mg錠2錠又は顆粒4包を単回投与。ただし、体重80kg以上の患者には20mg錠4錠又は顆粒8包を単回投与。12歳未満の小児には、次記の用量を単回投与。40kg以上：20mg錠2錠又は顆粒4包、20kg以上40kg未満：20mg錠1錠又は顆粒2包、10kg以上20kg未満：10mg錠1錠。②成人及び12歳以上の小児には、20mg錠2錠又は顆粒4包を単回投与。ただし、体重80kg以上の患者には20mg錠4錠又は顆粒8包を単回投与。12歳未満の小児には、次記の用量を単回投与。40kg以上：20mg錠2錠又は顆粒4包、20kg以上40kg未満：20mg錠1錠又は顆粒2包
ビダラビン <u>アラセナーA点滴静注用 300mg</u> Arasena-A（持田） 300mg/V 【薬価】 5,996.00 円 / 瓶	【効】 ①単純ヘルペス脳炎。②免疫抑制患者における带状疱疹 【用】 （注）5%ブドウ糖注射液又は生理食塩液を用いて用時溶解し、輸液500mLあたり2～4時間かけて点滴静注。①1日10～15mg/kg、10日間。②1日5～10mg/kg、5日間
ビダラビン <u>アラセナーA軟膏 3%</u> Arasena-A（持田） 3%2g/本 【薬価】 146.50 円 / g	【効】 带状疱疹、単純疱疹 【用】 （外）適量を1日1～4回、塗布又は貼布
ペラミビル水和物 <u>ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg</u> Rapiacta（塩野義） 300mg60mL/袋（ペラミビルとして） 【薬価】 6,331.00 円 / 袋	【効】 A型又はB型インフルエンザウイルス感染症 【用】 （注）300mgを15分以上かけて単回点滴静注。合併症等により重症化するおそれのある患者には、1日1回600mgを15分以上かけて単回点滴静注、症状に応じて連日反復投与可。適宜減量。小児：1日1回10mg/kgを15分以上かけて単回点滴静注。症状に応じて連日反復投与可。1回量として600mgまで
モルヌピラビル <u>ラゲブリオカプセル 200mg</u> Ⓢ Lagevrio（MSD） 200mg/capバラ40カプセル入り 【薬価】 2,357.80 円 / cap	【効】 SARS-CoV-2による感染症 【用】 （内）18歳以上の患者には、1回800mgを1日2回、5日間

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 <u>イナビル吸入粉末剤 20mg</u> Inavir (第一三共) 20mg/キット 【薬価】 2,179.50 円 / キット	【効】 A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症の治療及びその予防 【用】 (外)〔治療に用いる場合〕40mg を単回吸入, 小児: 10 歳未満の場合 20mg を単回吸入, 10 歳以上 40mg を単回吸入. 〔予防に用いる場合〕成人: 40mg を単回吸入, また, 20mg を 1 日 1 回, 2 日間吸入. 小児: 10 歳未満の場合 20mg を単回吸入, 10 歳以上 40mg を単回吸入. また, 20mg を 1 日 1 回, 2 日間吸入
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 <u>イナビル吸入懸濁用 160mg セット</u> Inavir (第一三共) 160mg/ セット 【薬価】 4,241.50 円 / 瓶	【効】 A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症の治療 【用】 (外) 成人及び小児には, 160mg を生理食塩液 2mL で懸濁し, ネブライザを用いて単回吸入投与
ラミブジン <u>ゼフィックス錠 100</u> ㉞ Zefix (グラクソ・スミスクライン) 100mg/T 【薬価】 307.10 円 / T	【効】 B 型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された B 型慢性肝疾患における B 型肝炎ウイルスの増殖抑制 【用】 (内) 1 回 100mg を 1 日 1 回
ラルテグラビルカリウム <u>アイセントレス錠 400mg (院内)</u> ㉞ Isentress (MSD) 400mg/T 【薬価】 923.00 円 / T	【効】 HIV 感染症 【用】 (内) 400mg を 1 日 2 回. 食事の有無にかかわらず投与可. 必ず他の抗 HIV 薬と併用すること
レムデシビル注射液 <u>ベクルリー点滴静注用 100mg</u> Veklury (ギリアド・サイエンシズ) 100mg/V 【薬価】 46,498.00 円 / 瓶	【効】 SARS-CoV-2 による感染症 【用】 (注) 成人及び体重 40kg 以上の小児には, 投与初日に 200mg を, 投与 2 日目以降は 100mg を 1 日 1 回点滴静注. 体重 3.5kg 以上 40kg 未満の小児には, 投与初日に 5mg /kg を, 投与 2 日目以降は 2.5mg /kg を 1 日 1 回点滴静注. 総投与期間は 10 日まで
<u>エバシェルド筋注セット</u> ㉞ Evusheld intramuscular injection set (アストラゼネカ) 各 150mg 1.5mL/V 1 バイアル (1.5mL) 中: チキサゲビマブ (遺伝子組換え) 150mg 1 バイアル (1.5mL) 中: シルガビマブ (遺伝子組換え) 150mg	【効】 SARS-CoV-2 による感染症及びその発症抑制 【用】 (注) <SARS-CoV-2 による感染症> 成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には, チキサゲビマブ (遺伝子組換え) 及びシルガビマブ (遺伝子組換え) としてそれぞれ 300mg を併用により筋注. <SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制> 成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には, チキサゲビマブ (遺伝子組換え) 及びシルガビマブ (遺伝子組換え) としてそれぞれ 150 mg を併用により筋注. SARS-CoV-2 変異株の流行状況等に応じて, チキサゲビマブ (遺伝子組換え) 及びシルガビマブ (遺伝子組換え) としてそれぞれ 300mg を併用により筋注可
<u>エプクルーサ配合錠</u> Epclusa (ギリアド) 1 錠 【薬価】 61,157.80 円 / T 1 錠中: ソホスブビル 400mg ベルパタスビル 100mg	【効】 C 型慢性肝炎, C 型代償性肝硬変又は C 型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 【用】 (内) <未治療又は前治療歴のない C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善> <C 型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善> 1 日 1 回 1 錠を 12 週間経口投与. <前治療歴を有する C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善> リバビリンとの併用において, 1 日 1 回 1 錠を 24 週間経口投与

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>カレトラ配合錠</p> <p>Ⓜ</p> <p>Kaletra (アッヴィ)</p> <p>1錠</p> <p>【薬価】290.30円/T</p> <p>1錠中：</p> <p>ロピナビル 200mg</p> <p>リトナビル 50mg</p>	<p>【効】HIV感染症</p> <p>【用】(内) ロピナビル・リトナビルとして1回400mg・100mg(2錠)を1日2回、又は1回800mg・200mg(4錠)を1日1回、体重40kg以上の小児：ロピナビル・リトナビルとして1回400mg・100mg(2錠)を1日2回投与可。食事の有無にかかわらず投与可</p>
<p>ツルバダ配合錠</p> <p>Ⓜ</p> <p>Truvada (鳥居)</p> <p>1錠</p> <p>【薬価】2,442.40円/T</p> <p>1錠中：</p> <p>エムトリシタピン 200mg</p> <p>テノホビルジソプロキシシル マル酸塩 300mg (テノホビルジソプロキシシルと して245mg)</p>	<p>【効】HIV-1感染症</p> <p>【用】(内) 1回1錠(エムトリシタピンとして200mg及びテノホビルジソプロキシシルマル酸塩として300mgを含有)を1日1回、他の抗HIV薬と併用</p>
<p>ハーボニー配合錠</p> <p>Harvoni (ギリアド)</p> <p>1錠</p> <p>【薬価】55,491.70円/T</p> <p>1錠中：</p> <p>レジパスビル 90mg</p> <p>ソホスブビル 400mg</p>	<p>【効】セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善</p> <p>【用】(内) 1日1回1錠(レジパスビルとして90mg及びソホスブビルとして400mg)を12週間</p>
<p>マヴィレット配合錠</p> <p>Maviret (アッヴィ)</p> <p>1錠</p> <p>【薬価】17,422.80円/T</p> <p>1錠中：</p> <p>グレカプレビル水和物 100mg</p> <p>ビブレンタスビル 40mg</p>	<p>【効】C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善</p> <p>【用】(内) ①セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎の場合：成人、12歳以上の小児及び3歳以上12歳未満かつ体重45kg以上の小児に1回3錠を1日1回食後、投与期間は8週間。C型慢性肝炎に対する前治療歴に応じて投与期間は12週間とすることができる。②セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型代償性肝硬変、セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しないC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変の場合：成人、12歳以上の小児及び3歳以上12歳未満かつ体重45kg以上の小児に1回3錠を1日1回食後、投与期間は12週間</p>
<p>ロナプリーブ注射液セット 300</p> <p>Ⓜ</p> <p>Ronapreve injection set (中外)</p> <p>各2.5mL/Vi</p> <p>1バイアル(2.5mL)中</p> <p>カシリビマブ(遺伝子組換え) 300mg</p> <p>イムデビマブ(遺伝子組換え) 300mg</p> <p>ロナプリーブ注射液セット 1332</p> <p>Ⓜ</p> <p>Ronapreve injection set (中外)</p> <p>各11.1mL/Vi</p> <p>1バイアル(11.1mL)中</p> <p>カシリビマブ(遺伝子組換え) 1332mg</p> <p>イムデビマブ(遺伝子組換え) 1332mg</p>	<p>【効】SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制</p> <p>【用】(注) 成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児には、カシリビマブ(遺伝子組換え)及びイムデビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ600mgを併用により単回点滴静注又は単回皮下注</p>

629. その他の化学療法剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アトバコン <u>サムチレール内用懸濁液 15%</u> Samtirel (グラクソ・スミスクライン) 750mg5mL/包 【薬価】 1,471.10 円 / 包	【効】 ①ニューモシスチス肺炎. ②ニューモシスチス肺炎の発症抑制. <適応菌種> ニューモシスチス・イロベチー 【用】(内) ① 1回 750mg (本剤として 5mL) を 1日 2回 21 日間, 食後. ② 1回 1500mg (本剤として 10mL) を 1日 1回, 食後
イトラコナゾール <u>イトリゾールカプセル 50</u> Itrazole (ヤンセン) 50mg/cap 【薬価】 134.70 円 / cap	【効】 ①内臓真菌症 (深在性真菌症): 真菌血症, 呼吸器真菌症, 消化器真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎. ②深在性皮膚真菌症: スポロトリコーシス, クロモミコーシス. ③表在性皮膚真菌症 (爪白癬以外): 白癬 (体部白癬, 股部白癬, 手白癬, 足白癬, 頭部白癬, ケルスス禿瘡, 白癬性毛瘡), カンジダ症 (口腔カンジダ症, 皮膚カンジダ症, 爪カンジダ症, カンジダ性爪囲爪炎, カンジダ性毛瘡, 慢性皮膚粘膜カンジダ症), 癬風, マラセチア毛包炎. ④爪白癬. <適応菌種> 皮膚糸状菌 (トリコフィトン属, ミクロスポルム属, エピデルモフィトン属), カンジダ属, マラセチア属, アスペルギルス属, クリプトコッカス属, スポロトリックス属, ホンセカエア属 【用】(内) ① 100 ~ 200mg を 1日 1回食直後. イトラコナゾール注射剤からの切り替えの場合, 1回 200mg を 1日 2回 (1日用量 400mg) 食直後. ② 100 ~ 200mg を 1日 1回食直後. 1日 200mg まで. ③ 50 ~ 100mg を 1日 1回食直後. 爪カンジダ症及びカンジダ性爪囲爪炎に対しては, 100mg を 1日 1回食直後. 1日 200mg まで. ④ (パルス療法) 1回 200mg を 1日 2回 (1日量 400mg) 食直後に 1週間, その後 3週間休薬. これを 1サイクルとし, 3サイクル繰り返す
イミキモド <u>ベセルナクリーム 5%</u> Beselna (持田) 12.5mg250mg/包 【薬価】 652.60 円 / 包	【効】 ①尖圭コンジローマ (外性器又は肛門周囲に限る). ②日光角化症 (顔面又は禿頭部に限る) 【用】(外) ①疣贅部位に適量を 1日 1回, 週 3回, 就寝前に塗布. 塗布後はそのままの状態を保ち, 起床後に塗布した薬剤を石鹸を用い, 水又は温水で洗い流す. ②治療部位に適量を 1日 1回, 週 3回, 就寝前に塗布. 塗布後はそのままの状態を保ち, 起床後に塗布した薬剤を石鹸を用い, 水又は温水で洗い流す. 4週間塗布後, 4週間休薬し, 病変が消失した場合は終了とし, 効果不十分の場合はさらに 4週間塗布
エフィナコナゾール <u>クレナフィン爪外用液 10%</u> Clenafin (科研) 10%3.56g (4mL) 1本 【薬価】 1,435.50 円 / g	【効】 爪白癬 <適応菌種> 皮膚糸状菌 (トリコフィトン属) 【用】(外) 1日 1回罹患爪全体に塗布
フルコナゾール <u>ジフルカンカプセル 100mg</u> Diflucan (ファイザー) 100mg/cap 【薬価】 158.30 円 / cap	【効】 ①カンジダ属及びクリプトコッカス属による次記感染症: 真菌血症, 呼吸器真菌症, 消化管真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎. ②造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防. ③カンジダ属に起因する腔炎及び外陰腔炎 【用】(内) ①カンジダ症: 50 ~ 100mg を 1日 1回, 小児: 3mg/kg を 1日 1回. クリプトコッカス症: 50 ~ 200mg を 1日 1回. 重症又は難治性真菌感染症の場合, 1日 400mg まで, 小児: 3 ~ 6mg/kg を 1日 1回, 重症又は難治性真菌感染症の場合には, 1日量として 12mg/kg まで. ② 400mg を 1日 1回. 小児: 12mg/kg を 1日 1回. 1日量として 400mg まで. 新生児: 生後 14日 まで; 小児と同じ用量を 72 時間毎, 生後 15日 以降; 小児と同じ用量を 48 時間毎. ③ 150mg を 1回
ホスフルコナゾール <u>プロジフ静注液 200</u> Prodif (ファイザー) ホスフルコナゾール 252.3mg (フルコナゾールとして 200mg) 2.5mL/V 【薬価】 5,734.00 円 / 瓶	【効】 カンジダ属及びクリプトコッカス属による次記感染症: 真菌血症, 呼吸器真菌症, 真菌腹膜炎, 消化管真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎 【用】(注) ①カンジダ症: ホスフルコナゾール 63.1 ~ 126.1mg (フルコナゾールとして 50 ~ 100mg) を維持用量として 1日 1回静注. 初日, 2日目は維持用量の倍量として, ホスフルコナゾール 126.1 ~ 252.3mg (フルコナゾールとして 100 ~ 200mg). ②クリプトコッカス症: ホスフルコナゾール 63.1 ~ 252.3mg (フルコナゾールとして 50 ~ 200mg) を維持用量として 1日 1回静注. 初日, 2日目は維持用量の倍量として, ホスフルコナゾール 126.1 ~ 504.5mg (フルコナゾールとして 100 ~ 400mg). 重症又は難治性真菌感染症の場合, ホスフルコナゾール 504.5mg (フルコナゾールとして 400mg) まで維持用量を増量可. 初日, 2日目は維持用量の倍量として, ホスフルコナゾール 1009mg (フルコナゾールとして 800mg) まで投与可

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ホスラブコナゾールL-リシン エタノール付加物 ネイリンカプセル 100mg (院外) Nailin (佐藤製薬) 100mg/C 【薬価】 814.80 円 /cap	【効】 爪白癬、〈適応菌種〉皮膚糸状菌（トリコフィトン属） 【用】 (内) 1日1回1カプセルを12週間
ミコナゾール オラビ錠口腔用 50mg Oravi (久光) 50mg/T 【薬価】 994.50 円 /T	【効】 カンジダ属による口腔咽頭カンジダ症 【用】 (内) 1回1錠（ミコナゾールとして50mg）を1日1回、上顎歯肉（犬歯窩）に付着して用いる
ミコナゾール フロリードゲル経口用 2% Florid (持田) 2%5g/本 【薬価】 98.20 円 /g	【効】 ①カンジダ属による次の感染症：口腔カンジダ症、②カンジダ属による次の感染症：食道カンジダ症 【用】 (内) ①1日200～400mg（本剤として10～20g）を4回（毎食後及び就寝前）に分割し、口腔内にまんべんなく塗布。病巣が広範囲に存在する場合、口腔内にできるだけ長く含んだ後、嚥下する。②1日200～400mg（本剤として10～20g）を4回（毎食後及び就寝前）に分割し、口腔内に含んだ後、少量ずつ嚥下する
ルリコナゾール ルコナック爪外用液 5% Luconac (ポーラ) 5%4mL/本 【薬価】 709.30 円 /g	【効】 爪白癬〈適応菌種〉皮膚糸状菌（トリコフィトン属） 【用】 (外) 1日1回罹患爪全体に塗布
バクタ配合錠 (院外) Baktar (塩野義) 1錠 【薬価】 69.20 円 /T 1錠中： スルファメトキサゾール 400mg トリメトプリム 80mg	【効】 〔一般感染症〕①肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，②複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，③感染性腸炎，腸チフス，パラチフス，〈適応菌種〉スルファメトキサゾール／トリメトプリムに感性的腸球菌属，大腸菌，赤痢菌，チフス菌，パラチフス菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア・レットゲリ，インフルエンザ菌〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制〕④ニューモシスチス肺炎，ニューモシスチス肺炎の発症抑制，〈適応菌種〉ニューモシスチス・イロベチー 【用】 (内) 〔一般感染症〕①～③配合錠は1日量4錠（ミニ配合錠の場合は16錠，配合顆粒の場合は4g）を2回に分割，〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制〕④治療に用いる場合：配合錠は1日量9～12錠（ミニ配合錠の場合は36～48錠，配合顆粒の場合は9～12g）を3～4回に分割，小児：トリメトプリムとして1日量15～20mg/kgを3～4回に分割，発症抑制に用いる場合：配合錠は1日1回1～2錠（ミニ配合錠の場合は4～8錠，配合顆粒の場合は1～2g）を連日又は週3日，小児：トリメトプリムとして1日量4～8mg/kgを2回に分割し，連日又は週3日
バクトラミン配合錠 Bactramin (中外) 1錠 【薬価】 42.60 円 /T 1錠中： スルファメトキサゾール 400mg トリメトプリム 80mg	【効】 〔一般感染症〕①肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，②複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，③感染性腸炎，腸チフス，パラチフス，〈適応菌種〉スルファメトキサゾール／トリメトプリムに感性的腸球菌属，大腸菌，赤痢菌，チフス菌，パラチフス菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア・レットゲリ，インフルエンザ菌〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制〕④ニューモシスチス肺炎，ニューモシスチス肺炎の発症抑制，〈適応菌種〉ニューモシスチス・イロベチー 【用】 (内) 〔一般感染症〕①～③1日量4錠（顆粒の場合は4g）を2回に分割，〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制〕④治療に用いる場合：1日量9～12錠（顆粒の場合は9～12g）を3～4回に分割，小児：トリメトプリムとして1日量15～20mg/kgを3～4回に分割，発症抑制に用いる場合：1日1回1～2錠（顆粒の場合は1～2g）を連日又は週3日，小児：トリメトプリムとして1日量4～8mg/kgを2回に分割し，連日又は週3日

63. 生物学的製剤

631. ワクチン類

6311. 細菌ワクチン類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
乾燥 BCG ワクチン <u>乾燥 BCG ワクチン（経皮用・1人用）</u> Ⓢ Ⓜ Freeze-dried BCG vaccine （日本ビーシージー） 生きた BCG（含水量 70% の湿菌として）12mg/A（溶解液付）	【効】 結核の予防 【用】 （注） 溶剂を加え上腕外側のほぼ中央部に滴下塗布，経皮用接種針（管針）を使用，添付の溶剂を加えて 80mg/mL の濃度の均一な懸濁液とし，接種部位の皮膚を緊張させ，懸濁液を塗った後，9 本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち，これを強く圧して行う．接種数は 2 箇所とし，管針の円跡は相互に接するものとする
乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン （破傷風トキソイド結合体） <u>アクトヒブ</u> Ⓢ Ⓜ ActHIB （サノフィ） 10 μ g/V 【薬価】 4,941.00 円 / 瓶	【効】 インフルエンザ菌 b 型による感染症の予防 【用】 （注） 本剤を添付溶剂 0.5mL で溶解し，その全量を 1 回分とする．初回免疫：4～8 週間の間隔で 3 回皮下注．医師が必要と認めた場合 3 週間の間隔で接種可能．追加免疫：初回免疫後 1 年の間隔を以て 1 回皮下注
沈降 15 価肺炎球菌結合型ワクチン （無毒性変異ジフテリア毒素結合体） <u>バクニュバンス水性懸濁注シリンジ</u> Ⓢ Ⓜ Vaxneuvance （MSD） 0.5mL / 筒	【効】 ①高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者：肺炎球菌（血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F 及び 33F）による感染症の予防．②小児：肺炎球菌（血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F 及び 33F）による侵襲性感染症の予防 【用】 （注）〈高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる 18 歳以上の者における肺炎球菌による感染症の予防〉1 回 0.5mL を筋注．〈肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる 18 歳未満の者における肺炎球菌による感染症の予防〉1 回 0.5mL を皮下注又は筋注．〈小児における肺炎球菌による侵襲性感染症の予防〉初回免疫：1 回 0.5mL ずつを 3 回，いずれも 27 日間以上の間隔で皮下注又は筋注．追加免疫：1 回 0.5mL を 1 回，皮下注又は筋注．ただし，3 回目接種から 60 日間以上の間隔をおく
肺炎球菌ワクチン <u>ニューモバックス NP シリンジ</u> Ⓢ Ⓜ Pneumovax NP （MSD） 0.5mL / 筒 【薬価】 4,735.00 円 / 筒	【効】 投与対象：2 歳以上で肺炎球菌による重篤疾患に罹患する危険が高い次のような個人及び患者．①脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発症予防．②肺炎球菌による感染症の予防：1) 鎌状赤血球疾患，あるいはその他の原因で脾機能不全である患者，2) 心・呼吸器慢性疾患，腎不全，肝機能障害，糖尿病，慢性髄液漏等の基礎疾患のある患者，3) 高齢者，4) 免疫抑制作用を有する治療が予定されている者で治療開始まで少なくとも 14 日以上之余裕のある患者 【用】 （注） 1 回 0.5mL を筋注又は皮下注
4 価髄膜炎菌ワクチン（破傷風トキソイド結合体） <u>メンクアッドフィ筋注</u> Ⓢ Ⓜ Menquadfi （サノフィ） 0.5mL / 瓶 【薬価】 19,943.00 円 / 瓶	【効】 髄膜炎菌（血清群 A, C, W 及び Y）による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防 【用】 （注） 1 回，0.5mL を筋肉内接種

6313. ウイルスワクチン類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>インフルエンザ HA ワクチン <u>インフルエンザ HA ワクチン</u> <u>「KMB」</u> ㊟㊜ Influenza HA vaccine (Meiji Seika) 1mL/V A 型株 A/ ビクトリア /1/2020(H1N1) A/ ダーウィン /9/2021(H3N2) B 型株 B/ プーケット /3073/2013 (山形系統) B/ オーストリア /1359417/2021 (ビクトリア系統) 各株の HA 含量 (相当値) は、1 株当たり 30μg 以上</p>	<p>【効】 インフルエンザの予防 【用】 (注) 6 か月以上 3 歳未満のものには 0.25mL を皮下に、3 歳以上 13 歳未満のものには 0.5mL を皮下におよそ 2～4 週間の間隔をおいて 2 回注射。13 歳以上のものについては、0.5mL を皮下に、1 回又はおよそ 1～4 週間の間隔をおいて 2 回注射</p>
<p>乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (チャイニーズハムスター卵巣細胞由来) <u>シングリックス筋注用</u> ㊟㊜ Shingrix (グラクソ・スミスクライン) 50μg/V</p>	<p>【効】 帯状疱疹の予防 【用】 (注) 抗原製剤を専用溶解用液全量で溶解。50 歳以上の者には、0.5mL を 2 回、2 か月の間隔をおいて、筋注。帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる 18 歳以上の者には、0.5mL を 2 回、1～2 か月の間隔をおいて、筋注</p>
<p>乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン <u>乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン</u> <u>「タケダ」</u> ㊟㊜ Freeze-dried live attenuated mumps vaccine (武田) 弱毒生ムンプスウイルス (鳥居株) 5000CCID50 以上 /V (溶解液付)</p>	<p>【効】 おたふくかぜの予防 【用】 (注) 添付溶剤 0.7mL で溶解し、1 回 0.5mL 皮下注</p>
<p>乾燥弱毒生水痘ワクチン <u>乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」</u> ㊟㊜ Freeze-dried live attenuated varicella vaccine (田辺三菱) 弱毒生水痘ウイルス (岡株) 1000PFU 以上 /V (溶解液付)</p>	<p>【効】 水痘及び 50 歳以上の者に対する帯状疱疹の予防 【用】 (注) 添付溶剤 0.7mL で溶解し、1 回 0.5mL 皮下注</p>
<p>乾燥弱毒生風しんワクチン <u>乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」</u> ㊟㊜ Freeze-dried live attenuated rubella vaccine (武田) 弱毒生風しんウイルス (TO-336 株) 1,000PFU 以上 /V (溶解液付)</p>	<p>【効】 風しんの予防 【用】 (注) 添付の溶剤 0.7mL で溶解し、その 0.5mL を 1 回皮下注</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
乾燥弱毒生麻疹ワクチン <u>乾燥弱毒生麻疹ワクチン「タケダ」</u> (株) (生) Dried live attenuated measles vaccine (武田) 弱毒生麻疹ウイルス (シュワルツ FF-8 株) 5,000CCID ₅₀ 以上 / V (溶解液付)	【効】 麻疹の予防 【用】 (注) 添付の溶剤 0.7mL で溶解し, その 0.5mL を 1 回皮下注
乾燥組織培養不活化 A 型肝炎ワクチン <u>エイムゲン</u> (株) (生) Aimmugen (Meiji Seika) 不活化 A 型肝炎ウイルス抗原 (HAV 抗原): 0.5 μ g/V (溶剤付)	【効】 A 型肝炎の予防 【用】 (注) 添付溶剤 0.65mL で溶解して使用. 0.5mL ずつを 2 ~ 4 週間間隔で 2 回, 筋肉内又は皮下に接種. 初回接種後 24 週経過後に 0.5mL を追加接種. 免疫の賦与を急ぐ場合には, 0.5mL ずつを 2 週間隔で 2 回, 筋肉内又は皮下に接種. 長期に抗体価を維持するためには 3 回目の追加接種をすることが望ましい
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン <u>組織培養不活化狂犬病ワクチン</u> (株) (生) Inactivated tissue culture rabies vaccine (Meiji Seika) 不活化狂犬病ウイルス (HEP Flury 株): 10 ⁷ LD ₅₀ 以上 (不活化前ウイルス量) / V (溶剤付) 【薬価】 11,478.00 円 / 瓶	【効】 狂犬病の感染予防及び発病阻止に使用 【用】 (注) 添付溶剤全量で溶解して使用. 1.0mL を 1 回量. 暴露前免疫: 4 週間隔で 2 回皮下注, 更に 6 ~ 12 か月後に 1 回追加. 暴露後免疫: 第 1 回目を 0 日とし, 以降 3, 7, 14, 30 及び 90 日の計 6 回皮下注
組換え RS ウイルスワクチン <u>アレクスビー筋注用</u> (株) (生) Arexvy (グラクソ・スミスクライン) 0.5mL / 瓶	【効】 RS ウイルスによる感染症の予防 【用】 (注) 抗原製剤を専用溶解用液全量で溶解し, 60 歳以上の者に 1 回 0.5mL を筋肉内に接種
組換え沈降 2 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン <u>サーバリックス</u> (株) (生) Cervarix (グラクソ・スミスクライン) 0.5mL / 筒 0.5mL 中: ヒトパピローマウイルス 16 型 L1 たん白質ウイルス様粒子 20 μ g ヒトパピローマウイルス 18 型 L1 たん白質ウイルス様粒子 20 μ g	【効】 ヒトパピローマウイルス (HPV) 16 型及び 18 型感染に起因する子宮頸癌 (扁平上皮癌, 腺癌) 及びその前駆病変 (子宮頸部上皮内腫瘍 (CIN) 2 及び 3) の予防 【用】 (注) 10 歳以上の女性に, 1 回 0.5mL を 0・1・6 か月後に 3 回, 上腕の三角筋部に筋肉内接種
組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来) <u>シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ</u> (株) Silgard9 (MSD) 0.5mL / 筒	【効】 ヒトパピローマウイルス 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 及び 58 型の感染に起因する次記の疾患の予防: 子宮頸癌 (扁平上皮癌及び腺癌) 及びその前駆病変 (子宮頸部上皮内腫瘍 (CIN) 1, 2 及び 3 並びに上皮内腺癌 (AIS)), 外陰上皮内腫瘍 (VIN) 1, 2 及び 3 並びに腔上皮内腫瘍 (VaIN) 1, 2 及び 3, 尖圭コンジローマ 【用】 (注) 9 歳以上の女性に, 1 回 0.5mL を合計 3 回, 筋注. 2 回目は初回接種の 2 か月後, 3 回目は 6 か月後に同様の用法で接種. 9 歳以上 15 歳未満の女性には, 初回接種から 6 ~ 12 か月の間隔を置いた合計 2 回の接種とすることができる

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
経口弱毒生ロタウイルスワクチン <u>ロタテック内用液</u> (株) (生) Rotateq (MSD) 2mL/ チューブ 2mL 中： G1 型ロタウイルス (WI79-9 株) 2.2×10^6 感染単位以上 G2 型ロタウイルス (SC2-9 株) 2.8×10^6 感染単位以上 G3 型ロタウイルス (WI78-8 株) 2.2×10^6 感染単位以上 G4 型ロタウイルス (BrB-9 株) 2.0×10^6 感染単位以上 P1A [8] 型ロタウイルス (WI79-4 株) 2.3×10^6 感染単位以上	【効】 ロタウイルスによる胃腸炎の予防 【用】 (内) 乳児：4 週間以上の間隔をおいて 3 回経口接種し、接種量は毎回 2mL
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン <u>ロタリックス内用液</u> (株) (生) Rotarix (グラクソ・スミスクライン) 弱毒生ヒトロタウイルス (RIX4414 株) $6.0 \log_{10} \text{CCID}_{50}$ 以上 1.5mL/ チューブ	【効】 ロタウイルスによる胃腸炎の予防 【用】 (内) 乳児に、4 週間以上の間隔をおいて 2 回経口接種し、接種量は毎回 1.5mL
日本脳炎ワクチン <u>ジェービック V</u> (株) (生) Jebik V (田辺三菱) 不活化日本脳炎ウイルス北京株 参照品と同等以上 / 本	【効】 日本脳炎の予防 【用】 (注) 添付の溶剤 (注射用水) 0.7mL で溶解。初回免疫：0.5mL ずつを 2 回、1～4 週間の間隔で皮下注。3 歳未満の者には、0.25mL ずつを同様の用法で注射。追加免疫：初回免疫後おおむね 1 年を経過した時期に、0.5mL を 1 回皮下注。3 歳未満の者には、0.25mL を同様の用法で注射

632. 毒素及びトキソイド類

6322. トキソイド類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
沈降破傷風トキソイド <u>沈降破傷風トキソイド「生研」</u> (株) (生) Adsorbed tetanus toxoid (田辺三菱) 5Lf 以下 0.5mL/V 【薬価】 1,063.00 円 / 瓶	【効】 破傷風の予防 【用】 (注) ①初回免疫：1 回 0.5mL ずつを 2 回、3～8 週間の間隔で皮下注又は筋注。 ②追加免疫：第 1 回の追加免疫には、初回免疫後 6 か月以上の間隔をおいて、(標準として初回免疫終了後 12 か月から 18 か月までの間に) 0.5mL を 1 回皮下注又は筋注。初回免疫のとき副反応の強かった者には適宜減量。以後の追加免疫のときの接種量もこれに準ずる

634. 血液製剤類

6343. 血漿分画製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>乾燥抗 HBs 人免疫グロブリン 乾燥 HB グロブリン筋注用 200 単位「ニチャク」 (特生) Dried HB globulin (日本製薬) 200 単位/V (溶解液として注射用水 1mL を添付) 【薬価】 8,855.00 円 / 瓶 乾燥 HB グロブリン筋注用 1000 単位「ニチャク」 (特生) Dried HB globulin (日本製薬) 1,000 単位/V (溶解液として注射用水 5mL を添付) 【薬価】 36,939.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ① HBs 抗原陽性血液の汚染事故後の B 型肝炎発症予防。② 新生児の B 型肝炎予防 (原則として、沈降 B 型肝炎ワクチンとの併用) 【用】 (注) 本剤 1 瓶を添付の溶解液 (注射用水) 1 瓶 (200 単位製剤は 1mL, 1,000 単位製剤は 5mL) で溶解して筋注。① 事故発生後 7 日以内 (48 時間以内が望ましい) に 1 回 5 ～ 10mL を筋注。必要に応じて増量するか又は同量を繰り返す。小児: 0.16 ～ 0.24mL/kg。② 初回は生後 5 日以内 (生後 12 時間以内が望ましい) に 0.5 ～ 1.0mL を筋注, 追加は 0.16 ～ 0.24mL/kg</p>
<p>乾燥抗 D (Rho) 人免疫グロブリン 抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」 (特生) Anti-D human immunoglobulin (日本血液製剤) 1,000 倍/V (溶解液付) 【薬価】 20,155.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 D (Rho) 陰性で以前に D (Rho) 因子で感作を受けていない女性に対し, 次記の場合に投与することにより, D (Rho) 因子による感作を抑制する。① 分娩後, 流産後, 人工妊娠中絶後, 異所性妊娠後, 妊娠中の検査・処置後 (羊水穿刺, 胎位外回転術等) 又は腹部打撲後等の D (Rho) 感作の可能性がある場合。② 妊娠 28 週前後 【用】 (注) 本剤は, 1 瓶を添付の溶解液 (注射用水) 2mL に溶解し, 次記のとおり投与。① 72 時間以内に本剤 1 瓶を筋注。② 本剤 1 瓶を筋注</p>
<p>乾燥抗破傷風人免疫グロブリン テタノブリン筋注用 250 単位 (特生) Tetanobulin (日本血液製剤) 250I.U./V (溶解液付) 【薬価】 5,124.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 破傷風の発症予防並びに発症後の症状軽減のための治療 【用】 (注) 本剤 1 瓶の内容を添付の溶剤 (注射用水 2.5mL) で溶解し, 筋注。(1) 破傷風の潜伏期の初めに用いて破傷風の発症を予防: 250I.U. を用いる。(2) 破傷風発症後の症状を軽くするための治療: 5000I.U. 以上を用いる</p>
<p>乾燥スルホ化人免疫グロブリン 献血ベニロナー I 静注用 5000mg (特生) Venilon-I (帝人) 5g/V (溶解液付) 【薬価】 43,001.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ① 低又は無ガンマグロブリン血症。② 重症感染症における抗生物質との併用。③ 特発性血小板減少性紫斑病 (他剤が無効で著明な出血傾向があり, 外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合)。④ 川崎病の急性期 (重症であり, 冠動脈障害の発生の危険がある場合)。⑤ ギラン・バレー症候群 (急性増悪期で歩行困難な重症例)。⑥ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症における神経障害の改善 (ステロイド剤が効果不十分な場合に限る)。⑦ 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 (多巣性運動ニューロパチーを含む) の筋力低下の改善。⑧ 視神経炎の急性期 (ステロイド剤が効果不十分な場合) 【用】 (注) 添付の注射用水に溶解し, 直接静注する場合, 極めて緩徐に。① 1 回 200 ～ 600mg/kg を 3 ～ 4 週間隔で点滴静注又は直接静注。② 1 回 2500 ～ 5000mg を, 小児: 1 回 50 ～ 150mg/kg を点滴静注又は直接静注。③ 1 日 200 ～ 400mg/kg を点滴静注又は直接静注。5 日間投与しても症状の改善が認められない場合は以降の投与を中止。④ 1 日 200mg/kg を 5 日間点滴静注又は直接静注, 若しくは 2000mg/kg を 1 回点滴静注。年齢及び症状に応じて 5 日間投与の場合は適宜増減, 1 回投与の場合は適宜減量。⑤ 1 日 400mg/kg を 5 日間点滴静注又は直接静注。⑥ 1 日 400mg/kg を 5 日間点滴静注。⑦ 1 日 400mg/kg を 5 日間連日点滴静注。年齢及び症状に応じて適宜減量。⑧ 1 日 400mg/kg を 5 日間連日点滴静注</p>
<p>乾燥濃縮人アンチトロンビン III ノイアート静注用 1500 単位 (特生) Neuart (日本血液製剤) 1500 国際単位/V (溶解液として注射用水 30mL 付) 【薬価】 54,896.00 円 / 瓶</p>	<p>【効】 ① 先天性アンチトロンビン III 欠乏に基づく血栓形成傾向。② アンチトロンビン III 低下を伴う汎発性血管内凝固症候群 (DIC) 【用】 (注) 添付の注射用水で溶解し, 緩徐に静注もしくは点滴静注。① 1 日 1000 ～ 3000 単位又は 20 ～ 60 単位/kg。② アンチトロンビン III が正常の 70% 以下に低下した場合は, ヘパリンの持続点滴静注のもとに 1 日 1500 単位又は 30 単位/kg。産科的, 外科的 DIC などで緊急処置の場合は 1 日 1 回 40 ～ 60 単位/kg</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
乾燥ポリエチレングリコール処理 人免疫グロブリン 献血グロベニン-I 静注用 5000mg (特生) Glovenin-I (日本製薬) 5g/V (溶解液付) 【薬価】 33,459.00 円 / 瓶	【効】 ①無又は低ガンマグロブリン血症。②重症感染症における抗生物質との併用。③特発性血小板減少性紫斑病 (他剤が無効で、著明な出血傾向があり、外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合)。④川崎病の急性期 (重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合)。⑤慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 (多巣性運動ニューロパチーを含む) の筋力低下の改善。⑥慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 (多巣性運動ニューロパチーを含む) の運動機能低下の進行抑制 (筋力低下の改善が認められた場合)。⑦天疱瘡 (ステロイド剤の効果不十分な場合)。⑧スティープンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症 (ステロイド剤の効果不十分な場合)。⑨水疱性類天疱瘡 (ステロイド剤の効果不十分な場合)。⑩ギラン・バレー症候群 (急性増悪期で歩行困難な重症例)。⑪血清 IgG2 値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制 (ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限る)。⑫多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善 (ステロイド剤が効果不十分な場合に限る)。⑬全身型重症筋無力症 (ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る) 【用】 (注) 添付の注射用水 (500mg 製剤は 10mL, 2,500mg 製剤は 50mL, 5,000mg 製剤は 100mL) で溶解。直接静注する場合、極めて緩徐に [溶解方法を参照]。① 1 回 200 ~ 600mg (4 ~ 12mL) /kg を 3 ~ 4 週間隔で点滴静注又は直接静注。② 1 回 2,500 ~ 5,000mg (50 ~ 100mL), 小児: 1 回 100 ~ 150mg (2 ~ 3mL) /kg を点滴静注又は直接静注。③ 1 日 200 ~ 400mg (4 ~ 8mL) /kg を点滴静注又は直接静注。5 日間使用しても症状に改善が認められない場合、以降の投与を中止。④ 1 日 200mg (4mL) /kg を 5 日間点滴静注又は直接静注、若しくは 2,000mg (40mL) /kg を 1 回点滴静注。1 回投与の場合は適宜減量。⑤ 1 日 400mg (8mL) /kg を 5 日間連日点滴静注又は直接静注。⑥ 「1,000mg (20mL) /kg を 1 日」又は「500mg (10mL) /kg を 2 日間連日」を 3 週間隔で点滴静注。⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 1 日 400mg (8mL) /kg を 5 日間連日点滴静注。①初回は 300mg (6mL) /kg, 2 回目以降は 200mg (4mL) /kg を点滴静注。投与間隔は通常 4 週間
人血液凝固第 XIII 因子 フィブロガミン P 静注用 (特生) Fibrogammin P (CSL ベーリング) 健康人血漿 1mL 中の第 XIII 因子 活性の 240 倍以上 /V (溶解液 4mL 付) 【薬価】 8,324.00 円 / 瓶	【効】 ①先天性及び後天性血液凝固第 XIII 因子欠乏による出血傾向。②血液凝固第 XIII 因子低下に伴う縫合不全及び瘻孔。③ IgA 血管炎における次記症状の改善: 腹部症状、関節症状 【用】 (注) 添付の注射用水に溶解する。① 1 日量 4 ~ 20mL を緩徐に静注。② 1 日量 12 ~ 24mL を緩徐に静注。急性炎症、急性感染の消褪した後で、血清総蛋白、血清アルブミン等に異常が無く、縫合不全、瘻孔が存続し、血液凝固第 XIII 因子が 70% 以下に低下している患者に投与。5 日間投与しても症状に改善が認められない場合、投与を中止。③ 1 日 1 回 12 ~ 20mL を緩徐に静注。血液凝固第 XIII 因子が 90% 以下に低下している患者に投与。3 日間の投与とする
人ハプトグロビン ハプトグロビン静注 2000 単位 「JB」 (特生) Haptoglobin (日本血液製剤) 2000 単位 100mL 【薬価】 50,287.00 円 / 瓶	【効】 熱傷・火傷、輸血、体外循環下開心術などの溶血反応に伴うヘモグロビン血症、ヘモグロビン尿症の治療 【用】 (注) 1 回 4000 単位を緩徐に点滴静注するか、体外循環時に使用する場合は灌流液中に投与。(参考) 小児: 1 回 2000 単位を目安とする
人免疫グロブリン ガンマグロブリン筋注 450mg/3mL 「タケダ」 (特生) Gamma globulin (武田) 450mg/3mL/ 瓶 【薬価】 527.00 円 / mL	【効】 ①無又は低ガンマグロブリン血症。②次記のウイルス性疾患の予防及び症状の軽減: 麻疹, A 型肝炎, ポリオ 【用】 (注) ①体重 1kg 当たり 100 ~ 300mg を毎月 1 回筋注。②体重 1kg 当たり 1 回 15 ~ 50mg を筋注

6349. その他の血液製剤類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>タコシール組織接着用シート <small>(特生)</small> Tachosil (CSL ベーリング) 9.5 cm × 4.8 cm / 枚 【薬価】 50,558.90 円 / 枚 1 cm²中： ヒトフィブリノゲン 5.5mg トロンビン画分 2.0I.U.</p>	<p>【効】 肝臓外科，肺外科，心臓血管外科，産婦人科及び泌尿器外科領域における手術時の組織の接着・閉鎖（但し，縫合あるいは接合した組織から血液，体液又は体内ガスの漏出をきたし，他に適切な処置法のない場合に限る。） 【用】 (外) 接着・閉鎖部位の血液，体液をできるだけ取り除き，本剤を適切な大きさにし，乾燥状態のままあるいは生理食塩液でわずかに濡らし，その活性成分固着面を接着・閉鎖部位に貼付し，3～5分間圧迫</p>
<p>ベリプラストPコンビセット組 織接着用 <small>(特生)</small> Beriplast P (CSL ベーリング) 0.5mL/ キット 【薬価】 8,561.80 円 / 組 バイアル1 (フィブリノゲン末) フィブリノゲン 40mg/V ヒト血液凝固第 XIII 因子 30 倍 /V バイアル2 (アプロチニン液) アプロチニン液 500KIE/V バイアル3 (トロンビン末) トロンビン 150 単位 /V バイアル4 (塩化カルシウム液) 塩化カルシウム水和物 2.94mg/V</p>	<p>【効】 組織の接着・閉鎖（但し，縫合あるいは接合した組織から血液，体液又は体内ガスの漏出を来し，他に適切な処置法のない場合に限る） 【用】 (外) 用法：フィブリノゲン末（バイアル1）をアプロチニン液（バイアル2）全量で溶解し，A液とする．トロンビン末（バイアル3）を，アプロチニン液量と同量の塩化カルシウム液（バイアル4）で溶解し，B液とする．接着・閉鎖部位にA液，B液を重層又は混合して適用．用量：10 cm²あたり A液 B液各々 1mL を適用</p>

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
<p>ボルヒール組織接着用 (特生) Bolheal (日本血液製剤) 0.5mL4 瓶 1 組 【薬価】 6,236.90 円 / 組 0.5mL 製剤中： バイアル 1 (フィブリノゲン凍結乾燥粉末)： 人フィブリノゲン 40mg 人血液凝固第 XIII 因子 37.5 単位 バイアル 2 (フィブリノゲン溶解液)： 局外規アプロチニン液 500KIE/0.5mL バイアル 3 (トロンビン凍結乾燥粉末)： トロンビン 125 単位 バイアル 4 (トロンビン溶解液)： 塩化カルシウム水和物 2.95mg/0.5mL</p>	<p>【効】 組織の接着・閉鎖 (但し、縫合あるいは接合した組織から血液、体液又は体内ガスの漏出を来し、他に適切な処置法のない場合に限る) 【用】(外) フィブリノゲン凍結乾燥粉末 (バイアル 1) をフィブリノゲン溶解液 (バイアル 2) 全量で溶解し、A 液とする。トロンビン凍結乾燥粉末 (バイアル 3) をトロンビン溶解液 (バイアル 4) 全量で溶解し、B 液とする。溶解した両液の等容量を接着・閉鎖部位に重層又は混合して適用。10 cm²あたり A 液 B 液各々 1mL を適用</p>
<p>ボルヒール組織接着用 (特生) Bolheal (日本血液製剤) 3mL4 瓶 1 組 【薬価】 29,787.30 円 / 組 3mL 製剤中： バイアル 1 (フィブリノゲン凍結乾燥粉末)： 人フィブリノゲン 240mg 人血液凝固第 XIII 因子 225 単位 バイアル 2 (フィブリノゲン溶解液)： 局外規アプロチニン液 3000KIE/3.0mL バイアル 3 (トロンビン凍結乾燥粉末)： トロンビン 750 単位 バイアル 4 (トロンビン溶解液)： 塩化カルシウム水和物 17.7mg/3.0mL</p>	

63. 生物学的製剤

636. 混合生物学的製剤

6361. ワクチン・トキソイド混合製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド <u>DTビック</u> (株) (生) (田辺三菱) 0.1mL/本 0.1mL中： ジフテリアトキソイド 5Lf以下(7I.U.以上) 破傷風トキソイド 1Lf以下(4I.U.以上)	【効】 ジフテリア及び破傷風の予防 【用】(注) ①初回免疫：1回0.5mLずつを2回，3～8週間隔で皮下注．10歳以上には，第1回量0.1mL皮下注．②追加免疫：初回免疫後6か月以上の間隔で(標準：初回免疫終了後12～18か月の間)0.5mLを1回皮下注，10歳以上0.1mL以下を皮下注
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン <u>トリビック</u> (株) (生) (田辺三菱) 0.5mL/筒 0.5mL中： 百日せき菌の防御抗原 4単位以上 ジフテリアトキソイド 15Lf以下(14国際単位以上) 破傷風トキソイド 2.5Lf以下(9国際単位以上)	【効】 百日せき，ジフテリア及び破傷風の予防 【用】(注) ①初回免疫：1回0.5mLを3回，3～8週間隔で皮下注．②追加免疫：初回免疫後6か月以上の間隔で0.5mLを1回皮下注．以後の追加免疫には，1回0.5mLを皮下注
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン <u>クアトロバック皮下注シリンジ</u> (株) (生) Quattrovac (KM バイオロジクス) 0.5mL/筒 0.5mL中： 百日せき菌防御抗原 4単位以上 ジフテリアトキソイド 16.7Lf以下 破傷風トキソイド 6.7Lf以下 不活化ポリオウイルス1型(Sabin株) 1.5DU 不活化ポリオウイルス2型(Sabin株) 50DU 不活化ポリオウイルス3型(Sabin株) 50DU DU：D抗原単位	【効】 百日せき，ジフテリア，破傷風及び急性灰白髄炎の予防 【用】(注) 初回免疫：小児に，1回0.5mLずつを3回，いずれも3週間以上の間隔で皮下注．追加免疫：小児に，初回免疫後6か月以上の間隔をおいて，0.5mLを1回皮下注

6393. 精製ツベルクリン

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
精製ツベルクリン <u>一般診断用精製ツベルクリン</u> <u>(PPD) 1人用</u> ㉞ ㉟ Purified tuberculin (日本ビーシージー) (一般診断用・1人用)0.25 μ g/V(溶解液付) 【薬価】 2,735.00円 / 瓶	【効】 結核の診断に用いる 【用】(注) ①添付の溶解液の全量を吸い上げ、標準品 0.25 μ g 相当量入りの本剤に注入して溶解し、0.5 μ g 相当量 /mL の精製ツベルクリン溶液をつくる。②精製ツベルクリン溶液 0.1mL を前膊(前腕)屈側のほぼ中央部又は上膊(上腕)屈側の中央からやや下部の皮内に注射し、注射後およそ 48 時間後に判読する

6399. 他に分類されない生物学的製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インターフェロンベーター 1a (遺伝子組換え) <u>アボネックス筋注 30μg ペン</u> ㉞ ㉟ Avonex (ハイオジェン) 30 μ g0.5mL/ 筒 【薬価】 32,847.00円 / キット	【効】 多発性硬化症の再発予防 【用】(注) 1回 30 μ g を週 1 回筋注
インターフェロンベーター 1b (遺伝子組換え) <u>ベタフェロン皮下注用 960 万国単位</u> ㉞ ㉟特生 Betaferon (バイエル) 960 万 I.U./V (溶解液付) 【薬価】 7,319.00円 / 瓶	【効】 多発性硬化症の再発予防及び進行抑制 【用】(注) 800 万 I.U. を隔日皮下注
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン <u>サイモグロブリン点滴静注用</u> <u>25mg</u> ㉞ ㉟ Thymoglobuline (サノフィ) 25mg/Vi 【薬価】 28,545.00円 / 瓶	【効】 ①中等症以上の再生不良性貧血。②造血幹細胞移植の前治療。③造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病。④次記の臓器移植後の急性拒絶反応の治療:腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植 【用】(注) ① 1 日 1 回 2.5 ~ 3.75mg/kg を、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 500mL で希釈して、6 時間以上かけ緩徐に点滴静注。投与期間は 5 日間。② 1 日 1 回 2.5mg/kg を、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 500mL で希釈して、6 時間以上かけ緩徐に点滴静注。投与期間は造血幹細胞移植 5 日前より 4 日間。③ 1 日 1 回 2.5 ~ 3.75mg/kg を、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 500mL で希釈して、6 時間以上かけ緩徐に点滴静注。投与期間は 5 日間。④腎移植の場合: 1 日 1 回 1.5mg/kg を、1 パリアル (25mg) あたり、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 50mL で希釈して、6 時間以上かけ緩徐に点滴静注。投与期間は 7 ~ 14 日間。肝移植、肺移植、膵移植及び小腸移植の場合: 1 日 1 回 1.5mg/kg を、1 パリアル (25mg) あたり、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 50mL で希釈して、6 時間以上かけ緩徐に点滴静注。投与期間は 14 日間まで。心移植の場合: 1 日 1 回 1.5 ~ 2.5mg/kg を、1 パリアル (25mg) あたり、生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液 50mL で希釈して、6 時間以上かけ緩徐に点滴静注。投与期間は 14 日間まで
サトラリズマブ (遺伝子組換え) <u>エンスプリング皮下注 120mg シリンジ</u> ㉞ ㉟ Enspryng (中外) 120mg 【薬価】 1,150,216.00円 / 筒	【効】 視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防 【用】(注) 1 回 120mg を初回、2 週後、4 週後に皮下注、以降は 4 週間隔で皮下注

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
スチムリマブ（遺伝子組換え） <u>エジャイモ点滴静注 1.1g（患者限定）</u> ㊞ ㊟ Enjaymo （サノフィ） 1.1g/22mL/瓶 【薬価】 244,074.00 円 / 瓶	【効】 寒冷凝集素症 【用】（注） 1回 6.5g 又は 7.5g を点滴静注。初回投与後は、1週後に投与し、以後2週間の間隔で投与
テセロイキン（遺伝子組換え） <u>イムネース注 35</u> ㊞ Imunace （共和） 35 万国内標準単位 / V（溶解液付） 【薬価】 44,045.00 円 / 瓶	【効】 ①血管肉腫。②腎癌。③神経芽腫に対するジヌツキシマブ（遺伝子組換え）の抗腫瘍効果の増強 【用】（注） ①生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液等に溶解し、1日 70 万単位を、1日 1～2 回に分割し連日点滴静注。最大投与量は 1日 140 万単位。②生理食塩液又は 5% ブドウ糖注射液等に溶解し、1日 70 万単位を、1日 1～2 回に分割し連日点滴静注。最大投与量は 1日 210 万単位。増量することにより、肝機能検査値異常、体液貯留が発現しやすくなるため注意。③ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）及びフィログラスチム（遺伝子組換え）との併用において、1日 1回 75 万単位 / m ² （体表面積）又は 1日 1回 100 万単位 / m ² （体表面積）を 24 時間持続点滴静注。28 日間を 1 サイクルとし、2, 4, 6 サイクルの 1～4 日目に 1日 1回 75 万単位 / m ² （体表面積）、8～11 日目に 1日 1回 100 万単位 / m ² （体表面積）を投与
トシリズマブ（遺伝子組換え） <u>アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター</u> ㊞ ㊟ Actemra （中外） 162mg/0.8mL 【薬価】 32,608.00 円 / キット	【効】 既存治療で効果不十分な次記疾患：①関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）。②高安動脈炎、巨細胞性動脈炎 【用】（注） ① 1回 162mg を 2 週間隔で皮下注。効果不十分な場合、1 週間まで投与間隔を短縮できる。② 1回 162mg を 1 週間隔で皮下注
ベグインターフェロンアルファ - 2a（遺伝子組換え） <u>ペガシス皮下注 90μg</u> ㊞ Pegasys （中外） 90μg1mL/V 【薬価】 8,842.00 円 / 瓶	【効】 ① C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善。② B 型慢性活動性肝炎におけるウイルス血症の改善 【用】（注） ① 使用にあたっては、HCV-RNA が陽性であることを確認したうえで行う。1回 180μg を週 1 回、皮下注。患者の状態を考慮し、減量、中止等の適切な処置を行うこと。② 使用にあたっては、HBV-DNA 量の測定等によりウイルスの増殖を確認したうえで行う。1回 90μg を週 1 回、皮下注。年齢、HBV-DNA 量等に応じて、1 回の投与量を 180μg とすることができる。患者の状態を考慮し、減量、中止等の適切な処置を行うこと
ラブリズマブ（遺伝子組換え） <u>ユルトミリス HI 点滴静注 300mg / 3mL（患者限定、今回限定）</u> ㊞ ㊟ Ultomiris （アレクシオン） 300mg / 瓶 【薬価】 699,570.00 円 / 瓶	【効】 ① 発作性夜間ヘモグロビン尿症。② 非典型溶血性尿毒症症候群。③ 全身型重症筋無力症（免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る）。④ 視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防 【用】（注） ①③④ 患者の体重を考慮し、1回 2,400～3,000mg を開始用量とし、初回投与 2 週後に 1回 3,000～3,600mg、以降 8 週ごとに 1回 3,000～3,600mg を点滴静注。② 患者の体重を考慮し、1回 600～3,000mg を開始用量とし、初回投与 2 週後に 1回 300～3,600mg、以降 4 週又は 8 週ごとに 1回 300～3,600mg を点滴静注

64. 寄生動物用薬

641. 抗原虫剤

6419. その他の抗原虫剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ベンタミジンイセチオン酸塩 <u>ベナンバックス注用 300mg</u> ㊦ Benambax (サノフィ) 300mg/V 【薬価】 6,510.00 円 / 瓶	【効】 カリニ肺炎. <適応菌種> ニューモシスチス・カリニ 【用】 (注) ①点滴静注・筋注: 4mg/kgを1日1回. 1) 点滴静注: 注射用水3～5mLに溶解した後, ブドウ糖注射液又は生理食塩液 50～250mLに希釈し, 1～2時間かけて点滴静注. 2) 筋注: 注射用水3mLに溶解した後, 2カ所以上の部位に分けて筋注. ②吸入投与: 300～600mgを注射用水 (1バイアルにつき3～5mL)に溶解し, 吸入装置を用いて1日1回30分かけて. 吸入装置は5 μ m以下のエアロゾル粒子を生成する能力を有する超音波ネブライザー又はコンプレッサー式ネブライザー等を使用すること. 吸入装置により霧化能力, 薬液槽容量が異なるので, 使用する機種に応じて薬液を注射用水で適切な量に希釈して用いること
メトロニダゾール <u>アネメトロ点滴静注液 500mg</u> Anaemetrol (ファイザー) 500mg100mL/瓶 【薬価】 1,188.00 円 / 瓶	【効】 ①嫌気性菌感染症: 敗血症, 深在性皮膚感染症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 骨髓炎, 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 骨盤内炎症性疾患, 腹膜炎, 腹腔内膿瘍, 胆嚢炎, 肝膿瘍, 化膿性髄膜炎, 脳膿瘍. <適応菌種> 本剤に感性的のペプトストレプトコッカス属, バクテロイデス属, プレボテラ属, ポルフィロモナス属, フソバクテリウム属, クロストリジウム属, ユーバクテリウム属②感染性腸炎 (偽膜性大腸炎を含む). <適応菌種> 本剤に感性的のクロストリジウム・ディフィシル③アメーバ赤痢 【用】 (注) 成人にはメトロニダゾールとして, 1回500mgを1日3回, 20分以上かけて点滴静注. 難治性又は重症感染症には症状に応じて, 1回500mgを1日4回投与
メトロニダゾール <u>フラジール内服錠 250mg</u> Flagyl (塩野義) 250mg/T 【薬価】 36.20 円 / T	【効】 ①トリコモナス症 (腔トリコモナスによる感染症). ②嫌気性菌感染症: 深在性皮膚感染症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 骨髓炎, 肺炎, 肺膿瘍, 骨盤内炎症性疾患, 腹膜炎, 腹腔内膿瘍, 肝膿瘍, 脳膿瘍. <適応菌種> 本剤に感性的のペプトストレプトコッカス属, バクテロイデス属, プレボテラ属, ポルフィロモナス属, フソバクテリウム属, クロストリジウム属, ユーバクテリウム属. ③感染性腸炎 (偽膜性大腸炎を含む). <適応菌種> 本剤に感性的のクロストリジウム・ディフィシル. ④細菌性陰症. <適応菌種> 本剤に感性的のペプトストレプトコッカス属, バクテロイデス・フラジリス, プレボテラ・ビビア, モビルンカス属, ガードネラ・バジナリス. ⑤ヘリコバクター・ピロリ感染症: 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症, ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎. ⑥アメーバ赤痢. ⑦ランブル鞭毛虫感染症 【用】 (内) ①1クールとして, 1回250mgを1日2回, 10日間. ②1回500mgを1日3回又は4回. ③1回250mgを1日4回又は1回500mgを1日3回, 10～14日間. ④1回250mgを1日3回又は1回500mgを1日2回7日間. ⑤アモキシシリン水和物, クラリスロマイシン及びプロトンポンプインヒビター併用によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合: メトロニダゾールとして1回250mg, アモキシシリン水和物として1回750mg及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回, 7日間. ⑥1回500mgを1日3回10日間. 症状に応じて1回750mgを1日3回. ⑦1回250mgを1日3回5～7日間
<u>バクトラミン注</u> Bactramin (中外) 5mL/A 【薬価】 455.00 円 / A 1アンブル (5mL) 中: スルファメトキサゾール 400mg トリメトプリム 80mg	【効】 カリニ肺炎. <適応菌種> ニューモシスチス・カリニ 【用】 (注) トリメトプリムとして1日量15～20mg/kgを3回に分割し, 1～2時間かけて点滴静注

642. 駆虫剤

6429. その他の駆虫剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イベルメクチン <u>ストロメクトール錠 3mg</u> ㉞ Stromectol (マルホ) 3mg/T 【薬価】 595.00 円 /T	【効】 ①腸管糞線虫症. ②疥癬 【用】(内) ①約 200 μ g/kg を 2 週間間隔で 2 回. ②約 200 μ g/kg を 1 回. (体重毎の 1 回当たりの投与量) 15 - 24kg : 1 錠, 25 - 35kg : 2 錠, 36 - 50kg : 3 錠, 51 - 65kg : 4 錠, 66 - 79kg : 5 錠, 80kg 以上 : 約 200 μ g/kg
プラジカンテル <u>ビルトリシド錠 600mg (院外)</u> Biltricide (バイエル) 600mg/T 【薬価】 1,283.50 円 /T	【効】 ①肝吸虫症, 肺吸虫症. ②横川吸虫症. [注]: 住血吸虫症に対する本剤の有用性は外国においては確立されており, WHO では住血吸虫症の治療のエッセンシャル・ドラッグとされているが, 国内における評価症例がないため, 我国においては住血吸虫症に対する効能は承認されていない 【用】(内) ① 1 回 20mg/kg を 1 日 2 回 2 日間. ② 1 回 20mg/kg を 1 日 1 ~ 2 回 1 日

71. 調剤用薬

7. 治療を主目的としない医薬品

71. 調剤用薬

711. 賦形剤

7111. 乳糖類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
乳糖水和物 乳糖「ホエイ」EFC Lactose hydrate (ファイザー) 末 【薬価】1.63円/g	【効】賦形剤として調剤に用いる

7112. デンプン類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
バレイショデンプン バレイショデンプン「ケンエー」 Potato starch (健栄) 末 【薬価】0.75円/g	【効】賦形剤として調剤に用いる

712. 軟膏基剤

7121. 油脂性基剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オリブ油 オリブ油「日医工」 Olive oil (日医工) 500mL/本 【薬価】2.13円/mL	【効】軟膏, 硬膏, リニメント剤などの基剤として調剤に用いる
白色ワセリン 白色ワセリン White petrolatum (丸石) 500g/本 【薬価】2.43円/g	【効】軟膏基剤として調剤に用いる。また, 皮膚保護剤として用いる

7122. 乳剤性基剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
親水クリーム 親水クリーム「ヨシダ」 Hydrophilic cream (吉田) 500g/本 【薬価】2.94円/g 1000g中: 白色ワセリン 250g ステアリルアルコール 200g プロピレングリコール 120g ポリオキシエチレン硬化ヒマシ 油60 40g モノステアリン酸グリセリン 10g パラオキシ安息香酸メチル 1g パラオキシ安息香酸プロピル 1g 精製水 適量	【効】軟膏基剤として調剤に用いる。また, 皮膚保護剤として用いる

713. 溶解剤

7131. 精製水類

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
注射用水 <u>大塚蒸留水</u> Water for injection (大塚) 20mL/A 【薬価】 62.00 円 / A <u>大塚蒸留水</u> Water for injection (大塚) 500mL/ 本 【薬価】 216.00 円 / 瓶 <u>注射用水</u> Water for injection (光) 100mL/V 【薬価】 147.00 円 / 瓶 <u>注射用水</u> Water for injection (光) 500mL/V 【薬価】 268.00 円 / 瓶 <u>注射用水</u> Water for injection (光) 1L/ 本 【薬価】 242.00 円 / 瓶	【効】 注射剤の溶解希釈剤, 注射剤の製剤
注射用水 <u>注射用水 PL「フソー」</u> Water for injection (扶桑) 500mL/V 【薬価】 216.00 円 / 瓶	【効】 注射用医薬品の溶解・希釈剤

714. 矯味, 矯臭, 着色剤

7142. シロップ製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
単シロップ <u>単シロップ</u> Simple syrup (吉田) 500mL/ 本 【薬価】 0.60 円 / mL	【効】 矯味の目的で調剤に用いる

719. その他の調剤用薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
塩化ナトリウム <u>塩化ナトリウム「オーツカ」</u> Sodium chloride (大塚) 末 【薬価】 0.91 円 / g	【効】 ①(内) 食塩喪失時の補給. ②(注) [0.4% 注射液] 注射剤の溶解希釈剤. [生理食塩液] 細胞外液欠乏時, ナトリウム欠乏時, クロール欠乏時, 注射剤の溶解希釈剤. [10% 注射液] ナトリウム欠乏時の電解質補給. [1M, 2.5M 注射液] 電解質補液の電解質補正. ③(外) 皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布, 含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進. ④(その他) 医療用器具の洗浄 【用】 ①(内) 1 回 1 ~ 2g をそのまま, 又は水に溶かして投与. ②(注) [0.4% 注射液] 適量を取り, 注射用医薬品の希釈, 溶解に用いる. [生理食塩液] 1) 20 ~ 1,000mL を皮下, 静注又は点滴静注. 2) 適量を取り, 注射用医薬品の希釈, 溶解に用いる. [10% 注射液] 電解質補給の目的で, 輸液剤などに添加して必要量を静注又は点滴静注. [1M, 2.5M 注射液] 電解質補液の電解質の補正として体内の水分, 電解質の不足に応じて電解質補液に添加して用いる. ③(外) (1) 等張液として皮膚, 創傷面, 粘膜の洗浄, 湿布に用いる. (2) 等張液として含嗽, 噴霧吸入に用いる. ④(その他) 生理食塩液として医療用器具の洗浄に用いる

72. 診断用薬（体外診断用医薬品を除く.）

721. X線造影剤

7211. ヨウ素化合物製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ガストログラフィン経口・注腸用 Gastrografin (バイエル) 100mL/本 (I: 370mg/mL) 【薬価】 15.60 円/mL 1 瓶 (100mL) 中： アミドトリゾ酸 59.73g メグルミン 15.924g 水酸化ナトリウム 629mg	【効】 ①消化管撮影：次記の場合における消化管造影（狭窄の疑いのあるとき、急性出血、穿孔の恐れのあるとき（消化器潰瘍、憩室）、その他、外科手術を要する急性症状時、胃及び腸切除後（穿孔の危険、縫合不全）、内視鏡検査法実施前の異物及び腫瘍の造影、胃・腸瘻孔の造影）、②コンピューター断層撮影における上部消化管造影 【用】(内) ① 1 回 60mL（レリーフ造影には、10～30mL）、② 30～50 倍量の水で希釈し、250～300mL。（注腸）3～4 倍量の水で希釈し、最高 500mL を注腸投与
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル リピオドール 480 注 10ml Lipiodol (富士製薬) 10mL/A (I: 480mg/mL) 【薬価】 25,792.00 円/A 1 管中： ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 10mL ヨウ素量として 4.8g (38w/w%)	【効】 ①リンパ系撮影、②子宮卵管撮影、③医薬品又は医療機器の調製 【用】(注) ①皮膚直下の末梢リンパ管内に注入。用量はヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステルとして上腕片側 5～6mL、下肢片側 10mL である。注入速度は 0.3～0.5mL/分程度が望ましい。②用時医師が定める。ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステルとして 5～8mL を 200mmHg 以下の圧で注入することが原則。③適量とり、医薬品又は医療機器の調製に用いる

7212. バリウム塩製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
硫酸バリウム エネマスター注腸散 Enemaster (伏見) 98.1%350/本 【薬価】 1.47 円/g	【効】 消化管（大腸）撮影 【用】(外) 本剤の適量に適量の水を加えて適当な濃度とし、その適量を注腸。次記量を標準とする：硫酸バリウム濃度 20～130w/v%、用量 200～2000mL
硫酸バリウム コロンフォート内用懸濁液 25% Colomfort (伏見) 32mL/瓶 【薬価】 498.60 円/瓶	【効】 腸内容物の標識による大腸コンピューター断層撮像の補助 【用】(内) 1 回 32mL（硫酸バリウムとして 8g）を検査前日から毎食後に 3 回
硫酸バリウム バリテスター A240 散 Barytester A (伏見) 98.5%300g/本 【薬価】 1.36 円/g	【効】 食道・胃・十二指腸二重造影撮影 【用】(内) 本剤 100g に対し水 18～26mL を加えて 200～240w/v% の濃度の懸濁液とし、その適量を経口投与。次の量を標準とする。食道（二重造影）：硫酸バリウム濃度 200～240w/v%（用量 30～50mL）。胃・十二指腸（二重造影）：硫酸バリウム濃度 200～240w/v%（用量 200～230mL）
硫酸バリウム バリブライツ LV Baribright LV (カイゲン) 99.5%末 1.2kg/袋 【薬価】 1.59 円/g	【効】 食道・胃・十二指腸二重造影撮影 【用】(内) 本剤 100g に対し水 18～26mL を加えて 200～240w/v% の濃度の懸濁液とし、その適量を投与。次の量を標準とする。食道（二重造影）：硫酸バリウム濃度 200～240w/v%、用量 30～50mL。胃・十二指腸（二重造影）：硫酸バリウム濃度 200～240w/v%、用量 200～230mL
硫酸バリウム バリブライツ P Baribright P (カイゲン) 98%300g/本 【薬価】 1.47 円/g	【効】 消化管撮影 【用】(内) 検査部位及び検査方法に応じ、本剤の適量に適量の水を加えて適当な濃度とし、その適量を経口投与又は注腸。次の量を標準とする。食道（経口）：硫酸バリウム濃度 50～200w/v%、用量 10～150mL。胃・十二指腸（経口）（充盈、レリーフ、二重造影）：硫酸バリウム濃度 30～200w/v%、用量 10～300mL。小腸（経口）：硫酸バリウム濃度 30～150w/v%、用量 100～300mL。大腸（注腸）：硫酸バリウム濃度 20～130w/v%、用量 200～2000mL

7213. 造影補助剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
クエン酸マグネシウム マグコロール散 68% 分包 50g Magcorol (堀井) 34g50g/ 袋 【薬価】 377.40 円 / 包	【効】 大腸検査 (① X線・②内視鏡) 前処置における腸管内容物の排除、③腹部外科手術時における前処置用下剤 【用】 (内) ①③高張液投与: 34g (本剤 50g) を水に溶解し、全量約 180mL とする、1 回 144 ~ 180mL を検査予定時間の 10 ~ 15 時間前、②高張液投与: 34g (本剤 50g) を水に溶解し、全量約 180mL とする、1 回 144 ~ 180mL を検査予定時間の 10 ~ 15 時間前、等張液投与: 68g (本剤 100g) を水に溶解し、全量約 1,800mL とする、1 回 1,800mL を検査予定時間の 4 時間以上前に 200mL ずつ約 1 時間かけて、2,400mL まで
クエン酸マグネシウム マグコロール内用液 13.6% 分包 250mL Magcorol (堀井) 13.6%250mL/ 本 【薬価】 393.50 円 / 包	【効】 大腸検査 (① X線・②内視鏡) 前処置における腸管内容物の排除、③腹部外科手術時における前処置用下剤 【用】 (内) ①③高張液投与: 1 回 27 ~ 34g (本品 200 ~ 250mL) を検査予定時間の 10 ~ 15 時間前、②高張液投与: 1 回 27 ~ 34g (本品 200 ~ 250mL) を検査予定時間の 10 ~ 15 時間前、等張液投与: 68g (本品 500mL) を水に溶解し、全量約 1800mL とする、1 回 1800mL を検査予定時間の 4 時間以上前に 200mL ずつ約 1 時間かけて、2400mL まで
④バルギン発泡顆粒 Balgin (カイゲン) 5.0g/ 包 【薬価】 11.80 円 / g 1g 中: 炭酸水素ナトリウム 460mg 酒石酸 420mg	【効】 胃及び十二指腸の透視・撮影の造影補助 【用】 (内) 透視開始に際して、造影剤投与開始直前あるいは投与開始後、年齢、胃内容積の個人差、造影の体位に応じて、約 100 ~ 400mL の炭酸ガスの発生量に相当する量を、少量の水又は、造影剤と共に投与

7214. 配合製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ウログラフィン注 60% Urografin (バイエル) 60%20mL/A (I: 292mg/mL) 【薬価】 736.00 円 / A 1mL 中: アミドトリゾ酸 471.78mg メグルミン 125.46mg 水酸化ナトリウム 5.03mg	【効】 ①内視鏡的逆行性膵胆管撮影、②経皮経肝胆道撮影 【用】 (注) 1 回次記量を使用、① 20 ~ 40mL、② 20 ~ 60mL

7219. その他の X 線造影剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イオジキサノール ビジパーク 270 注 20mL Visipaque (GEヘルスケア) 20mL/ 瓶 【薬価】 1,471.00 円 / 瓶	【効】 脳血管撮影、四肢血管撮影、逆行性尿路撮影、内視鏡的逆行性膵胆管撮影 【用】 (注) 1 回、次記の量を使用、血管内に投与する場合の総投与量は、270mgI/mL 製剤は 180mL まで、脳血管撮影: 4 ~ 15mL、四肢血管撮影: 8 ~ 80mL、逆行性尿路撮影: 20 ~ 200mL、原液を生理食塩水で 2 倍希釈し用いることも可能、内視鏡的逆行性膵胆管撮影: 3 ~ 40mL (注: 1 回の検査における総使用量)
イオトロラン イソビスト注 300 Isovist (バイエル) 10mL/ 瓶 【薬価】 7,612.00 円 / 瓶	【効】 ①子宮卵管撮影、②関節撮影 【用】 (注) ① 1 回 6 ~ 10mL を導管より子宮腔内に注入、② 1 回 1 ~ 10mL を関節腔内に注入

72. 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イオパミドール <u>イオパミドール 300 注 20mL 「F」</u> Iopamidol (富士製薬) 61.24%20mL/瓶 【薬価】 1,394.00 円 / 瓶	【効】 ①脳血管撮影. ②大動脈撮影. ③選択的血管撮影. ④四肢血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑦コンピューター断層撮影における造影. ⑧静脈性尿路撮影. ⑨逆行性尿路撮影 【用】 (注) 1 回次記量を使用. ① 6 ~ 13mL. ②⑤ 30 ~ 50mL. ③ 5 ~ 40mL. ④ 20 ~ 50mL. ⑥ 3 ~ 30mL. ⑦ 100mL. ⑧ 40 ~ 100mL. ⑨ 5 ~ 200mL. ⑥⑨原液又は生理食塩液で 2 ~ 4 倍希釈. ⑦ 50mL 以上は点滴静注. 胸・腹部を高速ラセンコンピューター断層撮影する場合は, 対象部位により投与速度を調節. 投与量は肝臓領域を除く胸・腹部の場合は 100mL まで, 肝臓領域の場合は 150mL まで投与することができる. ⑧ 50mL 以上は点滴静注
イオパミドール <u>イオパミロン注 300 シリンジ</u> Iopamiron (バイエル) 61.24%80mL/筒 (I : 300mg/mL) 【薬価】 3,425.00 円 / 筒	【効】 ①脳血管撮影. ②大動脈撮影. ③選択的血管撮影. ④四肢血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑦コンピューター断層撮影における造影. ⑧静脈性尿路撮影. ⑨逆行性尿路撮影 【用】 (注) 1 回次記量を使用. ① 6 ~ 13mL. ②⑤ 30 ~ 50mL. ③ 5 ~ 40mL. ④ 20 ~ 50mL. ⑥ 3 ~ 30mL. ⑦ 100mL. 胸・腹部を高速ラセンコンピューター断層撮影で撮像する場合, 撮影対象部位により静脈内投与速度を調節. 投与量は肝臓領域を除く胸・腹部の場合は 100mL まで, 肝臓領域の場合は 150mL まで投与できる. ⑧ 40 ~ 100mL. ⑨ 5 ~ 200mL
イオパミドール <u>イオパミロン注 370 シリンジ</u> Iopamiron (バイエル) 75.52%80mL/筒 【薬価】 3,810.00 円 / 筒	【効】 ①血管心臓撮影 (肺動脈撮影を含む). ②大動脈撮影. ③選択的血管撮影. ④四肢血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑦コンピューター断層撮影における造影. ⑧静脈性尿路撮影 【用】 (注) 1 回次記量を使用. ①④ 20 ~ 50mL. ②⑤ 30 ~ 50mL. ③ 5 ~ 40mL. ⑥ 3 ~ 30mL. ⑦ 100mL. ⑧ 20 ~ 100mL
イオプロミド <u>イオプロミド 370 注シリンジ 100mL 「BYL」</u> Iopromide (バイエル) 100mL/筒 【薬価】 5,445.00 円 / 筒	【効】 ①血管心臓撮影. ②胸部血管撮影. ③腹部血管撮影. ④四肢血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑦コンピューター断層撮影における造影. ⑧静脈性尿路撮影 【用】 (注) 1 回次記量を使用, 複数回投与する場合には総量 260mL まで. ① 3 ~ 40mL. ②③ 5 ~ 50mL. ④ 10 ~ 40mL. ⑤ 20 ~ 40mL. ⑥ 3 ~ 30mL. ⑦⑧ 50 ~ 100mL
イオヘキソール <u>イオヘキソール 300 注 20mL 「F」</u> Iohexol (富士製薬) 20mL 【薬価】 1,419.00 円 / 瓶 <u>イオヘキソール 300 注 100mL 「F」</u> Iohexol (富士製薬) 100mL/本 【薬価】 4,929.00 円 / 瓶	【効】 ①脳血管撮影. ②選択的血管撮影. ③四肢血管撮影. ④デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥コンピューター断層撮影における造影. ⑦静脈性尿路撮影 【用】 (注) 次の 1 回量を使用. ① 5 ~ 15mL. ② 5 ~ 50mL. ③ 10 ~ 50mL. ④ 1.5 ~ 50mL. ⑤ 20 ~ 50mL. ⑥ 40 ~ 100mL (50mL 以上は通常点滴 (高速ラセンコンピューター断層撮影で腹部の撮影を行う場合は 150mL まで投与可)). ⑦ 50 ~ 100mL (60mL 以上は通常点滴)
イオヘキソール <u>オムニパーク 240 注 10mL</u> Omnipaque (GEヘルスケア) 51.77%10mL/V (I : 240mg/mL) 【薬価】 647.00 円 / 瓶	【効】 ①コンピューター断層撮影による脳槽造影. ②コンピューター断層撮影による脊椎造影. ③頸部脊椎撮影. ④頸部脊椎撮影. ⑤胸部脊椎撮影. ⑥腰部脊椎撮影 【用】 (注) 1 回, 撮影の種類, 穿刺部位に応じて次記の量を使用. ①腰椎 5 ~ 10mL (ヨード含有量 : 1,200 ~ 2,400mg). ②④⑤⑥腰椎 8 ~ 12mL (ヨード含有量 : 1,920 ~ 2,880mg). ③外側頸椎 8 ~ 10mL (ヨード含有量 : 1,920 ~ 2,400mg)
イオヘキソール <u>オムニパーク 240 注シリンジ 100mL</u> Omnipaque (GEヘルスケア) 51.77%/Vi 【薬価】 4,023.00 円 / 筒	【効】 ①四肢血管撮影. ②コンピューター断層撮影における造影. ③静脈性尿路撮影 【用】 (注) 1 回, 次記の量を使用. ① 25 ~ 50mL. ② 40 ~ 100mL. ③ 60 ~ 100mL

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
イオヘキソール <u>オムニパーク 300 注シリンジ</u> <u>100mL</u> Omnipaque (GE ヘルスケア) 64.71%100mL/筒 (I:300mg/mL) 【薬価】 3,802.00 円 / 筒 <u>オムニパーク 300 注シリンジ</u> <u>150mL</u> Omnipaque (GE ヘルスケア) 64.71%150mL/筒 (I:300mg/mL) 【薬価】 6,503.00 円 / 筒	【効】 ①脳血管撮影. ②選択的血管撮影. ③四肢血管撮影. ④デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥コンピューター断層撮影における造影. ⑦静脈性尿路撮影 【用】 ① 1回, 次記の量を使用. ① 5～15mL. ② 5～50mL. ③ 10～50mL. ④ 1.5～50mL. ⑤ 20～50mL. ⑥ 40～100mL (高速ラセンコンピューター断層撮影で腹部の撮影を行う場合, 150mL まで投与可能). ⑦ 50～100mL
イオメプロール <u>イオメロン 350 注 50mL</u> Iomeron (ブラッコ) 71.44%50mL/V (I:350mg/mL) 【薬価】 2,423.00 円 / 瓶 <u>イオメロン 350 注 100mL</u> Iomeron (ブラッコ) 71.44%100mL/V (I:350mg/mL) 【薬価】 4,027.00 円 / 瓶	【効】 ①心臓血管撮影. ②胸部血管撮影. ③腹部血管撮影. ④四肢血管撮影. ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑥デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影. ⑦コンピューター断層撮影における造影. ⑧静脈性尿路撮影 【用】 ① 1回次記量を使用. 複数回投与する場合は総量 250mL まで. ① 心腔内撮影: 20～50mL, 冠状動脈撮影: 3～10mL. ② 5～50mL. ③ 5～60mL. ④ 10～80mL. ⑤ 10～50mL. ⑥ 3～40mL. ⑦ 40～100mL. 肝臓領域のダイナミックコンピューター造影の場合には, 1.8mL/kg を静脈内投与可 (最大投与量は 135mL). ⑧ 30～100mL (⑦ ⑧適宜点滴静注)
イオメプロール <u>イオメロン 350 注シリンジ 100mL</u> Iomeron (ブラッコ) 71.44%100mL/筒 (I:350mg/mL) 【薬価】 4,386.00 円 / 筒 <u>イオメロン 350 注シリンジ 135mL</u> Iomeron (ブラッコ) 71.44%135mL/筒 (I:350mg/mL) 【薬価】 6,107.00 円 / 筒	【効】 ①コンピューター断層撮影における造影. ②静脈性尿路撮影. ③心臓血管撮影. ④胸部血管撮影. ⑤腹部血管撮影. ⑥四肢血管撮影. ⑦デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影. ⑧デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影 【用】 ① 1回次記量を使用. 複数回投与する場合は総量 250mL まで. ① 40～100mL. 肝臓領域のダイナミックコンピューター断層撮影における造影の場合には, 1.8mL/kg を静脈内投与可 (最大投与量は 135mL). ② 30～100mL. ③ 心腔内撮影: 20～50mL, 冠状動脈撮影: 3～10mL. ④ 5～50mL. ⑤ 5～60mL. ⑥ 10～80mL. ⑦ 10～50mL. ⑧ 3～40mL

722. 機能検査用試薬

7223. 内分泌機能検査用試薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
テリパラチド酢酸塩 <u>テリパラチド酢酸塩静注用 100</u> <u>「旭化成」</u> Teriparatide acetate (旭化成) 100 単位 / Vi 【薬価】 19,087.00 円 / 瓶	【効】 Ellsworth-Howard 試験 【用】 ① 1回 100 テリパラチド酢酸塩単位を用時, 生食液 3mL に溶解して静注. 体表面積が 1m ² 未満の小児:100 テリパラチド酢酸塩単位 / m ² . 実施方法, 判定基準: 添付文書参照
プロチレリン酒石酸塩水和物 <u>②プロチレリン酒石酸塩注 2mg</u> <u>「NP」</u> Protirelin tartrate (ニプロ) 2mg1mL/A 【薬価】 1,720.00 円 / A 【先発品】 ヒルトニン 2mg 注射液	【効】 ①次記疾患に伴う昏睡・半昏睡を除く遅延性意識障害: 頭部外傷, クモ膜下出血 (但し, 意識障害固定期間 3 週以内). ②脊髄小脳変性症における運動失調の改善 【用】 ① 疾患に応じて, 次記の用量を 1 日 1 回 10 日間静注又は点滴静注. 静注の場合, 生理食塩液, ブドウ糖注射液又は注射用水 5～10mL に希釈し, 徐々に, 頭部外傷:1 回 0.732～2.92mg (プロチレリンとして 0.5～2mg). クモ膜下出血 (意識障害固定期間 3 週以内):1 回 2.92mg (プロチレリンとして 2mg). ② 1 日 1 回 0.732～2.92mg (プロチレリンとして 0.5～2mg) を筋注又は静注するが, 重症例には 2.92mg (プロチレリンとして 2mg). 2～3 週間連日注射した後, 2～3 週間の休業期間をおく. 以後, これを反復するか, 週 2～3 回の間歇注射を行う. 静注の場合, 生理食塩液, ブドウ糖注射液又は注射用水 5～10mL に希釈し, 徐々に

7224. 肝機能検査用試薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インドシアニングリーン ジアグノグリーン注射用 25mg Diagnogreen (第一三共) 25mg/V (溶解液付) 【薬価】801.00円/瓶	【効】①肝機能検査（血漿消失率、血中停滯率及び肝血流量測定）：肝疾患の診断、予後治癒の判定。②循環機能検査（心拍出量測定、平均循環時間又は異常血流量測定）：心臓血管系疾患の診断。③血管及び組織の血流評価。④次の疾患におけるセンチネルリンパ節の同定：乳癌、悪性黒色腫。⑤肝外胆管の描出 【用】（注）①血漿消失率測定及び血中停滯率測定の場合：0.5mg/kgに相当する量を注射用水で5mg/mL程度に希釈し、肘静脈より30秒以内に症状に注意しながら徐々に静注。肝血流量測定の場合：25mgをできるだけ少量の注射用水に溶かした後、生理食塩液で2.5～5mg/mLの濃度に希釈し、3mgに相当する前記溶液を静注。その後引き続き0.27～0.49mg/分の割合で約50分間採血が終るまで一定速度で点滴静注。②目的に応じて心腔内より末梢静脈に至る種々の血管部位に溶液を注入するが通常前腕静脈から行う。1人当たり1回量は5～10mg、すなわち1～2mL程度。小児：体重に応じて減量。（添付文書の「本検査の原理及び測定法」の項参照）。③25mgを5mLの注射用水で溶解し、0.04～0.3mg/kgを静注。脳神経外科手術時における脳血管の造影の場合、25mgを5mLの注射用水で溶解し、0.1～0.3mg/kgを静注。④乳癌のセンチネルリンパ節の同定：25mgを5mLの注射用水で溶解し、5mL以下を悪性腫瘍近傍又は乳輪部の皮下に分割投与。悪性黒色腫のセンチネルリンパ節の同定：25mgを5mLの注射用水で溶解し、1mLを悪性腫瘍近傍の皮内数箇所に分割投与。⑤25mgを10mLの注射用水で溶解し、1mLを静注

7225. 腎機能検査用試薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
インジゴカルミン インジゴカルミン注 20mg 「AFP」 Indigocarmine (アルフレッサ) 20mg5mL/A 【薬価】245.00円/A	【効】①腎機能検査（分腎機能測定による）。②次の疾患におけるセンチネルリンパ節の同定：乳癌、悪性黒色腫 【用】（注）①20～40mg（5～10mL）を静注した後、膀胱鏡で初排泄時間を調べる。〈参考〉健康成人の初排泄時間は3～5分で、遅くとも10分以内であれば機能異常ではない。腎機能障害がある場合、初排泄時間は遅延する。〔注〕色素初排泄時間の他に、色素が尿中排泄最高濃度に達する時間（正常5～7分）、排泄持続時間（正常90分）を調べる場合もある。②乳癌のセンチネルリンパ節の同定：20mg（5mL）以下を悪性腫瘍近傍又は乳輪部の皮下に適宜分割して投与。悪性黒色腫のセンチネルリンパ節の同定：4～12mg（1～3mL）を悪性腫瘍近傍の皮内数箇所に適宜分割して投与
フェノールスルホンフタレイン フェノールスルホンフタレイン注 0.6% 「AFP」 Phenolsulfonphthalein (アルフレッサ) 7.8mg1.3mL/A 【薬価】97.00円/A	【効】腎機能検査 【用】（注）排尿後、水300～500mLを飲ませ、30分後に6.0mg（本剤として1.0mL）を肘静注又は筋注。（小児用量例）体重3～5kg：2mg。体重5～10kg：3mg。体重10～20kg：4mg。体重20kg以上：6mg

7229. その他の機能検査用試薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
エドロホニウム塩化物 アンチレクス静注 10mg Ⓢ Antirex (杏林) 10mg1mL/A 【薬価】109.00円/A	【効】①重症筋無力症の診断。②筋弛緩剤投与後の遷延性呼吸抑制の作用機序の鑑別診断 【用】（注）①1回10mgを静注。その際、まず初めに2mgを15～30秒かけて注射し、45秒後に反応をみた上で必要に応じて残りの8mgを注射。②5～10mgを30～40秒かけて静注。筋弛緩状態が改善されれば非脱分極性ブロック、筋弛緩状態が増強されれば脱分極性ブロックと判定する。必要があれば5～10分以内に同量を反復投与

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
グルカゴン <u>グルカゴン G ノボ注射用 1mg</u> (株) Glucagon G novo (EA) 1mg (1I.U.) /V (溶解液付) 【薬価】 2,427.00 円 / 瓶	【効】 ①消化管の X 線及び内視鏡検査の前処置. ②低血糖時の救急処置. ③成長ホルモン分泌機能検査. ④肝型糖原病検査. ⑤胃の内視鏡的治療の前処置 【用】(注) ① 1mg を 1mL の注射用水に溶解し, 0.5 ~ 1mg を筋注又は静注. ② 1mg を 1mL の注射用水に溶解し, 筋注又は静注. ③ 1mg を 1mL の注射用水に溶解し, 0.03mg /kg を空腹時に皮下注. 最大投与量 1mg. [判定基準] 血中 hGH 値は, 測定方法, 患者の状態等の関連で異なるため, 明確に規定しえないが, 通常, 正常人では, 本剤投与後 60 ~ 180 分でピークに達し, 10ng/mL 以上を示す. 血中 hGH 値が 5ng/mL 以下の場合 hGH 分泌不全とする. なお, 本剤投与後 60 分以降は 30 分毎に 180 分まで測定し, 判定することが望ましい. ④ 1mg を生理食塩液 20mL に溶かし, 3 分かけて静注. 小児: 1mg を 1mL の注射用水に溶解し, 0.03mg/kg を筋注. 1mg まで. [判定基準] 正常反応は個々の施設で設定されるべきであるが, 通常, 正常小児では, 本剤筋注後 30 ~ 60 分で血糖はピークに達し, 前値より 25mg/dL 以上上昇する. 正常成人では, 本剤の静注後 15 ~ 30 分でピークに達し, 前値より 30 ~ 60mg/dL 上昇する. しかし, 投与後の血糖のピーク値だけでは十分な判定ができないと考えられる場合は, 投与後 15 ~ 30 分毎に測定し, 判定することが望ましい. ⑤ 1mg を 1mL の注射用水に溶解し, 筋注又は静注. 内視鏡的治療中に消化管運動が再開し, 治療に困難を来した場合又はその可能性がある場合, 1mg を追加投与. 本剤の作用発現時間は, 筋注の場合約 5 分, 静注の場合 1 分以内であり, 作用持続時間については, 筋注の場合約 25 分間, 静注の場合 15 ~ 20 分間である
ベンチロミド <u>腓外分泌機能検査用 PFD 内服液 500mg</u> PFD (エーザイ) 500mg10mL/A 【薬価】 636.40 円 / 瓶	【効】 腓外分泌機能検査 【用】(内) 早朝空腹時に採尿後 1 回 500mg を 200mL 以上の水とともに服用. 利尿をはかる目的で服用から約 1 時間後に最低約 200mL の水を飲用, それ以後については水分を自由にとらせてかまわない. 検査開始より, 3 時間以上経過した場合の食事は自由にとらせて良い. 尿は服用から 6 時間までの全尿を採尿 (成績は服用後 6 時間までの総尿中の PABA 排泄率 (%) で表示.)

729. その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く.）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アレルゲンエキス <u>アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」</u> Allergen extract (鳥居) 1mL 点滴用スポイト付瓶 【薬価】 8,110.00 円 / 瓶	【効】 診断: アレルギー性疾患のアレルゲンの確認 【用】(注) 乱刺又は切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ, 本品 1 滴を滴下し, 15 ~ 30 分後に膨疹径が対照の 2 倍以上又は 5mm 以上を陽性とする
インドシアニングリーン <u>オフサグリーン静注用 25mg</u> Ophthagreen (参天) 25mg/V (溶解液付) 【薬価】 1,988.00 円 / 瓶	【効】 網脈絡膜血管の造影 【用】(注) 25mg を注射用蒸留水 2mL に溶解し, 肘静脈より速やかに静注
塩化マンガン四水和物 <u>ボースデル内服液 10</u> Bothdel (協和キリン) マンガンとして 10mg250mL/ 袋 【薬価】 816.20 円 / 袋	【効】 磁気共鳴胆道膵管撮影における消化管陰性造影 【用】(内) マンガンとして 10mg (1 袋 250mL) を経口投与
ガドキセト酸ナトリウム <u>EOB・プリモビスト注シリンジ</u> EOB・Primovist (バイエル) 18.143%10mL1 筒 【薬価】 12,146.00 円 / 筒	【効】 磁気共鳴コンピューター断層撮影における肝腫瘍の造影 【用】(注) 0.1mL/kg を静注
ガドテリドール <u>プロハンス静注シリンジ 17mL</u> ProHance (ブラック) 17mL/ 筒 【薬価】 4,554.00 円 / 筒	【効】 磁気共鳴コンピューター断層撮影における次記造影: 脳・脊髄造影, 軀幹部・四肢造影 【用】(注) 0.2mL/kg を静注, 腎臓を対象とする場合には 0.1mL/kg を静注. 転移性脳腫瘍が疑われる患者: 0.2mL/kg 初回投与後, 腫瘍が検出されないか, 造影効果不十分であった場合には初回投与後 30 分以内に 0.2mL/kg を追加可

72. 診断用薬（体外診断用医薬品を除く.）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ガドテル酸メグルミン <u>⑥</u> ガドテル酸メグルミン静注 38% シリンジ 20mL 「GE」 Gadoterate meglumine (GE ヘルスケア) 37.695%20mL/筒 【薬価】 3,330.00 円 / 筒 【先発品】 マグネスコープ静注 38% シリンジ 20mL	【効】 磁気共鳴コンピューター断層撮影における次の造影：脳・脊髄造影，躯幹部・四肢造影 【用】 (注) 0.2mL/kgを静注，腎臓を対象とする場合には0.1mL/kg，必要に応じて0.2mL/kgまで
ガドプトロール ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL Gadovist (バイエル) 60.47%7.5mL/筒 【薬価】 6,222.00 円 / 筒	【効】 磁気共鳴コンピューター断層撮影における次記造影：脳・脊髄造影，躯幹部・四肢造影 【用】 (注) 0.1mL/kgを静注
デンプン部分加水分解物 トレランG液 75g Trelan G (陽進堂) ブドウ糖として75g225mL/V 【薬価】 205.20 円 / 瓶	【効】 糖尿病診断時の糖負荷試験に用いる 【用】 (内) ブドウ糖として，1回50g，75g，又は100g。小児：1.75g/kg
尿素 (13C) ユービット錠 100mg Ubit (大塚) 100mg/T 【薬価】 2,621.90 円 / T	【効】 ヘリコバクター・ピロリの感染診断 【用】 (内) 100mgを空腹時。判定基準は添付文書参照
フェルカルボトラン リゾビスト注 Resovist (富士フイルム) 864mg (鉄として44.6mg) 1.6mL/V 【薬価】 14,252.00 円 / 瓶	【効】 磁気共鳴コンピューター断層撮影における肝腫瘍の局在診断のための肝臓造影 【用】 (注) 0.016mL/kg (鉄として0.45mg/kg = 8 μ mol/kg) を静注。1.4mLまで。過剰量の投与あるいは追加投与はしない
フルオレseinナトリウム <u>⑥</u> フルオレサイト静注 500mg Fluorescite (日本アルコン) 500mg5mL/瓶 【薬価】 928.00 円 / 瓶	【効】 ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患の診断 【用】 (注) 200～500mgを肘静脈に注射
ペルフルブタン ソナゾイド注射用 16μL Sonazoid (GE ヘルスケア) 16 μ L/V 【薬価】 8,295.00 円 / 瓶	【効】 超音波検査における次記造影：肝腫瘍性病変，乳房腫瘍性病変 【用】 (注) 16 μ L (1バイアル) を添付の注射用水2mLで懸濁し，1回懸濁液として0.015mL/kgを静注

79. その他の治療を主目的としない医薬品

799. 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
アデノシン <u>⑧アデノシン負荷用静注 60mgシ リンジ「FRI」</u> Adenosine (富士フィルム) 60mg20mL/筒 【薬価】 5,127.00円/筒	【効】 十分に運動負荷をかけられない患者において心筋血流シンチグラフィによる心臓疾患の診断を行う場合の負荷誘導 【用】 (注) 1分間当たり 120 μ g/kgを6分間持続静脈内投与(アデノシン総投与量 0.72mg/kg)
1-メントール <u>ミンクリア内用散布液 0.8%</u> Minclea (日本製薬) 0.8%20mL/筒 【薬価】 836.40円/筒	【効】 上部消化管内視鏡時の胃蠕動運動の抑制 【用】 (内) 160mg(本剤20mL)を内視鏡の鉗子口より胃幽門前庭部に行きわたるように散布
D-ソルビトール <u>D-ソルビトール内用液 65%「マ ルイシ」</u> D-sorbitol (丸石) 500mL/瓶 【薬価】 1.02円/mL	【効】 ①消化管のX線造影の迅速化, 消化管のX線造影時の便秘の防止. ②経口的栄養補給 【用】 (内) ①X線造影剤に添加. 添加量はX線造影剤中の硫酸バリウム100gに対してD-ソルビトールとして10~20g(12~24mL). ②必要量を経口投与
ニコチン <u>ニコチネル TTS10 (院外)</u> Nicotinell (アルフレッサ) (17.5mg) 10cm ² /枚 【薬価】 198.00円/枚 <u>ニコチネル TTS20 (院外)</u> Nicotinell (アルフレッサ) (35mg) 20cm ² /枚 【薬価】 212.40円/枚 <u>ニコチネル TTS30 (院外)</u> Nicotinell (アルフレッサ) (52.5mg) 30cm ² /枚 【薬価】 219.20円/枚	【効】 循環器疾患, 呼吸器疾患, 消化器疾患, 代謝性疾患等の基礎疾患を持ち, 医師により禁煙が必要と診断された禁煙意志の強い喫煙者が, 医師の指導の下に行う禁煙の補助 【用】 (外) ニコチネル TTS10(ニコチンとして17.5mg含有), ニコチネル TTS20(ニコチンとして35mg含有)又はニコチネル TTS30(ニコチンとして52.5mg含有)を1日1回1枚, 24時間貼付. 最初の4週間はニコチネル TTS30から貼付し, 次の2週間はニコチネル TTS20を貼付し, 最後の2週間はニコチネル TTS10を貼付. 最初の4週間に減量の必要が生じた場合, ニコチネル TTS20を貼付. 10週間を超えて継続投与しない
バレニクリン酒石酸塩 <u>チャンピックス錠 0.5mg (院外)</u> Champix (ファイザー) 0.5mg/T 【薬価】 77.50円/T <u>チャンピックススタート用パック 1パック (水江)</u> Champix (ファイザー) 1パック 【薬価】 136.10円/T <u>チャンピックス錠 1mg (院外)</u> Champix (ファイザー) 1mg/T 【薬価】 136.10円/T	【効】 ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助 【用】 (内) 第1~3日目は0.5mgを1日1回食後, 第4~7日目は0.5mgを1日2回朝夕食後, 第8日目以降は1mgを1日2回朝夕食後. 投与期間は12週間
プロナーゼ <u>プロナーゼ MS</u> Pronase MS (科研) 20000単位0.5g/包 【薬価】 123.30円	【効】 胃内視鏡検査における胃内粘液の溶解除去 【用】 (内) 検査15~30分前に, 20,000単位を炭酸水素ナトリウム1gとともに約50~80mLの水に溶かし, 経口投与

79. その他の治療を主目的としない医薬品

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ミリプラ用懸濁用液 4mL Miripla (大日本住友) 4mL/A 【薬価】 443.00 円 / A	【効】 ミリプラ動注用 70mgの懸濁用 【用】 (注) ミリプラチン 70mgに対し、本懸濁用液 3.5mLを加えて使用
ニフレック配合内用剤 Niflec (EA) 137.155g/ 袋 【薬価】 766.50 円 / 袋 1 袋 (137.155g) 中： 塩化ナトリウム 2.93g 塩化カリウム 1.485g 炭酸水素ナトリウム 3.37g 無水硫酸ナトリウム 11.37g	【効】 ①大腸内視鏡検査，バリウム注腸 X 線造影検査における腸管内容物の排除。 ②大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除 【用】 (内) 本品 1 袋を水に溶解して約 2L とし，溶解液とする。1 回溶解液 2 ～ 4L を約 1L/ 時で投与。但し，排泄液が透明になった時点で投与を終了。4L まで。①) 大腸内視鏡検査前処置。a) 検査当日に投与する場合：当日の朝食は絶食（水分摂取のみ可），検査開始予定時間の約 4 時間前より投与開始。b) 検査前日に投与する場合：前日の夕食後は絶食（水分摂取のみ可），夕食後約 1 時間以上経過した後投与開始。前日の朝・昼食は残渣の少ないもの，夕食は固形物の入っていない液状食。2) バリウム注腸 X 線造影検査前処置：検査当日の朝は絶食（水分摂取のみ可），検査開始予定時間の約 6 時間前から投与開始。溶解液の投与開始時にモサプリドクエン酸塩として 20mg を溶解液（約 180mL）で投与。溶解液投与終了後，モサプリドクエン酸塩として 20mg を少量の水で投与。②手術前日の昼食後は絶食（水分摂取のみ可），昼食後約 3 時間以上経過した後投与開始
モビプレップ配合内用剤 Moviprep (EA) 244.212g/ 袋 【薬価】 1,634.30 円 / 袋 1 袋 (244.212g) 中： 大室 (A 剤) 塩化ナトリウム 5.382g 塩化カリウム 2.03g 無水硫酸ナトリウム 15.0g マクロゴール 4000 200.0g 小室 (B 剤) アスコルビン酸 9.4g L-アスコルビン酸ナトリウム 11.8g	【効】 大腸内視鏡検査，大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除 【用】 (内) 本剤 1 袋を水に溶解して約 2L の溶解液とする。溶解液を 1 時間あたり約 1L の速度で投与。溶解液を約 1L 投与した後，水又はお茶を約 0.5L 飲用。排泄液が透明になった時点で投与を終了し，投与した溶解液量の半量の水又はお茶を飲用。排泄液が透明になっていない場合には，残りの溶解液を排泄液が透明になるまで投与し，その後，追加投与した溶解液量の半量の水又はお茶を飲用。本剤 1 袋（溶解液として 2L）を超える投与は行わない。 大腸内視鏡検査前処置：検査当日の朝食は絶食（水分摂取は可）とし，検査開始予定時間の約 3 時間以上前から投与を開始。 大腸手術前処置：手術前日の昼食後は絶食（水分摂取は可）とし，昼食後約 3 時間以上経過した後，投与を開始

8. 麻薬

81. アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

811. あへんアルカロイド系麻薬

8114. モルヒネ系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
モルヒネ塩酸塩水和物 <u>アンペック注 50mg</u> (麻) (毒) Anpec (大日本住友) 50mg5mL/A 【薬価】 1,313.00 円 / A <u>モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「第一三共」</u> (麻) (毒) Morphine hydrochloride (第一三共) 10mg1mL/A 【薬価】 305.00 円 / A	【効】 ①皮下及び静脈内投与の場合：1) 激しい疼痛時における鎮痛・鎮静。2) 激しい咳嗽発作における鎮咳。3) 激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管蠕動運動の抑制。4) 麻酔前投薬，麻酔補助。5) 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛。②硬膜外及び③クモ膜下投与の場合：1) 激しい疼痛時における鎮痛。2) 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】(注) ① 1回 5～10mg を皮下注。麻酔の補助として，静注することもある。中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛において持続点滴静注又は持続皮下注する場合，1回 50～200mg。② 1回 2～6mg を硬膜外腔に注入。硬膜外腔に持続注入する場合，1日量として 2～10mg。③ 1回 0.1～0.5mg をクモ膜下腔に注入
モルヒネ塩酸塩水和物 <u>アンペック坐剤 10mg</u> (麻) (毒) Anpec (大日本住友) 10mg/個 【薬価】 320.10 円 / 個 <u>アンペック坐剤 20mg</u> (麻) (毒) Anpec (大日本住友) 20mg/個 【薬価】 612.90 円 / 個	【効】 激しい疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】(外) 1日 20～120mg を 2～4 回に分割し直腸内に。初めてモルヒネ製剤として本剤を投与する場合，1回 10mg より開始することが望ましい
モルヒネ塩酸塩水和物 <u>オプソ内服液 5mg</u> (麻) (毒) Opso (大日本住友) 5mg2.5mL/包 【薬価】 171.80 円 / 包 <u>オプソ内服液 10mg</u> (麻) (毒) Opso (大日本住友) 10mg5mL/包 【薬価】 211.90 円 / 包	【効】 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】(内) 1日 30～120mg を 1日 6 回に分割
モルヒネ塩酸塩水和物 <u>モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」</u> (麻) (毒) Morphine hydrochloride hydrate (大日本住友) 10mg/T 【薬価】 128.10 円 / T	【効】 ①激しい疼痛時における鎮痛・鎮静。②激しい咳嗽発作における鎮咳。③激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管蠕動運動の抑制 【用】(内) 1回 5～10mg，1日 15mg

81. アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
モルヒネ硫酸塩水和物 MS コンチン錠 10mg (麻) (毒) MS contin (塩野義) 10mg/T 【薬価】 245.60 円 / T MS コンチン錠 30mg (麻) (毒) MS contin (塩野義) 30mg/T 【薬価】 713.50 円 / T	【効】 激しい疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】 (内) 1日 20～120mgを2回に分割。初回量は10mgとすることが望ましい

8115. コデイン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩錠 20mg 「タケダ」 (麻) (毒) Codeine phosphate hydrate (武田) 20mg/T 【薬価】 79.50 円 / T	【効】 各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮静、疼痛時における鎮痛、激しい下痢症状の改善 【用】 (内) 1回 20mg, 1日 60mg

8119. その他のあへんアルカロイド系麻薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
オキシコドン塩酸塩水和物 (後) オキシコドン錠 2.5mgNX 「第一三共」 (院外) (麻) (毒) Oxycodone (第一三共) 2.5mg/T 【薬価】 47.60 円 / T オキノーム散 2.5mg (麻) (毒) Oxinorm (塩野義) 2.5mg0.5g/包 【薬価】 53.80 円 / 包 オキノーム散 5mg (麻) (毒) Oxinorm (塩野義) 5mg1g/包 【薬価】 111.20 円 / 包	【効】 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】 (内) 1日 10～80mgを4回に分割
オキシコドン塩酸塩水和物 オキシコドン徐放錠 5mgNX 「第一三共」 (麻) (毒) Oxycodone (第一三共) 5mg/T 【薬価】 121.40 円 / T オキシコドン徐放錠 10mgNX 「第一三共」 (麻) (毒) Oxycodone (第一三共) 10mg/T 【薬価】 233.60 円 / T	【効】 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】 (内) 1日 10～80mgを2回に分割

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ヒドロモルフォン塩酸塩 <u>ナルサス錠 2mg</u> ㊞㊟ Narusus (第一三共) 2mg/T 【薬価】 206.60 円 /T	【効】 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】 (内) 1日 4～24mg
ヒドロモルフォン塩酸塩 <u>ナルラピド錠 1mg</u> ㊞㊟ Narurapid (第一三共) 1mg/T 【薬価】 112.60 円 /T	【効】 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】 (内) 1日 4～24mgを 4～6回に分割

82. 非アルカロイド系麻薬

821. 合成麻薬

8211. フェニルピペリジン系製剤

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
ペチジン塩酸塩 <u>ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」</u> (麻) Pethidine hydrochloride (武田) 50mg1mL/A 【薬価】 361.00 円/A	【効】 ①激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮痙。②麻酔前投薬。③麻酔の補助。④無痛分娩 【用】(注) ①1回 35～50mgを皮下注又は筋注。必要に応じて3～4時間ごとに追加。特に急を要する場合には緩徐に静注。②麻酔前 30～90分に50～100mgを皮下注又は筋注。③5%ブドウ糖注射液又は生理食塩液で、1mL当り10mgを含有するように希釈し、10～15mgずつ間欠的に静注。場合により50mgまで増量することもある。④子宮口二横指開大ないし全開時に、70～100mgを皮下注又は筋注。必要に応じて3～4時間ごとに35～70mgずつ1～2回追加する。この場合、母体及び胎児の呼吸抑制を防ぐために、ペチジン塩酸塩100mgに対してレバロルファン酒石酸塩1mgの投与比率で混合注射するとよい

8219. その他の合成麻薬

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェンタニルクエン酸塩 <u>イーフェンバツカル錠 50μg</u> (麻)(商) E-fen (大鵬) 50μg/T (フェンタニルとして) 【薬価】 485.00 円/T	【効】 強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛 【用】(内) 1回の突出痛に対して、50又は100μgを開始用量とし、上顎臼歯の歯茎と頬の間で溶解させる。用量調節期に、1回50μg, 100μg, 200μg, 400μg, 600μg, 800μgの順に段階ずつ調節し、至適用量を決定。用量調節期に1回の突出痛に対して1回50～600μgのいずれかの用量で十分な鎮痛効果が得られない場合には、投与から30分後以降に同一用量までの本剤を1回のみ追加投与可。至適用量決定後の維持期には、1回の突出痛に対して至適用量を1回投与することとし、1回用量の上限は800μg。用量調節期の追加投与を除き、前回の投与から4時間以上の投与間隔をあげ、1日当たり4回以下の突出痛に対する投与にとどめること
フェンタニルクエン酸塩 <u>後フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」</u> (麻)(商) Fentanyl (テルモ) 0.1mg/A 【薬価】 242.00 円/A 【先発品】 フェンタニル注射液 0.1mg「第一三共」	【効】 ①全身麻酔、全身麻酔における鎮痛。②局所麻酔における鎮痛の補助。③激しい疼痛(術後疼痛、癌性疼痛など)に対する鎮痛 【用】(注) ①[バランス麻酔に用いる場合] 麻酔導入時: 1.5～8μg/kg(本剤として0.03～0.16mL/kg)を緩徐に静注するか、又はブドウ糖液などに希釈して点滴静注。麻酔維持: ブドウ糖液などに希釈して、次記1)又は2)により投与。1) 間欠投与: 25～50μg(本剤として0.5～1mL)ずつ静注。2) 持続投与: 0.5～5μg/kg/時(本剤として0.01～0.1mL/kg/時)で点滴静注。[大量フェンタニル麻酔に用いる場合] 麻酔導入時: 20～150μg/kg(本剤として0.4～3mL/kg)を緩徐に静注するか、又はブドウ糖液などに希釈して点滴静注。麻酔維持: 必要に応じて、ブドウ糖液などに希釈して、20～40μg/kg/時(本剤として0.4～0.8mL/kg/時)の速さで点滴静注。小児: [バランス麻酔又は大量フェンタニル麻酔に用いる場合] 麻酔導入時: 1～5μg/kg(本剤として0.02～0.1mL/kg)を緩徐に静注するか、又はブドウ糖液などに希釈して点滴静注。大量フェンタニル麻酔に用いる場合は、100μg/kg(本剤として2mL/kg)まで投与可。麻酔維持: 1～5μg/kg(本剤として0.02～0.1mL/kg)ずつ間欠的に静注するか、又はブドウ糖液などに希釈して点滴静注。② 1～3μg/kg(本剤として0.02～0.06mL/kg)を静注。③[静脈内投与の場合] 術後疼痛: 1～2μg/kg(本剤として0.02～0.04mL/kg)を緩徐に静注後、1～2μg/kg/時(本剤として0.02～0.04mL/kg/時)の速さで点滴静注。癌性疼痛: 1日0.1～0.3mg(本剤として2～6mL)から点滴静注を開始。患者の症状に応じて適宜増量。[硬膜外投与の場合] 単回投与方法: 1回25～100μg(本剤として0.5～2mL)を硬膜外腔に注入。持続注入法: 25～100μg/時(本剤として0.5～2mL/時)の速さで硬膜外腔に持続注入。[くも膜下投与の場合] 単回投与方法: 1回5～25μg(本剤として0.1～0.5mL)をくも膜下腔に注入

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
フェンタニルクエン酸塩 <u>⑧</u> フェンタニルクエン酸塩 1日用 テープ 1mg 「第一三共」 ⑧ Fentanyl citrate (第一三共) 1mg/枚 【薬価】 240.10 円/枚 【先発品】 フェントステープ 1mg <u>⑧</u> フェンタニルクエン酸塩 1日用 テープ 2mg 「第一三共」 ⑧ Fentanyl citrate (第一三共) 2mg/枚 【薬価】 464.40 円/枚 【先発品】 フェントステープ 2mg <u>⑧</u> フェンタニルクエン酸塩 1日用 テープ 4mg 「第一三共」 ⑧ Fentanyl citrate (第一三共) 4mg/枚 【薬価】 864.00 円/枚 【先発品】 フェントステープ 4mg <u>⑧</u> フェンタニルクエン酸塩 1日用 テープ 8mg 「第一三共」 (院内) ⑧ Fentanyl citrate (第一三共) 8mg/枚 【薬価】 1,616.50 円/枚 【先発品】 フェントステープ 8mg	【効】 非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記疾患における鎮痛（但し、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合には限る.）：中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛 【用】 (外) オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用. 胸部, 腹部, 上腕部, 大腿部等に貼付し, 1日（約 24 時間）毎に貼り替えて使用. 初回貼付用量は本剤貼付前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法・用量を勘案して, 1mg, 2mg, 4mg, 6mgのいずれかの用量を選択
フェンタニルクエン酸塩 <u>⑧</u> フェントステープ 0.5mg ⑧ Fentos (久光) 0.5mg/枚 【薬価】 266.70 円/枚 <u>⑧</u> フェントステープ 1mg ⑧ Fentos (協和キリン) 1mg/枚 【薬価】 491.30 円/枚 <u>⑧</u> フェントステープ 2mg ⑧ Fentos (協和キリン) 2mg/枚 【薬価】 914.40 円/枚 <u>⑧</u> フェントステープ 4mg ⑧ Fentos (協和キリン) 4mg/枚 【薬価】 1,701.50 円/枚	【効】 〈成人〉非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記疾患における鎮痛（ただし、慢性疼痛は他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合には限る.）：中等度から高度の疼痛を伴う各種癌, 中等度から高度の慢性疼痛. 〈小児〉非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛（ただし、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合には限る.）：中等度から高度の疼痛を伴う各種癌 【用】 (外) 成人：胸部, 腹部, 上腕部, 大腿部等に貼付し, 1日（約 24 時間）毎に貼り替えて使用. 初回貼付用量は本剤貼付前のオピオイド鎮痛剤の治療有無により, 次記のとおり選択. その後の貼付用量は患者の症状や状態により適宜増減. 〈がん疼痛〉貼付前にオピオイド鎮痛剤を使用していない場合, 0.5mgより開始. 他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合, 貼付前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法及び用量を勘案して, 0.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mgのいずれかの用量を選択. 〈慢性疼痛〉他のオピオイド鎮痛剤から本剤に切り替えて使用. 貼付前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法及び用量を勘案して, 0.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mgのいずれかの用量を選択. 小児：〈がん疼痛〉他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用. 2歳以上に対し胸部, 腹部, 上腕部, 大腿部等に貼付し, 1日（約 24 時間）毎に貼り替えて使用. 初回貼付用量は貼付前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法及び用量を勘案して, 6歳以上の場合は, 0.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mgのいずれかの用量を選択, 2歳以上6歳未満の場合は, 0.5mg, 1mg, 2mgのいずれかの用量を選択. その後の貼付用量は患者の症状や状態により適宜増減

商品名・規格・成分・会社	効能・効果・用法・用量
レミフェンタニル塩酸塩 ㊞ <u>レミフェンタニル静注用 2mg</u> 「第一三共」 ㊞ Remifentanyl (第一三共) 2mg/V 【薬価】935.00 円 / 瓶 【先発品】アルチバ静注用 2mg	【効】 ①成人：全身麻酔の導入及び維持における鎮痛。小児：全身麻酔の維持における鎮痛。②集中治療における人工呼吸中の鎮痛 【用】(注) ①他の全身麻酔剤を必ず併用し、次記用量を用いる。麻酔導入：0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ で持続静注。ダブルルーメンチューブの使用、挿管困難等、気管挿管時に強い刺激が予想される場合、1.0 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 。持続静注開始前に 1.0 $\mu\text{g}/\text{kg}$ を 30～60 秒かけて単回静注できる。気管挿管を本剤の投与開始から 10 分以上経過した後に行う場合には単回静注の必要はない。麻酔維持：0.25 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ で持続静注。全身状態を観察しながら、2～5 分間隔で 25～100% の範囲で加速又は 25～50% の範囲で減速できるが、最大でも 2.0 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ を超えない。浅麻酔時には、0.5～1.0 $\mu\text{g}/\text{kg}$ を 2～5 分間隔で追加単回静注できる。1 歳以上の小児では他の全身麻酔剤を必ず併用し、次記用量を用いる：0.25 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ の速さで持続静脈内投与。投与速度については、患者の全身状態を観察しながら、2～5 分間隔で 25～100% の範囲で加速又は 25～50% の範囲で減速できるが、最大でも 1.3 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ を超えない。浅麻酔時には、1.0 $\mu\text{g}/\text{kg}$ を 2～5 分間隔で追加単回静脈内投与することができる。②成人には、0.025 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ の速さで持続静注を開始し、患者の全身状態を観察しながら、適切な鎮痛が得られるよう、投与速度を適宜調節。投与速度の調節は 5 分以上の間隔で、0.1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ までは最大 0.025 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ ずつ加速又は減速させ、0.1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ を超える場合は 25～50% の範囲で加速又は最大 25% の範囲で減速させるが、投与速度の上限は 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 。投与終了時は、10 分以上の間隔で、最大 25% ずつ減速させ、0.025 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ を目安として投与終了

採用中止一覧

商品名	規格	病院区分	削除年月
アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1m l 1個	院内	削除(2024.01)
アカルボースOD錠50mg「NIG」	50mg/T		削除(2023.10)
アジスロマイシン錠250mg「NP」	250mg/T		削除(2024.05)
アジスロマイシン錠250mg「日医工」	250mg/T		削除(2023.08)
アジルバ錠40mg	40mg/T		削除(2023.08)
アセトキープ3G注	500mL/ソフトバツク		削除(2024.01)
アタバニン散	50mg/g	院外	削除(2024.05)
アテノロール錠25mg「NikP」	25mg/T		削除(2023.10)
アテノロール錠50mg「NikP」	50mg/T		削除(2023.10)
アデホスコワ腸溶錠60	60mg/T		削除(2023.12)
アピドラ注ソロスター	300単位3mL/キット	院外	削除(2023.06)
アプレース錠100mg	100mg/T	院外	削除(2023.12)
アフロクアロン錠20mg「サワイ」	20mg/錠	院内	削除(2022.07)
アヘンチンキ「第一三共」	0.1g/mL(モルヒネとして1%)		削除(2024.04)
アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」【経過措置】	200mg2mL/A		削除(2024.01)
アンカロン錠100	100mg/T	院外	削除(2024.04)
アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本		削除(2022.07)
イオパミドール300注20mL「FF」	61.24%20mL/瓶		削除(2024.03)
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	61.24%100mL/筒(I:300mg/mL)		削除(2024.04)
イオパミロン注370シリンジ	75.52%65mL/筒(I:370mg/mL)		削除(2023.09)
イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg2mL/A		削除(2024.01)
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	70%30mL/包		削除(2024.01)
インドメタシンゲル1%「日医工」	1%50g/本		削除(2023.11)
エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」	66.7%1.5g/包		削除(2024.03)
エクセラゼ配合錠	1錠		削除(2024.03)
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	60吸入/キット		削除(2024.04)
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」バラ	0.75μg/C		削除(2024.03)
l-メントール「日医工」【経過措置】	25g(ガラス)		削除(2024.04)
塩化カリウム「日医工」【経過措置】	末		削除(2024.05)
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	0.0184%500mL/キット		削除(2024.02)

採用中止一覧

商品名	規格	病院区分	削除年月
オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg 0.5mL/筒		削除(2022.07)
オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg 0.5mL/筒		削除(2022.07)
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg/T		削除(2023.09)
カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」	50単位		削除(2024.03)
カロナール坐剤100	100mg/個		削除(2023.10)
カロナール坐剤200	200mg/個		削除(2023.10)
ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「ニチヤク」	450mg/3mL/Vi		削除(2024.03)
キンダリー透析剤4E	A剤2988.0g/袋・B剤808.5g/袋		削除(2024.01)
クエチアピン錠25mg「サワイ」	25mg/T		削除(2023.08)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	50mg/錠		削除(2023.12)
クラビット錠500mg	500mg/T	院外	削除(2024.05)
クラリス錠200	200mg/T		削除(2024.04)
グリセリン「NikP」	84.0～87.0%500mL/本		削除(2024.03)
ゴナトロピン注用5000単位	5,000単位/V(溶解液付)		削除(2023.12)
コロネル錠500mg	500mg/T		削除(2024.04)
ザイボックス注射液600mg	600mg300mL/袋		削除(2024.05)
ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	10mg2mL/A		削除(2023.09)
シスプラチン注10mg「日医工」	10mg20mL/V		削除(2024.03)
シスプラチン注50mg「日医工」	50mg100mL/V		削除(2024.03)
シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	400mg200mL/袋		削除(2024.02)
シンメトレル細粒10%	100mg/g	院外	削除(2023.09)
シンメトレル錠50mg	50mg/T	院外	削除(2023.09)
シンメトレル錠100mg	100mg/T	院外	削除(2023.10)
スクラルファート内用液10%「日医工」	1g10mL/包		削除(2024.03)
スポンゼル	5cm×2.5cm/枚		削除(2023.12)
スポンゼル	10cm×7cm/枚		削除(2023.12)
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	100mg/g	院外	削除(2023.11)
ゼフナートクリーム2%	2%10g/本		削除(2024.02)
セララ錠50mg	50mg/T		削除(2023.08)
セルセプトカプセル250	250mg/カプセル	院外	削除(2022.12)
セレコキシブ錠100mg「トーワ」バラ	100mg/T 300錠入		削除(2024.03)
セレネース細粒1%	10mg/g	院外	削除(2024.04)

採用中止一覧

商品名	規格	病院区分	削除年月
ソタコール錠40mg	40mg/T		削除(2023.10)
タガメット錠200mg	200mg/T	院外	削除(2023.10)
ダラシンTローション1%	1%20mL/本		削除(2023.09)
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	結晶		削除(2024.01)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) [TJ-126]	2.5g/包	院外	削除(2024.04)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 徐放錠6mg「武田テバ」	6mg/T		削除(2023.09)
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	210mg1.91mL/筒		削除(2024.02)
テリボン皮下注用56.5 μ g	67.9 μ g(テリパラチ ドとして63.3 μ g)/ V		削除(2023.09)
トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/本	院外	削除(2024.04)
トリアゾラム錠0.25mg「テバ」	0.25mg/T		削除(2024.03)
トリセノックス注10mg	10mg/A	院内	削除(2024.03)
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	(0.3mg)7.5cm× 10cm		削除(2023.10)
ニルバジピン錠4mg「武田テバ」	4mg/T		削除(2024.03)
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%5g/本		削除(2024.01)
ノックビン原末	末	院外	削除(2023.09)
ノボラピッド注イノレット	300単位3mL/筒		削除(2023.10)
ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位3mL/筒		削除(2023.09)
ハイカリック液-1号	700mL/袋		削除(2023.10)
ハイカリック液-2号	700mL/袋		削除(2023.10)
パルモディア錠0.1mg	0.1mg/T		削除(2024.02)
ヒシファーゲン配合静注シリンジ 40mL	40mL/筒		削除(2023.10)
ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	100 μ g/瓶	患者限定、 今回限定	削除(2023.10)
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日 医工」	1g/V		削除(2023.10)
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日 医工」	2g/V		削除(2023.10)
ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット		削除(2023.09)
ビリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/V(I: 50mg/mL)		削除(2023.09)
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット		削除(2022.07)
フィナステリド錠1mg「ファイザー」	1mg/T	院外	削除(2024.03)
フェアストーン錠40	40mg/T	院外	削除(2024.01)

採用中止一覧

商品名	規格	病院区分	削除年月
フェブrik錠10mg	10mg/T		削除(2022.07)
フェブrik錠10mg(バラ)	10mg		削除(2022.07)
フェブrik錠20mg	20mg/T		削除(2022.07)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg/枚	院内	削除(2024.04)
フスコデ配合錠	錠		削除(2022.07)
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	20mg1mL/A		削除(2023.10)
プレドネマ注腸20mg	20mg60mL/本		削除(2024.05)
プレバナー13水性懸濁注	0.5mL/筒		削除(2024.04)
プロノン錠150mg	150mg/T		削除(2024.01)
ポビドンヨードゲル10%「明治」	10%4g/本		削除(2024.02)
マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	4.9004g13mL/筒 (37.695%)		削除(2024.04)
ミネプロ錠2.5mg	2.5mg/T		削除(2023.08)
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	2mL/筒		削除(2024.03)
メコバラミン錠500 μ g「SW」	500 μ g/T		削除(2024.01)
メサラジン錠500mg「サワイ」	500mg/T		削除(2024.03)
ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg/T	院外	削除(2024.04)
リファジンカプセル150mg	150mg/cap	院外	削除(2024.04)
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	50万単位/瓶		削除(2024.03)
リルゾール錠50mg「タナベ」	50mg/T		削除(2024.03)
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL/筒		削除(2023.11)
レケンビ点滴静注200mg	200mg/2mL/瓶		削除(2024.02)
レケンビ点滴静注500mg	500mg/5mL/瓶		削除(2024.02)
レベミル注イノレット	300単位3mL/筒		削除(2023.10)
ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g/本		削除(2022.07)
ロペラミド錠1mg「EMEC」	1mg/T		削除(2024.02)
ロルカム錠4mg	4mg/T		削除(2023.09)